


續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

上海古籍出版社

一〇〇三・子部・醫家類

成方切用十二卷首一卷末一卷（卷六至卷十二）……〔清〕吳儀洛撰……一
串雅八卷（內編四卷外編四卷）……〔清〕趙學敏撰……一八三
醫方論四卷……〔清〕費伯雄撰……三四五
潛齋簡效方不分卷……〔清〕王士雄撰……四二五
瘴瘧指南二卷……〔明〕鄭全望撰……四六一
重刻張鳳逵傷暑全書二卷……〔明〕張鶴騰撰〔明〕彭期生輯……四九九
瘟疫明辨四卷方一卷……〔清〕鄭奠一撰……五四七
廣瘟疫論四卷末一卷……〔清〕戴天章撰……六〇九
痧脹玉衡書三卷後一卷……〔清〕郭志邃撰……六六三

卷六上　祛風門　正方七十一　附方一十二
倭氏黑散　風引湯　防已地黃湯　礬石湯　頭風摩散
方　桂枝芍藥知母湯　烏頭湯　礬石湯　朮
附湯　越婢加朮湯　小續命湯　麻黃續命湯　桂枝續命湯　葛根續命湯　附子續命湯　桂
白虎續命湯　附續命湯　千金大續命湯　羌活連翹續命湯　錄驗續命湯
芪湯　地黃飲子　天麻丸　豨薟
丸　活絡丹　三生飲　牽正散　改容膏　蠲痺湯
成方切用　風　胃風湯　東垣胃風湯　解風散　愈風丹　清空膏　消
正吾散　二丹丸　排風湯
風散　轉舌膏
涼膈散　清心散　滌痰湯　方見除痰門　稀涎散　竹
瀝湯　貝母瓜蔞散　青州白丸子　星附散
治風六合湯　方見血門　方見理門　三聖散　加味六君子湯
薏苡仁湯　人參補氣湯　烏頭粥　桂枝五物
湯　方見表散門　十味剉散　通痺散　史國公藥酒方
三因白散子　獨活湯　防風通聖散　方見表裏門
祛風至寶丹　方見表裏門　獨活寄生湯　羌活續斷湯　資壽解
語湯　不換金丹　搜風順氣丸　順風勻氣散
攝生飲　調蘇合丸　烏藥順氣散　八味順氣
散　通頂散　瀉青丸　舒筋保安散　加味羚
羊角散　如聖飲　土中下通用痛風方　三化
湯　方見下門　攻　血痺湯　三痺湯　千金地黃湯　烏
梅擦牙關方　許胤宗方　王克明方　清震湯

吳氏醫學述第四種

武原吳儀洛遵程輯　門人周蘭九生庭　男　有榆蒼培同較　有杜僖望

成方切用

祛風門六氣風淫爲首故風病最多其淺而在皮毛則爲傷風其久而留於腠理痰瘧瘅其最重而入於腑臟則爲中風內經風痺痙痓厥四證各有專論獨風論中泛論中風惟曰風中五臟六腑之俞及雜風至善也後人以無所屯則爲偏風亦爲腑臟之風各入其門戶所屯則爲偏風不過兩述其狀而已趙仲景金匱書表章先聖語語金針尤有端緒之可求矣仲景以後英賢輩出方書充棟何反漫無取裁坐令中風一證鮮盡一之旨治之百無一効如劉河間則主火名風訓是火名風入火爲本而風爲標矣李東垣則主氣爲訓是氣名風入氣爲本而風爲標矣朱丹溪則主痰爲訓是痰名風入痰爲本而風爲標矣張景岳則以非風二字易中風二字其見雖超然豈無外邪乘虛而入以致卒倒者乎喻嘉言曰此證陽虛邪害空竅爲本而風從外入者必挾身中素有之邪或氣或痰或火而爲標也蓋風爲陽邪入身衛外之陽不固陽邪乘陽尤爲易入即如偏枯不仁要皆陽氣虛餒不能充灌所致中風卒倒其陽虛更審設非陽虛其人必輕矯使提何得卒倒耶要知風性善走空竅陽虛則風邪入臟腑此惟離照常空羣邪始得中之陽不治風必不出矣中風門中大小續命湯及六經加減法雖曰治風依然後人之法也金匱取古今錄驗續命湯治風痱之身無痛而四肢不收者仲景所重原不在此所重維何則驅風之中兼填空竅爲第一義也空竅一有實邪則風出而不復入其病膠矣古方中有侯氏黑散深得此意仲景取爲主方隨製數方輔其未備乃遵內經久塞其空之意也後人以無所屯之風之初治其表裏風邪非不外出而重矣

侯氏黑散　治大風四肢煩重心中惡寒不足者外臺用治風癩

菊花四十分　白朮　防風十分　桔梗八分　黃芩五分　人參　茯苓　當歸　川芎　乾薑　桂枝　細辛

牡蠣　礬石三分　十四味杵爲散用溫酒調方寸七日三服二十日再冷食服四十日禁一切魚肉大蒜共六十日止即藥積腹中不下熱食即下矣冷食自能助藥力

此爲中風家挾寒而未變熱者治法之準則也謂風從外入挾寒作熱此爲大風證見四肢煩重豈非四肢爲諸陽之本爲邪所薄而陽氣不運乎然但見於四肢不獨愈體重不勝乎證又見心中惡寒不足豈非漸欲陵心乎然燥熱猶

未乘心。不猶愈於不識人乎。故用參苓歸芪補其氣血爲君。菊花白朮牡蠣養肝脾腎爲臣。而加防風桂枝以行痺着之氣。細辛乾薑以驅內伏之邪。兼桔梗黃芩以開提肺熱爲佐。礬石所至卻溼解毒。收澀心氣。酒力運行周身爲使。且必爲散酒服至六十日止。又常冷食。使藥積腹中。不下壅塞胸中之空竅。而邪可不復入。內經所謂塞其空竅。是爲良工之理也。嘉言曰。仲景制方。皆原心獨創。乃於中風證首引此散。豈非淺服其長乎。至於驅風補虛。誰不能之。至於驅之補之。其間多有不能者。以其堵截之法。則非思議可到。方中取之之屯行其堵截之法。則非思議可到。方中取用礬石。以固濟諸藥。使之留積不散。以漸填其空竅。眼之日久。風自以漸而熄。所以初服二十日。不得不用溫酒調下。以開其痺着。以後則禁諸熱食。惟宜冷食。如此再四十日。則藥積腹中不下。而空竅填矣。空竅填則舊風盡出。新風不受。矣。是礬性得冷。即止。得熱。即行。故囑云熱食即下矣。冷食自能助藥力。抑何用意之微耶。

風引湯 金匱

治大人風引癲癎。小兒驚癎癇癡。日數十發。

龍骨四兩　牡蠣四兩　甘草二兩　桂枝三兩　寒水石　滑石　赤石脂　白石脂　紫石英　石膏六兩　乾薑一兩　大黃二兩

十二味杵粗篩以薑囊盛之取三指撮井花水三升煮三沸。溫服一升。

風邪內幷則火熱內生。五臟亢盛。逆歸於心。故風引湯用礬石。以固濟諸藥。使之留積不散。以漸填其空竅。眼之日久。風自以漸而熄。所以初服二十日。不得不用溫酒調下。以開其痺着。以後則禁諸熱食。惟宜冷食。如此再四十日。則藥積腹中。不下。而空竅填矣。空竅填則舊風盡出。新風不受。矣。是礬性得冷。即止。得熱。即行。故囑云熱食即下矣。冷食自能助藥力。抑何用意之微耶。

風引湯治大人風引癲癎。小兒驚癎癇癡。日數十發。

嘉言曰。風者。外司厥陰。內屬肝木。上隸手經。下隸足經。中見少陽相火。所以風自內發者。由火熱而生也。風生必挾痰。痰生必害中土。土主四肢。土病則四末不用。聚涎成痰。癱瘓者。以風火挾痰注於四肢故也。觀金匱此方。可見非退火。則風不熄。非散風。則風復生。風火一熾。則五神無主。故莫用藥如是之周到也。又曰。侯氏黑散。顧主補虛。此方兼主清熱。火熄。其風明此以治風之入臟者。游刃有餘。而後世以爲石藥過多。舍之不用。而用臟躁以散其真氣。花蛇以增其惡。毒智耶。愚耶。吾不解矣。忌可曰。河間謂風病多因熱甚。良由肺息火亢。虛衰不能制之。則陰虛陽實。而熱氣怫鬱。心神昏冒。筋骨不用。而幸倒無知。多因喜怒悲憂恐

方志過極。此最確之論。但云全無外風。未免太偏。不知熱能生風。風亦能生熱。故仲景既云脈微而數。中風。使然。此偏中外風者也。又以寸口脈遲而緩。亦為中風之脈。然又以寸口脈緩則為亡血。謂本氣先自病而外風因之也。脈緩則為中風。謂風強則然。而以遲入內者也。下則出風引湯方。而方名全主於風。以風為陽邪。故熱也。則知從亡血來。是熱能生熱。又助之也。從中風來。是風能生熱。以濇津液而痰涎壅腦也。是洞悉主熱之論。仲景早引其端緒。但不專主於熱。謂實有陽虛而外邪入之。為牽制。為偏枯。為筋急拘攣者也。若肺熱因而傳入五臟。為昏惑瘛瘲。脅悶暴瘖皆屬於火。為四肢不收。舌本強。足痿不收。疾誕有聲。皆屬於土。悉是逆熱之病。與中風之虛多寒多。皆為中風之理。全不相涉矣。按黑散風引二湯。喻氏以為仲景墜方。而後人地黃飲子。屢用於此。實祖於此。

治病如狂狀妄行獨語不休無頭風摩散方　全匱

大附子　炮　鹽　等分

為散沐了。以方寸七以摩頭風乃偏着之病。故以附子劫之。鹽清其邪。

桂枝芍藥知母湯　全匱　治諸肢節疼痛身體厥冷腳腫如脫頭眩短氣溫溫欲吐

桂枝芍藥知母湯

生薑　五兩　桂枝　白朮　知母　防風　四兩　芍藥　三兩

附子　炮　麻黃　甘草　二兩　九味以水七升煮取二升溫服七合日三服

此類歷節病。由風濕外邪而兼脾腎俱虛之方也。謂諸肢節疼痛。濕邪關節也。因而身體羸弱所痛則厥冷。濕從下受。亦或自上注之。總是濕滯。必氣湧氣湧必

防己地黃湯　全匱　治病如狂狀妄行獨語不休

奧孰其脈浮。

桂枝　防風　分　防己　甘草　分　以酒一杯漬之一宿絞取汁生地黃二斛咬咀蒸之如斗米飯久以銅器盛其汁更絞地黃汁和分再服

此亦風之進入於心者也。風升必氣湧氣湧必

喜歸下。故腳腫如脫。腎虛挾風故頭眩。衛氣於下。焦腎元既虧。三焦無主。致太陽與陽明相乘。制爲病。故胃氣欲下。行而太陽挈其氣在上。太陽欲上。行而胃澁相搏。不利。故短氣溫溫欲吐。用桂枝湯去棗加麻黃以助其通陽。加白朮防風以伸脾氣。加知母附子以調其陰陽。謂欲制其寒則上之鬱熱已甚。欲治其熱則下之腎陽已痺。故並加之爾

烏頭湯 金匱　治病歷節不可屈伸疼痛。亦治腳氣疼痛不可屈伸

烏頭 五枚 咀 以蜜二升煎取一升 即出烏頭　甘草 炙　黃耆　芍藥 各三兩　麻黃 三兩　將後四味咬咀。以水三升煮取一升去滓。內蜜煎中更煎之。服七合。不知。盡服之

升去滓。內蜜煎中更煎之。服七合。不知。盡服之

歷節病。即行痺之屬也。乃濕從下受。挾風流注故或足腫而必發熱。且更不可屈伸而疼痛。故以甘芍和陰。麻黃黃耆通肌肉之陽氣。而散川烏之迅發。以行其痺者

礬石湯 金匱　治腳氣衝心。此亦因風而自下而上也。按陽明主肉。麻黃六兩　白朮 四兩　甘草

礬石 二兩　以漿水一斗五升。浸腳良。礬石收澁。解毒。故以之爲外治。然至衝心。亦能治之。蓋腳氣而至衝心。皆由腎水挾腳氣以陵心。得礬石之卻水。而勢自不能相陵。所以有護心之功也

附子湯 近効　治風虛頭重眩苦極不知食味。痠胝補中。益精氣

附子 一枚 半炮去皮　甘草 炙　白朮 一兩　煨薑五片。棗一枚。水盞半。煎七分。去滓。溫服　三味。對每五錢

腎氣空虛。風邪乘之。漫無出路。風挾腎中濁陰之氣。厥逆上攻。故頭重眩苦至極。兼以胃氣亦虛。不知食味。此非輕揚風劑可愈。故用附子痠其水臟。白朮甘草痠其土臟。水土一痠。猶之冬月井中水土。既暖陽和之氣。即以立復。而濁陰之氣。不驅自下矣

越婢加朮湯 千金　治內熱極。則身體津脫。腠理開汗大泄。厲風氣下。焦腳弱

石膏 半斤 劬　麻黃 六兩　白朮 四兩　甘草 二兩　生薑 二兩　大棗 十五

枚　六咳以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥
煮取三升分溫三服　惡風加附子一枚
此治風極變熱之方也謂風勝則熱勝以致內
熱極而汗多將必津脫津脫而表愈虛則腠理
不能復固汗泄不已將必大泄風入營爲厲內
經曰厲者有營氣熱附今風入營爲熱卽是厲
風氣矣蓋風勝氣浮下焦本虛至厥陽獨行而
濁陰不降無以養陰而陰愈虛則下焦腳弱故
以麻黃通痺氣石膏清氣分之熱薑棗以和營

衛甘草白术以理脾家之正氣汗多而用麻黃
類白术之扶正石膏之養陰以制之故曰越婢
加术湯所謂用人之勇去其暴也汗大泄而加
惡風卽須防其亡陽故加附子。方內麻黃用根
薑用炮薑爲是

小續命湯千金　治中風不省人事神氣憒亂半身
不遂丹溪曰左半身不遂屬血虛卑痿血虛屬氣虛與痰以四
物湯加桃仁紅花薑汁竹瀝右半身不遂屬氣虛與痰以四
君子湯加竹瀝薑汁。筋急拘攣口眼㖞斜語言
蹇澀風邪腰痛疼痛爽快併多六經中風及剛柔二
痙痙者項背強直手足反張也傷風有汗爲柔
痙以風能散氣也傷寒無汗爲剛痙以寒能

泉穴在舌下竅通於腎津液之所出也。

防風一錢二分　桂枝　麻黃　杏仁去皮尖炒研　白芍酒炒　人參　甘草炙　黃芩酒炒　防己八分　附子四分炮去皮臍　芎藭酒洗

每服三錢加薑棗煎　筋急語遲脈弦者倍
人參加黃芪當歸去芍藥以避中寒煩躁不大
便去桂附倍芍藥加竹瀝日久不大便胸中不
快加大黃枳殼臟寒下痢去防己黃芩倍附子
加白术嘔逆加半夏語言蹇澀手足戰掉加石
菖蒲竹瀝身痛發搐加羌活口渴加麥冬花粉

煩渴多驚加犀角羚羊角汗多去麻黃杏仁加白朮口燥去桂附加石膏

此六經中風之通劑也鶴皐曰麻黃杏仁麻黃湯也治太陽傷寒桂枝芍藥桂枝湯也治太陽中風此中風寒有表證者所必用也人參甘草補氣川芎芍藥補血此中風寒血虛者所必用也風淫故主以防風挾溼佐以防已挾寒佐以附子挾熱佐以黃芩病來雜擾故藥亦兼該六經混淆弊少陽厥陰或肢節攣急或痲木不仁或雖多亦奚以爲

浮濇兼火則盛大兼陽虛則脈鼓兼陰虛則脈滑爲頭痛鼓選爲營衛衰然虛浮選數正氣不足尚可補救急大數疾邪不受制必死無疑然數大未至急疾尚有不死者又日世傳中風之人每遇外風一發宜進續命湯以藥之殊爲不然風勢纔定更用續命湯重引風入是除蛇足也惟用其寒藥類熱服俾內不名風外無從入之路且其寒一可息風二可補虛三可久服何樂不用耶保命集曰藏府陰陽不能言冒昧不知治宜麻黃湯小續命湯汗之謂有表邪縮於內當散風藥爲制更可知矣又曰厥陰風邪入腑則身體不能自收持或拘急不得轉側內之營衛痺而口不能言冒昧不知痛處亦言曰痺即痺之別名也風入而痺其營衛即身體不能自收持或拘急不得轉側也然營衛有虛有實虛者自內傷得之實者自外感得之此方則治外感之痺其營衛者故以得小汗爲貴熱已變越汗之制而加芎歸蓋血人參益氣矣其內傷而致營衛之痺者於補氣血藥爲制更可知矣

名桂枝續命湯治太陽中風有汗惡風去附子加石膏知母名白虎續命湯治陽明中風無汗身熱不惡寒加葛根倍桂枝黃芩名葛根續命湯治陽明中風身熱有汗不惡風倍附子加乾薑甘草名附子續命湯治太陰中風無汗身涼倍桂附甘草名桂附續命湯治少陰中風有汗無熱加羌活連翹名羌活連翹續命湯治中風六經混淆弊少陽厥陰或肢節攣急或痲木不仁玉機微義曰此方無分經絡不辨寒熱虛實雖多亦奚以爲哉治分六經庶乎合法

去防風防已附子白芍加當歸石膏即古今錄驗續命湯治中風痺身體不能自收持或拘急不得轉側內之營衛痺而口不能言冒昧不知痛處亦言曰痺即痺之別名也風入而痺其營衛者自內傷得之實者自外感得之此方則治外感之痺其營衛者故以得小汗爲貴熱已變越汗之制而加芎歸蓋血人參益氣矣其內傷而致營衛之痺者於補氣血藥爲制更可知矣

加乾薑黃芩竹瀝即千金大續命湯通治五臟偏枯賊風

錄驗方去人參

大秦艽湯機要　治中風手足不能運掉舌强不能言語風邪散見不拘一經者

秦艽　石膏三兩　當歸酒洗　白芍酒炒　川芎　生地酒洗　熟地　白朮土炒　茯苓　甘草炙　黃芩酒炒　防風　羌活　獨活　白芷一兩　細辛五錢　每服一兩　雨溼加生薑棗加知母心下痞加枳殼

此亦六經中風之通劑也中風虛邪也曰而不去其病則實故用驅風養血之劑兼而治之以秦艽爲君者以其主宰一身之風石膏所以去

胃中總司之火羌活去太陽百節之風邪責之細爲諸風藥中之軍卒三陽數變之風邪責之辛三陰內淫之風溼責之苓朮去厥陰經之風則有川芎去陽明經之風則有白芷風熱干乎氣清以黃芩風熱干乎血涼以生地獨活療風溼在足少陰甘草緩風邪上干於肺用當歸熱地芍藥者所以養血於疏風之內以滋風藥之燥也

此少陰氣厥不至名曰風厥當溫之

附子炮宜桂

熟地　巴戟去心　萸肉　蓯蓉酒洗　附子炮　官桂　石斛　茯苓　石菖蒲　遠志　麥冬　五味等分每服五錢入薄荷少許薑棗煎

熟地以滋根本之陰巴戟蓯蓉官桂附子以返真元之火石斛安脾而祕氣山萸溫肝而固精

菖蒲遠志茯苓補心而通腎臟麥冬五味保肺以滋水源使水火相交精氣漸旺而風火自息矣

醫貫曰治中風當以真陰中之水虛有陰虛有火虛火虛者專以河間地黃飲子爲主水虛者宜九爲主果是水虛平熱之藥與參者之品俱不可加減惟火盛制金不能平木而風木益甚甚而陰失守孤陽飛越若非佳附何以追復其散失之元陽其痰逆上湧者非佳附何以引火歸元水不歸元也而赤頰渴者火不歸元也惟桂附能引火歸元水火既歸其元則水能生木木不生風而風自息矣按腎氣厥不至舌下乃臟真之氣不上榮於舌本爾至其濁陰之氣必橫格於喉舌之間吞咯維艱甚至其濁陰之氣必橫格於喉舌之間吞咯維艱甚而非佳附何以追復其散失之元陽其痰逆上湧者非佳附何以引火歸元水不歸元也而赤頰渴者火不歸元也惟桂附能引火歸元水火既歸其元則水能生木木不生風而風自息矣

方者不可執已見而輒去之也。

天麻九 易老　養血祛風壯筋骨

天麻祛風牛膝強筋二味用酒同浸二日焙乾用　萆薢祛風濕強筋骨玄參各六兩杜仲七兩使筋骨相着當歸十兩和血生地筋益眞陰羌活十兩去骨節風附子炮一兩行經蜜丸一方有獨活五兩

此方大意主治腎熱生風其以天麻入牛膝同製取其下達倍用當歸地黃生其陰血萆薢玄參清下焦之溼熱附子補下焦之眞陽蓋唯腎

中陽虛故風得以久據其地也用羌活之獨本者即眞獨活不必更加也吁嗟多慾之人兩腎空虛有如烏風洞慘慘黯黯漫無止期環視風門諸藥有一能勝其病者乎此方雜在羣方內未易測識特表而出之劉宗厚曰秦艽湯愈風湯雖皆有補血之藥而行經散風之劑居其大半將何以養血而益筋骨也天麻丸養血肚筋骨庶幾近理。

豨薟丸 張詠　治中風手足不仁日久不愈經絡中有風痺由於脾腎兩虛陰血不足不由風溼而得溼痺死血腿臂間忽有一二點痛者亦忌服之唐成訥有進豨薟表宋張詠進豨薟丸表云其草金稜銀線素莖紫莖節葉相對頗類蒼耳臣嘗積至千服鬚髮烏黑筋力輕健效驗多端。

豨薟能驅風散溼行大腸之氣然風藥終燥若

諸瘡

豨薟草　以五月五日七月七日九月九日採

者佳不拘多少揀去粗筋雷枝葉花實蒸曬九次蜜丸　豨薟辛苦氣寒其味蒸臭必蒸曬九次加以酒蜜則苦寒之陰濁盡去而清香之美味見矣數不至九陰濁尚在不能透骨驅風而御病也。嘉言曰豨薟者豬也其畜屬亥乃風木所生之始取用其葉以治風凡腎臟生風之證服此其效最著其妙處全在氣味之薟劣與腎中之腥臊同氣相求故能入腎而助其驅逐陰風之力也因治腎風之方百不得一特錄此丸合前天麻丸兩發其義也。

括絡丹 治中風手足不仁日久不愈經絡中有風痺由於脾腎兩虛陰血不足不由風溼而得溼痺死血腿臂間忽有一二點痛者亦忌服之唐成訥有進豨薟表宋張詠進豨薟丸表云其草金稜銀線素莖紫莖節葉相對頗類蒼耳臣嘗積至千服鬚髮烏黑筋力輕健效驗多端。

川烏炮去皮　草烏炮去皮　膽星六兩　地龍即蚯蚓去泥洗焙乾　乳香　沒藥另研三兩　酒丸酒下

膽星辛烈所以燥溼痺二烏辛熱所以散寒溼蚯蚓溼土所生欲其引烏星直達溼痺所結之

處大易所謂同氣相求也風邪注於肢節久則血脈凝聚不行故用乳香沒藥以消瘀血（乳香活血能去風伸筋沒藥能散瘀血生新血二藥並能消腫止痛故每相須而行）

三生飲　治中風卒然昏憒不省人事痰涎壅盛語言蹇澁等證（東垣曰中風非外來風邪乃本氣自病也凡人年踰四旬氣衰之際或憂喜忿怒傷其氣者多有此證壯歲之時無有也若肥盛者則間有之亦是形盛氣衰而如此例。）

生南星（兩）生川烏（去皮）生附子（去皮臍）木香（二錢）

每服一兩加人參一兩煎

南星辛熱散風除痰附子重峻溫脾逐寒烏頭輕疏溫脾逐風二藥通行經絡無所不至皆用生者取其力峻而行速也重加人參所以扶其正氣少佐木香所以行其逆氣也（醫貫曰觀東垣之論當以氣虛爲主縱有風邪亦是乘虛而襲經曰邪之所湊其氣必虛是也當此之時豈容常藥頓能通達於上下哉愈以三生飲一兩加人參一兩煎服即愈此乃行經治痰之劑斬關搴旗王之將必用人參兩許駕馭其邪而補助真氣若則不惟無益適以取敗觀先哲參者參附其義可見若遺尿手散曰開鼻新爲不治然服前藥多有生者。）粉嘉言曰瞤陽必加陰藥一二味制其僭熱經絡之義又當如是并宜導之藥。

牽正散（直指方）　治中風口眼㖞斜（足陽明之脈俠口環脣足太陽之脈起於目內眥陽明內蓄痰熱太陽外中於風故牽急而不及則金化緩短乘之木爲金乘則木寡於長故口眼㖞斜也。又風生焉耳鼻常靜故風息焉。）

白附子　殭蠶　全蠍　等分爲末每二錢酒調

吳鶴皐曰凡防之屬可以驅外風而內生之風非其治也肝有熱則自生風與外感之風不同星夏之屬足以治痰而風虛之痰非其治也三藥療內生之風

治虛熱之痰得酒引之能入經而正口眼又曰白附辛可驅風能去頭面遊風殭蠶鹹能軟痰（屢試清化輕浮能走頭面驅風散痰全蠍面走厥陰爲治風要藥）辛中有熱（凡藥辛者必熱）可使從風鑽蠍有毒可使破結藥有用熱以攻熱用毒以攻毒者大易所謂同氣相求內經所謂寒之以其屬也

附改容音琶麻子一兩冰片三分共搗爲膏寒月加乾薑附子（各一錢）左畜貼右右畜貼左即正或用鱔魚血或用蜣螂搗敷亦良蓋三物皆追風接

毒之品也

蠲痺湯 嚴氏　治中風身體煩痛項背拘急手足冷痺腰膝沉重舉動艱難諸證皆因營衛虛而風邪乘之也營虛則不用不仁衛虛則不知痛癢也皮膚不知痛癢也不用運動也岐伯曰中風大法有四一曰偏枯半身不遂也二曰風痺身無疼痛四肢不收也三曰風痺惡寒忽不知人也四曰風痺諸痺類風狀也蓋言曰雖相類實有不同風則陽先受之爾致痺之因曰風曰寒曰濕雜合非可分屬但以風氣勝者爲行故也以寒氣勝者爲痛寒主收急故也以濕氣勝者爲痺濕主重滯故也

黃耆 炙蜜酒洗 當歸酒洗 赤芍酒炒 羌活 防風 甘草炙 加薑棗煎

片子薑黃酒炒 辛能散寒風能勝濕防風羌活除濕而疏風氣通則血活血活則風散黃耆炙草補氣而實衛血中之氣能入手足而祛寒濕也準繩曰凡風痺偏枯不因眞氣不周而病者也治之不用黃耆爲君人參歸芍爲臣防風桂枝鈎藤荊瀝竹瀝薑汁韭汁梨汁乳汁之屬爲佐而徒雜沓乎烏附羌獨以調營而耗衛如此死者醫殺之也

胃風湯 易老　治風冷乘虛客於腸胃飡泄注下完穀不化及腸風下血又治風虛能食牙關緊閉手足瘛瘲肉脣面腫名曰胃風

人參 白朮 土炒 茯苓 當歸 川芎 白芍 桂 等分加粟米百餘粒煎

胃風者胃虛而風邪乘之也風邪傷於陽氣胃虛則陰血不足故用參朮茯苓以固脾氣而益衛土故用參朮茯苓以固脾氣而益衛當歸川芎以養肝血而調營芍藥瀉肝而能和脾肉桂散風而能平朮木也朮得桂而枯制其木也其朮即死文辛能散風玉機微義曰此方名治風而實非治風乃補血和血益胃之藥血病而挾濕者實可倚仗。

東垣胃風湯 白芷升麻 各一錢 麻黃不去節 葛根 各一錢五分 加薑棗煎

柴胡羌活藁本蒼朮蔓荊草蒺藜黃檗當歸炙草 各五分

加薑棗煎亦治胃風證胸膈中何以反能食蓋此即十全湯去黃耆地黃甘草

解風散 治風成寒熱頭目昏眩肢體疼痛手足痲痺上膈壅滯

人參 兩半 麻黃二兩 川芎 獨活 細辛 甘草一兩 爲細末每五錢水盞半生薑五片薄荷葉少

許頭八分不拘時服
按風成爲寒熱乃風入胃中而釀營衛之偏勝前胃風湯正驅胃風使從外解之藥此因風入既久胃氣致虛故以人參爲君臣以麻黃川芎佐以獨活細辛使以甘草而和其營衛乃可收其外解之功也若夫久風成爲淫泄則風已入於裏又當用人參爲君桂枝白朮爲臣茯苓甘草爲佐使而驅其風於內此表裏之權衡內經之旨要也本方雖用風成寒熱四字漫無着落

今併及之

愈風丹　治諸風證偏正頭痛防風通聖散四物湯黃連解毒湯各一料加羌活　細辛　甘菊花　天麻　獨活　薄荷何首烏一兩　蜜丸如彈子大每服一丸細嚼茶清下不拘時服

按外風與身中之火熱相合以陽從陽必上攻於頭然風火盛營血必虧故其藥如是也

清空膏東垣　治正偏頭痛年深不愈及風濕熱上壅頭目及腦苦痛不止

風屬火多血虛右屬痰屬熱多分頭痛頭風爲二門然一病也淺而近者名頭痛深而遠者爲頭風。當驗其邪所從來而治之。

黃芩炒酒　黃連炒酒　羌活　防風各一錢　甘草炙半錢　爲末每服三錢茶調如膏白湯送下如少陰頭痛加細辛太陰頭痛脈緩有痰去羌活防風川芎甘草加半夏如偏頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一倍散少陽相火。如自汗發熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白虎湯加白芷東垣曰太陰頭痛必有痰也。少陰頭痛不上頭然痰與氣壅於腦中也。太陰少陰二經雖頭上氣不得暢而爲痛也。頭爲六陽之會其象爲天乃清空之位也風寒濕熱干之則濁陰上壅而作實矣羌防入太陽柴胡入少陽皆辛輕上升祛風勝濕之藥川芎入厥陰爲通陰陽氣血之使甘草入太陰散寒而緩痛辛甘發散爲陽也苓連苦寒以羌防之屬升之則能去濕熱於高巔之上矣芩連川酒炒非獨制其寒欲其上升也丹溪曰清空膏諸般頭痛皆治雖血虛頭痛從魚尾上連痛者不治魚尾眼

角也又云治少陽頭痛如痛在太陽厥陰者勿用蓋謂顳顬頂痛也頭痛用羌活防風柴胡川芎升麻細辛藁本之異者分各經也用黃芩黃連黃檗石膏知母生地之異者分各臟瀉火也用茯苓澤瀉者導溲也用參者補氣也用芎歸者養血也王海藏曰熱在至高之分當以輕劑揚之從治也若意服之上熱未除中寒生矣

消風散　治風熱上攻頭目昏痛項背拘急鼻嚏聲重及皮膚頑痲癮疹瘡癢婦人血風（婦人衝任二經爲風襲傷致生血病也）

厚朴薑汁炒　陳皮去白　甘草炙　荊芥五錢　防風　蟬蛻洗炒　川芎　茯苓　人參　羌活　藿香　殭蠶炒

二兩　爲末每服三錢茶湯下瘡癢酒下

羌防荊芎之辛浮以治頭目項背之風殭蠶蟬蛻之清揚以去皮膚之風藿香厚朴以去惡散滿參苓甘橘以輔正調中使風邪無留壅也

轉舌膏　治中風癒瘂舌塞不語

涼膈散加菖蒲遠志各等分蜜丸彈子大硃砂爲衣薄荷湯化下臨臥服

此乃治心經蘊熱之方也

正舌散　治中風舌本強難轉語不正

蠍梢二七個　茯苓一兩　末之每服一錢溫酒調又擦牙更效

此乃治風涎壅塞之方也

二丹丸　治風邪健忘養神定志和血內安心神外華腠理得睡

丹參　熟地　天冬去心兩半　硃砂　遠志五錢　茯神　麥冬　甘草一兩　煉蜜丸桐子大每服五十丸至一百丸空心食前服

按中風證心神一虛百骸無主風邪擾亂莫由安睡功見一班矣（相傳用愈風湯方不見硃失用方之意）

排風湯　治風虛冷溼邪氣入臟狂言妄語精神錯亂及五臟風發等證

麻黃　茯苓　獨活一錢半　甘草炙　當歸　芎藭　防風　白朮　皮五分　加薑三片

按虛風冷溼雖已入臟其治法必先宣之使從外散故用藥如是也

涼膈散　治心火上盛膈熱有餘口舌瘡
唇裂吐衄涎嗽稠黏二便淋閉胃熱發斑瘡疹
黑陷諸風瘛瘲手足掣掫筋攣疼痛
連翹　梔子仁　薄荷　大黃　芒硝　黃芩
甘草　加竹葉二枚葱一根
清心散
即涼膈散加黃連竹葉煎成去渣入蜜少許溫
服　如頭痛加防風川芎石膏

按中風不合君相二火主病多顯膈
熱之證古方用涼膈散最多不但二方已也如
轉舌膏用涼膈散加菖蒲遠志活命金丹用涼
膈散加青黛藍根蓋風火之勢上炎胸膈正熱
原之地所以清心寧神轉舌活命涼膈之功居
多不可以宣通腸胃之壯輕訾之也
滌痰湯　治中風痰迷心竅舌強口不能言
竹瀝　生薑汁二升　生薑汁二合　和勻分溫三服
按人身之積痰積熱常招致外風結爲一家令
人心神恍惚如邪所憑實非邪也治痰清熱開
痰其神自安此方可頻服也
貝母瓜蔞散　治肥人中風口眼㖞斜手足痲木
左右俱作痰治

貝母　瓜蔞　南星炮　荊芥　防風　羌活
黃蘗　黃芩　黃連　白朮　陳皮　半夏湯泡
次七薄荷　甘草炙　威靈仙　天花粉　加薑煎

按中風證多挾熱痰而肥人復素有熱痰不論左右俱作痰治誠爲當矣但肥人多虛風瘦人多實火虛風宜用甘寒一派如竹瀝人參麥冬生地生葛汁生梨汁鮮淡竹葉汁石膏瓜蔞蔵貝胡麻仁等藥此方三黃竝用治瘦人實火或可治肥人虛風甚不宜也至泛論治熱痰之藥諸方中又唯此足擅其長存之以備實火生風生熱之選

青州白丸子　治風痰壅盛嘔吐涎沫口眼㖞斜手足癱瘓及痰盛泄瀉肥人滑泄多屬之瘦人滑不食不饑多責之痰

白附子　南星二兩　半夏水浸去皮臍七次　川烏去皮臍五錢

四味俱生用爲末生絹袋盛於井花水內擺出粉末出者以手採令出查再擺再擺以盡爲度用磁盆日曝夜露每日一換新水攪而後滌舂五更十日去水曬乾如玉片以糯米粉作稀糊九如菉豆大每服二十九生薑湯下無時如癱瘓酒下

此治風痰之上藥也然藥味雖經浸曝毒氣已殺溫性猶存熱痰迷竅非所宜施

星附散　治中風能言口不歪而手足躲曳者

南星　半夏各製　茯苓　殭蠶炒　黑附子　白附子八分　前成藥

附子藥多取冷服謂熱因寒用水煎也此用烏頭附子人參一派溫補絕無發散之藥何非加以熱服得汗愈凡用而得汗耶

治風六合湯　治風虛眩運

方見卷一下理血門四物湯附方內

三聖散　治中風手足拘攣口眼㖞斜腳氣行步不正

當歸酒洗炒　玄胡索微炒爲末　肉桂去粗皮等分　爲末每服二錢空心溫酒調下

按此方治血虛風入之顓劇也故取以治口眼喎斜之左急右緩者然血藥中而加地黃白芍藥中而加天麻防風羌活白芷細辛或加獨活以去腎間風加蒼朮以除下焦熱又當隨證酌量也

加味六君子湯　治四肢不舉屬於脾土虛衰者須用此顓治其本不可加入風藥

六君子每味一錢加竹瀝生薑汁小盞　麥冬三錢　加薑三片棗二枚　口渴去半夏加葳蕤石膏　虛甚不熱者加附子

按中風門中從不錄用此方所謂治末而忘其本也夫風淫末疾四肢不舉乃風淫於內虛者多實者少審其果虛則以六君子加其寒藥如竹瀝麥冬之屬允爲治虛風之儀式也

薏苡仁湯　治痺在手足淫流關節并治手足注疼痛痲木不仁屈伸

薏苡仁　當歸　芍藥　甘草　桂心　麻黃　甘草炙　蒼朮米泔浸炒　加薑煎

此治風淫相搏關節不利之證故以薏苡仁爲君舒筋除淫其力和緩當倍之又倍加之至於麻黃雖能通陽氣然在淫勝方中卽無汗不可多用減之又減可也

人參補氣湯　治手指痲木

人參　黃耆二錢升麻　柴胡　芍藥　生甘草炙甘草五味子五分

按諸陽起於指手指痲木風已見端宜亟補其氣以禦外入之風故用此爲綢繆計也

烏頭粥　治痺在手足風淫末疾并治風寒淫痲木不仁此粥大治手足不隨及腫痛不能舉者宜服此預防之。

烏頭生研爲末　每用香熟白晚米二合入藥末四錢以砂罐煮作稀粥不可太稠下生薑汁一匙白蜜三匙攪勻空心溫啜之爲佳如中淫多更加芪仁未三錢

按四肢爲諸陽之本木根之地陽氣先已不用

況周身經絡之末乎。故用烏頭合穀味先從營衛所生之地注力俾四末之陽以漸而充也

桂枝五物湯　治在上之痺

方見卷三上桂枝湯附方內

此乃金匱治血痺之方也血痺而用桂枝湯加黃耆以其風邪獨勝。風性上行故其痺在上也

其脈微濇寸口關上微尺中小緊外證身體不仁如風痺狀此方主之。又可見風性善行隨其或上或下又皆主以此方。矣桂枝湯爲中風一證羣方之祖。不但中絡即中經中腑中臟藥中。皆當加入本方。以風從外出故也。後人競用續命湯爲加減。此方置之不錄。未免失者哉。

十味劍散　治在臂之痺又治中風血弱臂痺連及筋骨舉動難支

附子炮　黃耆　當歸　白朮七分　茯苓　肉桂五分　熟地酒洗焙乾二錢　白芍一錢　川芎　防風　棗三片

按臂痛乃筋脈不舒體盛者可去其筋脈中之風然既已血痺所受風燥之累不淺。故取此方養血之中加附子之力通其陽氣而用防風反佐黃耆出其分肉腠理之風也

通痺散　治腰以下至足風寒濕三氣合而成痺兩足至臍冷如氷不能自舉或因酒熱立冷水中久成此疾

天麻　獨活　當歸　川芎　白朮　藁本等分

末之每服二錢熱酒調下

此方因風寒濕三氣混合入於陰股其邪已遍於膀胱故變桂枝五物之制而用此散緩緩分出其邪也

史國公藥酒方　治中風語言蹇澁風燥其筋而舌本。手足拘攣風燥其筋而不濡也。半身不遂邪併於虛痿痺不仁風兼濕頑痲癈也。

晚蠶砂　炒　鼈甲　醋炒　虎脛骨　酥炙　松節　杵　防風　杜仲　薑汁炒　牛膝　酒浸　當歸　酒洗　白朮　炒土　川芎　蔓荊子　炒搥碎　秦艽　兩　枸杞　五兩　赤芍根　八兩　熟地　蒸熟　羌活　二兩　蒼耳子　炒

爲粗末絹袋盛浸無灰酒三十觔煮熟浪火

毒服每日數次常令醺醺不斷

防風羌活蒼耳秦艽松節防根蠶砂萆薢既以祛風兼以燥濕松節能除骨節間之風防根散血消腫能療凍瘃亦散寒之品當歸枸杞杜仲牛膝補陰潤燥養血榮筋白朮補氣而健脾脾主四肢。虎脛驅風而壯骨。風從虎故虎骨治風虎雖死猶立不仆其氣力皆在前脛。且脛骨能入手足若腰脊痛又當用脊骨。龍甲亦厥陰血分之藥能益陰血而去肝風風澁去氣血旺則病除矣治風痺藥酒方亦不爲少此方平中之奇功效顯著後有增

入白花蛇一條煮腸胃漫試其毒所者此又以所不取也

三因白散子　治肝腎中風澁潮壅塞不語嘔吐痰沫頭痛眩運兼治陰證傷寒六脈沉伏及霍亂吐瀉小便淋滴不通

大附子去皮臍生　滑石桂府者　半夏製七錢半　爲末每用二錢薑七片密蜜半匙煎空心冷服

按此方甚趫但不明言其所以然且引兼治陰證傷寒霍亂吐瀉等證爲言轉覺泛而不精矣蓋此即濁陰上逆之證緣肝腎之氣厥逆而上是以澁潮壅塞古語痰沫吐咯難出頭目

獨活湯　丹溪　治風虛癒瘂昏憒不覺或爲寒熱筋急而縮爲癒緩而縱爲瘂伸縮不已爲癒瘂俗謂之搐是也木曰曲直之象也肝虛而風乘之入於血脈則癒瘂若在皮膚則爲寒熱若移邪於所生則昏憒不覺也所生心也不能生火。

獨活　羌活　防風　細辛　桂心　白薇　當歸　芎藭　半夏　人參　茯神　遠志　菖蒲五錢　甘草炙二錢半　每服一兩加薑棗煎

肝屬風木而主筋故癒瘂爲肝邪肝欲散急食辛以散之二活防風祛風細辛桂心溫經半夏除痰芎歸辛散風而溫和血血活則風散辛以散之即辛以補之也木喜條達故以散爲補心爲肝子肝窾於神遠志安心神白薇菖蒲開心竅使神遠志安心神白薇菖蒲開心竅使

風靜火息血活神寧而瘛瘲自已矣

防風通聖散 治諸風潮搐手足瘛瘲大便結邪熱暴甚肌肉蠕動一切風證

祛風至寶丹 治諸風熱

方見卷五下表裏門防風通聖散附方內

獨活寄生湯 治肝腎虛熱風溼內攻腰膝作痛冷痺無力屈伸不便肝主筋腎主骨靈樞曰筋能伸而不能屈者病在骨

獨活 桑寄生 如無真者以續斷代之 細辛 當歸 酒洗 芍藥 酒炒 川芎 酒洗 熟地黃 杜仲 薑汁炒斷絲 牛膝 人參 茯苓 甘草 桂心 等分每服四錢

獨活細辛入少陰通血脈偕秦艽防風疏經升陽以祛風桑寄生益氣血祛風溼偕杜仲牛膝健骨强筋而固下芎歸芍地所以活血而補陰參桂苓草所以益氣而補陽辛溫以散之甘溫以補之使氣血足而風溼除則肝腎强而痺痛愈矣 丹溪曰久腰痛必用宜性以開之方止腰膝藥非

成方切用 卷六上 風 通聖散 祛風至寶丹 獨活寄生湯

不換金丹 退風散熱治中風口喎此方祛風之力頗大大勢風而挾寒痰氣窒閉者宜之或塗禺處亦可

荊芥穗 甘草炙 防風 天麻 殭蠶一兩 薄荷葉三兩 羌活 川芎 白附子 烏頭 蠍梢 藿香葉半兩 煉蜜丸彈子大每服一丸細嚼茶酒任下

搜風順氣丸 治風燥便祕因致氣閉不行暫時

用之以疏風濁燥順氣殊不可少。本方條下。過服百病皆除。老者還少。豈理也哉。然又云。孕婦勿服。如服藥覺臟腑微痛。以羊肚肺羹補之。則其藥有偏峻。不可久服明矣。

車前子二兩　牛　白檀香　火麻子微炒去殼　牛膝酒浸有

李仁湯泡去皮另研　菟絲子製　乾山藥二兩　枳殼麩炒　防風

獨活一兩　大黃五錢生牛熟　煉蜜丸桐子大每服

二十丸酒茶米飲任下。空心臨臥各一服去腸中宿滯并腸風下血。

順風勻氣散　治中風中氣半身不遂口眼㖞斜

牛身不遂偏枯也。經曰。胃脈沉鼓澀。胃外鼓大。心脈小堅急。皆爲偏枯。男子發左。女子發右。不痞舌轉。可治。蓋心是神機開發之本。胃是水穀充大之標本相得。則臟中氣海之宗氣盈溢分布。四臟三焦。上下中外。無不周徧。若標本相失。宗氣虛耗。分布不周於經脈。則偏枯。不周於五臟。則痞。口眼㖞斜者。是陽明之脈。俠口環唇。寒則筋急。熱則筋弛。左寒右熱。則左急而右緩。右寒左熱。則右急而左緩。陽明燥金主緊縮。風病而成筋縮。木極似金。反兼勝己之化。燥之甚也。治宜辛凉。不可用桂附。元戎曰。酒濕之病。亦能作痺。證。口眼㖞斜。半身不遂。舌強不正。渾似中風。當瀉濕毒。不可作風病治之而汗也。衍義易簡言。與此同。

及風氣腰痛

白朮二錢　烏藥半錢　人參　天麻五分　沉香磨　甘草炙三分　白芷　加薑煎

青皮　木瓜　蘇葉

按勻氣之說甚長。身內之氣有通無壅。外風自不能久居。而易於解散。故知勻氣即調氣之旨也。若取其方以治口眼㖞斜之右急左緩者。當倍用生熟甘草。加苡仁以緩其急。加麥冬竹瀝以熄其風。得效去白芷蘇葉。可多服也。戴復菴曰。治風之法。初得之。即當順氣及其久也。即當活血。若不順氣。遽用烏附。若不活血。遽用羌防天麻輩。未見其能治也。

攝生飲調蘇合丸　治一切卒中不論中風中寒中暑。中溼中氣及痰厥。飲厥之類。初起或可用

此先以皂角去皮弦細辛生南星半夏爲末。吹入鼻中。俟其噴嚏。即進前藥。牙禁者。中指點南星半夏細辛末并烏梅肉頻揉自開。

半夏百沸湯泡少頃一錢半　南星圓白者薑汁浸紙裹煨一錢半　南木香　蒼术　細辛　生甘草　石菖蒲一錢　右件剉散

分二服。加生薑七厚片。煎取其半。乘熱調蘇合丸半丸。灌下。痰盛者。加全蠍二枚炙。

按此方治卒中氣閉。痰迷不得不用之劑。但正氣素虛之人。不能當麝。及辛香推枯拉朽之

勢裁節而用十之二三可也諸香立散真氣虛
牛黃清心丸與蘇合丸異治熱阻關竅可用牛
黃丸開之寒阻關竅可用蘇合丸開之其口開
手撒遺尿等死證急用人參附子峻補間有得
生者若牛黃蘇合之藥入口即斃此無異于鈞
鎮絲也

凡中風皆
多挾中氣
不但急中
為然

烏藥順氣散　治風氣攻注四肢骨節疼痛遍身
頑痲及癱瘓語言蹇澁腳氣步履多艱手足不
遂先宜服此藥以疏氣逆然後隨證投以風藥
麻黃去節陳皮去白烏藥二兩白殭蠶炒去嘴川芎白
芷甘草炙枳殼麩炒桔梗一兩乾薑五錢為末每
服三錢水一盞薑三片棗二枚煎如憎寒壯
熱頭痛身體倦怠加葱白三寸煎併服出汗
或身體不能屈伸溫酒調服

成方切用　風　卷六上　烏藥順氣散　通頂散　翠

八味順氣散　治中風正氣虛痰涎壅盛
白朮炒白茯苓青皮去穰炒白芷陳皮去白台
烏藥人參一錢甘草五分

通頂散　治初中風不知人事風鼓火盛口噤不
開風冷之氣客於胸中滯而不能發

藜蘆生用細辛人參川芎一錢石膏五錢
為末用一字吹入鼻中有嚏者肺氣未絕可
治

中風不省人事病已急矣非平藥可以開其壅
塞故用藜蘆與人參細辛取其相反而相用也
藜蘆苦寒有毒入口即吐能通腦頂令人嘔痰
與人參細辛相反細辛散風通竅通經破痰腦
辛寒入肺降火甘草之平以緩之芎藭之用取其活氣
造氣上逆加石膏之重以墜之火盛氣即
利竅而已芎藭升清陽而開諸鬱佐血之使凡諸牽中尸厥鬱證皆當

發表還魂湯川芎麻黃桂枝清魂湯川芎及用皂角牛夏搐鼻取噦藜蘆砒石折齒取痰皆所以開發三焦使表邪流通也亦名忌用冷水閉表亦同此意

瀉青丸　治中風臼汗昏冒發熱不惡寒不能安臥此是風熱躁煩之故也

當歸　川芎　梔子　羌活　大黃　防風　龍膽草等分

蜜丸彈子大每服一丸竹葉湯化下

按此方以瀉青爲名者乃瀉東方甲乙之義也風入厥陰風木之臟同氣相求其勢必盛所處者虛而眩運熱而躁煩虛也熱也其可以爲壯實而輕瀉之乎審果壯實乃可施此審屬虛熱必以四物湯全方加人參竹瀝秦艽羌活八味爲劑始合法度也

舒筋保安散　治左癱右瘓筋脈拘攣身體不遂腳腿少力乾溼腳氣及溼滯經絡久不能去宜用此以宣導諸氣

虎骨酒炙　五靈脂　牛膝酒浸續斷　白殭蠶炒　松節　白芍藥　烏藥　天麻　威靈仙

黃耆　當歸　防風兩一　木瓜五兩　用無灰酒一斗浸上藥一七日緊封扎日足取藥焙乾搗爲細末每服二錢用浸藥酒調下

此治風溼搏結於筋脈之間凝滯不散阻遏正氣不得通行故用藥如是也

加味羚羊角散　治筋痺肢節束痛

羚羊角　當歸　白芍　川芎　附子　薄荷　獨活　防風　加薑三片

此方治筋痺之義甚善蓋筋痺必以舒筋爲主宜佐用羚羊角爲君筋痺必因血不榮養宜以白芍川芎更加當歸爲臣然恐羚角性寒但能舒筋不能開痺必少用附子之辛熱爲反佐更少用薄荷獨活防風入風寒溼隊中而爲之使也

如聖飲　治剛柔二痙面赤項強頭搖口噤角弓反張與悲痙同法痙者太陽中風感寒溼則引面緊溼則着面痙也風則燥而動寒則收而強故頭搖口噤項強而反張也風挾寒則血滯無汗爲剛痙風挾溼則液

出有汗爲柔痙

羌活　防風　白芷　柴胡　甘草　黃芩　半夏　川芎　芍藥　當歸　烏藥　加薑煎入薑汁竹瀝服柔痙加白朮桂枝剛痙加蒼朮麻黃口噤齘牙大便實加大黃

羌防芎芷柴胡甘草辛甘以發散風邪用烏藥者治風須順氣也用歸芍者治風先活血也用半夏薑汁竹瀝者風必挾痰也用黃芩者風生熱也柔痙加白朮桂枝有汗欲其無汗剛痙加蒼朮桂枝有汗欲其有汗口齒屬陽明陽明實則口噤齘牙而便祕故加大黃以泄胃熱也

上中下通用痛風方　丹溪

黃檗酒炒蒼朮泔洗南星薑製神麴炒調川芎上下行桃仁去皮尖搗龍膽草下行防已下行白芷一兩上行羌活上行威靈仙酒拌上下行桂枝三錢橫行紅花二錢半麪糊丸

痛風有寒有溼有熱有痰有血之不同此方能通治之黃檗清熱蒼朮燥溼此二妙散也龍膽治痿正藥羌活和機要之法爲可用設遇真中臟證下藥入口其人即不醒以中臟之便祕指爲中臟見其誤下不致損人益信子不中病難可復追矣

三化湯　治中風二便數日不行邪氣內實者以此方微利之嘉言曰風中經絡只宜宣之使散誤下則風邪乘虛入腑入臟釀患無窮若夫中臟之候多有平素積虛臟真不守者下之立斃不可不愼唯在胃腑一證內實便祕者閒有可下然不過解其煩熱非大下也所謂一氣之微汗一旬之微利亦因可用始用之至於子和以下立法機要以中臟者宜下爲言則指下爲定法胡可訓耶然中臟有緩急二候中腑日久熱勢深極傳入臟者此屬可下而下必使風與熱俱去塡其空竅則風不再生若開其壅塞必反增風勢何以下爲哉其卒虛身中急證下藥入口其人即不醒以中腑之便祕指爲中臟見其誤下不致損人益信子和機要之法爲可用設遇真中臟證下

方見卷四上攻下門附方內

大黃厚朴枳實小承氣湯也上焦滿治以厚朴枳實下焦實奪以大黃用羌活者不忘乎風也服後二便微行則三焦之氣無所阻塞而復其傳化之職矣故曰三化此乃攻裏之峻劑非堅實之體不可輕服蓋傷寒證胃熱腸枯不得不用大承氣以開其結然且先之以小承氣或調胃承氣恐誤用不當即傷人也在中風證多有虛氣上逆關隘阻閉之候斷無用大承氣之理古方取藥積腹中不下以漸填其空竅俾內風自熄奈何今人無問窾以出其風豈知窾空而風無藏長此安窮耶蔵

血痺湯　治血痺多驚筋脈攣急

人參　黃耆　肉桂　當歸　川芎　代赭石
羌活　厥陰肝臟所主者血也所藏者魂也血痺不行其魂自亂今不通其血而但治其驚此不得之數也故用人參以開血爲君黃耆肉桂當歸川芎爲臣以代赭石之顫通肝血者佐參耆之不逮少加羌活爲使蓋氣者血之天也氣壯則血行然必以肉桂當歸大溫其血預解其凝泣之勢乃以代赭之重墜直入厥陰血分者開通其瘀壅而用羌活引入風痺之所緣厥陰主風去則寒溼自不存矣

三痺湯　治氣血凝滯手足拘攣風寒溼三痺

人參　黃耆　茯苓　甘草　當歸　川芎
白芍　生地黃　杜仲（薑汁炒斷絲）　牛膝　桂心
細辛　秦艽　川獨活　防風　等分加薑棗
煎

喻嘉言曰此方用參耆四物一派補藥內加防風秦艽以勝風溼桂心細辛獨活以通腎氣凡治三氣襲虛而成痺患者宜準諸此

千金地黃湯　治熱風心煩及脾胃熱壅食不下

生地黃汁　枸杞子汁
生地黃汁一升　人參　天門冬八兩　白茯苓六兩　大黃
梔子四兩　以後五味爲細末先煎地黃等汁
荊瀝　竹瀝五升　眞酥
內末藥調服方寸匙再漸加服以利爲度

按此方補虛清熱潤燥滌痰除風開通瘀壅美善具備誠足貴也因養血藥痰難於兩用姑斟

此方爲例以聽臨證酌量又四肢不舉俱屬脾土而虛實分途異治苟其虛實不甚相遠此方更在所必用法無窮盡人存政舉未易言爾

烏梅擦牙關方　治中風口噤不開（胃陽明之脈循頰車入齒縫風寒中之輕則戰慄鼓頷重則口噤不開不噤者筋先絕也不治。）

烏梅　揩擦牙齒涎出即開

酸先入筋木能剋土（酸屬木陽明胃屬土）使牙關酸軟則開矣若以鐵槌攪之恐傷其齒也

許胤宗治唐柳太后病風脈沉而噤胤宗曰口不下藥宜以湯氣蒸之令藥入腠理周時可瘥遂造黃耆防風湯數十斛置於牀下氣如煙霧次日便得語蓋鼻氣通於天無形之氣由鼻而入呼吸傳變無處不到黃耆甘而善補得防風而功益速驅風補虛兩得之矣

王克明治盧州王守道風噤不能語以熾炭燒地熱灑以湯藥置病者於上須臾小蘇（若此二者危藥不能及亦治風之權變也。）

清震湯　治雷頭風頭面疙瘩腫痛憎寒壯熱六

如傷寒一云頭如雷吼風動作聲也東垣曰病在三陽不可過用寒藥重劑誅伐無過處清震湯治之三陽之氣皆會於頭額從額至鼻下面者屬陽明從頭角下耳中耳之前後者屬少陽

升麻　蒼术（五錢）　荷葉（一枚）

升麻性陽味甘氣升能解百毒蒼术辛烈燥溼強脾能辟瘴癘局方升麻湯也荷葉色青氣香形仰象震（震仰盂爲雷）遂類象形以治之能助胃中清陽上行用甘溫辛散之藥以升發之使邪從上越且固胃氣使邪不傳裏也

祛寒門　正方五十三　附方四十
理中湯　附子理中湯　桂枝人參湯　枳實理中丸　温中湯　補中安蚘丸　温胃湯　黄耆湯
理陰煎　六味回陽飲　四逆湯　四逆加人參湯　甘草乾薑湯　茯苓四逆湯　白通湯　芍藥甘草附子湯　回陽返本湯　茱萸四逆湯　當歸四逆湯　四逆加吳茱萸生薑湯　歸四逆湯　附子湯
真武湯　吳茱萸湯　吳茱萸加附子湯　大建中湯　小建中湯　黄耆建中湯　十四味建中湯　入味大建中湯　薤令建中湯

養中煎　白通加人尿豬膽汁湯　附薑湯　薑附薑歸桂湯　附薑歸桂參甘湯
附白通湯　附薑歸桂湯　附薑歸桂參甘湯
辛温平補湯　甘寒補氣湯　益元湯　回陽救急湯　栝蔞薤白麥丸　中滿分消湯　温胃飲
四神丸　二神丸　五味子丸　五倍子丸　烏頭赤石脂丸　五君子煎　感應丸　九痛丸　黄芽丸　導氣湯
附子粳米湯　胃關煎　佐關煎　抑扶煎　天台烏藥散　薏苡仁附子散　四維散　疝氣方　桔附湯　橘核丸　歸氣飲　煖肝煎　補
鎮陰煎

火丸　金液丹　來復丹　半硫丸　氣丹　返陰丹　破陰丹　百問方　黑鉛
黑錫丹　五德丸　七德丸　九起丸　喝復陽丹　三氣飲　壽脾煎　一烝丹
九烝丹　聖术煎　唐鄭相國方　熾青

吳氏醫學述第四種

武原吳儀洛遵程輯

門人周蘭九生庭
男　有榆蒼培同較
有杜雋望

成方切用

祛寒門

傷於寒之爲病有陰邪犯於表者有生冷所傷於內者有陰寒中於臟者此皆生於外而知者也至於本來之寒初無所感吳測其由丹溪曰氣有餘便是火夫今人之氣有餘者能十之幾其有或因稟受或因喪之賊以致陽氣不足者多見寒證中之而陽衰之痛無所不致其由來者漸形見者微當其未覺也孰爲之貴及其既甚也始知難治矣故能治於未病之前者上工也

理中湯　仲景

治傷寒太陰亦自利不渴王海藏曰上吐下瀉理中湯主之三陽傳陰經而下利者爲寒中陰經而下利者爲寒中三陽下利手足漐漐少陰厥陰下利身熱太陰下利身冷其大較也下利雖有表證不可發汗以下利爲那氣內虛也寒多而嘔腹痛太陰脾經也腹滿而吐食不下白朮甘草人參乾薑炮各等分右爲末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服若胃於陽氣既去之後死灰不可復然亦但附子性淫獨任爲難必得大甘之品如人參熟地炙甘草之類皆足以制其剛而濟其不及之際使陽氣將回不知回陽之法但以堅攪回若胃於陽氣既去之後死灰不可復然亦但附子性淫獨任爲難必得大甘之品如人參熟地炙甘草之類皆足以制其剛而濟其不及之際使陽氣將回不知回陽之法但以堅攪回

逆拘急　寒凍外來或結胸吐蚘於中及感寒霍亂陰陽氣不能理諸證俱乏用此分理陰陽安和胃氣

大腹屬太陰少腹屬少陰腎屬厥陰亦有挾食積與痰火相凝中而爲病者脈沉無力或厥下利不止脈況無力或厥不止而煩躁欲死者此陰盛格陽之候也白朮炒二兩陳壁上乾薑炮甘草炙人參一兩自利腹痛者加木香不痛利多者倍白朮渴者倍白朮滿去甘草甘鈐加厚朴枳實各一兩加附子一枚此陰證少腹痛去白朮加半夏薑汁甘澹各半盞煎服若胃於陽氣既去之後死灰不可復然亦但附子性淫獨任爲難必得大甘之品如人參熟地炙甘草之類皆足以制其剛而濟其不及之際使陽氣將回不知回陽之法但以堅攪回

飲停則愈。渴加茵蔯。寒實結胸加枳實。本方等分。蜜丸名理中丸。仲景曰。大病瘥後喜唾。久不了了。胃中有寒。宜理中丸。宋徽宗食氷太過。病脾泄。國醫進大理中丸。上曰。服之屢矣。介曰。請以氷煎。此氣已不返而毒相搏結於胸者。用此丸先理其氣。次療諸疾。其效如神。渴者加花粉。自汗者加牡蠣粉。去甘草加茯苓川椒烏梅名理中安蚘丸。（隆仲文）治胃寒吐蚘。蚘得酸則止。得辛則伏。故加椒梅。加當歸白芍陳皮厚朴川椒人蔘甘草名温胃湯。治憂思鬱結。脾肺氣滯。脹滿上衝。飲食不下。加黃耆白芍陳皮藿香名黃耆湯。（海藏亦出例決）加青皮陳皮名治中湯。治前證腹滿痞悶。非食積者。加陳皮茯苓名補中湯。治泄瀉不已。加附子。惡食不化。加砂仁。加黃連

本方。治中寒腹痛身痛四肢拘急。（漸傷口傷在中。中有中藏中。）加桂枝倍甘草名桂枝人參湯。（仲景）治太陽表證不解。而心下痞。表裏不和之。（邪在表。裏氣為邪所據。故用理中面加桂枝以解表。不名理中而名桂枝者。到底先表之意也。）大抵陽熱為病。則腹滿而咽乾。陰寒為病。則腹滿而吐利。加茯苓名茯苓湯。治寒實結胸。欲解表（非此不可）

理陰煎　治真陰虛弱。脹滿嘔逆。爽飲惡心。吐瀉腹痛。婦人經遲血瀉等證。

熟地（三五七錢或一二兩）當歸（二三錢或五七錢）甘草（炙二錢）或加肉桂一二錢。加附子名附子理陰煎。若風寒外感。邪未淺。但見發熱脈數不沈。凡內無火證。素稟不足者。但用此湯加柴胡一錢半。或二錢。連進二服。其效如神。若

崔行功曰。此是下後虛逆。氣已不返。而毒氣復上。攻氣相搏。結於胸者。用此丸先理其氣。次療諸疾。其效如神。渴者加花粉。自汗者加牡蠣粉。去甘草加茯苓川椒烏梅名理中安蚘丸。（隆仲文）治胃寒吐蚘。蚘得酸則止。得辛則伏。故加椒梅。加當歸白芍陳皮厚朴川椒人蔘甘草名温胃湯。治憂思鬱結。脾肺氣滯。脹滿上衝。飲食不下。加黃耆白芍陳皮藿香名黃耆湯。（海藏亦出例決）加青皮陳皮名治中湯。治前證腹滿痞悶。非食積者。加陳皮茯苓名補中湯。治泄瀉不已。加附子。惡食不化。加砂仁。加黃連

寒凝陰盛而邪有難解者必加麻黃一二錢發心用之或不用柴胡亦可恐其清利也若陰勝之時外感寒邪脈細惡寒或背惡寒者乃太陽少陰證也加細辛一二錢甚者再加附子一二錢熟地五錢或一兩當歸身三錢如泄瀉者或動以冬术代之如肉振汗多者加炙黃耆四五錢或一兩或冬白术三五錢如泄瀉不止加人參亦可若脾腎兩虛水泛爲痰或嘔或腹者加茯苓一錢五分或加白芥子五分以行之若泄瀉不止及腎瀉者宜少用

當歸或井去之加山藥藕豆吳茱萸破故紙肉豆蔻附子若腰腹有痛加杜仲牛膝若腹有脹滯疼痛加陳皮木香砂仁凡脾腎中虛等證宜剛燥此理中湯之變方也凡逆證亦有用此者身痛腹痛下利清穀三陰自利居多惡寒不者當用理中六君之類宜溫潤者當用理陰大營之類又凡真陰不足或素多勞倦之輩因而忽感寒邪不能解散或發熱或頭身疼痛或面赤煩躁格陽於外熱或乾嘔寒戰或咽痛如虛火上炎脈沉微細欲絕少陰脈有流有緊有數血虛火炎脈有流有緊有數細言之蓋流必重按始得細中見不似陽證浮大而緊數也薛慎齋曰人流細中見數爲熱不知流細中見數爲寒其陰寒證

四逆湯仲景治三陰傷寒四逆湯爲少陰主藥然亦有用此者身痛腹痛下利清穀三陰通用之太陽證脈浮自利居多惡寒不渴四肢厥冷諸陽之本寒則血脈凝澁陽氣不通四肢故名四逆湯爲太陽少陰兩感之證能救表而不能救裏故一身盡痛而手足厥冷也或反不惡寒面赤煩躁格陽於外虛火上炎脈沉微細欲絕少陰脈有流有緊有數血虛火炎脈有流有緊有數細言之蓋流必重按始得細中見不似陽證浮大而緊數也薛慎齋曰人流細中見數亦在沉細仲景總以微細欲絕言之

味二十粒如虛陽上浮加茯苓二錢如肝

人參一二兩或數錢製附子二三錢炮乾薑二三錢炙甘草一二錢熟地五錢或一兩當歸身三錢如泄瀉者或動以冬术代之白术三五錢如泄瀉者加烏梅二枚或北五

脈當有七八至（但按之無力而虛察之）
附子一枚（生用）乾薑一兩　甘草炙二兩　冷服　面赤者加葱九莖以通陽（喻嘉言曰陽虛之人雖有表證亦能發熱立至亡陽腹痛加生薑二兩以散其汗仍出其手足必厥繞用表藥外邪不服故用前湯加葱爲治）
格陽於上也加桔梗一兩以利咽利止脈不出加人參二兩以助陽補氣血嘔吐加生薑二兩以散
陰氣（其手足必厥繞用表藥立至亡陽）腹痛真陰不足也加芍藥二兩以斂陰咽痛陰氣
上結也加桔梗一兩以利咽利止脈不出加人
參二兩以助陽補氣血嘔吐加生薑二兩以散
逆氣
寒淫於內治以甘熱故以薑附大熱之（神伸發
成方切用　卷六下　四逆湯　七
陽氣表散寒邪（附子生用甘草炙）甘草亦補中散寒之
品又以緩薑附之僭上也（甘草爲君乾薑附子爲臣）必冷
服者寒盛於中熱飲則格拒不納經所謂熱因
寒用又曰治寒以熱涼而行之是也（此制奇之大劑也）
腎道遠非大劑不能達（仲景云傷寒醫下之續得下利清穀腹滿身痛者急當救表宜四逆湯主之救陰證下利讖語有燥屎脈沉遲按之無力者爲陽厥宜下以小承氣湯如脈沉遲按之無力者則爲陰厥宜四逆湯主之）
有力者爲陽厥止宜下以小承氣湯如脈沉遲按之無力者則爲陰厥宜四逆湯主之）
欲絕及寒疝臍下冷（引腰脊痛寒傷營血故加當歸）
歸木通名當歸四逆湯治感寒手足厥冷脈細
經曰凡陰陽不相順接便爲厥（手足逆冷是也）三陰三陽之脈俱相接於手足陰主寒陽主熱陽氣內陷不與陰氣相順接則手足逆冷
加人參一兩名四逆加人參湯治惡寒脈微復利利止亡血（利雖止而津液已竭故云亡血）再加茯苓六兩名茯苓四逆湯治汗下後病不解而煩躁去乾薑加芍藥三兩名芍藥甘草附子湯治傷寒發汗不解反惡寒者虛故也（百問曰汗後惡寒人必虛下後發熱人必實）除附子用甘草四兩乾薑二兩名甘草乾薑湯治傷寒脈浮自汗小便數微惡寒脚攣急用桂
成方切用　卷六下　四逆湯　八
枝湯誤攻其表得之便厥咽中乾煩躁吐逆與此湯以復其陽（脈浮自汗便數惡寒陽不足也攻表重虛其陽得之便厥故與甘草乾薑助陽）俟厥愈足溫重與芍藥甘草湯（各四兩）以和陰（慮辛熱傷陰隨與此湯和陰以復其津液雖鄰於少陰而不敢用四逆）其
脚即伸除甘草加葱白四莖名白通湯（復陽通脈）加
吳茱萸名茱萸四逆湯治少陰厥陰腹痛加當
歸木通名當歸四逆湯治感寒手足厥冷脈細
欲絕及寒疝臍下冷（引腰脊痛寒傷營血故加當歸）木通能通
血脈（仲景當歸四逆湯見後）加茵蔯名茵蔯四逆湯治陰黃
喜飲冷食而爲陰厥陰縮即喜飲熱湯

三〇

加生脈散陳皮名回陽返本湯治陰盛格陽加官桂良薑牛夏名橘水散潔古治虛寒水瀉冷汗脈微甚者幅吐此爲急病

當歸四逆湯仲景治厥陰傷寒手足厥寒脈細欲絕

當歸　桂枝　芍藥　細辛三兩　甘草炙　通草一名木通二兩　大棗二十五枚　生薑切六升　和煮名四逆加吳茱萸生薑湯

成方切用　卷六　真武湯　四逆湯　九

四逆之名多矣而有因寒因熱之不同此則因風寒中血脈而逆故以當歸辛溫血中之氣藥爲君通脈散逆必先去血中之邪故以桂枝散太陽血分之風細辛散少陰血分之寒爲輔未有營衛不和而脈能通者故以芍藥甘草大棗調和營衛通草利九竅通血脈關節諸藥皆以破阻滯而厥寒散矣

真武湯仲景治少陰傷寒腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此爲有水氣或咳或嘔或小便利傷寒日自利而渴者屬少陰證凡人寐則氣行於陽寐則氣行於陰然必自少陰始故少陰證但欲寐陰氣勝也一有陽擾則反是矣周揚俊曰但欲寐非能寐昏昏如夢爾少陰屬腎腎病不能制水水飲停爲水氣腹痛者寒淫內甚也四肢沉重疼痛寒淫外甚也小便不利自下利者漸勝而水穀不別也或咳或嘔皆停飲也

及太陽病發汗汗出不解仍發熱心悸頭眩筋惕肉瞤振振欲擗地氣虛惡寒汗出不解仍發熱心悸頭眩筋惕肉瞤振振欲擗地者此陽虛陰乘之候也太陽病發汗汗出過多則心液亡心虛如魚失水則躍也水停心下亦心悸心屬火火畏水故悸也虛陽內動故頭眩汗多則筋惕惕而跳肉瞤瞤而動也振振欲擗地者內陽無主欲擗地而入也程郊倩曰汗多亡陽大人知之然有衛外之陽爲周身營衛之主此陽虛遂有汗漏不止惡寒身痛之證有膽中之陽爲上焦心肺之主此陽虛遂有虛蓬有火手冒心及奔豚中之陽爲下焦真元之主此陽虛遂有發熱眩悸瞤振擗地之證有胃中之陽爲中焦水穀生化之主此陽虛遂有腹脹滿胃不和而成心下痞之證救誤者須觀脈證知犯何逆以法治之腎之真陽盛則水皆內附而與陽虛不能制水則汎濫爲病故上凌心而爲眩悸中傷土而致嘔瀉也方名真武蓋取固腎爲義喻嘉言曰汗雖出而熱不退則邪未盡而正已大傷況裏虛爲悸上虛爲眩經虛爲瞤身振振搖無在而非亡陽之象所以行真武把關生鐵之法也

附子一枚炮　白朮二兩炒　茯苓　白芍　生薑三兩　五味斂肺　水寒相搏咳者加五味子細辛乾薑　細辛乾薑氣細辛乾

薑散水寒小便利去茯苓以其滲利下利去芍藥加乾薑乾薑辛熱叫屈去附子加生薑一倍附子僭上生薑散遊

茯苓白朮甘土利水能伐腎邪而療心悸生薑辛熱溫胃勝佐以酸平

附子回陽益衛能壯真火而逐虛寒芍藥酸收能斂陰和營而止腹痛補陽必兼和陰不欲偏勝佐以酸平

真武北方之神一龜一蛇司水火生氣所寒寒氣寒寒經日寒淫所勝治以

者也腎命象之此方濟火而利水故以名焉程郊倩曰水氣雖太陽與少陰有之以二經同司夫水也然太陽發表得之膚腠不宣水氣爲元府所遏故以小青龍發之少陰由下焦有寒不能制服水客邪得深入而動其水氣緣胃陽衰

而隄防不及也故用真武湯溫中鎮水收攝其陰氣以二經皆太陽與少陰有之以二經同司夫水也然太陽發表得之膚腠不宣水氣爲元府所遏故以小青龍發之少陰由下焦有寒不能制服水客邪得深入而動其水氣緣胃陽衰

厥陰諸乾嘔吐涎頭痛厥陰之脈挾胃乾嘔吐涎沫裏寒內格也厥陰之脈上巔頭痛寒氣上逆也太陽發表得之膚腠不宜水氣爲元府太陰少陰二經之脈不上循頭故無頭痛雖厥陰與督脈會於巔亦有頭痛然風溫在少陰邃陰盛而生內寒致非外感也若以外感之則殺人矣故用參附助陽而游腎

氣內盛則背爲之惡寒若風寒在表而惡寒則一身盡寒矣又有陰氣不足陽氣乘虛內陷屯表陽新虛背微惡寒者經所謂爲寒無大熱口渴心煩背微惡寒者是也白虎加人參湯主之一爲陰寒內盛一爲陽氣內陷內無燥熱則口不渴津液口燥舌乾而渴也欲解陰陽寒熱之不同當以口中燥潤詳之

吳茱萸湯仲景治陽明陰盛吐利手足厥冷煩躁欲死者則屬上焦少陰證吐利手足厥冷煩躁欲死厥陰證諸乾嘔吐涎頭痛脈上巔頭痛寒氣上逆也太陽發表得之膚腠不宜水氣爲元府太陰少陰二經之脈不上循頭故無頭痛雖厥陰與督脈會於巔亦有頭痛然風溫在太陰而頭反痛是又不可拘拘者李東垣

吳茱萸一升泡　人參三兩　大棗十二枚　生薑六兩

嘔嘉言曰此明嘔有太陽亦有陽明若食穀而不得暢而爲痛也

嘔則屬胃寒與太陽之惡寒嘔逆原爲熱證者不同火熱上衝而嘔恐誤以寒藥治寒嘔也若服吳茱萸湯反劇者則仍屬太陽熱邪而非胃寒明矣宜葛根加半夏湯小柴胡湯梔子豉湯黃芩湯若少陰證吐利厥逆將成危候腎中陰盛於煩躁欲死腎中之陰氣上逆

上格乎陽而爲吐逆故用吳茱萸散寒下逆人參薑棗助陽補土使陰寒不得上干溫經而兼溫中也吳茱爲厥陰本藥故又治肝氣上逆嘔涎頭痛

加附子名吳茱萸加附子湯治寒疝腰痛牽引陰囊中大寒痛嘔不能飲食腹中寒氣上衝皮起出見有頭足上下痛而不可近者陽受氣於胸中陽虛則陰邪得以中之高起痛嘔不可觸近之證也加附子以散陰寒之氣逆而上衝橫格於中焦故見乘於心爲熱相激故痛寒乘於脾脾冷弱不消

大建中湯（金匱）　治心胸中大寒痛嘔不能飲食腹

水穀故痛而嘔復不能飲食也

畢丸尺脈沈遲

蜀椒二合乾薑四兩人參二兩　煎去滓內飴糖一升

微煎溫服

蜀椒辛熱入肺散寒入脾煖胃入腎命補火乾薑辛熱通心助陽逐冷散逆人參甘溫大補脾肺之氣飴糖甘能補土緩可和中蓋人以中氣爲主用辛辣甘熱之藥大建其中臟之陽以祛其逆上之濁陰也

小建中湯（仲景）　治傷寒陽脈濇陰脈弦腹中急痛

邪氣入裏與正相搏則腹痛者血不足也尺脈上也尺陽在表半表半裏有胸脇痛而無腹痛者少陽在半表半裏有腹痛而無胸脇痛者太陽在表無腹痛也宜下之大柴胡湯小承氣湯三陰下利而腹痛者裏寒也宜溫之四逆湯附子理中湯腸鳴泄瀉而痛者裏虛有寒也宜小建中湯溫中散寒

傷寒二三日心悸而煩悸陰與此湯先建其裏倍芍藥者陽躡陰也加飴糖者甘以潤土土潤則萬物生也

通治虛勞悸衄裏急腹痛夢遺失精四肢痠痛手足煩熱咽燥口乾虛勞黃疸黃亟小便利無熱也不可除熱當作虛寒治之喻嘉言曰虛勞病至於以血火精血相搏難爲力矣急宜建其中臟使飲食增而陰血自旺故但用穇穭作甘之味生其精血而酸辛酸苦在所不用舍是無良法也

桂枝　生薑三兩　芍藥六兩　甘草一兩炙　大棗十二枚

入飴糖一升微火解服嘔家不可用建中以甜藥湯但桂枝加芍藥大黃湯也此即桂枝加芍藥湯名桂枝芍藥而名建中今人用建中絕不用飴糖失仲景遺意矣吳鵬皐曰桂枝當是桂枝故用以解表桂味厚故用以建裏

準繩曰脾居四臟之中生育營衛通行津液一有不調則失所肯所行矣必以此湯溫建中臟故名建中脾欲緩急食甘以緩之故以飴糖爲君甘草爲臣桂枝辛熱辛散也潤也營衛不足

潤而散之芍藥酸寒酸收也泄也津液不通收而行之故以桂芍爲佐生薑辛溫大棗甘溫胃衛之源脾者營之本鍼經曰營出中焦衛出上焦是已衛爲陽益之必以辛營爲陰補之必以甘相合脾胃健而營衛通故以薑棗爲使

李東垣曰傷寒論云陽脈濇陰脈弦法當腹痛以芍藥之酸土中瀉木爲君飴糖炙甘草溫補脾養胃爲臣水挾木勢亦來侮土肉桂大辛熱佐芍藥以退寒水薑棗辛甘而溫發散陽氣行於經脈皮毛爲使或謂桂枝湯解表散而芍藥多何也皮膚爲營建中湯溫裏而芍藥多建中湯溫裏而芍藥多何也皮膚爲營近則制小其服心腹爲衛遠則制大其服所以不同也按此即表欲其散裏欲其收之義小建中湯

中治腹痛者以木來尅土取芍藥爲君土中瀉木也理中湯治腹痛者以木來侮土取乾薑爲君土中瀉水也平胃散治腹痛自利者取蒼术爲君燥土除濕也雲岐子曰建中爲補能補中不能補上焦下焦之虛而不能瀉中焦之實而不能瀉上焦下焦之實

加黃耆兩許名黃耆建中湯金匱治虛勞諸不足黃耆益衛壯氣補中首藥四君益氣四物養血陰陽調和則血氣各安其位矣半夏和胃健脾麥冬清心潤肺滋營補命門相火之不足桂附引火守之火而歸元於十全大補之中而有加減之妙也

汗後身痛表虛惡寒脈遲弱者身痛乃六經俱有之證有表有裏有寒有熱有風有濕有陽證身痛但拘急陰寒身痛沉重宛如被杖以此別之此證四過汗耗損陽氣血少不能榮養筋骨故痛陽虛故脈遲汗後故脈弱用黃耆甘草之甘以補中氣芍藥之酸以收陰氣桂枝辛熱外以益衛而實表內以和營而補虛使中氣建立則能生肉營衛通行津液表不虛而身自汗斂止虛勞不足可愈矣

十四味建中湯　治氣血不足虛損勞瘵短氣嗜臥欲成勞瘵及陰證發斑

腎氣或四過服涼藥逢陰證發斑煩躁而發斑無根失守之火上侵心包或因汗吐下後中氣虛乏或因慾事損傷隱隱見於肌表與陽證發斑隨發隨已紫赤者不同此胃氣極虛若服寒涼立見危殆吳鵬皐曰以參者桂附治斑之變者也醫不達權安足語此實寒甚脈微

黃耆蜜炙　人參　白朮土炒　茯苓　甘草蜜炙　半夏薑製

當歸酒洗　白芍酒炒熟地　川芎　麥冬　肉桂　加薑棗煎

細辛陳皮名樂令建中湯治臟腑虛損身體羸瘦潮熱自汗將成勞瘵大能退虛熱生氣血（喻嘉言曰樂令建中湯柴胡細辛爲君意在退熱而陰虛之熱則不可退十四味建中湯川桂附蔴養意在復陽而陰虛之陽未必可復又在用方者之善爲裁酌兩建其脾腎之陽蓋虛勞之病多本脾腎兩建中之法乃後人超出之方也）

養中煎　治中氣虛寒爲嘔爲泄者

人參一二錢　山藥炒二錢　白蒻豆炒三錢　炙甘草一錢　乾薑炒黃一錢　如噯腐氣滯者加陳皮一錢或砂仁四分　如胃中空虛覺餓加熟地三五錢

白通加人尿豬膽汁湯　治陰病下利脈微者與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔而煩服此湯後脈暴出者死微續者生（腎者胃之關也前寒邪客之則不能禁固故下利也與白通湯後陰利水後陰利太甚丙爲格拒陽氣逆亂也服此湯後脈暴出者正氣因發泄而脫也故死脈微續者陽氣漸復也故生）

蔥白四莖　乾薑兩一　附子炮一枚　人尿五合　豬膽汁一合

加減法同四逆湯

蔥白之辛以通陽氣攝附之熱以散陰寒此白通湯也陰病下利脈微一陰少陰故加人尿豬膽汁爲引脈達少陰故加人尿豬膽汁爲引脈達下咽之後冷體既消熱性便發情且不違而致大益經曰逆而從之從而逆之正者正治反者反治此之謂也（以熱治寒以寒治熱以寒治寒爲反治亦曰從治謂從其性而伏之也按厥有陰陽二證陰厥者身涼不渴脈遲細而微陽厥者陽熱極而反厥雖厥而煩渴妄身復時現陽厥極深至於身冷脈微欲絕爲熱極而將死矣急以大承氣下之則厥愈所謂寒藥反能生人也若以熱藥助其陽則陰氣暴絕而死矣陰厥用白通四逆湯亦須急投緩則無及）

薑附白通湯　治暴卒中寒厥逆嘔吐瀉利脈微氣冷肌膚凜慄無汗盛陰沒陽之證

附子炮去皮臍一枚　乾薑炮五錢　蔥白五莖取汁　豬膽大者一枚

水二大盞煎薑二味至一盞入蔥汁并豬膽汁和勻服再用蔥一大握以帶輕束切去兩頭留二寸許以一面熨熱安臍上用熨蔥白上面取其熱氣從臍入腹甚者連熨二三十餅又甚者再用艾炷灸關元氣海各二三十壯（臍下一寸五分名氣海二寸名丹田三寸名關元）內外協攻務在一

時之內令得陰散陽回身溫不冷次用附子歸桂湯

愈嘉言曰寒中少陰行其嚴令埋沒微陽肌膚凍裂無汗而斃神守意用附子乾薑加葱白以散寒加豬膽汁引入陰分然恐藥力不勝熨葱灼艾外內協攻乃足破其堅凝少緩須臾必無及矣又曰用薑附以勝陰復陽者取飛騎突入重圍寨旗樹幟使陝散之陽望幟爭趨頃之復合爾不知此義者加增藥味和合成湯反牽制其雄入之勢必至藥緩無功矣

附薑湯　治卒暴中寒其人腠理素虛自汗淋漓身冷手足厥逆或外顯假熱躁擾乃陰盛於內逼其陽亾於外即前方不用葱白也

附子（炮去皮臍）乾薑（炮）　當歸　肉桂　水二大盞煎至一盞加豬膽汁一蛤殼和溫冷服不用葱熨及艾灼

愈嘉言曰若其人真陽素擾腠理素疎陰盛於內必逼其陽亾於外舩汗淋漓吞項强硬用附子乾薑豬膽汁即不可加葱及熨灼恐助其散

附薑歸桂參甘湯　治陽氣將回陰寒未盡端緒第三服即用此方

附子（炮去皮臍）乾薑（炮）　當歸　肉桂　甘草（炙）　水二大盞煎至一盞大棗三蛤殼溫服

愈嘉言曰其次前藥中即須首加當歸肉桂兼理其營以寒邪中人先傷營血故也不爾藥偏於衛弗及於營與病即不相當即邪不盡服必非勝算也

附薑歸桂參甘湯　治陽氣將回陰寒少殺略有端緒第三服即用此方

附子（炮去皮臍）乾薑（炮）　當歸　肉桂　人參　甘草（炙）　水二大盞煎至一盞大棗二枚煎

等分

辛溫平補湯　治暴中寒證服前三方後其陽已回身溫色活手足不冷吐利漸除第四方即用此平調臟腑營衛俾不致有藥偏之害

附子炮去皮臍 乾薑炮 肉桂五分 當歸酒炒一錢 人參 甘草炙蜜 白芍酒炒 五味子十二粒 水二大盞煎至一盞入棗二枚煎至一盞入蜜五

匙攪勻服

蛤殼溫服

喻嘉言曰用前藥二三劑後覺其陽明在躬運動頗輕神情頗悅更加黃耆白朮五味白芍大隊陰陽平補不可厭手蓋重陰見眼浪子初歸斯時搖搖靡定急緩不爲善後必墮前功也又曰用羣隊之藥以培陰護陽其人即素有熱痰陽出早已從陰而變寒至此無形之陰寒雖散而有形之寒痰阻塞竅隧者無由遽轉爲熱薑附固可弗施其牛黃竹瀝一切寒涼斷不可用若因其素有熱痰急投寒劑則陰復用事陽即躁擾必墮前功也

甘寒補氣湯　治中寒服藥後諸證盡除但經絡開微有窒塞辛溫藥服之不能通快者第五方用甘平助氣藥緩緩調之

人參 麥冬 白芍酒一錢 黃耆蜜炙一錢二分 生地黃二錢 甘草炙七分 牡丹皮八分 淡竹葉鮮者取汁少許更炒乾者七分 水二大盞煎至一盞入梨汁少許熱服無梨汁用竹瀝可代

喻嘉言曰前用平補後已示銷共放馬偃武崇文之意茲後復有頑痰留積經絡但宜甘寒助氣開通不宜辛辣助熱動頗輕神情頗悅更加黃耆白朮五味白芍大隊陰陽平補不可厭手蓋重陰見眼浪子初歸已而用其毒陽既安堵即宜休養其陰何得喜功生事徒令病去藥存轉生他患漫無寧宇也

益元湯活人　治面赤身熱不煩而躁飲水不入口名戴陽證成氏曰煩躁者先煩而後躁煩者悶亂也躁者動搖也煩躁者先煩漸至躁也躁煩熱先躁後煩謂怫怫然頭面更作躁悶此爲陰盛格陽也雖大躁欲於泥水中臥但飲水不得入口是也此氣欲脫而爭譬如燈將滅而復明矣按內熱曰煩謂心中鬱煩而躁及先躁後煩者皆可治外熱曰躁謂身灑手足動擾欲裸衣人井爲無根之火故但躁不煩及先躁後煩者皆不治大抵獨煩不躁者多屬熱雖躁者屬虛獨躁不煩者多屬寒而火那者

開或有之。

附子炮乾薑　肉桂　人參　麥冬　五味子　甘草　知母　人參　加薑棗葱白煎入童便一匙冷服

附子乾薑艾葉　黃連　知母以滋在下之陰。以靜其躁蓋陽無陰則孤陽無所附麗故扶陽亦兼和陰也陽虛退其陰火所謂甘溫能除大熱也黃連以折泛上之火知母以滋在下之陰。以靜其躁蓋陽無陰則孤陽無所附麗故扶陽亦兼和陰也麥冬五味補肺清心合人參以生其脈加童便

成方切用寒門卷之下　益元湯　四陽救急湯　壹

回陽救急湯節菴自註云即四逆湯　治三陰中寒初病身不熱頭不痛惡寒戰慄四肢厥冷。引衣自蓋蹉臥沉重腹痛吐瀉口中不渴或指甲唇青口吐涎沫是寒中厥陰也。指甲唇青口吐涎沫是寒中太陰也。指甲唇青口吐涎沫是寒中少陰也腹痛吐瀉不渴是寒中於裏陽氣不宣於四肢臥沉重是寒中於裏陽氣不宣於四肢臥沉重是寒中於裏陽氣不宣於四肢初病無身熱頭痛無表邪。邪不在陽也。引衣自蓋蹉臥沉重是寒中於裏陽氣不宣於四肢初病無身熱頭痛無表邪。邪不在陽也。引衣自蓋蹉臥沉重是寒中於裏陽氣不宣於四肢初病無身熱頭痛無表邪。邪不在陽也。引衣自蓋蹉臥沉遲無脈。陰寒為已甚矣。故心寒是蹉。鼓氣鼓動。外爭而內爭。而正不勝者。真陽衰微。陰勝陽。邪氣盛。陰盛則陽虛。陰勝陽。邪氣盛。陰盛則陽虛。陰勝故身痛振搖。振搖大汗以解也。

附子炮乾薑　肉桂　人參　半夏　陳皮七分　甘草三分　五味子九粒　加薑煎入　麝三厘調服無脈加豬膽汁。若入心而通脈。泄瀉加升麻黃耆嘔吐加薑汁。吐涎沫加鹽炒吳茱萸寒中三陰陰盛則陽微故以附子薑桂辛熱之藥祛其陰寒而以六君溫補之藥助其陽氣五味合人參可以生脈加麝香者通其竅也

栝蔞瞿麥丸金匱　治小便不利有水氣其人渴

栝蔞根二兩　茯苓　薯蕷三兩　附子一枚炮　瞿麥一兩

成方切用寒門卷之下　栝蔞瞿麥丸

煉蜜丸服以小便利腹中溫爲知。

金匱治小便不利而淋且渴者用之。以其胃中有熱腹中有寒故變八味丸之制爲此丸。見其人趺陽脈數。卽胃中有熱。胃熱必消穀引食。大便必堅。小便必數。是其淋而且渴。爲胃熱中消明矣。故用栝蔞以清胃熱。茯苓瞿麥以利小水。然腎中寒水之氣上入於腹則腹中必冷。故用附子以勝其寒。方下云。以小便利腹中溫爲知。制方之義可繹思也

中滿分消湯東垣　治中滿寒脹寒疝二便不通四肢厥逆食入反出腹中寒心下痞下虛陰躁奔豚不收（或多食寒凉及脾胃久虛之人胃中寒生滿病此湯主之）

川烏乾薑　畢澄茄　生薑　黃連　人參　當歸　澤瀉　青皮　麻黃　柴胡（二錢）草蔻仁　厚朴　黃檗（五分）益智仁　吳茱萸　木香　半夏　茯苓　升麻（三分）　熱服

川烏二薑吳茱澄茄益智草蔻除溼開鬱煖胃溫腎以祛其寒青皮厚朴以散其滿升麻柴胡以升其清茯苓澤瀉以降其濁人參黃耆以補其中木香以調其氣當歸以和其血麻黃以泄其汗半夏以燥其痰黃檗黃連以去溼中之熱又熱因寒用也（李東垣曰中滿治法當開鬼門潔淨府開鬼門者發汗也潔淨府者利小便也中滿者鬲之於內謂脾胃有病令上下分消其溼下焦如瀆氣血自然分化如或大實大滿大小便不利者從權以寒熱藥下之）

溫胃飲　治中寒嘔吐吞酸泄瀉不思飲食及婦人臟寒嘔惡胎氣不安等證

白朮（炒一二錢）當歸（一二錢）人參（一二錢）白藊豆（炒二錢）甘草（炙一錢）乾薑（炒黃一二錢）陳皮（炒一錢）如下寒帶濁者加故紙一錢　如氣濕或兼胸腹痛者加藿香丁香白豆仁砂仁白芥子之屬　如兼外邪及肝腎之病者加桂枝肉桂甚者加柴胡　如脾氣陷而身熱者加升麻五七分　如水泛為痰而脇脇滿者加茯苓一二錢　如脾胃虛極大嘔大吐不能止者宜倍用參朮仍加柴胡胡椒二三分煎熟徐徐服　如泄瀉者去當歸無濕去陳皮

四神丸　治腎瀉脾瀉腎瀉者（腎主五更時瀉也經曰腎者胃之關也前陰利水後陰利穀腎屬水水旺於子腎之關也故將交陽分則瀉也脾瀉者脾之清陽下陷不能鍵閉不能運化關門元氣不足不能分別水穀而瀉也兩證皆由腎命火衰不能上生脾土故也楊仁齋曰腎命之氣交通水穀自然剋化）

破故紙（四兩酒浸）一宿炒　五味子（三兩炒）　肉荳蔻（二兩麵裹煨）　吳茱萸（一兩鹽湯泡）　用大棗百枚生薑八兩切片同煮棗爛去薑取棗肉搗丸每服二錢臨臥鹽湯下（若平旦服之至夜藥力已盡不能敵一夜之陰寒也）

破故紙辛苦大澁能補相火以通君火火旺乃

能生土故以爲君肉蔻辛溫能行氣消食煖胃固腸五味鹹能補腎酸能澁精吳茱辛熱除濕煖脾能入少陰厥陰氣分而補火蓋久瀉皆由腎命火衰不可專責脾胃故大補下焦元陽使火旺土強泄瀉自止矣

單用五味子吳茱萸名二神丸治同前有全不進食者服補脾藥皆不效予長二神丸頓能進食此病不可全作脾治蓋腎氣怯弱真元衰削是以不能化食如釜鼎之無火物終不熟也

五味子散治同除五味吳茱萸加茴香一兩木香肉蔻丸亦名四神丸瀉治同茴香亦煖胃之藥木香行氣

五錢薑煮棗丸

治脾胃虛寒噫吐泄瀉而兼溼者

人參二三錢　乾薑炒黃二錢　白朮　茯苓二錢　甘草一炙

加陳皮一錢名六味異功散之變方也

兼微滯者

按此即四君子湯五味異功散等藥

感應丸

治新舊冷積瀉痢等證

木香　肉蔻煨　丁香兩半　乾薑炮　百草霜一兩　杏仁一百四十粒去皮尖　巴豆七十粒去皮膜研去油心　巴豆杏仁另研同前藥末和勻用好黃蠟六兩溶化重絹濾

之間牽連痛楚亂其氣血攪其經界此而用氣分諸藥則轉益其痛勢必危殆仲景用蜀椒烏頭一派辛辣以溫散其陰邪然恐胸背既亂之氣難安而即於溫藥隊中取用乾薑之泥赤石脂之濇以填塞厥氣所橫衝之新隧俾胸之氣自行於胸背之氣自行於背各不相犯其患乃除此煉石補天之精義也今人知有溫氣補氣行散氣諸法矣亦知有堵塞邪氣攻衝之竇令胸背陰陽二氣並行不悖者哉

去渣好酒一升於砂鍋內煮數沸候酒冷蠟浮用清油一兩銚內熬熟取蠟四兩同化成汁就銚內和前藥末乘熱拌勻丸如豆大每服三十丸空心薑湯下

肉蔻逐冷消食下氣和中丁香煖胃助陽宣壅除癖木香升降諸氣和脾疎肝杏仁降氣散寒潤燥消積炮薑能逐痼冷而散痞通關巴豆善破沉寒而奪門宣滯寒積滯鉗非此莫攻百草霜和中溫散亦能消積治痢爲佐也醫貫曰此方神妙不可言雖有巴豆令人瀉其積自然消化李時珍曰一婦年六十餘溏瀉五載犯生冷油膩肉食即作痛服升澄藥瀉反甚脈沉而滑此乃脾胃久傷積冷凝滯法當以熱下之用蠟匱巴豆丸五十粒服二日當遂愈百人每用治瀉痢愈者近百人

久痛丸 金匱　治久寒心痛兼治卒中惡腹脹痛口不能言又治連年積冷流注心胸痛并冷腫上氣落馬墜車血疾等

附子三兩生　狼牙香炙　巴豆去皮心膜研　人參　乾薑　吳茱萸一兩　煉蜜丸桐子大酒下強人初服三丸日三服弱者二丸

仲景於胸痺證後附久痛丸治久寒心痛以其久着之邪不同暴病故藥則加峻而湯改爲丸取緩攻不取急蕩也久寒心痛乃久客之劇證即腎水乘心腳氣攻心之別名也痛久血瘀陰邪團結溫散藥中加生狼牙巴豆吳茱萸驅之使從陰竅而出以其邪據胸中結成堅壘非搗其巢邪終不去爾

黃芽丸　治脾胃虛寒或飲食不化或時多脹滿泄瀉吞酸嘔吐等證

人參二兩　焦乾薑二錢　蜜丸次實大常嚥服甚妙

加甘草二錢爲散名參薑散治脾肺虛寒嘔吐咳嗽氣短小兒吐乳等證　二方或陳皮或草撥或狀苓皆可酌用

導氣湯　治寒疝疼痛（陰氣積於內復爲寒邪所冷結硬如石或引睾丸而痛名寒疝）

川練子四錢　木香三錢　茴香二錢　吳茱萸一錢　長流

水煎
此治痎之通劑也川練苦寒能入肝舒筋使無攣急之苦又能導小腸膀胱之熱從小水下行爲治痎之主藥木香升降諸氣通利三焦疏肝而和脾茴香能入腎與膀胱煖丹田而祛冷氣吳茱萸入肝腎氣分煖溼而除寒三者皆辛溫之品用以宣通其氣使小便下利蓋痎病多因寒溼所致寒去則溼自除也

附子粳米湯（方見卷末）
治腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐

附子一枚（炮）　半夏半升　甘草一兩（炙）　大棗十枚　粳米半升　以水八升煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

腹中陰寒奔迫上攻胸脇以及於胃而增嘔逆頃之胃氣空虛邪無所隔徹入陽位則殆矣是其除患之機所重全在胃氣乘其邪初犯胃尚自能食而用附子粳米湯以溫飽其胃胃氣溫飽則土厚而邪難上越胸脇逆滿之濁陰得溫無攸留戀必還從下竅而出曠然無餘此持危扶頓之手眼也

胃關煎　治脾腎虛寒作瀉或甚至久瀉腹痛不止冷痢等證

熟地三五錢或一兩　山藥炒　蘊豆炒二白术炒　焦乾薑一二錢　甘草一二錢　吳茱萸製五七分　炙一二錢炒麪或補骨脂亦可　氣虛甚者加人參隨宜用　陽虛下脫不固者加製附子一二三錢　腹痛甚者加當歸二三錢　滯痛不通者加當歸二三錢　滑脫不禁者加烏梅二箇或五味子二十粒　肝邪侮脾者加肉桂一錢

佐關煎　治生冷傷脾瀉痢未久腎氣未損者宜用此湯以去寒溼安脾胃此胃關之佐者也

厚朴炒　陳皮炒一錢　山藥炒　蘊豆炒二錢　乾薑炒　肉桂一二錢　甘草炙七分　豬苓　澤瀉　如腹痛甚者加木香三五分吳茱萸亦可

抑扶煎　治氣令陰虛或暴傷生冷致成瀉痢凡初起氣血未衰脾胃未敗或脹滿或嘔惡皆可

先用此湯此胃關煎表裏藥也宜察虛實用之其有寒溼傷臟霍亂邪實者最宜用此

厚朴　陳皮　烏藥各一錢半　豬苓　澤瀉各二錢　甘草炙一錢　乾薑炮一錢二錢　吳茱萸製五七分　如氣滯痛甚者加木香五七分或砂仁亦可　血虛多痛者加當歸二錢　寒溼勝者加蒼朮錢半

天台烏藥散　治小腸疝氣牽引臍腹疼痛厥陰肝脈絡於陰器上入少腹循喉嚨乃肝脈也肝主筋故牽引疼痛小腸經絡並於厥陰寒邪客於小腸少腹痛引睾丸上而不下痛入脇腹甚則上衝心胸故俗亦名小腸氣古人指往往相類（天台烏藥散　柳州扶病）

巴豆七十粒　川練子十箇　烏藥　木香　茴香鹽炒　良薑炒　青皮五錢　檳榔二箇　先將巴豆微打破同川楝麩炒黑去麩及巴豆同餘藥爲末酒下一錢烏藥散膀胱冷氣能消腫止痛川楝導小腸邪熱從小便下行木香青皮行氣而平肝良薑茴香散寒而煖腎檳榔性如鐵石能下水潰堅巴豆斬關奪門破血瘕寒積皆行氣祛溼散寒之品也

憲芬仁附子散　治胸痺緩急之證

大附子一枚炮　杵爲散服方寸七日三服

胸中與太空相似天日照臨之所而膻中之陽運氣又賴以苞舉一身之氣者也今胸中之陽運而不舒其經脈所過非緩即急失其常度總由陽氣不運故致然也用憲芬仁以舒其經脈用附子以復其陽則宗氣大轉陰濁不留胸際噫若太空所謂化日舒長曾何緩急之有哉

四維散　治脾腎虛寒滑脫之甚或瀉痢不能止或氣血下陷二陰血脫不禁者無出此方之右

人參一兩　乾薑黃炒　製附子二錢　甘草炙一錢　烏梅五分或一箇　右爲末每服二錢酌其病之微甚而用之或不用此即四味倒陽飲也或加減乾再爲末每服一二錢溫酒調下

疝氣方　治疝氣發痛

吳茱萸　杜仲炒　枳殼麩　梔子　當歸　荔枝核煅　等分爲末空心長流水煎湯下二錢

吳茱入厥陰氣分溫肝逐寒山梔瀉三焦火熱

由膜胱出枳殼行氣而破癥山查散瘀而磨積荔枝雙結形類疝氣九能入肝腎辟寒散滯故假之以爲引也丹溪曰疝病白素問而下皆以爲寒世有寒而無疝者必有說以通之可也因思此病始於濕熱在經鬱遏以至久久感外寒濕熱被鬱而作痛只作寒論恐有未盡古方以烏頭梔子等分作湯其效亦速後因此方隨證加減無有不應須分濕熱多少而治之又有挾虛而發者當以參朮爲君而佐以疎導其脈沉緊而遲大者是也按疎導藥即桃仁山查枳實黑梔川楝吳茱萸延胡丁香木香之類。

鎮陰煎　治陰虛於下格陽於上則真陽失守血隨而溢以致大吐大衄六脈細脫手足厥冷危在頃刻而失血不能止者速宜用此使孤陽有歸則血自安也如治格陽喉痺上熱當以此湯冷服

熟地一二兩　牛膝二錢　甘草炙一錢　澤瀉錢半　肉桂一二錢　製附子一二錢或五七分　如兼嘔惡者加乾薑炒黃一二錢　如氣脫倦言而脈弱極者宜速速多加人參隨宜用之

橘核九　治四種癪痛睾丸腫硬不痛不癢爲癪痛不癢爲癀痛有囚膵腹痛等證

橘核川楝子海藻海帶昆布桃仁二兩延胡索厚朴枳實木通桂心木香五錢酒糊丸鹽湯或酒下

橘核木香能入厥陰氣分而行氣桃仁延胡能入厥陰血分而活血川楝木通之熱由小便下行所以去濕官桂能導小腸膀胱補腎命之火所以祛寒厚朴枳實並能行結水而破宿血昆布海藻帶鹹潤下而軟堅寒行水以泄熱濕久爲熱寒久亦爲熱。同爲散腫消堅之劑也朱丹溪曰癪痛不痛非痛斷房事與厚味不可若蒼木神麴山查白芷川芎枳實牛夏皆要藥又宜隨時月寒熱加減有熱加梔子堅硬加朴硝秋冬加吳茱萸。

歸氣飲　治氣逆不順呃逆嘔吐或寒中腧腎等證

熟地三五錢　茯苓　藿香一錢半　甘草八分　中氣寒甚者加製附子肝腎虛寒者加吳茱萸肉桂或加當歸

熟地二錢　炮薑一錢　丁香　陳皮　痩肝煎　治肝腎陰寒小腹疼痛等證

當歸二錢　枸杞子三錢　茯苓　小茴香　烏藥二錢　肉桂一錢二　沉香一錢或木香亦可　生薑三五片　如寒甚者加吳茱萸乾薑再甚者加附子一

補火丸　治冷勞氣血枯竭肉瘠齒落肢倦言微

吳鶴皐曰凡人之身有真火焉寄於右腎行於三焦由人於甲膽聽命於天君所以溫百骸養臟腑充九竅者皆此火也爲萬物之父故曰天非此火不能生物人非此火不能有生此火一息猶萬物無父故其肉衰而齒落筋衰而肢倦氣衰而言微也

豬大腸二尺　將硫黃爲末入豬腸中

爛煮三時取出去腸蒸餅爲丸如梧子大每服

十九日漸加之凡服硫黃者忌食諸禽獸血

硫黃火之精也亦號將軍大黃至寒亦號將軍故用之以補火以其大熱有毒故用豬臟爛煮以解之庸俗之人忌而罕用蓋不知其有破邪歸正返濕還清消陰回陽化魄生魂之力也吳鶴皐曰元禮有言凡服硫黃者忌食諸禽獸血惟黃連寒而不濕諸藥皆燥惟硫黃熱而不燥昔仁和吏舉服之年至九旬今正公之金液丹得效之玉真丸如神他如范文正公之參苓復元楊氏之紫霞丹但所主各有攸當爾之之道陰陽虛衰性質不能補者非硫黃不能補之其性雖燥毒而御敵利人有真陽人之補之其性雖燥毒而御敵利人與燥糟者不同苟製鍊得宜護爲救危拯弱藥用之不當賠禍

附金液丹　硫黃十兩研末瓷盒盛水和赤石脂封口鹽泥固濟日乾地內埋一小罐盛水令滿安盒在內用泥固濟慢火養七日七夜加頂火一觔煅取出研末蒸餅丸米飲下治久寒錮冷勞傷虛損傷寒陰證

來復丹　太陰元精石舶上硫黃硝石各一兩

同微煅不可大火拂條攪結成砂子五靈脂去砂青皮陳皮各一兩黃蠟玉機微義

雨醋和丸米飲下治伏暑泄瀉身熱脈弱

半硫丸　半夏硫黃等分生薑糊丸治老人虛祕冷祕

日硝石性寒佐以陳皮其性跋快硫黃能利大腸若作煖藥止瀉誤矣此由陰陽閉結揮霍變亂此藥通利三焦分理陰陽服之甚驗若因暑火燥熱者勿用

靈砂丹　水銀三兩硫黃一兩鍊成研細糯米糊丸治諸虛錮冷

二氣丹　硝石硫黃等分爲末石罐炒成砂再研糯米糊丸梧子大每服四十九井水下治伏暑傷冷二氣交錯中脘痞結或嘔或泄霍亂厥逆

返陰丹治陰毒傷寒心神煩躁四肢逆冷硫黃五兩硝石太陰元精石各一兩附子炮乾薑炮桂心各五錢用鐵銚先舖元精末一半次舖硝石末一半中間蓋硫黃末又着硝石一半蓋硫黃再以元精末蓋上用小盞合着炭三觔燒令得所勿令煙出研末和前藥末飯丸梧子大每服十五至二十九艾湯下汗出爲度

木事方破陰丹治陰中伏陽煩躁六脈沉伏硫黃一兩陳皮青皮各五錢先將硫黃入銚銚開次下水銀鐵杖攪勻令無星細研糊丸每服三十丸如煩躁冷鹽湯下陰證艾湯下

傷寒百問方硫黃五錢艾湯調下治身冷脈微厥而煩躁令臥汗出而愈

黑鉛丹黑鉛硫黃各二兩將錫鎔化漸入硫黃味結成靈砂爲君諸香燥純陽之藥爲臣用金鈴子苦寒一味爲反佐用沉香引入至陰之分爲使凡遇陰火逆冲真陽暴脫氣喘痰鳴之急證合此藥再無他法可施每用小囊佩帶隨身恐遇急證不及取藥且欲以吾身元氣溫養

黑錫丹　治真元虛憊陽氣不固陰氣逆冲三焦不和冷氣刺痛飲食無味腰背沉重膀胱久冷陽不升降上盛下虛頭目眩運

夜多小便女人血海久冷赤白帶下及陰證陰毒四肢厥冷不省人事急用棗湯吞一百粒自便回陽此藥大能升降陰陽補虛益元隆爽除濕破癥

黑錫去滓研　硫黃二兩麪裹煨　葫蘆巴酒浸炒　附子炮陽起石細研水飛　肉豆蔻麪裹煨　金鈴子蒸去皮核　沉香　舶茴香　破故紙　木香　肉桂半兩　用鐵銚內如常法結黑錫硫黃砂子地上出火毒研令極細餘藥並細末和勻白朔至暮以研至黑光色爲度酒糊丸如桐子大陰乾入布袋內擦令光瑩每四十丸空心鹽薑湯下女人艾棗湯下急證用百丸

喻嘉言曰此方用黑錫水之精硫黃火之精二味結成靈砂爲君諸香燥純陽之藥爲臣用金鈴子苦寒一味爲反佐用沉香引入至陰之分爲使凡遇陰火逆冲真陽暴脫氣喘痰鳴之急證合此藥再無他法可施每用小囊佩帶隨身恐遇急證不及取藥且欲以吾身元氣溫養

其藥藉手効靈厥功歷歷可紀即如小兒佝瘡與此藥適不相值然每有攻之太過如用蜈蚣穿山甲桑蟲之類其瘡雖勢然而起然頭面遍身腫如爪匏瘡爛難乾乃至眞陽上越氣喘痰鳴兒醫撒手駭去　投此丸領其陽氣下入陰中施以大劑地苘湯峻補其陰以固戀夫眞陽肌膚之熱反清腫反消瘡爛反乾而成厚靨如此而全活者不知凡幾因附本方項下以廣用方者之識

五德丸　治脾腎虛寒飧泄鶩溏等證或暴傷生冷或感時氣寒溼或酒溼傷脾腹痛作泄或飲食失宜嘔惡痛泄無火等證

補骨脂四兩炒　北五味或用肉荳蔻代之煨炒　吳茱萸製　木香二兩煨　乾薑四兩炒

右為末湯浸蒸餅丸桐子大每服六七十丸白滾湯或米湯或人參湯俱可下　腹痛多嘔者加胡椒二兩更妙

七德丸　治生冷傷脾初思瀉痢腹疼痛凡年少氣血未衰及寒溼食滯凡宜和胃者無不神效此即佐關煎之偏裨也

補骨脂炒四兩　乾薑炒焦蒼术炒　木香　茯苓一兩　神麴糊為丸梧子大每服七八十丸或百丸白滾湯下

唐鄭相國方　治虛寒嗆嗽腰腳疼痛

破故紙十兩酒蒸為末　胡桃肉二十兩去皮爛研　蜜調如飴每晨酒服一大匙不能飲者熟水調忌鐵器　羊血也

破故紙屬火入心包命門能補相火以通君火煖丹田壯元陽胡桃屬木能通命門利三焦溫肺潤腸補養氣血有木火相生之玅氣足則肺不虛寒血足則腎不枯燥久服利益甚多不獨上療嗆嗽下强腰腳而已也

水母之無蝦也李時珍曰命門在兩腎中央為生命之原相火之主腎命相通藏精而惡燥胡桃狀類腎皮汁青黑故入北方佐破故紙潤燥而調血使精氣內充血脈通調諸證自然愈矣

炒川萆薢童便浸　蜜丸治同加杜仲胡蘆巴小茴香萆薢名喝起丸治小腸氣痛引腰
復陽丹　治陽虛嘔吐泄瀉腹痛寒疝等證
北五味炒　甘草炙　附子製炮薑　胡椒兩　白麵二兩炒焦　爲末和勻入溫湯搗丸桐子大每服一錢隨證用藥引下
三氣飲　治氣血虛損風寒濕三氣乘虛內侵筋骨歷節疼痛之極及痢後鶴膝風痛等證
當歸　枸杞　杜仲二錢熟地三錢或加減用　甘草炙　北

細辛或代以獨活　芍藥酒炒　牛膝　茯苓　肉桂　白芷　附子一錢生薑三片　如氣虛者加人參白朮隨宜　風寒勝者加麻黃一二錢　此飲亦可浸酒大約每藥一觔可用燒酒六七觔浸十餘日徐徐服之

壽脾煎一名摠管煎　治脾虛不能攝血等證凡憂思鬱怒積勞及誤用攻伐等藥犯損脾陰致中氣虧陷神魂不寧大便脫血不止或婦人無火崩淋等證兼嘔惡尤爲危候速宜用此亟救脾氣

則統攝固而血自歸源此歸脾湯之變方也
如神若犯此證而再用寒涼則胃氣必脫無不即斃者
白朮二三錢　當歸　山藥二錢　棗仁牛錢炒　甘草炙一錢　遠志製三五分　炮薑一二錢　蓮肉去心炒二十粒　人參隨宜一二錢急者用一兩　如血未止加烏梅二箇凡畏酸者不可用或加地榆錢半亦可　滑脫不禁加醋炒文蛤一錢下焦虛滑不禁加鹿角霜二錢爲末攪入藥中服之　氣虛甚者加炙黃耆二三錢

氣陷而墜者加炒升麻五七分或白芷亦可
兼滑泄者加補骨脂一錢炒用　陽虛畏寒者加附子一二三錢　血去過多陰虛氣餒心跳不寧者加熟地人參七八錢或一二兩
一煎丹　治脾腎虛寒不時見等證此即參附湯之變方也　人參　製附子等分　煉白蜜爲丸如菜豆大每用白滾湯送下三五分或一錢凡藥餌不便之處或在途次暈船此丹最妙

九烝丹　治脾腎虛寒如五德丸之甚者
熟地八兩　附子製四兩　肉蓯蓉炒麥一兩　吳茱萸　熊薑
補骨脂炒酒一兩　五味子二兩　粉甘草炙一兩　煉
蜜丸或山藥糊丸桐子大每服六七十丸或百
丸滾白湯下如氣虛者加人參或二兩或四兩
尤妙

聖朮煎　治飲食偶傷或吐或瀉胸膈痞悶或脇
肋疼痛或過用苦伐等藥致傷臟氣而脈息無
力氣怯神倦者速宜用此不得因其虛滿虛痞
而畏用白朮此中虛實之機貴乎神悟也若痛
脹覺甚者即以此煎送神香散最妙若用治寒
瀉嘔吐諸尤爲聖藥

白朮用冬朮味甘者炒五六七八錢或一兩　乾薑炒赤肉桂一二錢
陳皮酌用或不用　若治虛寒瀉痢嘔吐等證則人
參甘草之類當隨宜加用　若治中虛感寒則
麻黃柴胡之類亦隨宜加用

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷七上

消暑門　正方二十　附方二十四

消暑丸　黃連消暑丸　小半夏茯苓湯　黃連香薷飲　二香散　三物香薷飲　五物香薷飲　六味香薷飲　十味香薷飲　五縮飲　大順散　來復丹　方見寒門　枇杷葉散　冷脾飲　桂苓甘露飲　又桂苓甘露飲　清燥湯　二妙散　三妙散　六一散　益元散　碧玉散　雞蘇散　清六丸　清暑益氣湯　黃耆人參湯　補肝湯　補三生益元散　黃連六丸　吳五苓散　方見泄門　四味香薷飲　方見燥門　石膏湯　方見火門　人參白虎湯　方見火門　生脈散　五味子湯　補氣補氣茯苓湯　補水葫蘆丸　大黃龍丸　潑火散

吳氏醫學述第四種

武原吳儀洛遵程輯

門人周蘭九生庭
男　有榆蒼培同較
有杜雋望

成方切用

消暑門

暑本夏月之熱病。左傳陰暍人於樹。暑久矣。在仲景謂之中暍。凡盛暑烈日之時。或於長途。或於田野。不辭勞苦。致病頭疼煩躁。肌體大熱大渴等證。遇無汗者。必以得汗爲正治。安知散外邪得汗已。尤有不得汗者。安察氣之虛實。火之微甚。或清其內。若多汗者。又當以益氣。或補可也。有畏暑貪涼。不避寒氣。或於淡堂大廈。或於風地樹陰。或乍熱乍寒之時。不謹衣被。以致寒邪襲於肌表。而病發熱惡寒。頭痛無汗。身形拘急。肢體痠疼等證。惟宜溫散爲主。當以傷寒傷法治之。又有不慎口腹。過食生冷。以致寒涼傷臟。而爲嘔吐瀉痢腹痛等證。治宜溫中。爲主。尚其不分表裏。不察陰陽。則殺人慘於刀刃矣。

消暑丸 海藏

治伏暑煩渴。發熱頭痛。脾胃不利。

半夏一兩 煮乾 酯五 茯苓 甘草 半生用 薑汁糊丸

勿見生水。熱湯下。有痰生薑湯下。

長夏炎蒸。溼土司令。故暑必兼溼。證見便祕煩渴或吐或利者。以溼勝不得施化也。此方不治其暑。顓治其溼。用半夏茯苓行水之藥。少佐甘草以和其中。半夏用醋煮者。醋能開胃散水。斂熱解毒也。使暑氣溼氣俱從小便下。降則脾胃和而煩渴自止矣。熱蒸其溼。是爲暑。無溼則但熱而已。非暑也。故肥人溼多。即病暑者多。瘦人火多。即病熱者多。

本方一兩 黃連二錢 名黃連消暑丸 治伏暑煩渴而多熱痰。

小半夏茯苓湯 金匱 治卒嘔吐心下痞膈間有水。眩悸。

方見下卷燥溼門

四味香薷飲 治感冒暑氣。皮膚蒸熱。頭痛頭重。或煩渴或吐瀉。

香薷一兩 厚朴 薑炒 五錢 黃連 薑炒 三錢 冷服

香薷辛熱。必冷服者。經所謂治熱以清涼而行之也。熱服作瀉。

香薷辛溫。香散。能入脾肺氣分。發越陽氣。以散皮膚之蒸熱。厚朴苦溫。除溼散滿。以解心腹之凝結。藿香甘淡。能消脾胃之暑溼。降濁而升清。黃連苦寒。能入心脾。清熱而除煩也。李時珍曰。有處高堂大廈而中暑者。緣納涼太過。飲冷太多。陽氣爲陰。邪所遏。反中入內。故見頭痛惡寒之證。用香

藿以發越陽氣散水和脾則愈王履曰此非仲暑蓋亦傷寒之類爾按香藿乃夏月發汗之藥其性溫熱只宜於受寒之人若暑火證服之反戕大害凡元氣虛者用之適足以招暑今人謂能解暑藥用代茶是開門揖盜也

除藊豆名黃連香藿飲治中暑熱盛口渴心煩或下鮮血暑邪所逼加茯神治癉瘧癉獨熱不寒曰癉瘧當責之暑邪暑先入心故加茯神以寧心除黃連加木瓜甘草香附陳皮蒼术紫蘇名二香藿飲治中暑濕盛再加傷身熱腹脹除黃連名三物香藿飲治傷暑嘔逆泄瀉再加茯苓甘草名五物香藿飲驅暑和中再加木瓜名六味香藿飲治中暑濕盛再加人參黃耆白术陳皮名十味香藿飲治暑濕內傷頭重吐利身倦神昏暑濕夾陰誤中加人參黃耆白术陳皮誤用香藿飲入疾便瘖後賢於香藿飲瘖嗌也三物香藿飲加羌活防風治夏月僵仆手足搐搦名暑風或再加黃耆芍藥

縮脾飲　清暑氣除煩渴止吐瀉霍亂及暑月酒食所傷

藊豆炒研　乾葛二錢砂仁　草菓煨去皮　烏梅　甘草

用白砂炒次入薑杏炒過篩去砂淨合桂為末每服二三錢湯點服

夏月過於飲冷飧寒陽氣不得伸越故氣逆而霍亂吐瀉也脾胃喜燥而惡溼喜溫而惡寒乾薑肉桂散寒燥溼杏仁甘草利氣調脾皆辛甘發散之藥升伏陽於陰中亦從治之法也吳鶴皐曰此方非治暑乃治暑月飲冷傷脾胃病矣故大蒜辛熱通竅故亦有安胃而投良等辛熱之品禍不旋踵矣

大順散　治冒暑伏熱引飲過多脾胃受溼水穀不分清濁相干陰陽氣逆霍亂吐瀉臟腑不調乾薑　桂　杏仁去皮尖　甘草　等分先將甘草

方見卷六下祛寒門補火丸附方內
枇杷葉散　治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩
枇杷葉去毛炙　陳皮去白焙　丁香　厚朴去皮薑汁炙五錢　麥門冬　乾木瓜　甘草　香薷半錢
白茅根　搗羅爲末每服二錢水一盞生薑三片煎七分溫服溫湯調服亦得如煩躁用井花水調下小兒三歲以下可服五分更量大小加減
冷香飲子　治傷暑口渴霍亂腹痛煩躁脈沉微或伏
附子炮一錢　陳皮　甘草炙　草菓半錢　水盞半薑十片煎八分去滓井水頓冷服
桂苓甘露飲　治中暑霎溼引飲過多頭痛煩渴溼熱便祕
滑石四兩　石膏　寒水石　甘草二兩　白朮　茯苓　澤瀉一兩　豬苓　肉桂五錢　每服三錢或五錢此五苓六一之合劑以清六腑之熱也
張子和去豬苓減桂只用一錢每服三錢亦名桂苓甘露飲治伏暑煩渴脈虛水逆渴欲飲水入卽吐名水逆
清暑益氣湯　東垣　治長夏溼熱炎蒸四肢困倦精神減少胸滿氣促身熱心煩口渴惡食自汗身重肢體疼痛小便赤澁大便溏黃而脈虛者暑溼人脾土受傷故肢倦便溏暑熱傷肺故氣促心煩口渴便赤澁氣在上則生臌脹故胸滿惡食暑先入心汗爲心液故自汗溼盛故身痛身重寒傷形表邪外盛故脈大而有餘暑傷氣元氣耗傷故脈虛而不足
黃耆　人參　白朮炒　蒼朮　神麯炒　青皮麩炒　陳皮留白　甘草炙　麥冬　五味　當歸酒洗　黃檗酒炒
澤瀉　升麻　葛根　薑棗煎
熱傷氣參耆益氣而固表溼傷脾二朮燥溼而強脾火盛則金病而水衰故用麥冬五味以保肺而生津肺爲水之上源火旺克金則金不能生水麥冬冬台人參生脈生津
黃檗以瀉熱而滋水青皮平肝而破滯當歸養血而和陰神麯化食而消積升葛解肌熱而升清清氣上升能生津液又風能勝溼
澤瀉瀉溼熱而降濁陳皮

理氣甘草和中合之以益氣强脾除溼清熱也東垣曰脾虛肺氣先絕故用黃耆閉滕理止汗益氣脾胃既虛陰火傷其生發之氣營衛大虧血虛以人參補之陽旺自能生陰血也更加當歸和血又加黃檗以救腎水蓋甘寒瀉火火滅則心氣得平而安也心火乘脾故用炙草瀉火而補脾少用恐滋滿也中滿者去之若腹中急痛急縮者卻宜多用咳者去人參爲清濁相干故以橘皮理之長夏溼勝故加二朮澤瀉上下分消其溼熱也溼勝則食不化炒麴辛其青皮辛溫治食快氣五味麥冬人參甘微酸寒瀉火熱而益肺金也醫貫曰有傷暑吐衄者宜滿暑益氣加丹皮生地犀角之類蓋暑傷心心亦傷氣其脈必虛以參耆補氣斯無弊也

除青皮澤瀉乾葛名黃耆人參湯東垣治暑傷元氣注夏倦怠胸滿自汗時作頭痛時痛時止爲內傷證除白朮青皮麥冬五味加茯苓豬苓柴胡羌活防風連翹知母名補肝湯東垣治陰汗如水陰冷如氷腳痿無力

清燥湯東垣　治肺金受溼熱之邪痿躄喘促胸滿少食色白毛敗頭眩體重身痛肢倦口渴便祕經曰肺者相傳之官治節出焉火盛尅金則嘘熱葉焦氣無所主而失其治節故肢體或縱或縮而成痿躄也火上逆肺故喘促肺主皮毛故色白毛敗溼熱壅於腠中故胸滿壅於陽明則食少上升於頭則眩注於身則體重流於關節則身痛肺受火傷大氣不能下降膀胱絕其化源故小便赤澀也

黃耆錢半　蒼朮炒一錢　白朮炒　陳皮　澤瀉五分　人參　茯苓　升麻三分　當歸酒洗　生地黃　麥冬　甘草炙神麴炒　黃檗酒炒　豬苓二分　黃連一分　五味子九粒　柴胡三分

肺屬辛金而主氣大腸屬庚金而主津燥金受溼熱之邪則寒水腑生化之源絕則腎水虧金不能生血不宜過用寒涼以傷心脾生地犀角之類蓋暑傷心亦傷氣其脈必虛以參耆補氣斯無弊也

二朮參苓甘橘神麴健脾燥溼理氣化痰所以升運動其土土者金之母也麥冬五味保肺以生津當歸生地滋陰而養血黃檗黃連燥溼而清熱黃芩止嗽藥加牛膝名三拗湯治清豬苓瀉所以降濁使溼熱從小便出則燥金清清肺爲高風病大率與諸痿證混同論治古聖論風痿條目不同治法亦異夫風病外感善行數變其病多實痿表行濕有何不可諸痿起於肺熱傳入五臟散爲諸證其昏惑瘈瘲昧暴瘖瘂皆屬於火其四肢不舉足痿舌强痰涎有聲皆屬於土悉是溼熱之病當作諸痿論治

大抵祇宜補養。若以外感風邪治之。寧免實實虛虛之禍乎。或曰。內經治痿。獨取陽明。何也。曰。只諸痿生於肺熱一語。已見大意。金體燥而居上。性涇而居中。主四肢。畏火者也。土性濕而惡木。木所養。火寡於畏。而侮所勝。肺得火邪而熱。矣。肺受熱。則金失所養。木寡於畏。而侮所勝。脾得木邪而傷矣。肺熱則不能管攝一身。脾傷則四肢不爲人用。而諸痿之病作矣。瀉南方。則肺金清。而東方不實。何脾傷之有。故陽明實。則宗筋潤。能束骨。虛。何肺熱之有。補北方。則心火降。而肺金不虛。何肺熱而利機關矣。治痿大法。無過於此。

六一散　河間　治傷寒中暑。表裏俱熱。煩躁口渴。小便不通。瀉痢熱瘧。霍亂吐瀉。下乳滑胎。解酒熱毒。偏主石淋。暑熱皆陽邪。在表則發熱。在裏則煩渴。瀉痢。霍亂。在上則煩渴。在下則便祕。或熱瀉火氣煎灼。精結成石。則爲石淋。

滑石六兩　甘草一兩　爲末。冷水或燈心湯調下。丹溪曰。泄瀉及嘔吐。生薑湯下。

中寒者加硫黃少許

滑石重能清降。寒能瀉熱。滑能通竅。淡能行水。使肺氣降而下通膀胱。火退則肺氣下降。故能祛暑佳也。小便利。則大便實。痢自虛。加甘草者。和其中氣。又以緩滑石之滑降也。甘。敷六一之義也。故又名天水散。發河間曰。統治上下表裏諸病。蓋取其能通除上下三焦涇熱也。然暑體盛涇多之人。宜服之。以解暑利水。使涇熱從小便出。若無涇之人。而服此。則反耗其津液。而渴轉甚矣。又當用生脈散。○清暑益氣湯六一比。

治涇熱吞酸。除滑石。加黃耆六兩名黃耆六一散。治諸虛不足。盜汗發熱。頭疼煩躁而渴。宜服。吞忍冬丸。

五苓散　治暑涇爲病。發熱頭疼。煩躁而渴。小便利。大便實。痢自虛。加甘草者。和其中氣。又以緩滑石之滑降也。甘。敷六一之義也。故又名天水散。發河間曰。統治上下表裏諸病。蓋取其能通除上下三焦涇熱也。然暑體盛涇多之人。宜服之。以解暑利水。使涇熱從小便出。若無涇之人。而服此。則反耗其津液。而渴轉甚矣。又當用生脈散。○清暑益氣湯六一比。

方見下卷燥涇門

竹葉石膏湯　治傷暑發渴。脈虛。

人參白虎湯　治太陽中暍。身熱汗出。足冷惡寒。脈微而渴。

以上二方俱見卷八下清火門

生脈散 千金　治熱傷元氣短倦息口渴多汗肺虛而咳肺主氣。火熱傷肺。故氣短。金爲火制。不能生水。故倦怠。肺主皮毛。故汗出。虛火乘肺。故咳。李東垣曰。津者。庚金之源。致脫體虛

錢漿水調服若血痢水煎服

喻嘉言總論消暑諸方曰元豐朝立和劑局萃集醫家經驗之方於中暑一門獨詳以夏月暑證五方歷試見聞廣爾其取用小半夏茯苓湯不治其暑顧治其溼又以半夏茯苓少加甘草至東垣之清暑益氣湯人參黃耆湯又補中實衛以去其溼熱肥白內虛之人所宜服者也中暑必兼躁煩熱悶東垣倣仲景竹葉石膏湯之制方名清燥湯仍以去溼爲首務夫燥與溼相反者也而清燥亦務除溼非東垣具過人之識

而重濕於藒車葛根甘草中佐以烏梅砂仁草菓以快脾而去脾所惡之溼甚則用大順散來復丹以治暑證之多瀉利者又即縮脾之意而推之也其枇杷葉散則以胃爲溼所竊據而濁穢故用香藒枇杷葉丁香白茅根之辛香以安胃而去胃所惡之臭甚則用冷香引子以治暑證之多嘔吐者又即枇杷葉散而推之也醫者於熱溼虛寒淺溼綫急間酌而用之其利溥矣而後來諸賢以益虛繼之河間之桂苓甘露飲五苓三石意在生津液以益胃之虛子和之桂苓甘露飲用人參葛根甘草藿香木香益虛之中又兼去溼或用十味香薷飲於局方五味中增人參黃耆白朮陳皮木瓜益虛以去溼熱乃至東垣之清暑益氣湯人參黃耆湯又補中實衛以去其溼熱肥白內虛之人所宜服者也中暑必兼躁煩熱悶東垣倣仲景竹葉石膏湯之制方名清燥湯仍以去溼爲首務夫燥與溼相反者也而清燥亦務除溼非東垣具過人之識不及此矣又如益元散之去溼而加辰砂則并去其熱五苓散之去溼而加人參則益虛加蒼朮砂減桂則去熱白虎湯加人參則益虛加辰砂則勝溼合之局方則大備矣然尚有未備焉嘗觀暑風一證其卒倒類乎中風而不可從風門索治百一選方雖有大黃龍丸初不爲暑風立法管見從而贊之曰有中暍昏死灌之立甦則其方亦可得暑風之一班矣儻其人陰血素虧暑毒深入血分進以此丸寧不立至危殆乎良

方復有地榆散治中暑昏迷不醒人事而欲死者但用平常涼血之藥清解淡入血分之暑風良莫良於此矣後有用之屢效而美其名爲潑火散者知言哉夫中天火運流金爍石而此能潑之益見暑風爲心火暴甚煎熬陰血合清心涼血之外無可撲滅爾綜羣方而論之因其詳故益加詳焉

吳氏醫學述第四種成方切用目錄
卷七下
燥溼門 正方二十七 附方二十九
五苓散 四苓散 茵蔯五苓散 辰砂五苓散 元戎五苓散 蒼术五苓散
桂苓丸 澤瀉湯 茯苓白术湯
春澤湯 又春澤湯 二术四苓湯 白茯苓湯
散 茯苓琥珀湯 四苓湯 節菴導赤
湯 薷苓湯 柴苓湯 豬苓湯 茯苓甘草湯
茯苓桂枝白术甘草湯 腎着湯 小半夏加茯苓湯 小半夏湯 大半夏湯
舟車丸 滁川 散 疏鑿飲子 實脾飲 五皮飲
成方切用 溼 卷七下 目錄 十
麥門冬湯 大分清飲 革薢分清飲 縮泉丸 琥珀散 茵蔯蒿湯 茵蔯三物湯 茵蔯將軍湯 升陽除溼湯 升陽除溼防風湯 禹功散 羌活勝溼湯 羌活除溼湯 東垣升陽除溼湯 大橘皮湯 八正散 防已飲 當歸拈痛湯 蒼术丸 平胃散 見消導門

吳氏醫學述第四種

武原吳儀洛遵程輯

門人周蘭九生庭

有榆荅培同較

男　有杜雋望

成方切用

燥溼門　溼病有出於天氣者。雨露之屬是也。有出於地氣者。泥水之屬是也。多傷人膚氣。有出於飲食者。酒醪之屬是也。多傷人皮肉筋脈。有由於汗液者。如大汗沾衣不遑解換之屬是也。多傷人膚腠。有由於汗後大汗。以水不化氣。陰不從陽而然。有溼從內生者。以外證未罷言。裏以煩也。悉由脾腎之虧敗。其為證也。在肌表。則為發熱惡寒。自汗。在經絡。則為痺為重。為筋骨疼痛。腰痛不能轉側。四肢痿弱。發痛。在肌肉則為痂。按肉如泥不起。在臟腑則為痺。木附煙黃疸。小水祕澀黃赤。大便泄瀉腹痛後重。脫肛癲疝等證。凡肌表經絡之病。溼由外而入者也。此其在外者為輕。在內者為重。是固然矣。然及其甚也。則未有表溼而不連臟者。裏溼而不連經者。此其溼病之變。不為不多。故凡治此者。必當辨表裏虛實而求其本也。然溼證雖多。而辨治之法。其要惟三。則一曰風溼。蓋溼從土化。而病為溼熱。則火土合氣。而病為寒溼。此溼之見證也。溼勝則脾病。溼於皮膚。則腫脹。併於大腸。則泄瀉。水停心下。則嘔逆。水寒射肺。則喘咳。暑先入心。故心火兼治中暑煩渴。五苓利小水。降心火。故煩渴。則陽不能化陰。故便祕而渴。陰陽不利。則脫熱。則金不能生水。勝則身痛身重。大抵下不通利。則陰陽不能升降。而變證多矣。

五苓散　仲景　治太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲飲水者少少與之令胃氣和則愈若脈浮小便不利微熱消渴者此湯主之及中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入即吐名曰水逆　表以外證未罷言。裏以煩渴屬腑言。邪熱挾積飲上逆故外水格而不入　及傷寒痞滿腹瀉心湯不解渴而煩躁小便不利　功擅蕩熱導飲。故亦為消痞良方程郊倩曰。邪在上焦。而治在下焦者。使濁陰出下竅而清陽之在上竅者自能宣化矣。心邪不從心瀉而從小便瀉。又一法也。非又一法也。乃臟實而瀉其腑也。通治諸溼腹滿水飲

水腫嘔逆泄瀉水寒射肺或喘或咳中暑煩渴身熱頭痛勝脫積熱便祕而渴霍亂吐瀉痰飲溼癉身痛身重　此皆傷溼之見證也。溼勝則脾腫脹。併於大腸。則泄瀉。水停心下。則嘔逆。水寒射肺。則喘咳。暑先入心。故心火兼治中暑煩渴。五苓利小水。降心火。故煩渴。則陽不能化陰。故便祕而渴。陰陽不利。則脫熱。則金不能生水。勝則身痛身重。大抵下不通利。則陰陽不能升降。而變證多矣。

豬苓　茯苓　朮炒　共十兩　澤瀉一兩六錢　桂半兩　按雜病當用桂。傷寒證中表未解者。仍當用桂枝。兼取解表。

為末每服三錢服後多飲熱水汗出而愈　傷暑者加硃砂燈心煎

太陽之熱傳入膀胱之腑故口渴而便不通經曰淡味滲泄爲陽二苓甘淡入肺而通膀胱爲君（水無當於五味故淡能利水茯苓走氣分豬苓走血分然必上行入肺滿其化源而後能下降利水也）鹹味涌泄爲陰澤瀉甘鹹入腎膀胱同利水道爲臣益土所以制水故以术之苦溫健脾去濕爲佐膀胱者津液藏焉氣化則能出矣故以肉桂辛熱爲使熱因熱用引入膀胱以化其氣使溼熱之邪皆由小水而出也（有大熱如狂小便不利而用此湯者欲使大陽隨經之邪直達膀胱由溺而出也大熱利小便亦釜底抽薪之義）

裏表之裏也太陽本膀胱腑也

來章曰治祕之道有三一曰肺燥不能化氣故用二苓滲以泄肺而降氣一曰脾溼不能升精故用蒼术之苦溫以燥脾而升精一曰膀胱氣化不能出溺故用桂之辛熱以溫膀胱而化陰使水道通利則上可以止渴中可以去溼下可以泄邪熱也東垣曰五苓散太陽之道有三一曰太陽高則汗而發之下則引而竭之裏之渴者邪入太陽本也當下之使從膀胱出也小便利者不宜用蓋太陽病熱而渴小便若利則胃中津液已耗不宜再用五苓以劫奪其津液也五苓散分陰陽驚膽經之半表半裏也理中氣而分陰陽也活人云脈浮大是表證當汗其人發熱煩渴小便亦卻當下此是表裏俱見五苓散主之五苓利水何以能止渴生津蓋溼熱壅於中焦則氣不得施化故津竭而小便不通也用五苓利其小水則溼熱下消津同而渴止矣亦內經通因通用之意東垣曰傷飲者無形之氣也宜發汗利小便以導其溼傷食者有形之物也轉則消化或損穀重則方可吐下若汗下之後內亡津液而便硬不利者不可用五苓恐重亡津液而益虛厥陰也勿治之便利自愈一切陽虛不化氣陰虛而泉竭以致小便不利者若再用五苓以劫其陰陽禍如反掌不可不慎

去桂名四苓散（李東垣曰無惡寒證不可用桂利者設若不渴則茯苓甘草爲渴而小便不湯足矣若但渴則四苓足矣）加辰砂名辰砂五苓散治溼熱發黃便祕煩渴加羌活名元戎五苓散治中焦積熱去桂滲瀉名豬苓散（金贋治嘔吐病在膈上思飲水者）

但用肉桂茯苓等分蜜丸名桂苓丸治冒暑煩渴引飲過多腹脹便赤但用滲瀉湯（金贋五兩）白术（二兩）名滲瀉湯治心下支飲常苦眩冒但用茯苓白术等分名茯苓白术湯治脾虛不能制水溼盛泄瀉再加郁李仁入薑汁服名白茯苓湯治水腫加川楝子治水疝加人參名春滲湯再加甘草（台四君子）亦名春滲湯治無病而渴與病痊後渴者去桂加蒼术甘草芍藥梔子黃芩羌活名二术四苓湯通治表裏溼邪兼清暑熱倍桂加黃

者如木之斷治傷暑大汗不止加甘草滑石梔子入食鹽燈草煎名節菴導赤散治熱蓄膀胱便祕而渴如中溼發黃加茵蔯水結胸加木通合益元散治諸溼淋瀝再加琥珀名茯苓琥珀湯謙甫治小便斷而欠頻來而短少也合平胃散名胃苓湯一名對金飲子治中暑傷溼停飲夾食腹痛泄瀉及口渴便祕此上下分消其溼也按機要論泄瀉有屬風屬溼屬寒屬火此因於外感者也三因言七情感動陽氣不內傷者也外則當調六氣內則當調五臟又有因飲食所傷而泄者法當解散因痰積上焦致大腸不固而泄者當除痰有脾胃氣虛而泄者當補中益氣使胃氣升騰而泄自止合黃連香薷飲名薷苓湯治傷暑泄瀉合小柴胡湯名柴苓湯治泄瀉發熱口渴瘧疾熱多寒少口渴心煩以上三方並加薑棗煎

豬苓湯仲景　治陽明病脈浮發熱渴欲飲水小便不通成氏曰脈浮發熱熱在表也渴欲飲水熱在裏也小便不利熱結下焦津液不通也準繩曰此浮字誤也是脈字下脫一不字也活人云脈浮者五苓散陽明篇脈沉者豬苓湯按太陽篇五苓散陽明篇豬苓湯性味辛甘寫陽主外阿膠甘平滑石甘寒寫陰主內若脈浮則當用五苓不當用豬苓矣少陰篇下利六七日咳而嘔渴心煩不得臥豬苓湯主之雖不言脈沉然少陰之脈必沉也以此推之少陰病下利六七日欲成氏隨文誤釋明矣

茯苓甘草湯仲景　治傷寒水氣乘心厥而心下悸者先治其水卻治其厥不爾水漬入胃必作利也太陽證飲水過多水停心下亦傷寒火炎水故心悸煩渴欲飲水小便不利水入則吐茯苓甘草湯主之雖不言厥悸然厥悸之證必有之不得服者豬苓湯亦治傷寒

汗出不渴者。經曰。傷寒汗出而渴者。五苓散主之。不渴者。茯苓甘草湯主之。汗而不渴者。未入裏。故但解表利水。而兼和中也。亦治膀胱痰飲而遺溺

茯苓　桂枝二兩　甘草一兩　生薑三兩

淡能滲水。甘能寧心助陽。故用茯苓。辛能散飲。溫能發汗。解肌。故用薑桂。益土可以制水。甘平能補氣和中。故用甘草

去生薑加白朮名茯苓桂枝白朮甘草湯（仲景治傷寒吐下後。心下逆滿。氣上衝胸。起則頭眩。脈沉緊。發汗則動經。身爲振搖者。逆滿。氣衝。寒邪伏飲。上搏於膈也。故令頭眩。流爲在裏。既經吐下復發其汗。則陽益虛。而津液耗。故振搖也。與此湯導飲和中。益陽固衛。）

金匱用治心下有痰飲。胸脇支滿目眩

腎着湯（金匱一名乾薑茯苓朮湯）

治傷溼。身重腹痛。腰冷不渴。小便自利。飲食如故。病屬下焦。（腎主水。溼性下流。必合於其所合而歸於坎。勢也。腰爲腎之腑。冷溼之邪着而不移。故腰冷身重。是着痺也。此由身勞汗出。衣裏冷溼。久久得之。）

宣明用治胞痺。腑脇熱痛。濇於小便。風寒溼邪客於胞中。氣不能化。故水道不通。足太陽經上額絡腦。太陽經氣不。得下行上入。溷而流於鼻。則爲鼽濇。

心氣而泄腎邪。能利小便。火因水而下行。則悸眩止。而痞消矣

除茯苓名小半夏湯（金匱治支飲嘔吐不渴。亦治心下有痰飲。胸脇支滿目眩）

黃疸（金匱云。嘔家本渴。渴者爲欲解。今反不渴心下有支飲故也。小半夏湯主之。）

大半夏湯（金匱治反胃。食入卽吐。薑之辛。蜜之甘。東垣曰。辛藥生津。液去。必渴。不可因渴而遽以。爲熱。除茯苓生薑。加人參白蜜名）

越婢湯（金匱治風水惡風。一身悉腫。脈浮不渴。續

自汗出無大熱者經曰肝腎并沉爲石水并浮爲風水水在皮膚故脈浮裏無熱故不渴病本於風故汗出惡風無大熱者熱未盡退也

麻黃六兩 石膏八兩生薑三兩 甘草二兩 大棗十二枚 惡

風者加附子

風水在肌膚之間用麻黃之辛熱以瀉肺石膏之甘寒以清胃肺主通調水道胃主分別水穀甘草佐之使風水從毛孔中出又以薑棗爲使調和營衛不使其太發散耗津液也胃爲十二經之主脾治水穀爲胃行其津液是方名越婢湯越婢湯即此義也

防已黃耆湯 金匱　治風水脈浮身重汗出惡風及諸風諸溼痲木身痛

防已 黃耆兩半 七錢 甘草炙五錢 每服五錢加薑棗煎腹痛加芍藥喘加麻黃有寒加細辛氣上衝加桂枝熱腫加黃芩寒多掣痛加薑桂溼盛加茯苓蒼朮氣滿堅痛加陳皮枳殼蘇葉

防已大辛苦寒通行十二經開腠瀉溼爲治風腫水腫之主藥黃耆生用達表治風注膚痛溼分肉實腠理白朮健脾燥溼與黃耆並能止汗爲臣防已性險而掉故用甘草甘平以緩之又能補土制水爲佐薑棗辛甘發散調和營衛爲使也

去白朮薑棗加茯苓 爲君桂枝名防已茯苓湯 金匱　治水在皮膚四肢聶聶而動名皮水

防已 茯苓善 桂枝走肢節 甘草五 白朮浮惡 生薑三 大棗十二枚

如鼓不惡風不渴名皮水不惡寒而渴名正水脈沉遲自喘名石水脈沉渥發熱胸滿身腫汗如漿汁名黃汗

加味腎氣丸 金匱　腎氣丸即桂附八味丸　治婦人轉胞無車前牛膝

腎大虛肚腹脹大四肢浮腫喘急痰盛小便不利大便溏黃已成蠱證亦治消渴飲一溲一 經曰腎者胃之關也關門不利故聚水而從其類也上下溢於皮膚則爲胕腫腎消者腎水衰竭雷之火不安其位上炎於肺胃下無火化而大勝號故飲一溲一也用桂附辛熱引氣歸元地黃純陰補腎水滋腎陰合下消之劑

熟地黃四兩 茯苓三兩 乳拌 山藥微炒 丹皮酒洗 山萸肉酒潤 澤瀉酒浸 牛膝酒浸 車前子微炒 肉桂一兩 附子製熟五錢

蜜丸

土爲萬物之母脾虛則土不能制水而洋溢水爲萬物之源天一生水腎虛則水不安其位而妄行以致泛濫皮膚肢節之間因而攻之虛虛之禍不待言矣經曰盛盛虛虛貽人禍殃因而盛之盛盛而病益甚因而虛之虛虛而病益劇防水湯能化陰陰化則便溺通加車前利小水而不走氣加牛膝益肝腎藉以下行使水道通而腫脹已又無損於真元也喻嘉言曰胃爲水穀之海五臟六腑之原脾不能散胃之水精於肺而病於中肺不能通調之水道於膀胱而病於上腎不能司胃之關門而病於下以致積水浸淫無所底止又曰按此方濟生以附子爲君然腎之關門不開必以附子同陽蒸動腎氣其關始開門中積水始下以陽主開故也關閉即車前茯苓用至無算膀胱前而水亦下關閉即車前茯苓牛膝之如何矣用方者將君附子乎抑君茯苓乎張景岳曰水腫證乃脾肺腎三臟相干之病蓋水爲至陰故其本在腎水化於氣故其標在肺水惟畏土故其制在脾今肺虛則氣不化精而化水脾虛則土不制水而反尅腎虛則水無所主而妄行求古治法惟金匱內加減腎氣湯爲對證之方予屢用之無不見效此雖壯水之劑而實即脾肺腎三臟之正治也蓋腎爲先天生氣之源若先天元氣虧於下則後天胃氣失於下則氣壅於上而喘脹由生但宜峻補命門所以不行是以水積其所本而由脾及肺治節所以不行今論其方如所用桂附以化陰中之陽也熟地山藥以養陰中之水也茯苓澤瀉車前以利陰中之滯也此能使氣化於精即所以治肺也補火生土即所以治脾也壯水通竅即所以治腎也補而不滯利而不伐凡病水腫於中年之後及氣體本弱者但能隨證加減用之其應如響誠諸方之第一更無出其右者又曰腫脹之治凡脾腎虛證如前論加減腎氣湯者誠然善矣然用之之法猶當因此廓充不宜執也余嘗治一陶姓之友年逾四旬因患傷寒爲醫誤治危在呼吸乃以大劑參附熟地之類幸得挽回愈後喜飲未及兩月忽病足股盡腫脹及於腹按之如鼓堅而且韌因其前次之病中氣本復傷近日之病又因酒溼度非加減腎氣湯不可遂連進數服雖無所碍然終不見效人皆料其必不可治余熟計其前後病因本屬脾腎大虛而今兼以滲利表兔減丟補方亦與實漏屁者何異元氣不能復病必不能退遂悉去利水等藥而專用參附理陰煎仍加白朮大劑與之三十餘劑而腹脹盡退自後凡遇至虛者悉用此法無一不效

舟車丸

河間倣仲景十棗例製此湯治一切水溼

治水腫水脹形氣俱實者口渴面

俱實

腫脹者水道壅遏也形氣相赴腹堅大小便秘也形氣俱實者手三陽經陰水先腫下肢腰髖腫足三陰經腫屬脾脹屬肝腫則陽氣猶行但單脹而不腫者名鼓脹爲木橫尅土難治腫脹而朝寬暮急爲血虛暮寬朝急爲氣虛朝暮俱急脹而人心腹者危男自下而上女自上而下者

皆難治。腫脹居黑則傷肝。缺盆平則傷心。脇出則傷脾。足平則傷腹。身熱脈大者是逆也。多死。

黑牽牛炒 四兩 大黃二兩 甘遂麪裹煨 大戟麪裹煨 芫花醋炒 青皮炒 橘紅一兩 木香五錢 輕粉一錢 水丸

牽牛大黃大戟芫花甘遂皆行水之厲劑能通行十二經之水然腫屬於脾脹屬於肝水之不行由於脾之不運脾之不運由於木盛而來侮之是以不能防水而洋溢也青皮木香疏肝泄肺而健脾與陳皮均爲導氣燥溼之品使氣行則水行脾運則腫消也輕粉無竅不入能去積痰故少加之然非實證不可輕投

疏鑿飲子　治遍身水腫喘呼口渴大小便祕上證俱熱而氣實也此爲陽水水見陽證脈必沉數陰水見陰證脈必沉遲

羌活　秦艽　檳榔　商陸　椒目　大腹皮　茯苓皮　木通　澤瀉　赤小豆　等分　薑皮煎

外而一身盡腫內而口渴便祕是上下表裏病也羌活秦艽解表疏風使溼從汗出而升之於上腹皮苓皮薑皮辛散淡滲所以行水於皮膚檳榔椒目赤豆去脹攻堅所以行水於腹裏木通瀉心赤而利小腸澤瀉瀉腎之水通於膀胱赤小豆瀉脾之水達於小腸內外分消其勢亦猶神禹疏江鑿河之意也

實脾飲嚴氏　治肢體浮腫色悴聲短口中不渴二便通利脾胃虛寒土不能制水故水妄行而浮腫而便不祕此爲陰水發腫用此先實脾土

白朮土炒　茯苓　甘草炙　厚朴薑炒　大腹子　草豆蔻　木香　木瓜　附子　黑薑　加薑棗

脾虛故以白朮甘草補之脾寒故以薑附草蔻溫之脾溼故以大腹茯苓利之脾滯故以木香厚朴導之然土之不足由於木之有餘木瓜酸溫能於土中瀉木兼能行水與木香同爲平肝之品使木不尅土而肝和則土能制水而脾實矣水病當以健脾爲主使脾實而氣運則水自行宜參苓爲君覩所快語加減明利水

葉多致不救醫貫曰治腫滿先以脾土爲主宜補中益氣湯六君子湯或疑水脹喘滿而用補劑不益脹滿乎曰肺氣餒虛不可復行其氣竊水。既衰不可復利其水。服補劑初覺不快過時有條理矣前嘉言曰治水以實脾陰邪爲先不但陰水爲然陰水者少陰腎中之真陽衰微不能封閉而泛溢無制爾方中不用桂而用厚朴大腹尚有可議

麥門冬湯　治水溢高原肢體皆腫經曰三焦者決瀆之官水道出焉上焦不治水溢高原中焦不治水停中脘下焦不治水畜膀胱

麥門冬　五十炒　粳米　五十粒

吳鶴皐曰肺非無爲也飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱此治病必求其本也或問此證何以脾肺熱則失其下降之令以致水溢高原淫於皮膚而爲水腫醫罕明此實脾導水皆不能愈故用麥冬清脈開其下降之源粳米益胃培乎生金之母此治病必求其本也或問此證何以辨之曰肢體皆腫小腹不急初起便有喘滿此其候也

五皮飲　澹寮

治水病腫滿上氣喘急或腰以下腫

五加皮　地骨皮　茯苓皮　大腹皮　生薑皮　一方五加易陳皮羅氏五加易桑白皮治大分清飲

病後脾肺氣虛而致腫滿

五加祛風勝溼地骨退熱補虛生薑辛散助陽大腹下氣行水茯苓滲溼健脾於散瀉之中猶寓補助之意皆用皮者水溢皮膚以皮行皮也

大分清飲　治積熱祕結小水不利或致腰腹下部極痛或溼熱不利黃疸溺血邪熱畜血腹痛淋閉等證

茯苓　澤瀉　木通　二錢　豬苓　梔子　枳殼

車前子　一錢　如內熱甚者加黃芩黃檗龍膽之屬　如大便堅硬脹痛者加大黃二三錢　如黃疸小水不利熱甚者加茵蔯蒿二錢　如邪熱畜血腹痛者加紅花青皮各一錢五分

小分清飲　治小水不利溼滯脹腫不能受補等證

茯苓　澤瀉　豬苓　二錢　枳殼　厚朴　一錢　如陰虛水不能達加生地牛膝各二錢　如黃疸者加茵蔯二錢　無內熱而寒滯不行

者加肉桂一錢
萆薢分清飲　治陽虛白濁小便頻數漩白如油
名曰膏淋熱腎氣虛不能管束而小便數膀胱有
入胞中及服熱藥則水道澁而清濁不分或敗精滲
爽積滲入膏成淋濁
川萆薢　石菖蒲　烏藥　益智仁等分甘草梢
減半　入鹽服一方加茯苓
萆薢能解陽明厥陰濕熱去濁而分清史國信曰若欲
興陽先滋筋力若欲便清先分肝火烏藥能疏
萆薢能泄陽明之濕入厥陰清肝火烏藥能疏
邪逆諸氣逐寒而溫腎益智脾藥兼入心腎固
腎氣而散結烏藥益智等分山藥糊丸名縮泉丸鹽湯下治便數石菖蒲

去而心腎通則氣化行而淋濁止矣此以疏泄
而爲禁止者也
琥珀散　治氣淋血淋膏淋砂淋心腎氣鬱清濁
溺滿而痛日淋膏淋便出如膏砂淋精結成石勞淋遇勞即發
冷淋寒戰後淋氣淋便濁餘瀝血淋尿血而痛
液渾濁而爲淋若冷氣滯於膀胱而作淋者十
無一二也
滑石二錢　琥珀　木通　萹蓄　木香　當歸

鬱金炒一錢　爲末服
滑石滑可去着利竅行水萹蓄苦能下降利便
通淋琥珀能降肺氣通於膀胱木通能瀉心火
入於小腸小腸爲心之腑主熱者也諸熱應於
心者其水必自小腸滲入膀胱經所
謂胞移熱於膀胱則癃溺血是也血淋由於血亂當歸能引血
歸經氣淋由於氣滯木香能升降諸氣諸淋由
心肝火盛鬱金能涼心散肝下氣而破血也大法

茵蔯蒿湯　仲景　治傷寒陽明病但頭汗出腹滿口
渴二便不利溼熱發黃脈沉實者經曰陽明病
爲熱越則不發黃若但頭汗身無汗小便不利此
渴引水漿此爲瘧熱在裏必發黃黃者脾胃之
邑也熱甚者身如橘色汗如檗汁頭爲諸陽之
會熱蒸於頭故但頭汗而身無汗夫熱外越則
不裏鬱下滲則不內存今便利不裏鬱而爲黃內有實熱故渴熱
故鬱而爲黃內有實熱故渴熱在裏熱甚則津液內竭
故小便不利凡瘧熱在裏熱入血室及水結胸
皆有頭汗之證乃傷寒傳變故與雜病不同
溼在經則日晡發熱鼻塞在關節則身痛在腦
腑則濡泄小便反牆腹或脈黃熱勝色明而便燥溼勝色晦而便溏又黃病
與溼病相似但溼病在表一身盡痛黃病在裏
不痛

茵蔯六兩大黃二兩梔子十四枚炒
茵蔯發汗利水以泄太陰陽明之溼熱故爲治黃主藥梔子爲臣大黃爲佐分泄前後則腹得利而解矣茵蔯導溼熱由小便出大黃能導溼熱由大便出
大黃易黃連名茵蔯三物湯治同加厚朴枳實
黃芩甘草入生薑煬草前名茵蔯將軍湯節卷治前證同去梔子大黃加附子乾薑治寒溼陰黃爲陽黃如身黃而色暗者爲陰黃宜此湯小便黃赤不利爲裏實宜利小便或下之無汗爲表實宜汗之或吐之若小便清是無熱也仲景云發黃小便自利當與虛勞門小建中湯自利腹滿而嘔不可除熱而除之必嘰小半夏湯主之王海藏曰內感傷寒勞役形體飲食失節中州變寒病生黃非外感而得只宜理中大小建中等方不可用茵蔯

禹功散

和

治寒溼水疝陰囊腫脹囊如水晶陰汗不絕謂水疝蓋得之醉後而寒溼乘腎虛而流入也二便不利寒溼所疑不得施化也

黑牽牛四兩炒　茴香一兩

爲末每一錢薑汁調下

或加木香一兩

牽牛辛烈能達右腎命門走精隧行水泄溼茴香辛熱溫散能疏丹田厥小腸冷氣同入下焦以泄陰邪也

升陽除溼防風湯

東垣

治大便祕澀或血悶勿利之利數至圊而不能便或有白膿或血悶勿利之利之則必至重病反鬱結而不通矣以此湯升舉其陽則陰自降矣通大便有用升麻者卽此意也

蒼朮泔浸四錢防風二錢茯苓　白朮　胃寒泄瀉腸鳴加益智半夏各五分薑煎

蒼朮辛溫燥烈升清陽而開諸鬱故以爲君白朮甘溫茯苓甘淡佐之以健脾利溼防風辛溫勝溼而升陽白芍酸寒斂陰而和脾也劉宗厚曰飲食

羌活勝溼湯

局方

治溼氣在表頭痛重或腰脊重痛或一身盡痛微熱昏倦溼氣在表頭痛腰脊痛著於太陽則頭項腰脊痛著於太陰則一身盡痛惟著於陽之經則一身盡痛惟著於陰則背痛且重也溼鬱則爲熱然溼乃陰邪故微熱而昏倦也東垣曰頭痛脊強乃太陽之經氣不行也此湯主之

羌活　獨活一錢　川芎　藁本　防風　甘草五炙

分蔓荊子三分　如身重腰中沉沉然中有寒溼也加酒洗漢防巳附子

經曰風能勝溼羌獨防葛芎蔓皆風藥也溼氣
在表六者辛溫升散又皆解表之藥使溼從汗
出則諸邪散矣（藁本善治太陽寒溼荊防善散
關節川芎能升厥陰清氣上治頭痛甘草助
諸藥辛甘發散爲陽氣味甘平發中有補也）若
水溼在裏則當用行水滲洩之劑（喻嘉言曰經
熱表之則易下之則難故當變常法而爲表散
吳鶴皐曰脾弱溼傷者二陳平胃之類主之溼
盛濡泄者五苓六一之類主之水腫發黃者五
皮茵蔯之類主之今溼流關節非前藥所宜矣
無窮不人性風爲能故凡閉節之病非風藥不
能到也三因用此湯加柴胡五分治臥而多驚
悸多魘搜者邪在少陽厥陰也如淋加澤瀉五
分經曰肝腎之病同一治此下焦風寒三經合

病非風藥行經不可也）

除獨活蔓荊川芎甘草加升麻蒼朮名羌活除
溼湯治風溼相搏一身盡痛除川芎加黃耆當
歸蒼朮升麻名升陽除溼湯治水而腫大陰汗
不絕再加麥芽神麴豬苓澤瀉除當歸黃耆亦
名升陽除溼湯（東垣）治脾虛瀉痢

大橘皮湯　治溼熱內攻心腹脹滿小便不利大
便滑瀉（小水併於大腸故小便不利而大便滑瀉）及水腫等證

赤茯苓一錢　豬苓　澤瀉　白朮
滑石六錢　甘草

土炒桂五分　陳皮錢半　木香　檳榔三分
五錢

赤茯豬苓澤瀉瀉火行水白朮補脾肉桂化氣
此五苓散也滑石清熱利溼甘草瀉火調中此
六一散也溼熱內甚故加檳榔峻下之藥陳皮
木香行氣之品使氣行則水行以通小便而實
大便也

八正散（局方）　治溼熱下注咽乾口渴心腹急滿小
便不通（溼熱下注小腹急滿則小便不行矣而牛不行者熱極之也）或淋痛

不專於治下。必三焦通利水乃下行也。朱丹溪曰。小便不通。有熱有溼。有氣結於下。宜清宜燥。宜升有之治。如不因肺燥。但膀胱有熱。則瀉膀胱。此正治也。如因肺燥不能生水。則清金。此因脾溼不運而精不升。故肺不能生水。則當燥脾健胃。此謂隔三。車前子茯苓。清肺也。蒼朮白朮。燥脾健胃也。瀉膀胱也。蒼朮白朮。燥脾健胃也。黃芩。瀉膀胱也。蒼朮白朮。燥脾健胃也。又曰。小便不通屬氣虛。血虛。實熱。痰閉。塔室吐之以升其氣。氣升。則水自降。氣虛。用參朮升麻等。先服後吐。或就參者藥中調理吐之。血虛用四物湯。先服後吐。或就芎歸湯探吐之。痰多。二陳湯。先服後吐。或加香附木通。實熱。當利之。或八正散。蓋大便動。則小便自通矣。或問以吐法通小便。其理安在。曰。譬如滴水之器。上竅閉。而下竅始出也。則下竅無自以通。必上竅開。而下竅閉。

當歸拈痛湯　東垣　治溼熱相搏。肢節煩痛。肩背沉

成方切用　卷七下　當歸拈痛湯　圭

重或偏身疼痛。或腳氣腫痛。腳膝生瘡。膿水不

絕。及溼熱發黃。脈沉實緊數。動滑者。溼則腫。熱則痛。足膝腫下注也。發黃。溼熱蒸脾胃也。腳氣

蒼朮　炒　羌活　防風　升麻　葛根　蒼朮辛溫。雄壯。能健脾燥溼。爲臣。溼熱相合。肢節煩痛。苦參。黃芩。苦寒。以爲因用。血壅不知母。茵蔯。苦寒。以泄之。酒炒。以導其氣。使苦寒不傷脾胃。治溼熱不利。小便。非其治也。豬苓。澤瀉。甘淡鹹平。導其留飲爲佐。上下分消其溼。使壅滯得宣通也。玉機微義曰。此方本爲治腳氣

茵蔯　酒炒　羌活　防風　升麻　葛根　蒼朮

白朮　甘草　炙　黃芩　酒炒　苦參　酒炒　當歸　豬苓

成方切用　卷七下　當歸拈痛湯

溼熱之劑。後人用治諸痛。甚驗。

防己飲　治腳氣足脛腫痛。憎寒壯熱。腳氣自外

風雨水。或履溼熱之地。自內。傷得油麪溼熱之毒。有溼有熱。溼性下流。故注於足。熱勝則壯熱。有兼頭痛諸證者。狀類傷寒。但脛腫。掣痛。爲異爾。此病忌用補劑及冰洗。以溼熱得補增劇也。亦不宜大瀉。治之喜通而惡塞。若腳氣衝心。喘悶不止。嘔吐不休者死。水凌火故也。先痛傷血也。先腫而後痛者。血傷氣也。筋脈弛張腫痛者。名溼腳氣。宜利溼疏風。蹉縱枯細。不痛者。名乾腳氣。即熱也。宜瀉血清燥。

防己　木通　檳榔　生地　酒洗　川芎　白朮　炒　黃柏　酒炒　知母　酒炒　甘草梢　犀角　熱加黃芩。時

令熱加石膏肥人有痰加竹瀝薑汁或南星大便祕加桃仁紅花小便赤澁加牛膝或木瓜薏苡仁

防已行水療風瀉下焦之溼熱檳榔攻堅利水隧諸藥使下行木通降心火由小腸出草梢泄脾火徑達腎經黃檗生地滋腎陰而涼血解熱蒼白二朮燥脾溼而運動中樞腫由血鬱川芎行血中之氣痛由肝實犀角涼心而清肝合之以清熱利溼消腫止痛也

成方切用　卷之十　藥九　三十

蒼朮丸　治寒溼在脾泄瀉久不能愈者

真茅山蒼朮（米泔浸一宿切炒如飴無釀乾炒）白芍（炒黃去開口者炒出汗）小茴香（炒一兩）厚朴（薑汁炒四兩）雲苓（二兩）甘草（炙）川椒子大每服食遠清湯下七八十丸

潤燥門（正方二十八附方七）
麥門冬湯　炙甘草湯　清燥救肺湯　通幽湯（當歸潤肺湯）　濟川煎　潤腸丸（活血潤燥湯　又潤腸丸）　決津煎　韭汁牛乳飲　活血潤燥生津湯　甘露飲（桂苓甘露飲小甘露飲）　消渴方　地黃引子　治久嗽方　瓊玉膏　麻仁蘇子粥　桑白皮等汁十味煎　滋燥養營湯　白茯苓丸　文蛤散　黃耆湯

成方切用　卷之十　目錄　十一

宣明黃耆湯　宣明麥門冬飲子　易老門冬飲子　豬膏湯（豬膏金銀花酒）　豬膏髮煎　竹葉石膏湯（方見瀉火門）　甘麥大棗湯

武原吳儀洛遵程輯

門人周蘭九生庭
有恂蒼培同較
男
有杜雋望

成方切用

潤燥門

內經病機一十九條獨遺燥氣。他凡隨文作解。弗察其說。頻翻嘉言特爲正之。大意謂春傷於風。夏傷於暑。長夏傷於濕。秋傷於燥。冬傷於寒。六氣配四時之首。與五運不相背戾。而千古之大疑。始一抉也。夫燥金所傷。木甚則白戕肺金。蓋肺金主氣而治節行焉。此惟士生之金。堅剛不撓。故能生殺自由。純編不紊。若病起於秋而傷其燥金受火刑。化劑且擅型施。欲仍清肅之舊。其可得耶。經謂燥不止而出白血者死。白血謂色淺血而似肺者。非肺金自創。何以有此。試觀草木菁英可掬。一乘金氣忽焉改容。焦其上首而燥氣先傷。上焦華蓋屬肺。諸痿喘嘔。皆屬於上。豈不明耶。詳此則病機之諸氣膹鬱。皆屬於上。二條明指燥病言矣。肺主氣通天。論秋傷於燥上逆而咳。發爲痿厥。燥病之痿。一言而終。與病機二條。適相脗合。夫燥則諸氣窒滯。肅之令下。而通身回達。亦何致膹鬱耶。諸痿喘嘔之屬於上者。上亦指肺不指心也。若統上焦心肺莫非肺病不主痿喘及嘔也。惟肺燥其則肺葉不清。心病不生痿喘不用肺氣逆而喘鳴。食難過膈而嘔出。三者皆燥盛之候者也。經文原有逆秋氣則太陰不收。肺氣焦滿之文。其可稱爲濕病受其左胜腸痛不能轉側。發乾面皺。身無津液。足外反熱。腰痛骭酸。躄躚筋攣。丈夫癲疝。婦人少腹痛目昧。皆燥之本於肝而散見不一者也。肝藏見燥證固當急救肝葉。勿令焦損。然清其肺金。降其金以平其肝木。尤爲先務。若肺金自病。不及於肝。亦應力救肺。焦枯且恐。亟宜兩可分功。緩圖乖

麥門冬湯 金匱 治火氣上逆咽喉不利

麥門冬七升 半夏一升 人參三兩 甘草二兩 大棗十二枚 粳米三合 水一斗二升煮六升。服一升。日三夜一。

物嘉言曰。此胃中津液枯。虛火上炎之證。用寒涼藥而火反升。徒知與火相爭。知母貝母屢施不應。不知胃者肺之母。屬燥金。逆母氣也。仲景於麥冬人參甘草大補中氣。大生津液。隊中增入半夏之辛溫一味。用以利咽下氣。此非半夏之功。實善用半夏之功。擅古今未有之奇矣。

炙甘草湯 仲景 治傷寒脈結代。心動悸。及肺痿。咳唾多。心中溫溫液液者。脈動而中止。能自還者。血虛甚。不能相續也。心中痺痛多者。以胃中之津液上供。悉從燥熱化

炙甘草 炙四兩 生薑 桂枝 生地黃 酥一斤 麥冬 去心 麻仁 紉研 半斤 大棗 十二枚 阿膠 蛤粉炒 二兩 水酒

各半煎內阿膠烊化服
人參麥冬甘草大棗益中氣而復脈生地阿膠
助營血而寧心麻仁潤滑以緩腑胃薑桂辛滋
以散餘邪加清酒以助藥力也聖濟經云津液
散爲枯五臟痿弱營衛涸流溼劑所以潤之麻
仁阿膠麥冬地黃之甘潤經益血復脈通陽也

喻嘉言曰此仲景傷寒門中之聖方也千金翼
用治虛勞外臺用治肺痿究竟本方所治亦何
止二病哉外臺所取在於益肺氣之虛潤肺金
之燥至於桂枝辛熱似有不宜不知桂枝能通
營衛致津液則肺氣能轉輸逆沫以漸而下尤
爲要緊所以云治心中溫溫液液也王機微義
曰肺痿如咳久聲唾聲嘶咯血此屬陰虛火熱
甚也吐涎沫而不渴必遺尿小便數以上虛不
能制下此肺中冷也必眩多涎唾用炙甘草乾薑湯以溫之肺痿涎唾多心中溫溫液液者用炙甘草湯此補虛勞也與補陰虛火熱不同故肺痿有寒熱之異

清燥救肺湯

治諸氣臌鬱諸痿喘嘔

二桑葉經霜者得金氣而柔順不取之爲君去枝梗三錢　石膏稟清肅之氣極清肺熱二錢半煅　甘草和胃生金一錢　人參生胃之津養肺之氣七分　胡麻仁炒研一錢　真阿膠入肺分麥門冬去心一錢泡去皮　杏仁去皮尖炒黃七分　枇杷葉刷去毛蜜炙黃一片　水一碗煎六分頻頻漱熱服瘥多加貝母瓜蔞血枯加生地黃熱甚

加增石膏
喻嘉言曰諸氣臌鬱之屬於肺者屬於肺之燥也而古今治氣鬱之方用辛香行氣絕無一方治肺之燥者諸痿喘嘔之屬於上者亦屬於肺之燥也而古今治法以痿嘔屬陽明以喘屬肺是則嘔與痿屬之中下而唯喘屬之上矣所以千百方中亦無一方及於肺之燥也即喘之屬於肺者非表即下非行氣即瀉氣閒有一二用潤劑者又不得其肯綮總之內經六氣脫誤秋

傷於燥一氣指長夏之溼爲秋之燥後人不敢更端其說置此一氣於不理即或明知理燥而用藥夾雜如弋獲飛鳥茫無定法示人也今擬此方名清燥救肺湯大約以胃氣爲主胃土爲肺金之母也其天門冬雖能保肺然味苦而氣滯恐反傷胃陰胃陰故不用也其知母能滋腎水清肺金亦以苦而不用其他苦寒降火傷胃之藥尤在所忌蓋肺金自至於燥所存陰氣不過一綫爾儻更以苦寒下其氣傷其胃其人尚有

生理乎。誠倣此增損以救肺燥變生諸證如沃焦救焚不厭其頻疫克有濟爾

通幽湯東垣　治幽門不通上衝吸門噎塞不開氣不得下大便艱難名曰下脘不通上衝吸門噎塞不開治在幽門下脘即幽門胃之下口也人身上下有七門皆下衝上也幽門上衝吸門吸門即會厭氣喉上掩飲食者也衝其吸入之氣不得下歸肝腎爲陰火所拒故隔噎不通濁陰不得下降而大便乾燥不行胃之糟粕與陰火俱在其中則腹脹作矣治在幽門使幽門通利而其陰火潤其燥血生其新血則幽門亦不受邪脘噎得開脹滿俱去矣是濁陰得下歸地也

當歸身　升麻　桃仁　研　紅花　甘草炙　原生地　熟地　或加檳榔

當歸二地滋陰以養血桃仁紅花潤燥而行血檳榔下墜而破氣滯加升麻者天地之道能升而後能降清陽不升則濁陰不降經所謂地上爲雲天氣下爲雨也李東垣曰腎開竅於二陰經曰大便難者取足少陰夫腎主五液津液不足熱結冷祕由冷氣橫於腸胃凝陰固結津液不通非燥糞也仲景曰脈浮而數能食不大便者此爲實名曰陽結脈沉而遲不能食身體重大便反鞕名曰陰結李東垣曰實祕熱祕即陽結也宜散之虛祕冷祕即陰結也宜溫之。

加大黃麻仁名當歸潤腸湯潤腸丸東垣　治腸胃有伏火大便祕濇全不思食風結血結或素有風病者亦多祕濇氣祕由氣不升降血祕由血虛津液不足熱祕由大腸熱結冷祕由冷氣橫於腸胃凝陰固結津液不通非燥糞也仲景曰脈浮而數能食不大便者此爲實名曰陽結脈沉而遲不能食身體重大便反鞕名曰陰結李東垣曰實祕熱祕即陽結也宜溫之虛祕冷祕即陰結也宜散之。

當歸尾　羌活　五錢　桃仁　研　大麻仁　去殼　一兩

蜜丸一方有防風風藻加秦艽皂角子燒存性用

歸尾桃仁潤燥活血羌活搜風散邪大黃破結通幽麻仁滑腸利竅血和風疏腸胃得潤則自然通利矣朱丹溪曰古方通大便皆用降氣品傳送之劑蓋肺氣不降則難傳送周根叔流香訶子杏仁等是也又老人虛人風人津液少而祕者宜滑之川芎麻仁阿膠等疑皆如此

以峻藥逐之則精液走氣血耗雖暫通而即祕矣。必變生他證。

加防風皂角仁蜜丸名活血潤燥丸治同（皂角得酥則滑澁指則燥結自除）去羌活加升麻紅花生熟二地名潤燥湯（俱東垣方）治同大黃煨熟當歸酒浸枳實炒等分蜜丸亦名潤腸丸治痔病肛門燥澁

決津煎　治婦人血虛經滯不能流暢而痛極者當以水漬水若江河一決而積垢皆去宜用此湯隨證加減主之此用補爲瀉之神劑也

當歸三五錢（或一兩）澤瀉一錢五分　肉桂一二錢　熟地二三錢（或五七錢或不用亦可）烏藥一錢

如陰滯不行者非加附子不可　如氣滯而痛脹者加香附一二錢或木香七八分　如血滯者加酒炒紅花一二錢　如小腹不煖而痛極者加吳茱萸七八分　如大便結濇者加肉蓯蓉三錢或鎖陽亦可煮粥彌佳　如氣虛者宜少用澤瀉烏藥之類甚者不用亦可

治胃脘有死血乾燥枯槁食下血聚則肝氣燥燥熱燥故槁也痰血阻碍故食下作痛翻胃而吐出也痰血不去則新血不生故腸枯而便祕。膈噎翻胃多因氣血兩虛槁在胃冷而成飲飲而下咽食不下槁在之會厭亦脘痛須臾吐出槁在貫門竇之上口也此」焦名噎食下良久吐出槁在幽門小腸下口也此中焦名膈朝食暮吐槁在關門下口也此下焦名翻胃又有寒痰瘀血或痰積壅塞胃口者或補。或消或潤宜隨病施治。

韭菜汁　牛乳　等分時時呷之有痰阻者加薑汁一方去牛乳加陳酒治血腸尤捷

韭汁辛溫益胃消痰牛乳甘平潤燥養血瘀去則胃無阻血潤則大腸通而食得下矣

治噎膈諸藥韭汁牛乳俱宜

汁散瘀竹瀝薑汁消痰。童便降火人乳牛乳潤燥補血蔗汁止嘔。芦汁和胃蔗汁和脾。梨汁涼肺。蜜和諸藥。消食鹽氣。蘆根汁和米醋開胃。竹瀝加薑酒煮小便燥結宜加腸大便燥結宜加腸人乳有五味之妙兼服四物湯爲「」兼不可服牛羊乳時時嘔之。

活血潤燥生津湯（丹溪）　治內燥津液枯少

當歸　白芍　熟地黃（一錢）　天冬　麥冬　栝蔞（八分）　桃仁（研）　紅花（五分）

歸芍地黃滋陰養血栝蔞二冬潤燥生津桃仁

紅花活血去瘀凡陰虛血燥而兼瘀滯者此方最宜

甘露飲　治胸中客熱牙宣口氣齒齦腫爛時出膿血吐血衄血目瞼垂重常欲合閉或飢餓煩不欲食飲及目赤腫痛不任涼藥口舌生瘡咽喉腫痛瘡疹已發皆可服之又治脾胃受濕瘀熱在裏或醉飽房勞濕熱相搏致生疸病身目皆黃肢體微腫胸滿氣短大便不調小便黃澀或時身熱

生地　熟地　天冬　麥冬　石斛　茵蔯

黃芩　枳殼　枇杷葉　甘草　一方加桂苓名桂苓甘露飲

此方創自潔古老人。朱丹溪以爲此心肺胃三經藥也主治胸中客熱口臭齒爛心煩咽痛等證許學士又去麥冬。加犀角主治與上略同。但彼是胸中有熱。此是胸中伏火。血不足也。足陽明胃。主。血。熱則消穀善饑是血中伏火。必傳中滿鼓脹。皆不治也。亦傳能食者。必發腦疽背疽。不能食者

黃連　天花粉　生地汁　藕汁　牛乳　將黃連花粉爲末調服或加蔓汁蜂蜜爲膏嚥化

地黃引子（易簡）　治消渴煩躁咽乾面赤（腎火上炎）

人參　黃耆（蜜炙）　甘草（炙）　生地黃　熟地黃　天冬　麥冬　杷葉（蜜炙）　石斛　澤瀉　枳殼（麩炒）

此方生津補血潤燥止渴佐以澤瀉枳殼疏導降心與小腸（心移熱於小腸相爲表裏經曰大腸流暢則肺經潤澤肺與大腸相爲表裏）宿熱既除其渴自止矣（翁嘉言曰八參

白虎湯專治氣分燥熱此湯頗治血分燥熱竹葉黃者湯兼治氣血燥熱若辨證而擇用之附方竹葉黃耆湯淡竹葉生地黃各二錢當歸川芎各一錢治消渴渴而虛兼有胃火者

治久嗽方（千金）

白蜜（勺）　生薑二（取汁）　潤肺散寒（白蜜潤能潤肺生薑辛能散寒）　先秤銅銚知勺兩訖納蜜

薑汁微火熬令薑汁盡唯有蜜勺兩在則止每含如棗大一九日三服（朱丹溪曰陰分嗽者多屬陰虛治用知母止嗽宋洪遵有爽疾晚復嚼薑桃如前數劑臥必愈遵如言臥時嚼服即飲湯勿用生薑以其辛散故也）

麻仁蘇子粥（本事方）　治老人風祕（許叔微曰一婦年八十四忽腹痛頭痛惡心不食醫皆議補脾治風積利頭目服藥雖愈全不進食其家憂惶子辨前藥皆誤此是老人風祕腸胃壅滯聚於胸中則腹脹惡心不思飲食上至於頭則頭痛不清也令作此粥兩啜而氣泄下結糞如拔十餘枚漸得通利不藥而愈矣）及產後大便不通（婦人產後有三種疾鬱冒則多汗則大便不通故難於用藥）

大麻仁　紫蘇子　等分洗淨合研再用水研

取汁煮粥

麻仁陽明正藥滑腸潤燥利便除風蘇子兼走太陰潤肺通腸和血下氣行而不峻緩而能通

故老人產婦氣血不虛者所宜用也

桑白皮等汁十味煎　許仁則　治氣嗽經久將成肺癆乍寒乍熱嗽涕稠黏喘息氣上唇口焦乾亦有嗽血者潮覺瘦悴小便赤少色收毛聳此亦成蒸及久嗽成肺癰嗽惡成膿出無多少

桑白皮升地骨皮三升二味合煎取汁三升生地汁五升生麥門冬汁二升生葛根汁竹瀝三升生薑汁白蜜各一升牛酥三合　以麥冬生地葛根竹瀝薑汁和煎減半再內桑皮地骨汁和煎三分減一再

成方切用　卷八上　桑白皮等汁十味煎　十三

入酥蜜膏攪勿停手煎如飴糖夜臥時取一胡桃大含之稍加至鷄子大或盡日丸服亦得

桑皮瀉肺行水麥冬補肺生津地骨退熱除蒸竹瀝清痰通絡能除痰迷之有大熱者生薑祛寒而溫胃腎補土以生金地汁葛汁甘寒以除大熱白蜜牛酥甘潤以止久嗽也

滋燥養營湯　治火爍肺金血虛外燥皮膚皴揭筋急爪枯或大便風祕肺主皮毛肝主筋爪肝故外見皮毛枯槁肌膚燥渴而有筋急便祕之候

當歸酒洗二錢生地黃熟地黃各一錢防風甘草五分

泰九一錢防風甘草五分

前證爲血虛而水涸當歸潤燥養血爲君二地滋腎水而補肺芍藥瀉肝火而益血爲臣黃芩風藥多燥尤防味辛能潤又泰艽能養血榮筋防風乃血藥之使吐血血崩皆用爲使甘草甘平瀉火大潤劑則補陰血爲佐使也

白茯苓九　治腎消因中消之後胃熱入腎消爍腎脂令腎枯燥遂致此疾兩腿漸細腰腳無力腎消即下消乃上消中消之傳變飲一溲二溲如膏油狀是肺上氣無病則氣能管束津液其精微者榮養筋骨血脈餘者爲溲肺病則津液無氣管攝而精微者亦隨溲下如膏油也

茯苓　黃連　花粉　葦薴　熟地黃　覆盆子　人參　元參各一兩　蛇牀子五錢　鷄肫皮三十具微炒　石斛七錢五分　鷄胵白者皮黃者肫卽鴨肫　蜜丸　磁石湯送下

茯苓降心火而交肺腎連清脾火而溫心石斛平胃熱而滋腎熟地元參生腎水覆盆蛇牀固腎精人參補氣花粉生津葦薴清熱利溲胵胵

鷄之脾也能消水穀通小腸膀胱而止便數書
治膈淨磁石色黑入腎補腎益精故加之以爲
使也愈嘉言曰友人病消渴後渴少止反加躁
病而以黃連犀角治心毋乃倒乎予曰腎者胃
之關也胃熱下傳於腎則關門大開心之陽火
得以直降於腎心火灼腎躁不能需予用犀角
黃連對治其下降之陽光寧爲倒乎服之果効
再用六味地黃丸加
犀角而肌澤病起矣

文蛤散　本文云渴欲飲水不止者文蛤散主之
文蛤一味搗杵爲散以沸湯五合和服方寸匙
金匱於小溲微覺不利蚕用文蛤一味治之方

書從不錄用詎知軟堅之品非劫陰卽傷陰獨
此一種平善無過兼可利水誠足寶乎按傷陰
論用此治燥以水噀人面肌膚粟起之表證亦
消渴裏證亦用之蓋取其功擅軟堅且利水徹
熱爾

黃耆湯　本事方

黃耆　熟地黃　芍藥　五味子　麥冬　天
冬　人參　甘草　茯苓　加薑棗烏梅煎
黃耆人參補氣熟地芍藥補血烏梅五味斂耗
生津天冬麥冬瀉火補水茯苓淡以利溼甘草
甘以和中溼去氣運則脾和而思食津生而燥
退矣

宣明黃耆湯　治心移寒於肺爲肺消飲少溲多
當補肺平心

黃耆兩五　五味子　人參　麥門冬　桑白皮二兩
枸杞子　熟地黃兩半　爲末每服五錢

宣明麥門冬飲子　治心移熱於肺傳爲膈消胸
滿心煩精神短少

人參　茯神　麥門冬　五味子　生地黃
甘草炙　知母　葛根　栝蔞根等分　咬咀每服
五錢加竹葉十四片

愈嘉言曰宣明二方爲內經心移寒移熱兩證
各出其治一種苦心非不可嘉然移寒移熱其
勢頗銳而生精養血其應差緩情非的對易老
門冬飲子亦然予謂心之移寒必先束肺之外
郭用參耆補肺加散寒之藥可也而用枸杞熟
地黃補腎則汪矣用桑白皮瀉肺其如外束之

寒何至心之移熱治以鹹寒先入其心如交蛤散之類自無熱可移正宜走大梁解圍之上着何不及之所以觀於海者難爲水也

易老門冬飲子　治老弱虛人大渴

人參　枸杞子　白茯苓　甘草　五味子　麥門冬　加薑煎

喻嘉言曰按易老方即變宣明麥冬飲子去生地知母葛根加枸杞也方下不言心移熱於肺唯以治老弱虛人大渴而增枸杞之潤去地黃之泥知母之苦葛根之發立方於無過治本之圖不爲迂矣

豬膏湯　治過勞四肢筋液耗竭數數轉筋爪甲皆痛不能久立名曰筋極（肝主筋筋極六極之一也經曰陽氣者精則養神柔則養筋筋骨過勞耗其津液不能榮養故勁急而筋數轉也爪甲者筋之餘筋屬木枯則枝葉皆萎也不能久立筋衰不能束骨也）

豬脂　薑汁二升五合　先將豬脂薑汁煎取三升再入酒分三服

津竭筋枯非草木之藥卒能責効豬脂潤能養筋薑汁辛能潤燥酒和血而性善行取易達於四肢也

除薑汁加金銀花煮酒飲治瘡疥最良

豬膏髮煎（金賈）　治諸黃令病從小便出

豬膏半斤　亂髮（如鷄子大三枚）　二味和煎髮消藥成分可服

徐忠可曰此爲黃疸之穀氣實者設也腎爲胃關胃家穀氣實則氣閉而腎燥故以豬膏潤腎燥髮灰利陰血則胃燥和而鬱解仲景於婦人

胃氣下泄陰吹而正結者亦用此方註曰此穀氣之實也以豬膏髮煎導之乃利陽明之陰以洩穀氣之實也然此之穀氣實又非穀疸之比蓋穀疸原由風寒不能消穀此則真穀氣過實熱而閉爾予友駱天游黃疸腹大如鼓百藥不效用豬膏四兩髮灰四兩一劑而愈仲景豈欺我哉

人參白虎湯　原治太陽中暍汗出惡寒身熱而渴

竹葉石膏湯　治虛煩燥渴

以上二方俱見下卷瀉火門

物嘉言曰按此二方治火熱傷其肺胃清熱救渴之良劑也故消渴病之在上焦者必取用之東垣以治膈消潔古以治能食而渴者其不能食而渴者用錢氏白朮散倍加葛根而東垣論消渴未傳能食者必發腦疽背疽其不能食者必成中滿鼓脹一變其方爲蘭香引子用石膏知母生熟甘草人參加入蘭香防風白芷蔻仁山

連翹桔梗升麻半夏再變其方爲生津甘露飲子用石膏人參生熟甘草知母加黃葉杏仁山梔薄荷白茯苓白芷蔻仁山連翹薑黃麥門冬蘭香常歸身桔梗升麻黃連木香柴胡藿香全蠍而爲之辭曰此制之緩也不惟不成中滿亦不傳下消矣三消皆可用予實不敢信其然也乃至三四之石子蓉苁湯潔古之清涼飲子俱從此方增入他藥引入他臟全失急救肺胃之意此後賢之所以爲後賢耶

甘麥大棗湯　金匱　治婦人臟燥悲傷欲哭象如神靈所作數欠伸亦補脾氣婦人血室先受積冷之燥靈樞曰一陰主鬱鬱之閉折則肝氣絕而喜悲則知燥氣乘肝爲悲傷欲哭象如神靈所作病從血液見陰象也靈樞曰胃病善伸數欠顏黑則知燥氣侵胃爲欠伸但使肝氣津潤君火不亢則臟陰不燥何致乘肝侵胃今令悲傷欠伸其肝陰之熱可知心脾之熱亦可知故以甘麥大棗湯主之

甘草　子氣　小麥一升　大棗十枚　以水六升煮取三升分溫三服

小麥能和肝陰之客熱而養心液且有消煩利

溲止汗之功故以爲君甘草瀉心火而和胃生金故以爲臣大棗調胃而通津液利其上壅之燥故以爲佐蓋病本於血心爲血主肝之子也心火瀉而土氣和則胃氣下達肝臟潤肺氣調則燥止而病自除也

吳氏醫學述第四種成方切用目錄
卷八下
瀉火門 正方五十四
附方四十七
黃連解毒湯 三黃金花丸 大金花丸 梔子金花丸 梔子檗皮湯 三補丸 梔子檗皮湯 三黃瀉心湯 大黃黃連瀉心湯 半夏瀉心湯 甘草瀉心湯 生薑瀉心湯 附子瀉心湯 人參白虎湯 白虎加蒼術湯 桂枝白虎湯 化斑湯 柴胡石膏湯 竹葉石膏湯 又竹葉石膏湯 白頭翁湯 甘草湯 桔梗湯 甘桔湯 清音湯 枳桔湯 桔梗湯 甘桔防風湯 如聖湯 詞子桔梗湯 保陰煎 滋腎丸 補腎丸 大補丸 滋本丸 補腎滋本丸 滋腎丸 黃檗滋腎丸 升陽散火 潛行散 升陽散火湯 火鬱湯 節菴抽薪飲 從薪飲 龍膽瀉肝湯 升陽散火湯 東垣龍膽瀉肝湯 又龍膽瀉肝湯 清流飲 涼膈散 方見祛風門 當歸龍薈丸 化陰煎 瀉青丸 方見祛風門 人參瀉肺湯 瀉白散 黃芩一物湯 清金丸 東垣加減瀉白散 寶鑑加減瀉白散 謙甫加減瀉白散 利膈散 化肝煎 導赤散 清胃散 獨活散 天門冬散 玉女煎 瀉黃散 又瀉黃散 地黃煎 左金丸 戊巳丸 連附六一湯 抑青丸 瀉心湯 約陰丸 導赤各半湯 消毒飲 約營煎 紫雪 碧雪 人參清肌散 人參敗毒散 白朮除溼湯 石膏散 玉泉散 清骨散 二母散 元參升麻湯 陽毒升麻湯 消斑青黛飲 蒼耳散 辛夷散 玉屑無憂散 腎熱湯 綠豆飲 香連丸 黃連雪梨漿 大清飲

吳氏醫學述第四種

武原吳儀洛遵程輯　門人周蘭九生庭　有榆著培同較　男　有杜集望

成方切用

瀉火門

內經至真要大論所列病機凡言火病之見於諸篇者四凡皆謂之火也然諸言實而彼言虛者豈果本經之自矛盾耶蓋言不過總言五運六氣之大約原非確指為實熱也故於篇末復以有無虛實四字總結於後此軒岐之明見萬世正恐後人誤以火熱二字悉認為真因而曉示如此此其火有虛實熱有真假從可知矣蓋火得其正能為陽氣之虛也火之不可無亦不可衰衰則陽氣即在血所謂有形者其化實即此凡火之為病其在外者必見於皮肉筋骨其在內者必見於臟腑九竅如果有熱證可據則火性急烈誠可畏也然實火止隨形質因證而攻之滌之又何難哉惟虛火則本於元氣之虛而再攻其火非挺即死是以凡火未必殺人而以虛作實則無不殺之矣瀉火諸藥

梔子　黃芩　黃檗　柏皮　知母　青黛　石膏　寒水石　滑石　天花粉　山梔仁　降火　從小陞出其性能屈曲下行右膏瀉陽胃之火非此不可黃芩清脾肺大腸之火黃檗瀉肝腎之火地骨皮退陰中之火善除骨蒸夜熱生地麥門冬清肝肺涼血中之火天門冬瀉肺大腸之火桑皮瓜蔞梨汁貝母解上焦痰逆之火柴胡乾葛解肝脾諸經之鬱火龍膽草瀉肝腎膀胱之火槐花清肝腎大腸之火能解諸毒芍藥石斛清肝胃之火天花粉清痰止渴解上焦之火連翹瀉諸經之浮火元參清上焦之浮火山茈根解咽喉之火牛蒡子開心脾胃脘之痰火青黛蘆薈胡黃連瀉五臟之疳熱火參瀉痼蝕之火木通下行瀉小腸之火滑石利小腸膀胱之火澤瀉車前子利窻閉之火人中白清肝脾腎之陰火童便降陰中血分之浮火天黃朴硝瀉陽明諸經實熱之火人參潰脅者白朮甘草除氣

成方切用　火　卷　十一　黃連解毒湯

黃連解毒湯

相傳此方為太倉公火劑而崔氏治劉護軍又云其自製者

一切火熱表裏俱盛狂躁煩心口燥咽乾大熱乾嘔熱毒上逆錯語吐血衄血

黃連　黃芩　黃檗　梔子　等分

三焦積熱邪火妄行故用黃芩瀉肺火於上焦黃連瀉脾火於中焦（王海藏曰黃連瀉心實瀉脾也子能令毋實實則瀉其子）黃檗瀉腎火於下焦梔子通瀉三焦之火從膀胱出蓋陽盛則陰衰故用大苦大寒兼三焦而統治之瀉其亢甚之火而救其欲絕之水也然非實熱不可輕投（劉河間曰傷寒表熱極甚嘔吐發汗吐下擬以小柴胡天水冰壺有微熱不可發汗吐下擬以小柴胡天水冰壺有微熱不可發汗吐下擬以小柴胡天水冰壺有微熱不可

滿滿在心胸也不在胃也若雜病痞滿有寒熱虛熱之不同保命集云脾不能行氣於四臟結而不散則爲痞傷寒之痞爲寒實內熱室苦泄雜病之痞爲氣不條暢宜辛散

大黃二兩　黃芩一兩　附子一枚炮去皮臍別煮取汁

吳鶴皐曰心下痞故用三黃以瀉痞惡寒汗出故用附子以回陽非三黃不能去痞熱無附子恐三黃益損其陽寒熱並用斯爲有制之兵矣

喻嘉言曰此邪熱既盛眞陽復虛之證故於三黃湯內加附子汁其成傾痞之功全賴有大黃附子湯亦同此意大黃細辛各二兩附子一枚炮治脇下偏痛發熱脈弦緊此寒也以溫藥下之陽中有陰當以溫藥下其寒後人罕識其旨而治熱痞大黃黃連之類也有陰有寒藥而治者

陽不和而痞用寒熱藥者大黃黃連加附子之類也有陰盛陽虛而痞用辛熱藥多而寒藥少者半夏生薑甘草瀉心之類也經又曰傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也當先解表乃可攻痞解表桂枝湯攻裏大黃黃連瀉心湯經又曰本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解此有停飲故也李東垣曰酒積雜病下之太過亦作痞傷盡下多亡陰陰者脾胃水穀之陰也脾胃氣虛下陷於心之分野故致心下痞宜升其胃氣以血藥兼之若全用氣藥導之則痞益甚甚而復下之氣愈下降必變爲中滿膨脹矣

去附子黃芩名大黃黃連瀉心湯仲景**治傷寒心下痞按之濡**音軟關上脈浮經曰按之自濡但氣痞爾周揚俊曰以非痰實結聚故無取半夏生薑也活人云結胸與痞關脈浮而結者三黃以瀉肺

李時珍曰仲景治心氣不足吐衄血者用瀉心湯實瀉心包肝脾胃四經血中之伏火也又治心下痞滿按之軟者用瀉心湯亦瀉脾胃之溼熱非瀉心也病發於陰而反下之則痞滿乃寒傷營血邪結上焦胃之上脘在心故曰瀉心經曰濁氣在上則生脹脹是已病發於陽而反下之則結胸乃邪熱陷入血分亦在上脘故大陷胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃血分之邪而散其熱也若結胸在氣分只用半夏瀉心湯按只發陽發陰諸解不同終成疑案李氏則以寒傷爲陰病熱陷爲陽病然仲景所用皆寒藥未嘗有所分也周揚俊則謂總屬下早致然似爲近理

半夏瀉心湯仲景**治傷寒下之早胸滿而不痛者爲痞身寒而嘔飲食不下非柴胡證**經曰傷寒五六日嘔而發熱柴胡證具而以他藥下之不爲逆必蒸蒸而振卻發熱汗出而解若心下滿而鞕痛者此爲結胸也大陷胸湯主之若滿而不痛者此爲痞柴胡不中與也宜半夏瀉心湯凡用瀉心者皆屬誤下之證非傳經熱邪也

半夏半升**黃連**一兩**黃芩　甘草**炙**人參　乾薑**三兩

大棗十二枚

成氏曰否而不泰爲痞苦先入心瀉心者必以苦故以黃連爲君黃芩爲臣以降陽而升陰也辛走氣散痞者必以辛故以半夏乾薑爲佐以分陰而行陽也欲通上下交陰陽者必和其中

故以人參甘草大棗爲使以補脾而和中已下脾氣必虛則痞熱消而大汗以解矣舊註云此方藥味蓋本理中人參黃芩湯方王海藏曰外證全是下證而脈反細不可下者鴻心湯主之脈有力者黃連瀉心湯脈無力者半夏瀉心湯原以滌飲此證因嘔故推半夏爲君程郊倩曰痞雖虛邪然表氣入裏慌亂於心陽之分寒亦成熱矣寒已成熱則不能外出而熱非實樣又不能下行唯用苦寒從其部而瀉之仍慮下焦之陰邪上入兼苦熱以溫之陰陽兩解不攻痞而痞自散所以寒熱互用若陰痞不關陽鬱即鬱而未成熱藏是上下陰陽分拒格而成瀉心之法蓋不可用也又曰人皆曰汗多亡陽不知下多亦亡陽以陰中之陽故曰亡陰爾下焦之陽驟虛氣必上逆則上焦之陽反因下而成實以火氣不下行故也治多瀉上補下心君得苦寒而安則反能從陽引之入陰故芩連梔子連瀉不足前法一無所用矣

除人參再加甘草一兩谷前四兩名甘草瀉心湯仲景治傷寒中風醫反下之下痞鞕而滿乾嘔心煩醫復下之其痞益甚此非結熱但以胃虛客氣上逆故使鞕也爲下後裏虛胃弱內損陰氣故加甘草以和中益胃復其陰退甘虛熱大要痞滿下利者爲實按甘草甘令人滿故中滿證忌之而別錄甄權並云甘草能除滿以脾健運則滿除也觀仲景用以消痞豈非取其散滿哉又按此乃傷寒之下利陽鳴也雜證陽鳴屬脾胃虛經云脾胃虛則腸鳴腹滿又云中氣不足腸爲之苦鳴宜參木補劑加甘草芩連枳實乾薑等丹溪曰腹中水鳴乃火激動其水也宜二陳湯加芩連梔子主之脈有力者黃連瀉心湯脈無力者半夏瀉心湯嘉言曰諸瀉心湯原以滌飲此證因嘔故推半夏爲君程郊倩曰痞雖虛邪然表氣入裏慌亂於心陽之分寒亦成熱矣寒已成熱則不能外出而熱非實樣又不能下行唯用苦寒從其部而瀉之仍慮下焦之陰邪上入兼苦熱以溫之陰陽兩解不攻痞而痞自散所以寒熱互用若陰痞不關陽鬱即鬱而未成熱藏是上下陰陽分拒格而成瀉心之法蓋不可用也又曰人皆曰汗多亡陽不知下多亦亡陽以陰中之陽故曰亡陰爾下焦之陽驟虛氣必上逆則上焦之陽反因下而成實以火氣不下行故也治多瀉上補下心君

白虎湯仲景治傷寒脈浮滑表有熱裏有寒浮爲在表滑爲在裏裏寒指傷寒即病病之本因也及三陽合病脈浮大腹滿身重難以轉側口不仁而面垢讝語遺尿發汗則讝語下之則頭上生汗手足逆冷自汗出者不惡寒反惡熱頭痛自汗口渴舌胎白痛鼻乾不得臥心煩躁亂日晡潮熱或陽毒發斑胃熱諸病邪熱盛故脈洪大外無寒邪故不惡寒反惡熱中風有汗傷寒無汗傳入陽明則有

汪謂之熱越故陽明病法多汗裏熱故但渴陽
主肌肉故肉燥故肌熱脈交額中故目痛脈俠鼻孔
燥故鼻乾胃不和故臥不安人之陽氣晝日行
陽二十五度平旦屬少陽日中屬太陽日晡屬
陽明傷寒証屯日晡潮熱為胃
實無虛證屯胃熱失下則發斑
石膏一斤　知母六兩　甘草二兩　粳米六合　先煮石膏數
十沸味淡難出再投藥米米熟湯成溫服
熱淫於內以苦發之故以知母苦寒為君熱則
傷氣必以甘寒為助故以石膏甘草為臣津液
內爍故以粳米甘平益氣為使不致傷胃也又
煩出於肺躁出於腎石膏清肺而瀉胃火知母
清肺而瀉腎火甘草和中而瀉心脾之火或瀉
其子肺心不顯治陽明氣分熱也石膏
甘草不但清裏兼能發表然必實熱方可用或
有血虛身熱類白虎證脈洪大而虛以此為辨又按陰
盛格陽陽盛格陰二證最為難辨蓋陰盛極而
格陽於外外熱而內寒陽盛極而格陰於外外
冷而內熱證所謂重陰必陽重陽必陰重寒則
燥重熱則寒是也當於小便分之便清者外雖
燥熱而中必寒便赤者外雖厥冷而內實熱再
看口中燥潤及舌胎淺深舌為心苗應南方
火邪在表則未生胎邪入裏津液搏結則生胎
而滑胎白者丹田有熱胸中有寒邪在半表半
裏也然入裏深則燥而滑胃則黃芒承
表淺則薄而白若熱痰白膩為腎水刑於心火
熱盛於內而外反見假寒之象也

心煩背微惡寒者背為陽陽背惡寒口和者少
陰病也宜附子湯今熱未退而微惡寒為表未全罷尚屬太
陽然燥渴心煩為裏熱已熾與白虎湯解表邪清裏熱加人參
補氣生津太陽病在表故惡寒不惡寒少陽在半表
半裏亦微惡寒陽明在裏故不惡寒反惡熱問
有惡寒者與太陽合病也許叔微曰仲景云傷
寒吐下後七八日不解表裏俱熱夫渴燥煩者
白虎加人參湯主之又云傷寒脈浮發熱無汗
其表不解不可與白虎林億校正謂於此表裏
差矣予謂不然大抵白虎能除傷寒發熱前後二證或云表裏俱熱或
皆可服之一種發熱無汗其表不解
全是表與裏複說安可行白虎也

中暍身熱汗出惡寒足冷脈微而渴身熱惡寒
脈微又可表亦治火傷肺胃傳為膈消喻嘉言曰
膈消以地

貴九治其血分腎消以白虎湯治其氣分病不能除醫之罪也加蒼术名白虎加蒼术湯治溼溫脈沉細者名溼溫其證歷冷腹滿頭痛身痛多汗渴而譫語李東垣曰動而傷暑火熱傷氣辛苦之人多得之宜蒼术白虎湯　加桂枝名桂枝白虎湯金匱治溫瘧但熱不寒骨節疼痛時嘔除粳米加人參名化斑湯治胃熱發斑脈虛者加柴胡黃芩半夏名柴胡石膏湯治暑嗽喘渴

竹葉石膏湯仲景　治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐傷寒解後餘熱未盡津液不足氣逆上衝人參竹葉能止喘渴脈虛

竹葉二把　石膏一斤　人參三兩　甘草二兩炙　粳米半升　麥冬一升半夏半升　加薑煎

竹葉石膏之辛寒以散餘熱竹葉能止喘促氣逆上衝人參甘草麥冬粳米之甘平以益肺安胃補虛生津半夏之辛溫以豁痰止嘔故去熱而不損其真導逆而能益其氣也

又方竹葉石膏木通薄荷桔梗甘草亦名竹葉石膏湯

石膏湯治胃實火盛而作渴土材曰陽明外盡陽明內實則用承氣以攻下此云胃實非有停滯但陽明勝爾火旺則金囚故以桔梗救金薄荷散火於上木通泄火於下甘草緩以竹葉瀉火以石膏直入戊土而清其中三焦火平則炎蒸退而津液生矣

白頭翁湯仲景　治傷寒熱利下重欲飲水者陽熱與陰寒不同陰利宜理中四逆溫臟陽利糞色必焦黃熱臭便出作聲臍下必熱宜涼藥

白頭翁二兩　秦皮　黃連　黃檗三兩

白頭翁苦寒能入陽明血分而涼血止渴秦皮苦寒性濇能涼肝益腎而固下焦黃連涼心清肝黃檗瀉火補水竝能燥溼止利取其寒能勝熱苦能堅腎濇能斷下也徐忠可曰此主熱利下重蓋下陷則傷陰陰傷則血熱而不用調氣之藥痢不在氣爾厥陰少陽其表也臟腑相連於法禁下故但謀去其熱熱除而利自止矣

甘桔湯金匱名桔梗湯　治少陰咽痛咳無痰火鬱在肺手少陰心脈循喉嚨火炎挾咽足少陰腎脈循喉嚨一陰一陽結謂之喉痺一陰少陰相火也金匱云熱之所過血為之凝滯蓄結癰膿吐如米粥始萌可救膿成難治火鬱在肺則乾咳無痰

甘草二兩　桔梗一兩　或等分生好古加減法失音

加訶子聲不出加牛蒡上氣加陳皮涎嗽加知母貝母痰湯加五味酒毒加葛根少氣加人參嘔加半夏生薑吐臘血加紫苑肺痿加阿膠胸膈不利加枳殼痞滿加枳實目赤加梔子大黃面腫加茯苓膚痛加黃耆發斑加荆芥防風瘡毒加牛蒡子大黃不得眠加梔子

甘草甘平。解毒而瀉火。桔梗苦辛。清肺而利膈又能開提氣血表散寒邪排膿血而補內漏故治咽痛嗌痺肺癰咳嗽取其辛苦散寒甘平除

熱也金匱曰咳而胸滿振寒咽乾不渴時出濁唾腥臭爲肺癰此湯主之愈嘉言曰此上提之法乘其新起提其敗血或從嗽出或從便出是以殺其毒此因胸滿振寒不渴病尚在表用此開提肺氣若勢已入裏又當引之從胃入腸此法不中用矣綱曰咳痺惡寒爲寒閉於外熱鬱於內忌用膽蠀等劑點嗽使陽鬱不得伸又忌硝黃等寒劑下之使陽邪陷裏反用表藥提其氣升因助陽也如不惡寒脈滑實者又當用寒劑下之酸劑收之也。外臺祕要曰五臟之俞六腑之合天之德通達風氣性愛溫而惡寒心火爲王而肺居其上肺爲華蓋下覆肺金被火傷則葉萎倘着於肝肝正陽俱蹈變成嗽矣肺主皮毛遏寒則慄而粟起肺嗽因寒倘若於肝而成病由本能扣金與虛熱相其腎則愈矣

除桔梗名甘草湯金匱治同加防風名甘桔防風湯治同加防風荆芥連翹名如聖湯宋仁宗治上焦風熱加訶子和童便服名訶子清音湯治中風不語肺屬金。主音。金空則有聲。風痰壅塞。則不能言。或三脈凸血管不轉運。而不能言。或舌無血榮養而痞。舌蹇者。中風不能轉運之類。而咽喉聲音如故。喉痺者。勞嗽失音之類。而舌本則能轉運言語也。除甘草加枳殼名枳桔湯治胸中痞塞噫氣吐酸或欬枳殼桔梗苦下氣而散痞。寒發汗。反下之。遂成痞。枳實理中丸最良。審知是痞。先用枳桔湯尤妙。緣桔梗枳殼行氣下膈也

保陰煎治男婦帶濁遺淚色赤帶血脈滑多熱便血不止及血崩血淋或經期太多凡一切陰虛內熱動血等證

生地　熟地　方藥二錢　山藥　川續斷　黃芩　黃檗半錢　生甘草一錢　如小水多熱或兼怒火動血者加焦梔子一二錢　如夜熱身熱加地骨皮一錢五分　如肺熱多汗者加麥冬地骨皮血熱甚者加黃連一錢五分　如血虛血滯筋骨腫痛者加當歸二三錢　如氣滯而痛者去熟地加青皮陳皮丹皮香附之屬　如血脫血滯及便血久不止者加地榆一二錢或烏梅一二個或百藥煎一二錢文蛤亦可　如少年或氣血正盛者不必用熟地山藥　如肢節筋骨疼痛或腫者加秦艽丹皮各一二錢

滋腎丸　又名通關丸　東垣　治下焦邪熱口不渴而小便祕及腎虛蒸熱腳膝無力陰痿陰汗衝脈上衝而喘腎中有水有火水不足則火獨治故虛熱甚於下焦故腳膝無力陰痿汗出衝脈起於二陰之交故氣逆上而喘　黃檗二兩炒　知母一兩炒　桂一錢　蜜丸

小便者足太陽膀胱所主生於肺金肺中伏熱水不能生是絕小便之源也渴而小便不通者肺氣不得降是也故用清燥金之正化氣薄淡滲之藥瀉火而清肺滋水之化源也若熱在下焦而不渴是絕其流而溺不泄也須用氣味俱厚陰中之陰藥治之　王善夫病小便不通漸成中滿腹堅如石腿裂出水夜不得眠不能飲食東垣診治歸而至旦不寐因記素問曰無陽則陰無以生無陰則陽無以化又云膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣此病癃祕是無陰則陽無以化也此因膏粱積熱損傷腎水火又逆上而爲嘔噦內關外格之證悉具死在旦夕矣遂處北方大苦寒之劑黃檗知母各一兩桂一錢爲引須臾前陰如刀刺火燒溺如瀑泉腫脹遂消此謹一在上焦氣分而渴一在下焦血分而不渴二者之殊至易辨爾又曰凡病在下焦皆不渴血中有溼故不渴也　若膀胱陽虛無以化又當用八味腎氣丸按消渴證以渴爲主而分氣血故血分亦有不渴者

去桂名療腎滋本丸　治腎虛目昏去桂加黃連名黃檗滋腎丸　治上熱下冷陽極似陰水衰心煩單黃檗一味名大補丸　治腎虛膀胱虛熱腰股痛而足心熱爲未薑汁酒調服名潛行散　治痛風腰以下溼熱流注

升陽散火湯　東垣　治肌熱表熱四肢發熱骨髓中熱熱如火燔捫之烙手此病多因血虛得之又

胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土並宜服此
柴胡八錢　防風二錢半　人參　白芍五錢　葛根　升麻　羌活　獨活
五錢加薑棗煎
柴胡以發少陽之火爲君升葛以發陽明之火羌活以發少陰之火獨活以發少陰之火爲臣此皆味薄氣輕上行之藥所以升舉其陽使三焦暢遂而火邪皆散矣人參甘草益脾土而瀉熱芍藥瀉脾火而斂陰且酸斂甘緩散中有收

不致有損陰氣爲佐使也　吳鶴皐曰經曰少火生氣天非此火不能生物人非此火不能有生揚之則光遏之則滅今爲飲食抑遏則生道幾乎息矣使清陽出上竅則濁陰自歸下竅而飲食傳化無抑遏之患矣東垣聖於脾胃治之必主升陽俗醫知降而不知升是撲其少火也安望其衛生耶又曰古人用辛散佐以酸收故桂枝湯中亦用芍藥猶兵家之節制也

除人參獨活加葱白名火鬱湯治同　火鬱者內外熱外寒脈沉而數火鬱無發故外寒沉爲在裏流而數知爲內熱也

陶節菴升陽散火湯人參白朮茯神甘草陳皮麥冬當歸芍藥柴胡黃芩加薑棗金器煎治傷寒父手昏冒寒邪傳入陽經頭痛身熱惡寒口苦咽乾目眩耳聾胸滿脇痛或發寒熱往來或痰涎壅盛或飲食不進或嘔吐酸水或大便不通或小便赤澁或發黃或譫語或昏不識人或狂言妄見或鼻衄或吐血或下血或發斑或發疹或發渴或發汗或不汗或汗出不止或汗出不徹或汗出不解或汗出過多或汗出偏多或汗出偏少或汗出偏身或汗出偏頭或汗出偏手或汗出偏足或汗出偏半身或汗出偏左或汗出偏右或汗出偏上或汗出偏下或汗出偏前或汗出偏後或汗出偏內或汗出偏外或汗出偏寒或汗出偏熱或汗出偏濕或汗出偏燥或汗出偏風或汗出偏痰或汗出偏氣或汗出偏血或汗出偏虛或汗出偏實或汗出偏陰或汗出偏陽或汗出偏表或汗出偏裏或汗出偏半表半裏或汗出偏上焦或汗出偏中焦或汗出偏下焦或汗出偏三焦或汗出偏經絡或汗出偏臟腑或汗出偏肌肉或汗出偏筋骨或汗出偏皮毛或汗出偏頭面或汗出偏手足或汗出偏胸腹或汗出偏腰背或汗出偏四肢或汗出偏全身或汗出偏半身或汗出偏左或汗出偏右或汗出偏上或汗出偏下或汗出偏前或汗出偏後或汗出偏內或汗出偏外或汗出偏寒或汗出偏熱或汗出偏濕或汗出偏燥或汗出偏風或汗出偏痰或汗出偏氣或汗出偏血或汗出偏虛或汗出偏實或汗出偏陰或汗出偏陽或汗出偏表或汗出偏裏或汗出偏半表半裏或汗出偏上焦或汗出偏中焦或汗出偏下焦或汗出偏三焦或汗出偏經絡或汗出偏臟腑或汗出偏肌肉或汗出偏筋骨或汗出偏皮毛或汗出偏頭面或汗出偏手足或汗出偏胸腹或汗出偏腰背或汗出偏四肢或汗出偏全身

寒父手胃心爭衣摸牀譫語昏沉不省人事節菴曰俗醫不識誤認風證不知此乃肝熱乘肺元氣虛衰不能主持名撮空證小便利者可治有小便不利者可治有其神故尋衣摸牀小便利則肺氣猶降膀胱猶能化氣而腎水未枯故可治

抽薪飲　治諸凡火盛而不宜補者
黃芩　石斛　木通　梔子炒　細甘草三分　煎成食遠溫服
膏者加連翹天花粉以解之
腸者加槐蕊黃連以清之　熱在陽明頭面或躁煩便熱者加生石膏以降之　熱在下焦小水痛澁者加草龍膽車前以利之　熱在陰分津液不至者加麥冬生地芍藥之類以滋之
熱在腸胃實結者加大黃芒硝以通之

徙薪飲　治三焦氣火一切內熱漸覺而未甚者宜抽薪飲先宜清以此劑其甚者
黃芩二錢　麥冬　芍藥　黃檗
陳皮八分　如多鬱氣逆傷肝脇肋疼痛或致動血者加青皮梔子

龍膽瀉肝湯 局方　治肝膽經實火濕熱脇痛耳聾之部也。火盛故作痛。膽脈絡於耳故聾。肝者將軍之官也。謀慮出焉。膽者中正之官也。決斷出焉。膽虛數謀慮而不決。膽氣上溢。故口苦。或腫。或痛。白濁溲血。皆肝火也。肝主筋。濕熱勝。故筋痿。肝脈絡於陰器。故或作

龍膽草 炒酒洗　生地黃 炒酒　梔子 炒酒　澤瀉　木通　車前子　當歸 酒洗　柴胡　生甘草

龍膽瀉厥陰之熱。肝膽經所過也。柴胡平少陽之熱。膽與肝為表裏。黃芩梔子清肺與三焦之熱以佐之。澤瀉瀉腎經之

澤木通車前瀉小腸膀胱之濕以佐之。然皆苦寒下泄之藥。故用歸地以養血而補肝。用甘草以緩中而不使傷胃。為臣使也

東垣無黃芩梔子甘草亦名龍膽瀉肝湯 治前陰熱瘡臊臭。此因飲酒。風濕熱合於下焦。為邪引澤瀉車前木通利小便。亦除臊氣。所謂在下者因而竭之。生地龍膽苦寒。以瀉濕熱。肝主血當歸以滋肝血不足也。一方除當歸生地木通澤瀉車前加人參五味天冬麥冬黃連知母亦名龍膽瀉肝湯。治筋痿。陰急口苦爪枯。亦治前證。加人參者。并土

當歸龍薈丸 宜明　治一切肝膽之火。神志不寧。驚悸搐搦。躁擾往越。頭運目眩。耳鳴耳聾。胸膈痞塞。咽嗌不利。腸胃燥澁。兩脇痛引少腹。肝移熱於肺而咳。嗽驚狂。背屬肝火。目為肝竅。膽脈絡於耳。二經火盛。故目眩耳聾。心脈絡於胸膈。肺主氣。主氣不宣。故搐搦。水衰火盛。故口燥咽乾。膽脈循脇。肝膽經所循。故相引而痛。五臟六腑皆有火。然必傳以與肺肝之移熱。此與當

治盜汗 歸六黃湯同意。

當歸 酒洗　龍膽草 酒洗　梔子 炒黑　黃連 炒　黃檗 炒　黃芩 炒　大黃 酒浸　青黛 水飛　蘆薈 各一錢　木香 二錢　麝香 五分

蜜丸薑湯下

肝木爲生火之本肝火盛則諸經之火相因而起爲病不止一端矣故以龍膽青黛瀉其火也蘆薈大苦大寒氣臊入肝能引諸藥同入厥陰先平其甚者而諸經之火無不漸平矣諸藥苦寒已甚當歸辛溫能入厥陰和血而補陰故以爲君少加木香麝香者取其行氣通竅也然非實火不可輕投

化陰煎　治水虧陰涸陽火有餘小便癃閉淋濁

疼痛等證

生地　熟地　牛膝　豬苓　澤瀉　生黃檗

加食鹽少許　若水虧居多而陰氣大有不足者可遞加熟地用至一二兩亦可

瀉青丸　錢乙　治肝火鬱熱不能安臥多驚多怒筋痿不起目赤腫痛

肝者將軍之官風淫火熾不易平也龍膽大黃苦寒味厚沉陰下行直入厥陰而散瀉之所以抑其怒而折之使下也羌活氣雄防風善散並能搜肝風而散肝火所以從其性而升之於上也少陽火鬱多煩躁梔子能散三焦鬱火而使邪從小便下行少陽火實多頭痛目赤川芎能上行頭目而逐風邪且川芎當歸皆血分之藥能養肝血而潤肝燥血虛故肝燥故多怒多驚又皆血中氣藥辛能散而溫能和一瀉一散一補同爲平肝之劑故曰瀉青然必壯實之人方可施用余子

容曰若醫多執肝常有餘之說舉手便云平肝按聖濟經云原四時之所養始於春女子受娠一月是厥陰肝經養之所化始於木宛十二經之肝者乃春陽發動之始萬物生化之源故戒怒養陽使先天之氣相生於無窮是攝生之切要也不可泥於此說內經六節藏象論曰所謂得五行時之勝各以氣命其藏求其勝也皆歸始春蓋春屬肝木乃吾身升生之氣此氣若有不充則四藏何所稟承如春無所生則夏長秋收冬藏者何物乎五行之中皆木有發榮暢茂之象花葉蕾蕊艷而可愛結菓成實食之以全生皆此木也使天地無木則世界黯淡無色矣由是言之培之養之儲恐不暇而倚欽剪伐之哉外臺秘要曰五行五藏皆互相生肝屬風木木盛生火故發熱在肉之下骨之上有多肝多甚於寅卯木旺之時按之經火干之故臥不安肝在志爲怒故多怒肝虛膽性急多驚膽逸熱則縱故疼曰爲肝家虛熱故膽痛

雖處中而爲臟首位在甲乙懷養仁之故應春而王也爲心之母餘臟循次而生焉

人參瀉肺湯　治肺經積熱上喘欬嗽胸膈脹滿痰多大便澀

人參　黃芩　梔子仁　枳殼　薄荷　甘草　桔梗去皮尖　桑白皮　大黃　桔梗

按人參瀉肺熱反能傷肺此清肺經積熱以人參瀉肺立名可見瀉其肺熱必不可傷其肺氣也況人參之溫以一味清涼監之有餘如此大隊寒下之藥不推之爲君其敢用乎

瀉白散　治肺火皮膚蒸熱　錢乙

桑白皮　地骨皮各一錢　甘草五分　粳米百粒

桑白皮甘辛而寒行水降火瀉肺氣之有餘除在皮毛。驅淅寒熱邪在皮毛。嗽氣急肺主氣逆。地骨皮寒瀉肺火皮膚蒸熱肺主皮毛輕按即得。重按全無是熱邪在膚腠。甘草緩急。粳米和胃。

利膈散　治脾肺大熱虛煩上壅咽喉生瘡

人參　甘草　等分爲末每服二錢不拘時沸湯點服咽喉口瘡甚加殭蠶

桔梗　牛蒡子炒　荊芥穗　防風　柏子仁　薄荷　連翹　杏仁去皮尖　桑白皮　大黃　桔梗

按此方清上焦熱全用辛涼輕清之氣不雜苦寒降下之味其見甚趨較涼膈散諸方爲更勝

化肝煎　治怒氣傷肝而因氣逆動火致爲煩熱脇痛動血等證

青皮　陳皮　白芍二錢　澤瀉　丹溪清金丸瀉肺金血火黃芩一物湯丹溪清金丸分之火清金丸即黃芩炒爲末水丸。

子炒丹皮一錢五分　土貝母二錢　如大便下血者加地榆小便下血者加木通各一錢五分　如兼寒熱者加柴胡一錢　如火盛加黃芩一二錢　如肋腹痛脹加白芥子一錢　脹滯多者勿用芍藥

導赤散　錢乙　治小腸有火便赤淋痛面赤狂躁口糜舌瘡齒牙口渴心與小腸相表裏心熱則小腸亦熱故便赤淋痛心屬君火是五臟六腑之主故諸經之熱皆應於心面赤煩躁齒牙口渴皆心熱也舌為心苗若心火上炎薰蒸於口則口糜口瘡輕手按至皮毛之上則熱自中大甚是熱在血脈為心熱也此方主之如治白濁沙淋等證合導赤散

生地黃　木通　甘草梢　淡竹葉

生地涼心血竹葉清心氣故清上焦木通降心火入小腸同所用各別君心火也相腎火也草梢達莖中而止痛便赤淋痛以其導丙丁之火由小水而出也小腸為丙火心為丁火心熱泄小腸五苓散治口糜神效經曰膀胱移熱於小腸膀胱不便上為口糜亦有用附子理中湯者因脾胃虛衰之火被逼上炎故用參朮甘草補其本心氣熱則火得所助接引退舍矣綱目曰腎氣虛則下竄宜導赤散宜地黃丸

天門冬散　治肺壅腦熱鼻乾大便祕澁

天門冬去心皮　桑白皮　升麻　甘草　荊芥

按此方藥味較人參瀉肺湯為少減然用升麻且升且降以散上焦壅熱可取

清胃散　東垣　治胃有積熱上下牙痛牽引頭腦滿面發熱其牙喜寒惡熱或牙齦潰爛或牙宣出血或唇口頰腮腫痛足陽明胃脈循鼻外入上齒中挾口環唇循頰車上耳前至上牙齦喜寒飲而惡熱手陽明大腸脈上頸貫頰入下齒挾口至下牙齦喜熱飲而惡寒足陽明經絡腦故腦痛陽明之脈營於面故面熱二經熱盛故唇口齒頰病面腫痛也齒為骨屬腎牙宣牙齦出血也亦名齒縫出血也為陽明熱盛以鉤乃腎病若血多而溢出不止陽明多氣多血也唇屬脾胃大腸經燥則乾熱則裂風則瞤寒則搐若腫皺裂如蠶繭名曰繭唇陽明多氣多血也

清升熱除則腫消而痛止矣薛新甫曰濕熱而牙痛者承氣湯輕者清胃散大腸熱而齦腫痛者調胃湯六鬱面痛者越鞠丸中氣虛而痛者補中益氣湯思慮傷脾而痛者歸脾湯房勞腎經虛熱而痛者六味丸腎經虛寒而痛者還少丹重則入味丸其屬風熱者羌活附子湯當臨時制宜附獨活散風寒入腦者羌活防風各五錢細辛荊芥薄荷生地各二錢每服三錢

玉女煎　治水虧火勝穴脈浮洪滑大少陰不足陽明有餘煩熱乾渴頭痛牙疼失血等證其効如神若大便溏泄者大非所宜

生石膏三五錢　熟地三五錢或一兩　麥冬二錢　知母　牛膝

一錢五分　如火之盛極者再加梔子地骨皮之屬亦可　如多汗多渴者加五味子十四粒　如小水不利或火不能降者加澤瀉一錢五分或茯苓亦可　如金水俱虧因精損氣者加人參二三錢尤效

瀉黃散　治脾胃伏火口燥唇乾口瘡口臭煩渴易饑熱在肌肉口唇爲脾竅唇者脾之外候口燥故煩熱易饑痂名也乾口瘡口臭皆屬脾火脾熱輕按重按皆不熱不輕不重乃得之遇夜尤甚者爲陰弱熱實熱宜此湯及調胃承氣虛熱宜補中益氣湯。按面上熱身前熱一身盡熱狂妄言妄見皆足陽明有餘及足外廉胭踝後熱皆足太陽口熱舌乾中熱而喘足下熱而痛皆足少陰有上熱頂似拔耳前熱若寒皆手太陽身熱膚痛手少陰攣渐寒熱手太陰掌中熱手太陰少陰厥陰熱而筋縱不收陰痿足陽明厥陰又曰胃居臍上胃熱則臍以下熱肝膽居脇肝膽熱則脇亦熱肺居胸背肺熱則胸背亦熱腎居腰腎熱則腰亦熱可類推也

防風四兩　藿香七錢　山梔炒黑一兩　石膏五錢　甘草二兩　右末微炒香酒調服

山梔清心肺之火使屈曲下行從小便出藿香理脾肺之氣去上焦壅熱辟惡調中石膏大寒瀉熱兼能解肌甘草甘平和中又能瀉火重用防風者取其升浮能發脾中伏火又能於土中瀉木也木盛剋土防風能散肝火吳鶴皐曰或問既惡燥何以用防風不用黃連余曰燥矣乃風藥中潤劑也李東垣曰瀉脾中濕熱也實則瀉其子以脾爲生肺之主源故用石膏梔子之類

錢乙瀉黃散白芷防風升麻枳殼黃芩一錢半　石斛二錢　甘草七分　治同前證或唇口皴裂瘡爛火也白芷升脾之華在唇瞤動也風也皴裂火也白芷升麻皆陽明藥防風祛風而散脾火燥在口唇故從其性而升發之也黃芩瀉中上之熱枳殼利中上之氣半夏能燥能潤發表開鬱石斛清

脾平胃退熱補虛甘草和脾兼能泄火亦火鬱發之之義也

地黃煎　治積熱

地黃汁 四升 三合　茯神　知母　葳蕤 四兩　栝蔞根　生薑汁　鮮地骨皮　生麥冬汁　白蜜 二升

膏 八兩　竹瀝 三合

右㕮咀以水一斗零二升先煮諸藥取汁三升去查下竹瀝地黃麥冬汁緩火煎四五沸下蜜薑汁微火煎至六升初服四合日三服夜一服加至五七合四五月作散服之

成方切用 火 卷六 地黃煎 羌

按此方生津凉血制火徹熱兼擅其長再加人參乃治虛熱之聖方也

左金丸 又名茱連丸

治肝膽鬱火左脇作痛或胸脇痛不可忍吞酸吐酸筋疝痞結酒溼發黃肝火盛則脇痛吞酸吐酸亦由肝火上干肺胃從木之化故酸厥陰之脈絡陰器溼熱干之則成筋疝肝木過盛尅制脾土則成痞結亦治噤口痢湯藥入口卽吐加糯米一撮濃煎但得三四復吐矣

黃連 六兩 薑汁炒　吳茱萸 一兩 鹽水泡

肝實則作痛心者肝之子實則瀉其子故用黃連瀉心清火爲君使火不尅金金能制木則肝平矣吳茱辛熱能入厥陰肝行氣解鬱又能引熱下行故以爲反佐一寒一熱而平肝也東垣曰病機云諸嘔吐酸水者甚則酸水浸其心次令牙酸不能相對以大辛熱療之必滅若病機作熱攻之誤矣或問吞酸素問以爲熱東垣以爲寒何也丹溪曰吐酸與吞酸不同吐酸不可暫解非寒而何素問時津液隨上升之氣鬱而成積溼中生熱故隨吐出酸水如醋平人亦有熱有寒而有鬱之久伏於腸胃之間不得上不得下即表得風寒則內熱愈鬱而酸味刺心肌表溫煖勝理開發或得香熱湯丸汁液得行亦可暫解非寒而何素問言熱言其本也東垣言寒言其末也予嘗治吞酸用黃連吳茱製炒隨時令迭爲佐使蒼朮茯苓爲輔蒸餅爲丸吞之仍教攜食蔬菓自養則病易安。戴氏曰房勞腎虛不能納氣氣虛之人膈膜多有隱痛此因腎虛不能生血血虛之故氣與血猶水也盛則流暢虛則不能作痛宜破故紙之類補腎芎歸之類補血若作常肠痛治則殆矣

加炒蒼朮陳皮亦名茱連丸治同加芍藥等分爲丸名戊已丸治熱痢熱瀉已爲脾土加芍藥瀉肝瀉水使不尅脾土除吳茱萸加附子一兩名

連附六一湯治胃脘痛寒因熱用也用黃連一味吳茱萸浸一宿爲丸名抑青丸大瀉肝火治左脇作痛單黃連煎服名瀉心湯治心熱約陰丸　治婦人血海有熱經脈先期及過多者或兼腎火而帶濁不止及男婦大腸血熱便紅等證

當歸　白朮炒　白芍酒炒　生地　茯苓　地榆
黃芩　白石脂醋煅淬　北五味　丹皮　續斷
等分爲細末煉蜜丸服　火盛者加黃連　兼

肝腎之火盛者加知母黃檗各等分　大腸血熱便紅者加黃連防風各等分

導赤各半湯　治傷寒後心下不硬腹中不滿二便如常身無寒熱漸變神昏不語或睡中獨語目赤口乾不欲飲水與粥則嚥不與勿思形如醉人名越經證傷寒不鞕不滿二便如常病不在腑也神昏譫語不思食形如醉人此邪熱傳於手少陰心心火上炎逼肺也邪熱入裏故目赤舌乾邪熱在陰故不渴此證自足而傳手經故曰越經。

黃連　黃芩　犀角　知母　山梔　滑石
麥冬　人參　甘草　茯神　竹葉各等分

陳來章曰熱入心經涼之以黃連麥冬泄之以滑熱上逼於肺清之以黃芩知母寒從小腸膀胱出也故亦曰導赤然邪之越經而傳于心者以心神本不足也故又加人參茯神以補之。

消毒犀角飲　治大人小兒內蘊邪熱瘀涎壅甚腮項結核口吞生瘡及遍生瘡瘍已潰未潰並宜服之。

犀角磨冲　防風　荊芥穗一錢　鼠粘子炒二錢　炙甘草一錢

按此方顓清上焦蘊熱與利膈散略同彼可多服此可暫服爾。

蓮子清心飲局方　治憂思抑鬱發熱煩躁或酒色過度火盛尅金口苦咽乾漸成消渴遺精淋濁遇勞即發四肢倦怠五心煩熱夜靜晝甚及女人崩漏煩躁遺精淋濁者心虛而有熱也心火妄動不能下交于腎故元精失守也遇勞即發爲勞淋勞則動其心火也而逼肺也晝偏熱者陽虛也崩中由損傷衝任氣血俱虛經曰陰虛陽

搏謂之崩由陰虛而陽搏之血得熱而妄行也帶者病本於帶脈而得名赤屬血白屬氣由陰虛陽搏譬氣下陷或涇痰涇熱蘊積而下流也

心服

石蓮肉　人參　黃耆　茯苓　柴胡三錢　黃芩炒　地骨皮　麥冬　車前子　甘草炙二錢　空心服

參耆甘草所以補陽虛而瀉火東垣曰參耆甘草瀉火之聖藥助氣化而達州都膀胱也氣化則能出地骨退肝腎之虛熱柴胡散肝膽之火邪黃芩麥冬清熱於心肺上焦茯苓車前利溼於膀胱下部中以石蓮清心火而交心腎則諸證悉退也

服鑾煎　此方性味極清輕善入心肝二臟行滯氣開鬱結通神明養正除邪大有奇効

生地　麥冬　白芍　石菖蒲　石斛　丹皮　茯神二錢　陳皮一錢　木通　知母一錢五分　如痰勝多鬱者加貝母二錢　痰盛兼火者加膽星一錢五分　陽明火盛內熱狂叫者加石膏二三錢　便結脹滿多熱者加元明粉二三錢調服或漸加大黃亦可　氣虛神困者加人參隨宜無論脾胃大小腸膀胱等

普濟消毒飲　東垣　治大頭天行初覺憎寒體重次傳頭面腫盛口不能開上喘咽喉不利口渴舌燥俗云大頭天行親戚不相訪問染者多不救醫以寒氣加藍根下之稍緩翼日如故下之又緩終莫能愈漸至危篤東垣視之曰夫身半以上天之氣也身半以下地之氣也此邪熱客於心肺之間上攻頭而爲腫盛以承氣瀉胃中之實熱是爲誅伐無過病活甚衆遂名普濟消毒飲子全

黃芩　炒酒　黃連　五錢　炒酒　陳皮　白去　生甘草　元參　柴胡　桔梗　藍根　馬勃　鼠黏子

薄荷一錢　殭蠶　升麻　七分　爲末湯調時時服

之或蜜拌爲丸噙化一方無薄荷有人參三錢亦有加大黃治便祕者或酒浸或煨用

芩連苦寒瀉心肺之熱君元參苦寒橘紅苦辛甘草甘寒瀉火補氣爲臣連翹薄荷鼠黏辛苦而平藍根甘寒馬勃殭蠶苦平散腫消毒定喘爲佐升麻柴胡苦平行少陽陽明之陽氣不得伸桔梗辛溫爲舟楫不令下行爲載也此解本之東垣而稍加刪潤然十書中無此方見於準繩

約營煎　治血熱便血無論脾胃大小腸膀胱等

證皆可用
生地芍藥　續斷　地榆　黃芩　槐花
荊芥穗炒焦　烏梅一個　如火盛者加梔子黃連膽
星之屬　如氣虛者加人參白朮　如氣陷者
加升麻防風

紫雪方見　治內外煩熱不解狂易叫走發斑發黃
口瘡腳氣瘴毒蠱毒熱毒藥毒
黃金百兩　寒水石　石膏　滑石　磁石三劒水煮搗煎
去渣入後藥　升麻　元參一劒　甘草炙半劒　犀角　羚羊

角　沉香　木香五兩　丁香一兩　並搗剉入前藥
朴硝　硝石二劒搥淨入前藥汁中煎去渣入後藥
後味　辰砂三兩　住手將柳木攪候汁欲凝再加入
研細　麝香當門子一兩二錢研細
入前藥拌勻

合成退火氣冷水調服每一二錢

黃金

寒水石石膏滑石硝石以瀉諸經之火而兼利
水爲君磁石元參以滋肺腎爲臣犀角羚角以
清心寧肝升麻甘草以升陽解毒沉香丁香木
香以溫胃調氣麝香以透骨通竅丹砂黃金以

鎮驚安魂瀉心肝之熱爲佐使諸藥用氣味獨
用質者以其水鹵結成性峻而易消以瀉火而
散結也

碧雪　治一切積熱咽喉口舌生瘡心中煩躁嘔
物妨悶致咽閉壅塞及天行時熱發狂昏憒
芒硝　朴硝　硝石　馬牙硝　青黛　石膏
寒水石研水飛　甘草等分　犀角　羚羊
渣入諸藥再煎用柳木棍不住手攪令消溶得
所入青黛和勻傾入砂盆內候冷結凝成霜研

爲細末每用少許含化津嚥不拘時候如覺喉
壅閉塞不能吞物卽以小竹筒吹藥入喉中卽
愈

按此方倣紫雪之制而不用黃金犀羚等貴重
之藥亦爲簡便

人參清肌散　治午前潮熱氣虛無汗熱發午前
火乘之也火燥熱鬱故無汗身熱無汗陰氣有餘爲多汗無汗陽虛面陰
無汗而寒按此有餘乃病邪有餘爲病過中則皆病也經曰陽氣有餘爲
內寒皆充則爲實非真陰陽盛也陰陽和則無陰陽盛生外熱陰盛生

人參　白朮　茯苓　甘草炙半夏麴　當歸
赤芍藥　柴胡　乾葛　加薑棗煎
四君以補陽虛歸芍以調陰血半夏和胃而行
痰柴葛升陽而退熱蓋以甘溫瀉火除大熱辛
溫活血汗即血也辛甘解肌有汗宜實表無汗宜虛解肌此之無汗
與傷寒無汗不同故但解其肌熱而不必發出
其汗也
前藥各一兩加黃芩五錢每服三錢加薑棗煎
名人參散微許叔治邪熱客於經絡爽嗽煩熱頭
痛目疼益泪汗俗息一切血熱虛勞喻嘉言曰此邪熱淺在經絡
以達其邪之恐邪入臟腑雖用柴葛之輕至藉參朮之力痰隨入臟腑用茯苓半夏兼動其
痰合之當歸歸赤芍黃芩併治其血中之熱正用三錢為劑蓋方成知約庶敢用柴胡乾葛爾
白朮除溼湯東垣治午後發熱背惡風四肢沉困
小便色黃又治汗後發熱午後發熱熱在陰分腹為陰背惡寒者陽不得伸也脾主四肢四肢陽明沉困溼勝而脾不運也小便黃溼兼熱也汗後而熱不退或陰虛或陽虛也
人參　赤茯苓　甘草炙　柴胡五錢　白朮一兩　生地
黃　地骨皮　知母　澤瀉七錢　每服五錢如

有刺痛加當歸七錢小便利減苓瀉一半
陽陷陰中熱在血分故以生地滋其少陰而以
知母地骨瀉血中之伏火也柴胡升陽以解其
肌陽陷陰中故以柴胡提出其陽苓瀉利溼兼清其熱參朮甘
草益氣助脾氣足陽升虛熱自退脾運而溼亦
除矣方名除溼而治在退熱欲熱從溼中而下降也
石膏散外臺　治勞熱骨蒸四肢微瘦有汗脈長者
此指勞熱因陽邪入裏傳為骨蒸令人先寒後熱淅瀝成瘧瘦者有汗胃實也脈長陽明證也
石膏研細每夕新汲水服方寸七取熱退為度

石膏大寒質重能入裏降火味辛氣輕能透表
解肌雖寒而甘能緩脾火勞有實熱者非此不
為功故外臺祕要名醫錄皆載之玄珠曰五行六氣水特其
一爾一水既虧豈能勝五火哉醫不知邪氣未除便用補劑邪氣得補便入經絡至死不悟夫
涼劑能清火養水熱劑能補火燥水理易明也人脈勞為熱證明矣尚可補乎雖無熱無積之人脈微無力方可補之必察其胃中及右腎二火俱虛勞獨用熱藥者猶歐云治虛勞獨用冷藥者猶過用冷藥者猶釜中無水而進火也釜下無火而添水也非徒無益又害之
玉泉散亦名六一甘露散　治陽明內熱煩渴頭痛二便
祕結瘟疫斑黃及熱痰喘嗽等證

石膏六兩生用粉甘草一兩　爲細末每服一二三錢
新汲水或熱湯或人參湯調下或加硃砂三錢
此益元散之變方也其功倍之
清骨散　治骨蒸勞熱火炎水虧真陰消爍故肌
垣曰晝熱夜靜者是陽氣旺於陽分也晝靜夜
熱者是陽氣陷入陰中也名曰熱入血室晝夜
俱熱者是重陽無陰也當急瀉其陽
峻補其陰晝病則在氣夜病則在血
銀柴胡錢半　胡黃連　秦艽　鼈甲酥炙便　地骨皮
青蒿　知母一錢炙甘草五分

地骨胡連知母之苦寒能除陰分之熱而平之
於內柴胡秦艽青蒿之辛寒能除肝膽之熱而
散之於表鼈陰類而甲屬骨能引諸藥入骨而
補陰甘草甘平能和諸藥而退虛熱也
二母散　治肺勞有熱不能服補氣之劑者肺虛
或咳嗽發熱陰虛已甚再服補陽之藥則火益
九而陰愈虧故有雖病虛羸不能服溫補藥者

知母　貝母　等分炒爲末

火旺爛金肺虛勞熱能受溫補者易治不能受
溫補者難治故又設此法以滋陰用貝母化痰
瀉肺火知母滋腎清肺金取其苦寒勝熱潤能

去燥也
元參升麻湯　治發斑咽痛發斑者陽明胃熱也
咽痛者太陰肺火也
元參　升麻　甘草等分
升麻能入陽明升陽解毒元參能入太陰清金
制火甘草甘平能散能和故可利咽散斑也
除元參加犀角射干黃芩人參名陽毒升麻湯
治陽毒發斑頭項背痛狂躁罵詈咽腫吐血溫
服取汗
消斑青黛飲　卷　治傷寒熱邪傳裏裏實表虛陽

毒發斑血熱不散蒸於皮膚則爲斑形如錦紋
紫黑者熱極而胃爛也多死此或因陽證誤投熱藥或因下早表熱乘虛入胃或因下遲表熱
還熱而胃中皆發斑○有陰證發斑者元氣大
虛寒伏於下焦逼其無根失守之火上獨薰肺傳於皮膚淡紅而稀少也宜大建中湯誤投寒劑則殆矣

青黛　黃連　犀角　石膏　知母　元參
梔子　生地黃　柴胡　人參　甘草　加蘆
薑煎入苦酒醋也一盞和服
發斑雖由胃熱亦諸經之火有以助之青黛黃
連以清肝火梔子元參以清心肺之火知母生

地以清腎火屏角石膏以清胃火此皆大寒而能解鬱熱之毒者引以柴胡使達肌表（柴胡清少陽相火）使以薑棗以和營衛其用人參甘草者以和胃也胃虛故熱毒乘虛入裏而發於肌肉也加苦酒者其酸收之義乎

蒼耳散（無撰）　治鼻淵鼻流濁涕不止名鼻淵乃風滲爲涕又曰鼽鼻熱燥腦而液外滲也經曰腦移熱於腦則辛頞鼻淵頻卽山根辛頞痠痛也原病式曰如以火燥金熱極則反化爲水肝熱甚則出涙心熱甚則出汗脾熱甚則出涎腎熱甚則出嚏皆火熱盛極消爍以致之也

白芷一兩　薄荷　辛夷五錢　蒼耳子炒二錢半　爲末食前葱茶湯調下二錢

凡頭面之疾皆由清陽不升濁陰逆上所致白芷主手足陽明上行頭面通竅表汗除溼散風辛夷通九竅散風熱能助胃中清陽上行頭腦蒼耳疏風散溼上通腦頂外達皮膚薄荷泄肺疏肝清利頭目葱白升陽通氣茶清苦寒下行使清升濁降風熱散而腦液自寧矣

辛夷散（嚴氏）　治鼻生瘜肉氣息不通不聞香臭（鼻爲

肺竅氣清則鼻通氣熱則鼻塞溼熱甚盛蒸於肺門則生瘜肉猶溼地得熱而生芝菌也）

辛夷　白芷　升麻　藁本　防風　川芎　細辛　木通　甘草　等分爲末每服三錢茶調下（外用燒磚爲末加硇砂少許吹鼻中能消之）

經曰天氣通於鼻若胃中無痰火積熱則平時上升皆清氣也由溼火內焚風寒外束氣血壅滯故鼻生瘜肉而窒塞不通也辛夷升麻白芷辛溫輕浮能升胃中清氣上行頭腦防風藁本辛溫雄壯亦能上入巔頂滕溼祛風細辛散熱破結通精氣而利九竅芎藭補肝潤燥散諸鬱而助清陽此皆利竅升清散熱除溼之藥木通和中又以緩其辛散也（時珍曰肺開竅於鼻鼻爲陽明胃脈俠鼻上行腦爲元神之府鼻爲命門之竅人之中氣不足清陽不升則頭爲之傾九竅爲之不利）

玉屑無憂散（陳無擇）　治纏喉風痺咽喉腫痛咽物有碍或風涎壅滯口舌生瘡大人酒癥小兒孀癖及骨骾哽塞

元參　黃連　荊芥　貫衆　山茈根　茯苓

甘草　砂仁　滑石五錢　硼砂　寒水石三錢
爲末每一錢先抄入口徐以清水嚥下
元參黃連寒水石清火貫衆山荳根解毒滑石茯苓利水砂仁硼砂軟堅並能消骨哽。荊芥散結甘草和中故能統治諸病也丹溪曰咽痛必用荊芥虛火上炎必用玄參心又有氣血大虛虛火游行無制客於咽喉遂成咽痛脈必浮大重取必濡宏讀煎人參湯細細呷之如用清降之藥立斃。

腎熱湯千金　治腎熱耳流膿血不聞人聲耳爲腎竅舌爲心竅以舌非孔竅故心亦寄竅於耳十二經屯除足太陽手厥陰其餘十經皆入絡耳中腎治內之陰心治外之陽清淨精明之氣上走空竅而聽斯聰矣若二經不調陰陽不和或煩勞陰虛或衛氣不下循經脈或得於風邪或經臟積熱或大怒氣逆或藩飲痞隔或熱聚不散流出膿血或風熱搏結成核塞耳皆令暴聾穿通耳調氣安腎之劑。

慈石　煅紅淬七次　牡蠣鹽水煮煅粉　白朮炒五兩　麥冬一兩一錢　甘草一兩一錢　生地黃汁　葱白一升一大束十五枚
分三服
慈石體重辛鹹色黑補腎祛熱通耳明目故以爲君牡蠣鹹寒軟痰破結生地大寒瀉火滋腎麥冬甘寒補肺清金肺爲腎母又聲屬金王太僕曰肺虛則不能報息而耳聾不聽又曰耳得血而能聽。皆能生水而制火退熱而斂陰白朮甘草大棗補脾之品益土氣正以制腎邪也土能防水。經云頭痛耳鳴腸胃之所生也仲景曰耳聾無聞者陽氣虛也敷者皆固本之藥使精氣充足邪熱自退耳竅自通加葱白者以引腎氣上通於耳也

綠豆飲　凡熱毒勞熱請火熱極不能退者用此最妙
用綠豆不拘多寡寬湯煮糜爛入鹽少許或蜜香連丸直指　治脾胃兩經中濕火傳變大腸下痢赤白兼下者氣血俱病也後重通也按裏急後重有因火熱者因積滯者有因氣虛者有因血虛者當審證論治。赤白膿血相雜裏急後重濕熱之積。干於血分則赤干於氣分則白

黃連二十兩吳茱萸十兩同炒去茱萸用木香四兩八錢不見火醋糊丸米飲下一方等分蜜丸一方加甘草八兩黃連用蜜水拌蒸曬九次入木香爲丸

痢爲飲食不節寒暑所傷溼熱蒸鬱而成黃連苦燥溼寒勝熱直折心脾之火故以爲君用吳茱同炒者取其能利大腸壅氣且以殺大寒之性也裹急由於氣滯木香辛行氣溫和脾能通利三焦泄肺以平肝使木邪不尅脾土氣行而滯亦去也一寒一熱一陰一陽有相濟之玅經

所謂熱因寒用寒因熱用也云近日香連丸絕非舊法雜用消尅瀉下之藥人自爲政亦名香連殺人如麻眞可痛恨

加石蓮肉治噤口痢石蓮清心火開胃口加大黃治熱痢積滯大黃瀉胃熱蕩積滯加訶子龍骨名黃連丸宣明加吳茱萸肉豆蔻烏梅湯丸並治痢疾斷下烏梅龍骨肉豆蔻訶子皆澁大腸

雪梨漿　解煩熱退陰火

用清香甘美大梨削去皮用大碗盛清冷甘泉將梨薄切浸於水中少頃水必甘美但頻飲其水勿食其渣退陰火極速也

治胃火煩熱狂躁嘔吐等證可與白虎湯出入酌用

知母　石斛　木通一錢五分　石膏生用三錢　或加麥門冬

按人身熱病最多蓋素蘊之熱挾天時之熱而橫發爾是則胃氣清和遇暄熱而不覺其熱者乃爲平人迫至積熱既久然後治之已爲失箸況於藥不對病乎所以肥人之病多因血肉過盛而積飲食之熱瘦人之病多因津液素衰而生火炎之熱治肥人之熱慮虛其陽治瘦人之熱慮虛其陰未可執方妄施矣茲所錄以上諸方各宜自爲推廣也

卷九上
除痰門 正方三十一 附方二十一
荅桂朮甘湯 二陳湯 陳皮半夏湯 枯梗半夏半夏茯荅湯 茯荅導痰湯 二陳加梔連生薑湯 砂枳二陳湯 順氣導痰湯 加味二陳湯 溫中化痰丸 三聖丸 生薑半夏湯 橘皮湯 潤下丸 二賢散 順氣消食化痰湯 六安煎 和胃二陳煎 荅朮括痰丸 礞石滾痰丸 竹瀝達痰丸 清膈煎 茯荅丸 控涎丹 辰砂散 寧志膏 金水六君煎 金沸草散 半夏白朮天麻三子養親湯 常山飲 截瘧七寶飲 滌痰湯 星香散 牛黃丸 貝母丸 清肺飲 清氣化痰丸 蘇子降氣湯 定喘湯 七氣湯 三因七氣湯 四七湯 白金丸 百花膏 加味百花膏 六君子湯 見治氣門 六味地黃丸 見補養門 八味地黃丸 見補養門

上海圖書館藏

吳氏醫學述第四種

成方切用

武原吳儀洛遵程輯

門人周蘭九生庭
有榆蒼培同較
男
有杜雋望

除痰門

內經止有積飲之說並無痰證之名至仲景始立四飲之名而痰飲居其一。今後世相傳無論是痰非痰開口便言痰火。有云怪病之爲痰者。有云痰爲百病母者。不知痰之爲病。必有所以致之者。如因風因火而生痰者。但治其風火風火息而痰自清也。因虛因實而生痰者。但治其虛實虛實愈而痰自平也。未聞治其痰而風火可自散。虛實可自調者。此所以痰必因病而生非病之因痰而致也。治之之法全在詳辨虛實果其年力猶盛血氣未傷或以涇或以肥甘過度或以溫熱盛行或逆氣內連肝膈皆能驟致痰飲但察其形氣病氣多屬有餘者即實痰也此則不可也。如其形羸氣弱年及中衰或以多病或以勞倦或以憂思無不皆虛痰也。此則宜行消伐但去其痰而已。若過於攻擊或脈見細數藏府卒厥者或風邪已致成勞損非風亦無陽邪時爲嘔漾泄瀉氣短聲喑等證但察其形氣病氣不非有餘者皆虛痰也此則但宜調補若或攻之無不危矣。揆之治痰之法但能使元氣日強則痰自不能爲害而且充助胃氣若元氣日衰則雖水穀津液無非痰爾隨去隨生有能攻之使盡而且保元氣無恙者乎故善治痰者惟能使之不生方是補天之手苟不辨其虛實而欲一槩攻之如王隱君所論內外百病皆生於痰悉用滾痰丸之類其亦但知目前而不

知日後之患哉。諸家治痰之法多有治其標者雖。不可廢也。亦不可廢也。詳列如左。

苓桂朮甘湯 金匱　治心下有痰飲胸脇支滿目眩

茯苓四兩　桂枝三兩　白朮三兩　甘草二兩

痰飲陰氣阻抑其陽用此陽藥化氣以伸其陽此正法也茲所主乃在胸脇支滿目眩者何耶靈樞謂心包之脈是動則病胸脇支滿然則痰飲積於心包其病自必若此目眩者痰飲阻其胸中之陽不能布水精於上也茯苓治痰飲伐腎邪通水道桂枝通陽氣和營衛開經絡白朮甘草得茯苓則成方切用　卷九十三　苓桂朮甘湯　二

治風眩燥痰水除脹滿準繩云蕨之本由於脾不治痰而治水者不知痰飲當從小便去之苓桂朮甘湯主之。嘉言曰。予辨息論中已詳仲景分別呼吸言病之旨矣。今短氣亦分呼吸各出一方。呼氣之短用苓桂朮甘湯以通其陽陽氣化則小便能出矣。吸氣之短用腎氣丸以通其陰腎氣通則小便之關門利矣。

二陳湯 局方　陳皮半斤　夏製其性故名二陳。　治一切痰飲

則少燥散之半夏溫燥半夏濕潤各異。脫或悞施。

爲病咳嗽脹滿嘔吐惡心頭眩心悸稠者爲痰稀者爲飲水經其本也得火則結爲痰隨氣升降在肺則咳在胃則嘔在頭則眩在心則悸在背則冷在

脇則脹中脘有痰令人憎寒壯熱頭痛類外感表證久則潮咳夜重又類陰火內傷走注脹痛又類風證但肌色如故脈滑不勻爲異。

半夏薑製二錢　陳皮去白　茯苓一錢　甘草五分　加薑煎薑能

製半夏之毒。　治痰通用二陳風痰加石膏青黛溼痰加竹瀝寒痰加半夏薑汁火痰加石膏青黛溼痰加蒼朮白朮燥痰加栝蔞杏仁食痰加山查麥芽神麴老痰加枳實海石苡礎氣痰加香附枳殼脇痰及在皮裏膜外加白芥子四肢痰加竹瀝

殆有頭風劄痙骨痛投以風藥不効投以痰藥見功又有眼赤羞明與之涼藥不瘳鼻以痰劑養愈有人坐處吐痰滿地不甚稠黏只是沫多此氣虛不能攝津不可用利藥宜六君子加益智仁一錢以攝之

去茯苓甘草名陳皮半夏湯再加桔梗名桔梗半夏湯治熱痰加黃連梔子生薑名二陳加梔連生薑湯治膈上熱痰令人嘔吐去生薑嘈雜加砂仁枳殼名砂枳二陳湯行痰利氣加膽星枳實名導痰湯治頑痰膠固非

二陳所能除者加膽星以助半夏加枳實以成四肢肩背痠痛手足罷軟悞以爲風則非其治宜導痰湯加木香片子薑黃衝牆倒壁之功有痰飲流入蒲治驚悸健忘怔忡不寐導痰湯加木香香附名順氣導痰湯治痰結胸滿痞逆上氣加枳實栝蔞枳實山查神麴治食積痰嗽發熱加蒼朮枳殼片子薑黃名加味二陳湯仁齋治痰攻眼腫併酒家手臂重痛痲木除甘草加乾薑薑汁糊丸名溫中化痰丸寶鑑治胸膈寒痰不快除茯苓甘草加黃連麵糊丸薑湯下名三聖丸治痰火

嘈雜心懸如饑單用陳皮生薑名橘皮湯金匱治乾嘔噦及手足厥者單用半夏薑汁名生薑半夏湯金匱治似喘不喘似嗽不嗽心中憒憒然無奈者

潤下丸　治膈中痰飲

廣陳皮去白八兩鹽水洗漫甘草二兩蜜炙　蒸餅糊丸或將陳皮鹽水煮爛曬乾同甘草爲末名二賢散薑湯下瀉滕加星夏火盛加枳連則痰消氣順則痰下食

鹽潤下而軟堅潤下則痰降軟堅則痰化痰在膈中故用甘草引之入胃甘草經蜜炙能健脾調胃脾胃健則痰自行矣

治酒食生痰胸膈脹悶

五更咳嗽過飲則脾濕過食辛熱油膩之物皆能生痰痰壅於胸膈故滿悶五更咳嗽由胃有積熱至此時火氣流入肺中故嗽

半夏薑製膽星一錢製　青皮　陳皮去白　萊菔子生用　蘇子

沉水者　山查　麥芽　神麴　葛根　杏仁去皮尖

香附製一兩　薑汁和蒸餅糊丸一方半夏南星白礬皂角生薑

等分同煮至南星無黑爲
度去皂角薑切同曬乾用
爽由溼生半夏南星所以燥溼爽由氣升蘇子
菔子杏仁所以降氣爽由氣滯青皮陳皮香附
所以導滯爽因於酒食葛根神麯所以解酒山
查麥芽所以化食溼去食消則爽不生氣順則
咳嗽止痰滯既去滿悶自除也
金水六君煎　治肺腎虛寒水泛爲痰或年邁陰
虛血氣不足外受風寒咳嗽嘔惡多痰喘急等
證神効劾劑　此六君子湯之變方也

當歸二三錢　熟地三五錢　陳皮一錢半　半夏二錢　茯苓二錢
炙草一錢　加生薑三五七片　如大便不實而
多溼者去當歸加山藥　如痰盛氣滯胸膈不
快者加白芥子七分　如陰寒盛而嗽不愈者
加細辛五七分　如兼表邪寒熱者加柴胡一
二錢
金沸草散　活人　治肺經傷風頭目昏痛咳嗽多痰
風盛則氣壅氣壅則痰升故頭目昏痛而咳嗽
血脂方云咳嗽感風者鼻塞聲重傷冷者慢清
快寒挾熱爲焦煩受溼爲纏滯挾血則膈閉腥
悶停水則心下怔忪三因方云一婦牙疼治療

不效口頰皆腫以金沸草
散大劑煎湯薰漱而愈
旋覆花即金沸草　前胡　細辛　半夏五分　甘草炙三分　加薑棗煎局方加麻黃赤
芍無赤茯細辛如滿悶加枳殼桔梗有熱加柴
胡黃芩頭痛加川芎
風熱上壅荊芥輕辛發汗而散風痰涎內結前
胡旋覆消痰而降氣半夏燥痰而散逆甘草發
散而緩中茯苓行水細辛溫經蓋痰必挾火而
兼溼故下氣利溼而證自平茯苓用赤者入血

半夏白朮天麻湯　東垣　治脾胃內傷眼黑頭眩頭
痛如裂身重如山惡心煩悶四肢厥冷謂之足
太陰痰厥頭痛痰厥者溼痰厥逆而生也痰逆
則上實故令頭痛目眩眼前見黑色也東垣曰太陰頭痛必有痰也少陰頭
痛足寒而氣逆也太陰少陰二經雖不上循頭
然痰與氣逆壅於膈中頭上氣不得暢而爲痛也
分而瀉丙丁也
半夏薑製　麥芽　錢半　神麯炒　白朮炒　錢一　蒼朮泔浸　人參
黃耆蜜炙　陳皮　茯苓　澤瀉　天麻　五分　乾薑
三分　黃檗二分酒洗　每服五錢

痰厥頭痛非半夏不能除半夏燥痰而能和胃頭旋眼黑虛風內作非天麻不能定黃耆人參甘溫可以補中亦可以瀉火二朮甘苦而溫可以除痰亦可以益氣去溼故除痰健脾故益氣茶澤瀉熱導水陳皮調氣升陽神麴消食蕩胃中滯氣麥芽化結助戊已運行胃爲戊土脾爲已土乾薑辛熱以滌中寒黃檗苦寒以療少火在泉發躁也東垣曰夫風從上受之風寒傷上邪從外入令人頭痛身重惡寒此傷寒頭痛也頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛者過在手太陽少陰乃溼熱頭痛也如氣上不下頭痛巔疾者下虛上實也過在足太陽

少陰甚則入腎寒溼頭痛也如頭半寒痛者先取手少陽陽明次取足少陽陽明此偏頭痛也有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓髓者以腦爲主腦逆故令頭痛齒亦痛有眞頭痛者甚則腦盡痛手足寒至節死不治頭痛每以風藥治之者以高巔之上唯風可到味之薄者陰中之陽乃自地升天者也太陽頭痛惡風寒脈浮緊川芎羌活獨活麻黃之類爲主少陽頭痛脈弦細往來寒熱柴胡蘇葉熱惡寒脈浮緩長實者升麻葛根白芷石膏爲主太陰頭痛必有痰濕其脈沉緩蒼朮半夏南星爲主少陰頭痛三陰三陽經不流行而足寒氣逆爲寒厥其脈沉細麻黃附子細辛湯主之厥陰頭項痛或吐涎沫厥冷脈浮緩吳茱萸湯主之血虛頭痛當歸川芎爲主氣虛頭痛人參黃耆爲主氣血俱虛頭痛調中益氣湯少加川芎蔓荊子細辛清空膏風溼頭痛藥也白朮半夏天麻湯痰厥頭痛藥也羌

活附子湯厥逆頭痛藥也如溼氣在頭者因苦吐之不可執方而治按以苦吐茶之類是也或搐去鼻中黃水亦治溼氣在頭之捷法

六安煎　治風寒咳嗽痰滯氣逆

陳皮一錢五分　半夏二三錢　茯苓二錢　甘草一錢　杏仁一錢　白芥子五七分年老氣弱者不用　加生薑三五七片　凡外感風邪咳嗽而寒氣盛者多不易散宜加北細辛七八分或一錢　若冬月寒邪盛者加麻黃桂枝亦可　若風勝而邪不盛者加防風一錢或蘇葉亦可　若頭痛鼻塞者加川芎白芷蔓荊子皆可　若兼寒熱者加柴胡蘇葉　若風寒邪咳嗽痰不利者加當歸二三錢老年者尤宜　若氣血不足者當以金水六君煎俱此參用　凡時行初感痰勝而氣不順者加藿香一錢五分兼脹滿者加厚朴一錢暫開痰氣然後察其寒熱虛實而調補之若氣虛猝倒及氣平無痰者皆不可用此

去杏仁白芥子加炒乾薑一二錢砂仁四分名和胃二陳煎治胃寒生痰惡心嘔吐滿悶噯氣去杏仁白芥子加豬苓澤瀉茯苓一錢五分白朮一二錢乾薑炒黃二錢名苓朮二陳煎治痰飲水氣停蓄心下嘔吐吞酸等證如肝腎兼寒者再加肉桂一二錢去杏仁加乾薑豬苓爲末湯浸蒸餅爲丸綠豆大白滾湯下名括痰丸治一切停痰積飲吞酸嘔酸脹悶如胸脇疼痛者加天台烏藥

礞石滾痰丸　王隱君

治實痰老痰怪證百病風木太過木鬱土衰脾胃不運化積滯生痰痰壅塞中上二焦致頭目昏眩或痰在胸膈或痰在肢體或痰在皮裏膜外或痰挾風邪或痰挾食積或痰挾鬱火或痰挾氣逆或痰挾瘀血或痰挾寒濕或痰挾虛熱或痰挾氣虛或痰挾血虛或痰挾陰虛或痰挾陽虛或痰挾濕熱或痰挾燥熱或痰挾風熱或痰挾寒熱或痰挾驚悸或痰挾怔忡或痰挾健忘或痰挾恐懼或痰挾喜笑或痰挾悲哀或痰挾思慮或痰挾煩惱或痰挾憂愁或痰挾疼痛或痰挾麻木或痰挾瘙癢或痰挾眩暈或痰挾昏迷或痰挾癲狂或痰挾痴呆或痰挾喘急或痰挾咳嗽或痰挾吐衄或痰挾下血或痰挾便秘或痰挾泄瀉或痰挾小便淋漓或痰挾小便不通或痰挾大便不通或痰挾水腫或痰挾氣脹或痰挾黃疸或痰挾瘧疾或痰挾痢疾或痰挾疝氣或痰挾遺精或痰挾白濁或痰挾帶下或痰挾崩漏或痰挾胎前或痰挾產後或痰挾乳病或痰挾瘡瘍或痰挾癰疽或痰挾結核或痰挾痰核或痰挾瘰癧或痰挾痞塊或痰挾積聚或痰挾癥瘕或痰挾蟲積或痰挾食積或痰挾酒積或痰挾氣積或痰挾血積或痰挾痰積或痰挾水積或痰挾寒積或痰挾熱積或痰挾濕積或痰挾燥積或痰挾風積或痰挾虛積或痰挾實積或痰挾陰積或痰挾陽積或痰挾表證或痰挾裏證或痰挾半表半裏證或痰挾上焦證或痰挾中焦證或痰挾下焦證或痰挾三焦證或痰挾五臟證或痰挾六腑證或痰挾奇經證或痰挾八脈證或痰挾十二經證或痰挾全身證或痰挾局部證或痰挾內證或痰挾外證或痰挾內外證或痰挾上下證或痰挾左右證或痰挾前後證或痰挾表裏證或痰挾寒熱證或痰挾虛實證或痰挾陰陽證或痰挾氣血證或痰挾臟腑證或痰挾經絡證或痰挾筋骨證或痰挾皮肉證或痰挾毛髮證或痰挾爪甲證或痰挾口舌證或痰挾咽喉證或痰挾耳目證或痰挾鼻證或痰挾齒牙證或痰挾舌證或痰挾唇證或痰挾口瘡證或痰挾咽痛證或痰挾喉痹證或痰挾口糜證或痰挾口瘡證或痰挾舌瘡證或痰挾唇瘡證或痰挾齒痛證或痰挾牙痛證或痰挾耳痛證或痰挾目痛證或痰挾鼻痛證或痰挾頭痛證或痰挾面痛證或痰挾頸痛證或痰挾胸痛證或痰挾脇痛證或痰挾腹痛證或痰挾腰痛證或痰挾背痛證或痰挾臂痛證或痰挾手痛證或痰挾腿痛證或痰挾足痛證或痰挾關節痛證或痰挾筋骨痛證或痰挾肌肉痛證或痰挾皮膚痛證或痰挾毛髮痛證或痰挾爪甲痛證或痰挾口舌痛證或痰挾咽喉痛證或痰挾耳目痛證或痰挾鼻痛證或痰挾齒牙痛證或痰挾舌痛證或痰挾唇痛證或痰挾口瘡痛證或痰挾舌瘡痛證或痰挾唇瘡痛

清膈煎　治痰因火動氣壅喘滿內熱煩渴等證

陳皮一錢五分　貝母二三錢敲碎　膽星一二錢　海石　木通二錢七分　如火盛痰不降者加童便一

如痰火上壅而小水不利者加澤瀉一二錢

如痰火閉結大便不通而兼脹滿者加大黃數錢或朴硝一二錢酌宜用

茯苓丸　指迷方

治痰停中脘兩臂疼痛脾主四肢。脾滯而氣不行攻臂。是也。

茯苓一兩　枳殼五錢麩炒　風化硝二錢半　如一時未易成。但以朴硝撒竹盤中。少時。盛水置。當風處。即乾。如芒硝刮取。亦可用。　薑汁

不下。故上行攻臂。其腦沉細者是也。

半夏麴二兩　茯苓一兩　乳拌麩炒　風化硝如一時

半夏燥溼茯苓滲水枳殼行氣化硝軟堅去堅痰。

生薑制半夏之毒而除痰使痰行氣通臂痛自止矣　四肢。嘉言曰。痰藥雖多。此方甚效。令人肩背痠痛。兩手罷軟。誤以爲風。則非其治。宜導痰湯加木香薑黃各五分。輕者指迷茯苓丸。重者控涎丹。若血虛不能榮筋而致臂痛。宜獨痺四物湯各半帖和服。

控涎丹　一名妙應丸。三因方　治人忽患胸背手足腰項筋骨牽引釣痛。走易不定。或手足冷痺。氣脈不通。此乃痰涎在胸膈上下。誤認癱瘓非也

甘遂去心　大戟去皮　白芥子　等分爲末。糊丸。臨臥加丸數。腳氣加檳榔木瓜。松枝卷柏。鷰痰加硃砂全蠍。鷰氣成塊加穿山甲。鼈甲。延胡索。蓬朮。熱痰加盆硝。寒痰加胡椒丁香。薑桂

李時珍曰。痰涎爲物。隨氣升降。無處不到。入心則迷。成癲癎。入肺則塞竅。爲喘咳。背冷。入肝則膈痛乾嘔。寒熱往來。入經絡則痲痺。疼痛。入筋骨則牽引釣痛。入皮肉則瘰癧癰腫。陳無擇三因方。並以控涎丹主之。殊有奇功。此乃治痰之本。痰之本。水也。溼也。得氣與火。則結爲痰。大戟能泄臟腑水溼。甘遂能行經隧水溼。直達水氣所結之處。以攻決爲用。白芥子能散皮裏膜外痰氣。唯善用者。能收奇功也　虛弱人慎用。丹溪曰。胃氣亦。痰也。養不可盡。攻。攻盡則虛。而愈劇。

辰砂散靈苑　治風痰諸癎癲狂心疾諸癎因驚恐心痰塞心竅發時卒倒搐掣叫吼吐涎食頃乃醒身熱脈浮在表者陽癎屬六腑易治身冷脈沉在裏者陰癎屬五臟難治其實痰火與驚而已癲狂亦由於此

辰砂一兩光明者　乳香一兩光瑩者　棗仁五錢炒　溫酒調下治同

浴飲沉醉聽睡一二日勿動若驚寤不可復治

辰砂鎮心湯心火乳香入心散瘀血棗仁補肝

加人參一兩

丸薄荷湯下

雨蜜丸彈丸大名寧志膏本事每服一

成方切用　卷九　痰　常山飲　三十六　養親陽　西

三子養親湯韓忠　治老人氣實痰盛喘滿懶食痰不自動因火而動氣有餘便是火氣盛上壅故喘痰火寒胸故懶食

紫蘇子　沉水者　白芥子　萊菔子　各微炒研煎服或等分或看病所主爲君

白芥子除痰紫蘇子降氣萊菔子消食然皆行氣豁痰之藥氣行則火降而痰消矣吳鶴皐曰治痰先理氣此治標爾終不若二陳能健脾去濕有治本之功也李士材曰治病先攻其甚若氣實而喘痰火未盡而氣虛者非所宜矣是在智者神而明之

常山飲局方　常山二錢燒酒炒　草菓燥檳榔　知母　貝母一錢　烏梅二箇　薑三片棗二枚半酒半水煎露一宿日未出時面東空心溫服渣用酒浸煎待瘧將發時先服一方有良薑甘草無檳榔一方加穿山甲甘草

古云無痰不作瘧常山引吐行水祛老痰積飲檳榔下氣破積能消食行痰陰陽不和則瘧作陽勝則熱陰勝則寒知母滋陰能治陽明獨勝之火草菓

成方切用　卷九　痰　常山飲　三十七　養親陽　西

辛熱能治太陰獨勝之寒貝母清火散結瀉熱除痰烏梅酸斂濇收生津退熱斂陰故熱草菓常山瘧集以成瘧之劑也趙以德曰常究本草菓知母草菓常山方者爲知母性寒入足陽明治獨勝之熱使退就太陰草菓溫燥治足太陰獨勝之寒使退就陽明二經和則無陰陽交錯之變是爲君藥常山主寒熱瘧吐胸中痰結是爲臣藥檳榔除痰癖破滯氣是爲佐藥烏梅酒穿山甲穿山而入陰陽貫穿經絡於營分遇水而入則是出入陰陽貫穿經絡於營分以破暑結之邪爲使藥也惟脾胃有鬱痰者用之收效李士材曰常山生用多用則吐與甘草同用亦必吐若酒浸炒透但用錢許每見奇功未見其或吐也世人泥於老人久病忌服之說使良藥見疑沉疴難起抑何愚耶李時珍曰常山蜀漆劫痰截瘧須在發散表邪及提出陽分

之。後用之。得宜。得甘草則吐。得大黃則利。得烏梅穿山甲則入肝。得小麥竹葉則入心。得秫米麻黃則入肺。得龍骨附子則入腎。得草蔻檳榔則入脾。蓋無痰不作瘧。一物之功。亦在驅逐痰水而已。

截瘧七寶飲　簡易

治實瘧久發不止。寸口脈弦滑浮大者。脈弦爲肝風。滑爲痰。浮爲在表。大爲陽。若脈沉細微濇者禁用。不問鬼瘧食瘧並皆治之。

常山（酒炒）　草菓（煨）　檳榔　青皮　厚朴　陳皮　甘草　等分。用酒水各一鍾煎熟。絲綿蓋之。露一宿。於當發之早面東溫服。經曰。工不治其已發。爲其氣逆也。

凡瘧將來。可服藥阻其來。將去。可服藥追其去。若瘧勢正盛。服藥與之混戰。徒自苦爾。但瘧之來去既遠。藥不相及。五不當一。故服藥莫妙在將來將去之時。

常山能吐老痰。積飲檳榔能下食積痰結。草菓能消太陰膏粱之痰。陳皮利氣。厚朴平胃。青皮伐肝（瘧爲肝邪）。皆爲溫散行痰之品。加甘草入胃。佐常山以吐瘧痰也。

玉機微義曰。此方乃溫脾燥烈之藥。蓋作脾寒治也。用之亦效者。值病人陰陽相拌。脾氣鬱結。濁液凝痰閉塞中脘。因得燥熱。亦以暫開。所以氣通而疾止。若中氣虛弱。內有鬱火之人。復用燥熱。愈劫愈爍。各將誰執。楊仁齋曰。瘧有水有血。惟水飲所以作寒熱。惟痰血所以增寒熱。常山能逐水痰。當加桃仁。五靈脂爲佐。入生薑同煎。苟無行血之品。何以收十全之功耶。瘧夜發者。乃邪氣深遠。而入血分爲崇。命集云。瘧夜發者。乃邪氣深入肝。得小麥竹葉則入心。得秫米麻黃則入肺。得龍骨附子則入腎。得草菓檳榔則入脾。蓋無痰不作瘧。一物之功。亦在驅逐痰水而已。

滌痰湯　嚴氏

治中風痰迷心竅。舌強不能言。心在竅爲舌。心別脈繫舌根。脾脈連舌本。散舌下。腎脈挾舌本。三脈虛。則痰涎乘虛。閉其脈道。故舌不能轉運言語也。若三脈亢血。不能榮養而痺者。又當加補血藥。風痰壅塞其經絡。舌強不能言。其證爲重。若壅熱上攻。舌腫不能轉者。其證爲輕。

半夏（薑製）　膽星　各二錢　橘紅　枳實　茯苓　各二錢　人參　菖蒲　各一錢　竹茹　甘草　各七分　加薑煎。

心脾不足。風邪乘之。而痰與火。塞其經絡。故舌

木強而難語也。人參茯苓甘草補心益脾而瀉火。陳皮南星半夏利氣燥溼而祛痰。菖蒲開竅通心。枳實破痰利膈。竹茹清燥開鬱。使痰火降則經通而舌柔矣。（喻嘉言曰。此證最急。此藥最緩。有兩不相當之勢。審其屬實。用此湯調下牛黃丸。審其屬虛。用此湯調下二丹丸。庶足開痰通竅。二丹丸見祛風門。）有風中心脾者。有痰塞心竅者。有風寒壅滯者。致舌木木強。又有氣虛血虛腎虛。及老人暴不能言。其

星香散　治中風痰盛體肥不渴者

膽星　八錢　木香　二錢　爲末。服或加全蠍

南星燥痰之品製以牛膽以殺其毒且膽有益肝膽之功（肝膽之經屬風木）佐以木香取其行氣以利痰也（木香能疏肝氣和脾氣）肥而不潟宏燥可知加全蠍者以散肝風也（中風體虛有痰者宜六君子或四君子湯調下此散）

牛黃丸　治風痛迷悶涎潮抽掣（風癇或感風寒暑溼或飲食不節逆於膓氣鬱而生涎閉塞諸經厥而乃成或數日一發或一日數發發則脫仆倒地昏不知人瘈瘲抽掣口目喎斜或隨臟氣作六畜之聲）

全蠍（去足焙）二錢　白附子　天麻　羌活　防風　各五分　牛黃　麝香　各五分　煮棗肉和水

銀五分細研入藥末爲丸朱爲衣辛散之味殭蠶蟬蛻清化之品白附頭面之藥牛黃清心解熱開竅利痰天麻防風南星全蠍去頭面搜風皆能搜肝風而散痰結麝香通竅水銀劫痰引以茸芹者亦以逐風而行痰也（按牛黃丸之方頗多互有異同然大要在於搜風化痰寧心通竅多用水麝牛膽全蠍中藏珠屑泊若中藏者宜之如中血脈者反能引風入骨此方藥味頗簡故錄之以爲其餘也）

貝母丸　消痰熱潤肺止嗽或肺癰肺瘻乃治標之妙劑

貝母（一兩）　爲末用砂糖或蜜和丸龍眼大或噙化或嚼服之若欲劫止久嗽每貝母一兩宜加百藥煎蓬砂天竺黃各一錢五分尤妙如無百藥煎即醋炒文蛤一錢亦可或粟殼亦可酌用若治肺癰宜加白蘞一錢同貝母丸服如前法最妙

清肺飲　治痰溼氣逆而咳嗽（肺受火傷則氣逆而爲咳脾有停溼則生痰而作嗽病有五臟六腑之殊而其要皆歸於肺以肺爲五臟華蓋下通膀胱外達皮毛者肺也皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪氣以從其合也五臟俱令人欬何也曰五臟六腑俱虛飲食不進宜補久嗽曾經解利以致肺胃俱虛飲食不進宜溫中助胃兼治嗽藥。素問曰肺之令人欬非獨肺也皮毛先受邪氣以從其合也五臟六腑俱令人欬非獨肺也皮毛者肺之合

食積痰加香附山查枳實瀉痰除貝母加半夏南星燥痰加栝蔞知母天冬午前嗽屬胃火宜清胃加石膏黃連午後嗽屬陰虛宜滋陰降火加苓歸芍地知檗二冬竹瀝薑汁傳送黃昏嗽爲火浮於肺不可用涼藥宜五倍五味訶子斂而降之勞嗽見血多是肺受熱邪宜加歸芍阿膠天冬知母款冬紫菀之類久嗽肺虛加參耆如肺熱用沙參

此治嗽之通劑也杏仁解肌散寒降氣潤燥貝母清火散結潤肺化痰五味斂肺而寧嗽茯苓除溼而理脾橘紅行氣甘草和中桔梗清肺利膈載藥上浮而又能開壅發表也

清氣化痰丸　治熱痰（痰者必降其火治火者必順其氣也）

半夏薑製膽星（兩半）橘紅（去白）仁（去油）黃芩（酒炒）茯苓（各一兩）枳實（麩炒）杏仁（去皮尖）栝蔞（薑汁糊）九淡薑湯下。

此治痰火之通劑也半夏南星以燥溼氣黃芩栝蔞以平熱氣陳皮以順裏氣杏仁以降逆氣枳實以破積氣茯苓以行水氣水溼火熱皆生痰之本也氣之亢而爲火猶民之反而爲盜盜平則還爲良民而復其業矣火退則還爲正氣而安其位矣故化痰必以清氣爲先也

蘇子降氣湯（局方）　治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛喘嗽嘔血或大便不利（肺爲氣主火升尅肺故有氣痛便祕用通劑而愈不通故暫通復祕因而下血者亦當順氣氣順則自通當求溫緩之劑。）

蘇子　半夏　前胡　厚朴（薑炒）　橘紅　當歸（一錢）

甘草（炙）　肉桂（五分）　加薑煎一方無桂有沉香

蘇子前胡厚朴橘紅半夏皆能降逆上之氣兼能除痰氣行則痰行也數藥亦能發表既以疏內壅又以散外寒也（風痰壅盛多挾外感）當歸潤以和血甘草甘以緩中下虛上盛故又用官桂引火歸元也（玉機微義曰此散鬱和中之劑準繩曰口鼻出血皆由上盛下虛有升無降血隨氣升法當先順其氣氣降則血歸經矣宜蘇子降氣湯加人參阿膠各一錢下養正丹多發表破氣動血之藥養正丹全石烹煉而成皆偶用治標之劑未可以爲定訓也）

定喘湯　治肺虛感寒氣逆腸熱而作喘（腸有膠固

之痰外有非時之感則令人哮喘由寒束於表陽氣併於腑中不得泄越故腑熱氣迫聲粗爲哮喘外感之前餘也氣促爲喘虛而不足也

白菓三十枚炒黃去殼　麻黃蘇炙二錢　桑白皮蜜炙二錢　杏仁去皮尖二錢　黃芩半錢　甘草一錢　半夏三錢　加薑煎

表寒宏散麻黃杏仁桑皮甘草辛甘發散瀉肺而解表裏熱宏清炙冬溫潤白菓收斂善化濁痰定喘而清金蘇子降肺氣黃芩清肺熱半夏燥溼以共成散寒疏壅之功也

治七情氣鬱痰涎結聚咯不出嚥不下胸滿喘急或咳或喘或攻衝作痛七情者喜怒憂思悲恐驚也七情之病令人氣結痰聚陰陽不得升降故有痞滿喘咳衝攻等證

七氣湯三因方亦名四七湯　半夏洗七次薑汁炒　厚朴薑汁炒二錢　茯苓四錢　紫蘇二錢　加薑煎

厚朴苦溫降氣散滿紫蘇辛溫散鬱必以行氣化痰爲先半夏茯苓甘淡滲溼益脾通心氣鬱則痰聚故散鬱解而諸證平矣

寬中暢肺定喘消痰茯苓甘淡滲溼益脾通心氣行則結散鬱解而諸證平矣

交腎痰去氣行則結散鬱解而諸證平矣

加白芍陳皮人參桂心亦名七氣湯三治七情

出嚥不下胸滿喘急或咳或喘或攻衝作痛七情者喜怒憂思悲恐驚也七情之病令人氣結痰聚

參以壯主氣之臟肺　官桂以制謀慮之官肝者將軍之官謀慮出焉桂能平肝鬱久生痰半夏爲之驅逐鬱故不和國老爲之調停況桂性辛溫疏氣甚提鬱結者還爲和暢矣湯名四七者以四味治七情也

白金丸　治癲狂失心癲多喜笑狂多忿怒不足狂多忿怒皆屬有餘此病多因驚憂痰血塞於心竅所致難經云諸陽爲狂諸陰爲癲

白礬三兩鬱金七兩　薄荷糊丸

白礬酸鹹能軟頑痰鬱金苦辛能去惡血痰血

去則心竅開而疾已矣

百花膏　治喘嗽不已或痰中有血虛人尤宜

百合　款冬花　等分蜜丸龍眼大臨臥薑湯下或噙化加紫苑百部烏梅名加味百花膏

款冬瀉熱下氣清血除痰百合潤肺寧心補中益氣並爲理嗽要藥

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷九下

殺蟲門　正方一十

烏梅丸　溫臟丸　集効丸　蠟蟲丸　使君子丸　獺肝丸　掃蟲煎　化蟲丸　雄檳丸　消渴殺蟲方

吳氏醫學述第四種

武原吳儀洛遵程輯

門人周蘭九生庭
男　有榆耆培同較
有杜雋望

成方切用

殺蟲門

風字從虫，蟲風化也。溼熱鬱久則生蟲，鷹草爲螢，陳麥爲蛾之類，菓實外殼完整，蟲生於內，人之腸胃無物不受，豈得無蟲三尸九蟲，理或有之，其猖狂於腸胃爲嘯爲噦，爲噯爲嗜，種種煩苦，須伏殺蟲之方，每多險峻，今人腸胃脆薄，須兼養胃，故併主久利見陰陽不相順接而下利之證，皆可以此方掐之也。經曰：凡陰陽不相順接，便爲厥，方時行曰：霍亂云，手之三陰從手走頭，足之三陽從頭走足，是三陰三陽俱相接於手足者也。陽氣內陷，不與陰氣相順接，故手足逆冷，不知安用雷丸使君之類反致傷氣血而疾作矣。

烏梅丸　仲景

治傷寒厥陰諸寒厥吐蚘傷寒臟厥者脈微而厥至七八日膚冷發躁氣喜暫安時也蚘厥者蚘上入膈則煩須臾復止得食則嘔而又煩蚘聞食臭復出也此爲臟寒，亦治胃腑發自吐蚘與烏梅丸溫臟安蚘。

咳咳而嘔嘔甚則長蟲出亦主久痢

烏梅三百枚　細辛　桂枝　人參　附子炮　黃檗六兩　黃連勉一斤　乾薑十兩　川椒去汗當歸四兩　苦酒也浸

右十味，異搗篩，合治之，以苦酒漬烏梅一宿去核，蒸熟和藥，蜜九。

烏梅九

治諸蟲積既逐而復生者多由臟氣虛寒宜溫健脾胃以杜其源

人參隨宜用　川椒去閉口者炒出汗　白芍酒炒　茯苓　細棯

肉　使君子煨取肉　檳榔二兩　白朮米泔浸炒　當歸四兩炮

蔔　吳茱萸湯泡一兩

爲末，神麴糊丸，桐子大。每服五七十九，或百九，饑時白湯下。如臟寒甚者，加製附子一二兩。

集效九　三因

治蟲嚙腹痛作止有時，或翻起往來腹痛有作止者，蟲嚙則痛，不嚙則不痛，其位也。耕起往來者，蟲不安其位也。

大黃炒　兩　鶴虱炒　檳榔　訶子皮　蕪荑炒　香乾薑炒　附子七錢五分

蜜九，食前烏梅湯下。

婦人酷湯下
蟲喜溫惡酸而畏苦故用薑附之熱以溫之烏梅訶皮之酸以伏之大黃檳榔蕪荑鶴虱之苦以殺之木香辛溫以順其氣也

蠐螬丸　治諸蟲積脹痛黃瘦等病
蕪荑　雷丸　桃仁　乾茶（炒煙盡）　雄黃（微炒）　錫灰（加倍）
皂角（炒煙盡）　檳榔　使君子（等分）　輕粉（減半）　細槺肉
蒸餅丸綠豆大每服五七分滾白湯下陸續服

使君子丸　治蠱脹腹痛及食勞發黃喜食茶米炭土等物（飲食停滯蠱脹痛或發黃身腫喜食生米茶葉土炭者蠱之所嗜也）
使君子（去殼二兩）　南星（薑製）　檳榔（一兩）　右藥合炒如喜食生米用麥芽一觔炒喜食茶葉用茶葉炒喜食炭土用炭土炒取藥爲末蜜丸每晨砂糖水下（誘之以其所嗜與炒以諸物同意）

獺肝丸（附後）　治鬼疰傳尸勞瘵（此五疰之一其證使人寒熱沉沉默默不知所苦而無處不惡死後傳人乃至滅門）
獺肝（一具須從獺身取下不爾多僞）　陰乾爲末滾水服二錢日三

吳鶴皐曰獺肝治鬼疰此何以故凡物惡人而僻處晝伏而夜出者皆陰類也故假之以治陰疾獨用其肝者肝爲厥陰藏魂之臟也（按物之惡人僻處晝伏夜出者狐鼠皆然不獨獺也諸肝皆有他獸此其所以能治鬼疰也與）

掃蟲煎　治諸蟲上攻胸腹作痛
青皮　小茴香（炒）　吳茱萸（一錢）　檳榔　烏藥（一錢五分）
細槺肉（三錢碎）　烏梅（二箇）　甘草（八分）　硃砂（五分）　雄黃（五分）
右藥合炒如喜食生米用米一撮炒喜食茶葉用茶葉炒喜食炭土用炭土炒取藥爲末蜜丸每晨砂糖水下（誘之以其所嗜與炒以諸物同意）

化蟲丸　治腸胃諸蟲爲患
胡粉（炒）　苦楝根（東引未者）　檳榔　蕪荑

使君子五錢 枯礬二錢五分 爲末亦可麪糊作丸量
人大小服之一歲兒可五分
消渴殺蟲方 夷堅志 治消渴有蟲
苦楝根 取新白皮一握切焙入麝香少許煎
空心服雖困頓不妨取下蟲三四條類蚘而色
紅其渴乃止
消渴一證有蟲耗其津液而成者蓋飲醇食炙
積成胃熱溼熱生蟲理固有之臨病多諦審也
雄檳丸 治腹痛胃痛乾痛有時 乾痛者不吐不瀉而但痛也有

時者淡食而饑則痛厚味而飽則否此爲蟲也
雄黃 檳榔 白礬 等分飯丸每服五分
雄黃之辛苦檳榔之苦降白礬之酸澁皆殺蟲
之品也故合用以治之 吳鶴皐曰古方殺蟲丸如貫衆乾漆蠐螬百部錫灰之類皆其所常用者也有加附子乾薑烏梅黃連者蟲得苦而伏也加參黃連者蟲得酸而斂也加蜀椒乾薑瓜蒂者欲其帶蟲瀉下也川雄黃川椒蛇牀樟腦水銀檳榔者治瘡疥之蟲也用胡桐淚黃蘗者子韭子蟾酥者治齲齒青葙子覆盆葉者治九竅蠶蝕之蟲也用川楝皮海桐皮者治風癬之蟲也用桃符板虎糞骨死人枕瓤鶴骨者驅勞瘵之蟲也

吳氏醫學述第四種成方切用目錄
卷十上
經帶門 正方二十一 附方七
溫經湯 膠艾湯 方見胎產門 柏子仁丸 升陽舉經湯 東垣升陽經 固經丸 通瘀煎 連附四物湯 四物加芩連湯 正氣天香散 調經飲 加芩术湯 四物加芩連湯 熱六合湯 風六合湯 氣六合湯 鰾鱗珠 啟宮丸 抑氣散 逍遙飲 五物煎 牡丹皮散 芎歸六君子湯 如聖散 人參荊芥散 固下丸 白芷散 當歸煎丸 婦寶丹 見理血門

武原吳儀洛遵程輯　門人　周蘭九生庭
殷豫龍浩如同較

成方切用

經帶門

婦人諸病本與男子無異而其有異方論此外雜證但與男子相同者自有各門之際大忌寒涼凡行經諸藥飲食亦然

溫經湯 金匱

治婦人少腹寒久不受胎兼治崩中去血或月水來過多及至期不來 金匱曰婦人年五十所病下利數十日不止暮即發熱少腹裏急腹滿手掌煩熱唇口乾燥何也曰此病屬帶下何以故曾經半產瘀血在少腹不去何以知之其唇口乾燥故知之當以溫經湯主之徐忠可註曰此乾燥故知就婦人之年五十其天癸已絕應不從經血水斷絕者而亦必據證斷之以立法也謂婦人年五十其天癸已絕應不從經血而病證下利數十日不止知非偶感矣暮即發熱少腹裏急腹滿手掌煩熱屬陰矣少腹裏急明乎病屬下焦矣因而腹滿是脾病而根于下焦矣手掌煩熱掌屬心心主血血鬱則煩熱也唇口必得津潤營氣鬱則陰火從之故乾燥非渴也渴則胸中熱腑無熱而但陰分有鬱為胸中乾燥也然皆非相因的對之證故火故不渴而乾疑而問仲景乃略其下利發熱腹滿而斷之為帶下且決其骨經牛產瘀血在少腹不去謂下利而發熱陰虛者有之因而少腹裏急下多亾陰虛者有之若唇口乃營氣所主下利之不止暮即發熱少腹裏急腹滿手掌煩熱唇口乾燥何也此病屬帶下何以故曾經半產瘀血在少腹不去何以知之其唇口乾燥故知之當以溫經湯主之徐忠可註曰此乾燥故知就婦人之年五十其天癸已絕應不從經血水斷絕者而亦必據證斷之以立法也謂婦人年五十其天癸已絕應不從經血而病證下利數十日不止知非偶感矣暮即發熱少腹裏急腹滿手掌煩熱屬陰矣少腹裏急明乎病屬下焦矣因而腹滿是脾病而根于下焦矣手掌煩熱掌屬心心主血血鬱則煩熱也唇口必得津潤營氣鬱則陰火從之故乾燥非渴也渴則胸中熱腑無熱而但陰分有鬱為胸中乾燥也然皆非相因的對之證故火故不渴而乾疑而問仲景乃略其下利發熱腹滿而斷之為帶下且決其骨經牛產瘀血在少腹不去謂下利而發熱陰虛者有之因而少腹裏急下多亾陰虛者有之若唇口乃營氣所主下利之不止暮即發熱少腹裏急腹滿手掌煩熱唇口乾燥何也此病屬帶下何以故曾經半產瘀血在少腹不去何以知之其唇口乾燥故知之當以溫經湯主之徐忠可註曰此乾燥故知就婦人之年五十其天癸已絕應不從經血水斷絕者而亦必據證斷之以立法也謂婦人年五十其天癸已絕應不從經血而病證下利數十日不止知非偶感矣暮即發熱少腹裏急腹滿手掌煩熱屬陰矣少腹裏急明乎病屬下焦矣因而腹滿是脾病而根于下焦矣手掌煩熱掌屬心心主血血鬱則煩熱也唇口必得津潤營氣鬱則陰火從之故乾燥非渴也渴則胸中熱腑無熱而但陰分有鬱為胸中乾燥也然皆非相因的對之證故火故不渴而乾疑而問仲景乃略其下利發熱腹滿而斷之為帶下且決其骨經牛產瘀血在少腹不去謂下利而發熱陰虛者有之因而少腹裏急下多亾陰虛者有之若唇口乃營氣所主下利之不止暮即發熱少腹裏急腹滿手掌煩熱唇口乾燥何也此病屬帶下何以故曾經半產瘀血在少腹不去何以知之其唇口乾燥故知之當以溫經湯主之徐忠可註曰此乾燥故知就婦人之年五十其天癸已絕應不從經血水斷絕者而亦必據證斷之以立法也謂婦人年五十其天癸已絕應不從經血而病證下利數十日不止知非偶感矣暮即發熱少腹裏急腹滿手掌煩熱屬陰矣少腹裏急明乎病屬下焦矣因而腹滿是脾病而根于下焦矣手掌煩熱掌屬心心主血血鬱則煩熱也唇口必得津潤營氣鬱則陰火從之故乾燥非渴也渴則胸中熱腑無熱而但陰分有鬱為胸中乾燥也然皆非相因的對之證故火故不渴而乾疑而問仲景乃略其下利發熱腹滿而斷之為帶下且決其骨經牛產瘀血在少腹不去謂下利而發熱陰虛者有之因而少腹裏急下多亾陰虛者有之若唇口乃營氣所主下利之不止暮即發熱少腹裏急腹滿手掌煩熱唇口乾燥何也此病屬帶下何以故曾經半產瘀血在少腹不去何以知之其唇口乾燥故知之當以溫經湯主之徐忠可註曰此乾燥故知就婦人之年五十其天癸已絕應不從經血水斷絕者而亦必據證斷之以立法也謂婦人年五十其天癸已絕應不從經血而病證下利數十日不止知非偶感矣暮即發熱少腹裏急腹滿手掌煩熱屬陰矣少腹裏急明乎病屬下焦矣因而腹滿是脾病而根于下焦矣手掌煩熱掌屬心心主血血鬱則煩熱也唇口必得津潤營氣鬱則陰火從之故乾燥非渴也渴則胸中熱腑無熱而但陰分有鬱為胸中乾燥也然皆非相因的對之證故火故不渴而乾疑而問仲景乃略其下利發熱腹滿而斷之為帶下且決其骨經牛產瘀血在少腹不去謂下利而發熱陰虛者有之因而少腹裏急下多亾陰虛者有之若唇口乃營氣所主下利之不止暮即發熱少腹裏急腹滿手掌煩熱唇口乾燥何也此病屬帶下何以故曾經半產瘀血在少腹不去何以知之其唇口乾燥故知之當以溫經湯主之徐忠可註曰此乾燥故知就婦人之年五十其天癸已絕應不從經血水斷絕者而亦必據證斷之以立法也謂婦人年五十其天癸已絕應不從經血而病證下利數十日不止知非偶感矣暮即發熱少腹裏急腹滿手掌煩熱屬陰矣少腹裏急明乎病屬下焦矣因而腹滿是脾病而根于下焦矣手掌煩熱掌屬心心主血血鬱則煩熱也唇口必得津潤營氣鬱則陰火從之故乾燥非渴也渴則胸中熱腑無熱而但陰分有鬱為胸中乾燥也然皆非相因的對之證故火故不渴而乾疑而問仲景乃略其下利發熱腹滿而斷之為帶下且決其骨經牛產瘀血在少腹不去謂下利而發熱陰虛者有之因而少腹裏急下多亾陰虛者有之

吳茱萸三兩　當歸　芎藭　芍藥　人參　桂枝　阿膠　丹皮　生薑　甘草二兩　麥冬去心半夏

一升　右十二味以水一斗煮取三升分溫三服

膠艾湯 金匱

治婦人陷經漏下黑不解或損傷衝任月水過多淋瀝不斷

方見下卷胎產門

婦人之經雖從下出實由心胃之氣主之故升降有期今曰漏下是無期也所漏者黑是下有因寒而滯之物故曰陷經陷者有降無升久則為黑色故以膠艾湯主之四物通調肝血加甘膠峻補之病本于寒故以艾溫而行之也（丹溪謂婦人之經談為有水紫為熱黑為熱極故兼水化）

假令其人素從熱病來者容有之然而仲景言道其常也

柏子仁丸良方　治經行復止。血少神衰。女子善懷。每多憂思。憂多則傷心。傷則不能生血。而血少。血少則肝無所藏。而血衝任之脈枯。故經閉不行也。○經者。胞脈閉也。胞脈者屬心而絡于胞中。今氣上逼肺。心氣不得下降。故月事不來。

柏子仁去油牛膝酒浸卷柏五錢澤蘭續斷二兩熟地黃一兩蜜丸。米飲下。

柏子仁安神而養心。地黃續斷牛膝補肝腎而益衝任。卷柏澤蘭活血脈而通經閉。

升陽舉經湯東垣　治崩漏身熱。自汗短氣。倦怠懶食。此由勞傷所致。

補中益氣湯見內傷門　加白芍黑山梔薑棗煎。

補中湯以益氣升陽。退熱收汗。加芍藥以斂陰。黑梔以清熱。

又東垣蘭室秘藏升陽舉經湯。黃耆當歸白朮各二錢甘草炙各一錢獨活附子炮各三錢羌活防風藁本各一錢半

人參熟地川芎各一錢細辛六分桃仁十箇去皮尖研紅花新者炒黃二錢木香七分

每服三錢。漸加五錢。治經水不止。及崩中漏下。紫黑成塊。

花肉桂芍藥各五分

每服三錢。漸加五錢。治經水不止。及崩中漏下。紫黑成塊。

當大升浮氣血。切補命門之下脫也。

固經丸良方　治經行不止。及崩中漏下。紫黑成塊。衝任爲經脈之海。若無損傷。則陰陽和平。氣血調適矣。若勞動過度。損傷臟腑。衝任之氣虛。不能約制經血。故經多暴下。或由陰虛陽搏。爲熱所乘。攻傷衝任之脈。枯竭經閉不行也。○經者。胞脈閉也。胞脈者屬心而絡于胞中。今氣上逼肺。心氣不得下降。故月事不來。順大者爲逆。紫黑成塊者。熱甚而反兼水化。非寒也。玉機微義曰。血得寒則凝。既凝而行。而紫黑。故知非寒也。

龜板炙四兩芍藥酒炒黃檗酒炒三兩黃芩二兩香附童便浸炒椿皮炙兩半酒丸

經多不止者。陰氣不足以制胞絡之火。故越其常度也。崩中漏下者。虛而挾熱也。紫黑成塊者。火極似水也。黃芩清上焦之火。黃檗瀉下焦之火。龜板芍藥滋陰而養血。皆壯水以制陽光也。香附辛以散鬱。椿皮澀以止脫。

通瘀煎　治婦人氣滯血積。經脈不利。痛極拒按。及產後瘀血實痛。并男婦血逆。血結等證。

歸尾三錢五分山查香附紅花黃二錢烏藥一錢二分青皮澤瀉一錢五分水煎。加酒一二錢或吳茱萸五分。

小鍾　蒜寒滯者。加肉桂一錢。

火盛內熱血燥不行者加炒梔子一二錢
微熱血虛者加芍藥二錢　血虛濇滯加牛膝
血瘀不行者加桃仁二十粒去皮尖或加蘇木
延胡之類　瘀極而大便結燥者加大黃一二
三錢或朴硝蓬朮亦可

連附四物湯　丹溪方　治經水過期紫黑成塊也紫血熱也黑熱甚也白者虛也或成塊氣滯也或風冷乘之也若淡屋漏水混濁夾痰停水以混之也如煙塵豆汁糊者淫痰也

四物湯血門加香附黃連四物以益陰養血加黃連以清血熱香附以行氣鬱以乾薑使入氣分兼入血分用諸辛溫以解鬱散肝令氣調而血和則經行有常自無痛澼之患矣

烏藥陳皮專入氣分而理氣香附紫蘇能入血分而行氣引以乾薑使入氣分兼入血分用諸辛溫以解鬱散肝令氣調而血和則經行有常自無痛澼之患矣

鮫麟珠　治婦人血氣俱虛經脈不調或斷續或帶濁或腹痛或腰痠或飲食不甘瘦弱不孕服一二劑即可受胎凡種子諸方無以加此

甘草　川芎一兩熟地蒸搗　菟絲子製　當歸四兩　杜仲炒　人參　白朮土炒　茯苓　芍藥酒炒　鹿角霜　川

氣鬱

四物加芩朮湯亦名溫脾能統血四物加芩朮六合丸治經水過多黃芩抑陽白朮補脾連湯治經水適斷五心煩熱經來色黑或如豆汁如豆汁者熱兼濕也芩連湯加梔連爲熱六合湯加薑附名寒六合湯加陳朴名氣六合湯加羌艽爲風六合湯皆經產通用之藥也

調經飲　治經脈阻滯氣逆不調多痛而實者

當歸三錢　牛膝五錢　山查二錢　香附　青皮　茯苓

一錢五分　如因不忌生冷而寒滯于內加肉桂吳茱萸之類　如脹悶者加厚朴一錢或砂仁亦可　氣滯者加烏藥一錢或痛在小腹者加小茴香一錢五分

正氣天香散紺珠　治一切諸氣上湊心胸攻築脇肋刺痛月水不調婦人多憂鬱故氣病爲多氣滯則血亦不能行故月候不調

香附八錢　烏藥二錢　陳皮　蘇葉一錢乾薑五分　每五六錢煎

椒二兩　爲末蜜丸彈子大空心嚼服一二丸用酒或白湯送下或爲小丸吞服亦可　如經遲腹痛宜加破故紙（酒炒）肉桂各一兩甚者再加吳茱萸五錢或加龍骨一兩（煅醋）如子宮寒甚或泄或痛加製附子或炮薑（隨宜）有鬱怒氣不順而爲脹爲滯者宜加香附（酒炒）二兩或甚者再加沉香五錢　血熱多火經亦內熱者加川斷地骨皮各二兩或另以湯劑暫清其火而後服此或以湯引送下亦可　男子製服宜加枸杞胡桃肉桂也

啟宮丸　治子宮脂滿不能孕育（婦人肥盛不孕往往因此）

芎藭　白朮　半夏麴　香附一兩　茯苓　神麴　橘紅（五錢）　甘草（二錢）　粥丸

橘半白朮燥溼以除其痰（肥而不孕多由痰盛故以二陳爲君而加氣藥也）香附神麴理氣以消其滯川芎散鬱以活其血則壅者通塞者啟矣茯苓甘草用以去溼和中也

抑氣散（嚴氏）　治婦人氣盛于血變生諸證頭運

凡人血氣和平則無諸疾苟血少氣滿多壅于胸膈則滿上攻于頭則運

香附（四兩）　陳皮（二兩）　甘草（炙）　茯神（一兩）　每服二錢

經曰高者抑之香附能散鬱氣陳皮能調諸氣茯神能安心氣甘草能緩逆氣氣得其平則無亢害之患矣（氣盛于血固當抑氣若過用行氣藥使陰血亢足則陽火自平乃正治之法蓋補其不足即所以制其有餘也）

五物煎　治婦人血虛凝滯蓄積不行小腹急痛產難經滯等證此即四物湯加肉桂也

當歸（三五錢）　熟地（三四錢）　白芍（二錢酒炒）　川芎（一錢）　肉桂（一二錢）

如兼胃寒或嘔惡者加乾薑　水道不利者加澤瀉或茯苓　氣滯者加香附或丁香木香砂仁烏藥　陰虛疝痛者加小茴香　血瘀不行臍下若覆杯漸成積塊者加桃仁或酒炒紅花

牡丹皮散（良方）　治血瘕（瘀血凝聚而成之病隱伏于臍下之處盤結膠固須破血活血之品治之）

丹皮　桂心　歸尾　延胡索　三棱　莪朮

藥　莪蒁六分三稜四分　水酒各半煎
丹皮桂心赤芍牛膝以行其血三稜莪蒁歸尾
延胡以行其血中氣滯氣中血滯氣血週流則
結者散矣

芎歸六君子湯　治經水後期其來濇少形體肥盛體肥而經水後期濇少者氣虛而痰滯于經絡也。

當歸　川芎　人參　白朮　茯苓　甘草
橘紅　半夏　加薑煎

二陳治其痰滯參朮補其氣虛氣行則痰行。芎歸活

其經血

逍遙飲　治婦人思鬱過度致傷心脾衝任之源
血氣日枯漸至經脈不調者

當歸二三錢　熟地三五錢　棗仁二錢　芍藥一錢五分
甘草炙一錢　陳皮八分　遠志三五分製　如氣虛者加人
參一二錢　經水過期兼痛滯者加酒炒香附
一二錢

如聖散　治崩漏不止凡非時血行淋瀝不已謂之漏下忽然暴下如山崩然謂之崩中有五色以應五藏。

櫻櫚燒烏梅一兩　黑薑半兩　每服二錢烏梅湯下
濇能止血故用櫻櫚酸能收斂故用烏梅。溫能
守中。故用乾薑。黑能止血故並煅用

人參荊芥散　婦寶　治血風勞。血風勞者血脈空疎。
展轉不已。乃成勞也。感受風邪。寒熱盜汗。

人參　白朮　熟地　棗仁　炒黛甲童便炙　羚羊
角　枳殼　柴胡　荊芥五分　防風　甘草炙　芎
藭　當歸　桂心三分　加薑煎

陳來章曰。血中之風。荊芥防風散之。木盛生風。
羚角柴胡平之。陰虛發熱。地黃黛甲滋之。血氣
痛滯。月水不調。芎藭當歸桂心枳殼調之。倦怠
食少。益汗心忡。人參白朮炙草棗仁補而收之。

固下丸　治赤白帶下。帶下傷人于和　帶下起于胞屯或中經脈。流入藏腸。陰虛陽竭。營氣不升。衛氣下陷。滯于下焦。奇經之分。因帶脈而得名。故曰帶。赤者屬血。白者屬氣。其狀如涕。相連而下。言帶者。亦病形也。有濕熱流滯下焦者。有肝腎陰濕勝者。有驚恐而木乘土位。濁液下流者。或思慮無窮。而爲白濁者。或餘經溼熱。屈滯于小腹之下者。病本雖殊。皆爲氣血虛損。營衛累滯而成也。

樗皮兩半　白芍五錢　良薑煅黑三錢　黃檗煅黑三錢　粥丸米飲

下

陳來章曰。楊皮苦燥溼。寒勝熱。濇固下。故赤白帶因于溼熱者。用之爲君。古方有蒼朮楊皮。側朮楊皮。茶木楊皮等九。隨證加香芩黃柏。芩連。及星夏等藥。芍藥之酸。斂陰氣。收下澁之熱。以散寒溼。黃檗之寒。以祛熱溼。並炒黑。以止血。收脫爲佐使也

白芷散 良方 治赤白帶滑脫不禁。良方曰。帶下由傷。傷肝經者。色青如泥。傷心經者。色赤如津。傷肺經者。色白如涕。傷脾經者。黃如爛瓜。傷腎經者。黑如鮓。血

白芷一兩煅　海螵蛸二兩煅　胎髮五錢煅　酒調二錢

白芷辛溫燥溼而祛風。烏鯽鹹溫收溼而和血。髮者血之餘。補陰消瘀。煅黑又能止血也。

當歸煎丸 嚴氏 治赤白帶下。腹中痛。不飲食。羸瘦。此血虛有熱之證。法當涼補。脈訣云。崩中日久。其陽反陷。白滑之物。下注不止。多時骨本枯。言崩久則血少。復以

當歸　熟地　阿膠炒　續斷　白芍炒　牡蠣煅粉

二地榆炒黑　兩　三錢

醋糊丸米飲下。

歸芍熟地續斷阿膠補肝滋腎。以治血虛。牡蠣

地榆清熱收脫。以止帶下。赤芍酸寒。能散惡血。去瘀。所以生新。散之亦以收之也。

卷十下 胎產門 正方三十七 附方二十一
膠艾湯 又方 膠艾湯 又方 當歸芍藥散 桂枝茯苓丸
乾薑人參半夏丸 橘皮湯 半夏茯苓湯 鈎藤湯 當歸貝母苦參丸 羚羊角散 天仙藤散 紫蘇飲 白朮散 鯉魚湯 竹葉湯 紫苑湯 安榮散 胎元飲 固胎煎 涼胎飲 參朮飲 表實六合湯 人參六合湯 朴實六合湯 大黃六合湯 桃子六合湯 石膏六合湯 茯苓六合湯 風溼六合湯 升麻六合湯 柴胡六合湯 膠艾四物湯 四物大黃湯 附子當歸散 棗胎枳殼散 殿胞煎 豬蹄湯 當歸補血湯加葱白方 參朮膏 黑神散 九蜜煎 古黑神散 清化飲 失笑散 通靈散 清魂散 當歸羊肉湯 當歸生薑羊肉湯 返魂丹 免懷湯 艾附煖宮丸 見理血門 佛手散 見理血門 歸芎湯 乾地黃六兩 艾葉四兩 當歸三兩 芎藭二兩 甘草二兩 水五升 清酒三升 合煮取二升去

膠艾湯 仲景云婦人有漏下者有半產後因續下血都不絕者有妊娠忽下血者假令妊娠腹中痛爲胞阻膠艾湯主之此緊言婦人下血其血而妊娠亦其一但致病有不同無端漏下不絕半產後續下血都不絕因瘕復若妊娠下血因瘕此因火血血虛而正氣難者固有之而兼腹中痛則是因胞阻阻者阻其欲行之血而氣不相順非癥瘕害也故同以膠艾湯主之養陰補血莫如四物血安行必挾風而爲痰濁膠以驅皮爲主能去風以濟水煎成能澄濁艾性溫而善行能導血歸經甘草以和之使四物不偏于陰三味之力也而運用之巧實在膠艾。

乾地黃六兩 艾葉 當歸三兩 芎藭 阿膠 芍藥四兩 甘草二兩 水五升 清酒三升 合煮取二升去

渣內膠令消盡溫服一升日三服不差更作一方加乾薑二兩（胡氏治胎動無乾薑）嚴氏治胎動經漏腰痛腹滿搶心短氣加黃耆千金翼治從高墜下損傷五臟吐血及金瘡經肉絕者加乾薑

又方阿膠一觔蛤粉炒艾葉數莖亦名膠艾湯（良方）治胎動不安腰腹疼痛或胎上搶心去血腹痛指迷方加秦艽

當歸芍藥散（金匱）　治婦人懷妊腹中疙痛（疙音紇又音忽）急痛也

芍藥（一觔）　澤瀉（半觔）　茯苓（勗）　白朮（四兩）　當歸（三兩）　芎藭（三兩）

六味杵爲散取方寸匕酒和日三服

疙痛者正氣不足使陰得乘陽而水氣勝土脾鬱不伸鬱而求伸土氣不調則急痛矣故以歸芍養血芩朮扶脾澤瀉瀉其有餘之舊水芎藭暢其欲遂之血氣不用黃芩疙痛因虛則稍挾寒也然不用熱藥原非大寒正氣充則微寒自知加至三丸

桂枝茯苓丸（堅牢不去故須下之爲安耳）　桂枝　茯苓　牡丹皮（去皮熬）　桃仁（去尖熬）　芍藥　等分末之煉蜜丸如兔屎大每日食前服一丸不知加至三丸

桂枝芍藥一陽一陰茯苓丹皮二氣一血調其寒溫扶其正氣桃仁以之破惡血消癥癖而不嫌于傷胎血者所謂有病則病當之也且癥之初必因寒桂能化氣而消本寒癥之成必挾瘀熱爲巢囊苓滲溼氣以清血熱芍藥斂肝血而

金匱云婦人宿有癥病經斷未及

扶脾使能統血則養正即所以去邪耳然消癥方甚多一舉而兩得莫有若此方之巧矣每服甚少而頻更巧要知癥不礙胎其結原微故以漸磨之

乾薑人參半夏丸　金匱　治妊娠嘔吐不止

乾薑　人參一兩　半夏二兩　末之以生薑汁糊爲丸如梧子大每服十九日三服

九如梧子大每服十九日三服

諸嘔吐酸皆屬于火此言胃氣不清暫作嘔吐者也若妊娠嘔吐不止則因寒而吐上出爲嘔不止則虛矣故以半夏治嘔人參補虛而以生薑汁恊半夏以下其所逆之飲

橘皮湯　治妊娠嘔吐不下食惡阻以聞食而嘔責之脾虛嘔吐以食人猶吐責之有火所謂諸逆衝上屬于火也乃厥陰之血既養其胎少陽之火虛而上逆也

橘皮　竹茹　人參　白朮　生薑一兩　厚朴十八銖

竹茹能平少火厚朴能下逆氣橘皮生薑所以開胃人參白朮所以益脾開胃益脾欲其安穀云爾

半夏茯苓湯　治孕娠惡阻飲食也此是下部氣血不足復盜脾胃之氣以固養胎元故令脾胃自弱一聞穀氣便惡心而妨阻也

半夏　生薑三十銖　乾地黃十八銖　人參　苓蘭　細辛　橘皮　甘草　桔梗十二銖

半夏生薑能開胃而醒脾地黃苓芍能養陰而益血人參甘草能和中而益氣橘皮桔梗旋覆細辛皆辛甘調氣之品可以平惡逆之氣而進飲食者也半夏爲妊娠所忌以其燥陰液也若惡阻之證則有當用者故孫眞人養胎之劑用半夏者蓋五方焉

鉤藤湯　良方　治癒癒胎動不安癒癒手足抽掣也熱爲陽風主動肝風相火爲病也

鉤藤鉤　當歸　茯神　人參二錢　桔梗半錢　桑寄生五分　風熱加黃芩梔子柴胡白朮風痰加半夏南星竹瀝風勝加全蠍僵蠶

鉤藤之甘寒以除心熱而散肝風柴胡桔梗之辛涼黃芩梔子之苦寒以平少陽厥陰之風熱茯神以益氣而寧神

當歸寄生以養血而安胎也

當歸貝母苦參丸 金匱　治妊娠小便難飲食如故

當歸　貝母　苦參　等分煉蜜丸如小荳大飲服三丸加至十九

從來小便難傷寒熱邪傳裏則有之必先見表證或化源鬱熱者有之上必見渴中氣不化者有之飲食必不調中氣下陷者有之必先見脾胃證下焦鬱熱有之必不渴而飲食如故今妊娠飲食如故然小便難必因便溺時得風冷鬱於下焦而爲熱致耗勝胱之水故以苦參能入陰治大風開結氣除伏熱爲君當歸辛温能入陰利氣善治衝帶之病爲臣其證雖不由肺然勝胱者氣化之門下竅難則上必不利故以貝母開肺氣之鬱爲佐全不用利水藥病不因水鬱也

羚羊角散 本事方　治妊娠中風涎潮忽仆目弔口噤角弓反張名子癎陰主靜陽主動風陽邪也搐搦眩冒反張之證

羚羊角屑一錢　獨活　防風　芎藭　當歸　康仁炒　茯神　杏仁　薏仁炒　木香　甘草二分半

加薑煎一方有五加皮

羚羊角之辛涼以平肝火防風獨活之辛温以散風邪茯神酸棗以寧神當歸川芎以活血杏仁木香以利氣薏仁甘草以調脾也扶土所以抑木故薏仁亦治筋急拘攣之證

紫蘇飲 嚴氏　治胎氣不和湊上胸腹腹滿頭痛心腹腰脇痛名子懸由下焦氣實相火旺盛舉胎而上逼心胸也

蘇葉一錢　當歸七分　芎藭　大腹皮五分　甘草二分　加薑煎空心服心腹痛甚者加木香延胡索

芎歸芍藥以和其血蘇橘大腹以順其氣氣順血和則胎安矣既利其氣復以參甘養其氣者順則順其邪逆之氣養則養其冲和之氣也

天仙藤散 陳景初　治子氣婦人衝任素受血風因妊娠而足腫喘悶妨食其則腳指出黄水病名子氣非水也

天仙藤即青木香薤微炒　香附炒　烏藥　陳皮　甘草

炙　等分加紫蘇三葉木瓜生薑各三片空心煎服或爲末鹽湯調下日三

天仙藤之苦溫疏氣活血能解血中之風氣香附烏藥陳皮之辛溫以疏表氣甘草之甘緩以和正氣少加木瓜以除溼熱利筋骨調營衛也

白术散　全生　治子腫面目肢體虛胕如水狀胎中水與血搏溼氣流注血目肢體浮腫亦名胎水原因煩渴引飲過多或泄瀉損傷脾胃脾虛不能制水五六箇月多有之

白术一錢　薑皮　茯苓皮　大腹皮五分　陳皮　爲末米飲下指迷方有桑白皮無白术此即五皮飲

丹溪除薑皮腹皮加川芎木通

水病當令上下分消薑皮橘皮辛而能散使水從毛竅出腹皮苓皮淡而能泄使水從溺竅出

水盛由于土衰故用白术之甘溫以扶脾土而隄防之不致汎溢也

鯉魚湯　千金　治妊娠腹大胎間有水氣

白术五兩　茯苓四兩　當歸　白芍三兩　石細辛各一兩　鯉魚一尾修事如食法煮取汁去魚不用每服四錢入魚汁一盞半生薑七片橘皮少許煎至七分去滓空心服或服鯉魚粥亦可

按此方用歸芍以養血芩术以實脾薑橘以和胃止用鯉魚汁以利水絕不雜用利水之藥走氣傷陰暗損胎元且制小其服以緩治之深爲有見

竹葉湯　治妊娠心驚膽怯終日煩悶名子煩受胎四五箇月相火用事或盛夏君火大行俱能乘肺以致煩躁胎動不安亦有停痰積飲滯於胸膈致令煩躁者

麥冬半錢　茯苓　黃芩一錢　人參五分　淡竹葉十片　如有痰者加竹瀝少許

竹葉清煩黃芩消熱麥冬凉肺心火乘脾故煩出於肺茯苓寧心人參補虛妊娠心煩固多虛也

紫菀湯　方良　治子嗽

紫菀天冬一錢　桔梗五分　甘草炙　桑白皮　杏仁三分　竹茹二分　入蜜溫服

子嗽由於火邪當以清火潤肺爲務桔梗桑皮

之涼以瀉之天冬竹茹之寒以清之紫苑炙草之溫杏仁白蜜之澤以潤之也

安榮散（本治子淋心煩悶亂子淋膀胱小腸虛熱也虛則不能制水熱則不得通利故淋心與小腸相表裏故煩悶亦有因房勞內傷胞門衝任虛者宜入珍湯或腎氣丸等方）

人參　細辛（一兩當歸　甘草　燈草（五錢）木通　滑石　麥冬（三錢）為末每二錢麥冬湯調下

陳來章曰虛熱宜補故用人參甘草之甘淋閉宜通故用木通燈草之滲滑石之滑肺燥則天氣不降而麥冬能清之腎燥則地氣不升而細辛能潤之經曰地氣上為雲天氣下為雨上下交陰陽和而後便能通也血燥則溝瀆不濡而當歸能滋之也

胎元飲　治婦人衝任失守胎元不安不固者隨證加減用之或問曰或二三日常服一二劑腑腎虛而胎不固者此方最宜蓋胎元多遺濁者加山藥五味子補骨脂之屬氣分痰飲壅滯以致之者不用

人參（宜隨錢半）　杜仲　芍藥（二錢）　熟地（二錢）　白术　當歸　陳皮（七分無滯）

參术飲（井溪）　治妊娠轉胞（轉胞者胎一邊胞系轉而胎下悉痛溲數或閉也因氣血虛弱瘀飲壅滯以致之）

熟地黃　芎藭　人參　白术　芍藥　枳殼　石斛　當歸　生地　芍藥（二錢）黃芩　當歸（一錢）

茯苓（一錢五分）　甘草（七分生用）　如熱甚者加黃檗一二錢

涼胎飲　治胎氣內熱不安等證

白芍藥（二錢）　當歸（一錢五分）　砂仁（一錢五分）　陳皮（一錢）芍藥（一錢五分）　黃芩（二錢）　白术（一二錢）　當歸（一錢五分）

固胎煎　治肝脾多火多滯而屢墮胎者

天麩二錢煨薑二三片

陳皮白出半夏
入珍湯去茯苓加陳皮
甘草炙　加薑煎空心服此即加陳也

氣虛補以四君血虛補以四物痰飲消以二陳使氣得升舉而胞自通也丹溪曰轉胞之病婦之稟受弱者憂悶多者性躁惡者貪厚味者多有之古方用滑利藥鮮效因思胞不自轉爲胎所壓胎若舉起胞系自疏水道自通矣近吳宅寵人患此脈似濇重則弦予曰此得之憂患濇爲血少氣虛弦爲有飲中焦不清而不能舉氣虛有飲中焦不清而不能舉氣虛有飲中焦不清而不能舉氣虛

大渴而煩熱長而大四物四兩加茯苓澤瀉各五錢名茯苓六合湯治妊娠傷寒小便不利太陽本病本膀胱府也四物四兩加阿膠艾葉各五錢名膠艾四物湯一方加甘草一方加甘草黃耆乾薑治妊娠傷寒汗下後血漏不止損動胎氣者四物四兩加附子六合湯治妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脈沉遲者少陰病也桂附雖辛熱動胎之藥然寒證用之適所以安胎四物大黃湯治妊娠傷寒畜血大黃各五錢名四物大黃湯酒浸

證歌曰婦人妊娠若畜血抵當桃仁莫妄施要教母子俱無損大黃四物對分之婦人血少有熱胎動胎不安及數生產難產者並宜服之胎無疾苦臨盆易產產後百病悉皆主之

當歸散金匱　妊娠有宜常服者婦人血少有熱胎動不安及數生產難產者並宜服之胎無疾苦臨盆易產產後百病悉皆主之

當歸　芎藭　芍藥　黃芩一兩半　白朮　為末酒調服日二

衝任血盛則能養胎而胎安歸芎芍藥能養血而益衝任又懷妊宜清熱涼血血不妄行則胎安黃芩養陰退陽能除胃熱白朮補脾燥溼亦能除胃熱脾胃虛則胎氣不和脾胃健則能運化

精微取汁爲血以養胎自無惡阻嘔逆之患矣易簡方加山茱萸治經三四月不行或一月再至數月不行者血少也滋之以芎歸芍藥補之以白朮山茱一月再至者脾虛有熱也白朮能補脾黃芩能涼血山茱能固經

達生散亦名束胎散丹溪　妊娠八九月服數十劑易生有力詩曰誕彌厥月先生如達達小羊也其生則易產難多因氣虛虛弱替衛滯澀服此如達矣

當歸酒洗　芍藥酒炒　人參　白朮土炒　紫蘇一錢　甘草二錢　大腹　陳皮一錢　葱五葉黃楊腦子七箇煎

黃楊木主產難或加枳殼砂仁或春加川芎夏加黃芩冬如本方或有別證以意消息

當歸芍藥以益其血人參白朮以益其氣腹皮陳皮紫蘇葱葉以疏其壅氣血不虛不滯則臨產自無艱難之患矣丹溪曰產難往往見於鬱悶安逸之人富貴奉養之家若貧賤者鮮有之古方有瘦胎飲爲溯陽公主而作恐非至到之言子族妹若於難產遇胎則觸而去之子其憫焉視其形肥而勤於女工知其氣血久坐不運兒因母氣虛亦不能自運爾當補母氣則兒健易產今其有孕五六月以大全良方紫蘇飲加補氣藥與之數十貼得男甚快因以其方隨母性稟與時令加減服無不應因名曰達生散云昔溯陽公主難產方

士進瘦胎欲用枳殼四兩甘草二兩炙五月後
日服一錢漸古改以枳木名束胎丸寇宗奭明
其不然蓋孕婦全賴血氣以養胎血氣充實胎
乃易生彼公主奉養太過氣實有餘故可服之
若一槩濫施誤之甚矣按瘦胎飲又名枳殼散
治胎肥難產臨月服之張氏加香附行氣寬膈
葺湯下。凡臨產坐草母用力須待兒子順
身臨逼門戶穀道挺進漿破血下方可用力一
送令兒下生若用力太早并妄服催生藥多致
不救。生不必催也催之則摘方苞之墓搌宋人之苗揠非唯無益而又害之矣古方有用兎腦者有用猪脂者有用牛乳榆皮滑石者有用金鳳子者有用葵子者有用油蜜葱白者有用蜂子者有手握石燕者雖曰各有深意但虛灰而雖近理而莫必其效也又有用琴牙灰者有用筆頭灰者有用百草霜者有用蛇退灰者有用鑿頭灰者有用蒐麻子貼于足心者有用蛇肝者有用鑿頭灰者有用龍肝者有用虻蟲而又害之矣古方有用兎腦者有用猪脂者有用葵子者有用油蜜葱白者有用金鳳子者有用牛乳榆皮滑石者有用琴牙灰者有用筆頭灰者有用百草霜者有用蛇退灰者有用鑿頭灰者有用蒐麻子貼于足心者有手握石燕者雖曰各有深意但虛灰而

殿胞煎　治產後兒枕疼痛等證如神

當歸五七錢或一兩　川芎　炙甘草　茯苓一錢　肉桂二三錢或五七分　水煎熱服　如脈細而寒或嘔者加

五錢　如氣滯者加香附一二錢或烏藥亦可

炒黃乾薑一二錢　如脈弱陰虛者加熟地三

腰痛加杜仲二三錢　如血熱多火者去肉

桂加酒炒芍藥一二錢張景岳曰丹溪云芍藥性酸大伐發生之氣產後忌用之此亦言之過也夫芍藥之寒不過下生血藥中稍覺其清徵非若芩連輩之大苦大寒者也使芍藥猶忌則他之用矣余每見產家過慎者或因太煖或因年力方壯而飲食藥餌大補過度以致產後動火者病熱極多若盡以產後爲虛必須皆補豈盡然哉最宜于陰氣散失不可不辨也

豬蹄湯　治乳少

豬蹄一隻　通草一兩

豬蹄鹹能潤下通草淡能通竅

當歸補血湯加葱白方　治產後無乳

當歸二錢　黃耆一兩　葱白十枚

當歸黃耆大補其氣血此養乳汁之源也葱白

辛溫直走陽明以達于乳房故用之爲使此通

乳汁之渠也

參朮膏　丹溪　治產後胞損成淋瀝證或遺尿

人參二錢五分　白朮二錢　黃耆錢半　茯苓一錢　炙甘草五分　用豬羊胞煮湯入藥煎服　桃仁　陳皮

產後胞損必令氣血驟長其胞可完若稍遲緩恐難成功故以參朮草以補之加陳皮以宣其滯桃仁以活其血茯苓以助其下行用豬羊胞煮湯入藥煎服取其以胞補胞之義不特引經也（丹溪曰收生不謹以致損胞而得淋瀝有此因思肌肉破傷在外者自亦可治）膠其脈虛甚因悟曰難產之人多是氣虛難產之後氣血尤虛因用峻補以參朮膏煎以豬羊胞極餞時與之每劑一兩一月而安

黑神散 局方　治產後惡露不盡攻衝作痛及胞衣不下胎死腹中（出血滯不行也）

熟地黃　歸尾　赤芍　蒲黃　桂心　乾薑　炒甘草　黑豆（炒去皮）　牛膝　各四兩　黑豆炒牛升

牛煎便產須知有生地熟地歸芍之潤以濡血蒲前證皆因血瘀不行黃黑豆之滑以行血桂心乾薑之熱以破血（乾薑辛熱能去惡生新故產後發熱多用之）用甘草者緩其正氣用童便者引入血分以助藥力也

清化飲 治產後因火發熱及血熱妄行陰虧諸火不清等證

白芍　麥冬（二錢）　丹皮　茯苓　生地　石斛（三錢）　黃芩（一錢）　骨蒸多汗者加地骨皮一錢半

熱甚而渴或頭痛者加石膏一二三錢　內熱便濇者加木通一二錢或黃檗梔子皆可隨證用之　如兼外邪發熱加柴胡一二錢

失笑散 局方　治惡露不行心包絡痛或死血腹痛（惡血阻而不行上衝于心則心包絡痛下阻于腹中則腹悶而作痛）

蒲黃　五靈脂　等分爲末煎膏醋調服

生蒲黃性滑而行血五靈脂氣臊而散血（氣臊入脈）

皆能入厥陰而活血止痛故治血痛如神
本方各一兩加木通赤芍各五錢每四錢入鹽
少許服名通靈散治九種心痛

清魂散嚴氏　治產後惡露已盡忽昏運不知人產後氣血虛弱又感風寒也

澤蘭葉　炙甘草　人參三分　川芎五分　荆芥一錢
爲末溫酒調下更宜燒漆器焠醋炭于牀前使
開其氣
氣血虛弱故以人參甘草補其氣外感風邪故
以荆芥疏其風荆芥最散血屯屯其風故以爲君澤蘭川芎以去
其未下之瘀血風邪去餘血下氣血生則神清
矣肝藏魂故曰清魂

當歸羊肉湯　治產後發熱自汗肢體疼痛名曰
蓐勞

當歸七錢　生薑五錢　用羊肉一觔
黃耆一兩　人參
煮汁去肉入前藥煎服如惡露未盡加桂辛熱行血
有寒加吳茱萸有熱加生地汁有氣加細辛
參耆補氣而固衛當歸養血而調營生薑辛溫

引氣藥入氣分而生新血羊肉甘熱用氣血之
屬以補虛勞熱退而汗收矣吳輕易緩曰產後不可
時傷力發熱有去血過多發熱有惡露不盡發熱汗蓋有產
熱有三日乳蒸發熱或早起勞動飲食停滯亦
皆發熱狀類傷寒要須詳辨大抵產後大血空
虛若汗之則變筋惕肉瞤或昏迷不醒或搐搦
不定或大便閉牆其害匪輕凡有發熱且與四
物湯芎歸爲君白芍須炒過酒蒸熟地黃佐之
加軟苗柴胡乾薑人參主之蓋乾薑辛熱能引
血藥入血分氣藥入氣分且能去惡生新有陽
生陰長之道以熱治熱深合內經之旨如惡露
不盡者益母九黑神九必兼用之胃虛食少加
白朮茯苓嘔逆者加陳皮半夏其餘隨本病之
皆同必以四物湯爲主乃養血務本之要也劉

除人參黃耆用羊肉一觔生薑五兩當歸三兩名當歸
生薑羊肉湯金匱治產後腹中疠痛及寒疝腹痛

返魂丹御藥院方　治胎前產後一切諸病及月
經不調赤白帶下
五月五日六月六日或小暑日益母草花正開
時連根採收陰乾用花葉及子石臼搗末蜜丸
或搗汁于砂鍋內文武火熬成膏服忌鐵如胎
動腹痛下血不止當歸湯下橫生逆產胎衣不

下炒鹽湯下。產後血運口渴狂言。產後中風失音口噤。及血結奔痛時發寒熱面赤心煩。或鼻衄舌黑口乾。並童便和酒下。產後喘嗽惡心吐酸。脇痛無力。酒下。產後瀉血東壁湯下。產後痢疾米湯下。產後崩漏糯米湯下。產後帶下。膠艾湯下。產後二便不通。煩躁口苦。薄荷湯下。凡產後以童便化服一丸。能調經絡破血痛。益母草功擅消水行血去瘀生新。利大小便故爲經產所需。然其性辛散寒滑。唯血滯血熱者宜之。稍挾虛寒者服之。爲害不淺。今人以其有若治血分風熱明目調經用子爲良。若胎產瘡腫消水行血則可並用。蓋根莖花實莖葉實皆可用。益母草根有補也。

免懷湯　欲摘乳者此方主之。婦人之血。上則爲乳。下則爲經。欲摘乳者通其月事則乳汁下行。免乳服之若矣。

當歸尾　赤芍藥　酒紅花　酒牛膝各五錢　四味皆下行導血之品。故以用之。名曰免懷者。子生三年。然後免于父母之懷也。

卷十一上　嬰孩門（正方四十九　附方五）

初生拭口法　甘草下胎毒法　豬乳法　襁褓乳兒法　哺兒法　雜將護法

柴歸飲　升麻葛根湯（方見表散門）　疏邪飲（柴葛煎）　參蘇飲（方見表裏門）　惺惺散　透邪煎　麻黃湯（方見表散門）　加味葛根湯（紅花湯　五味異功散）　羌活透肌湯（桔梗湯）　透肌散　紫草化毒湯　搜毒煎　涼血養營煎　甘桔湯（方見治火門）　消毒飲　加味如聖散　前胡化斑湯（方見治火門）　人參白虎湯（方見寫火門）　七正散　加味導赤散　辰砂益元散（方見消暑門　退火囘生散）　當歸黃連湯　保元湯　十二味異功散　九味異功煎　六氣煎　白术茯苓澤瀉湯　補中益氣湯（方見治氣門）　四物湯（方見治血門）　當歸活血湯（方見治理）　內托散　八珍湯（方見治氣門）　附子理中湯（方見祛寒門）　止痛活血散　痧證初起方

武原吳儀洛遵程輯　門人周蘭丸生庭殷豫龍浩如同較

成方切用

嬰孩門

小兒之病與大人無異惟初生保護及痘疹等證不得不另集方法以便施用。世俗所謂驚風即四時感證也方中行痧書翰嘉言寓意草中論之最詳當從傷寒門循經救治切不可用抱龍丸鎮驚丸等金石藥鎮墜外邪深入臟腑爲害不淺。

初生拭口法

嬰兒初生忌以綿裹指拭兒口中舌上惡血穢露謂之玉衡若啼聲一發即入腹成百病。薛氏曰嬰兒初生口含血塊啼聲一出隨即嚥下而毒伏于命門遇天行時氣久熱或飲食停滯或外感風寒發熱等因發爲瘡疹急須於未啼時用軟帛裹指揩去其血雖出痘亦輕矣。

甘草下胎毒法

用粉甘草中指一節拍碎以水二蜆殼煎一蜆殼以綿纏蘸令兒吮之若吐出割斷黑猪乳佳如兒口難開先點猪乳。

又看舌下若連舌有膜如石榴子若啼不出聲不轉速以指爪摘斷之或用葦刀子割之微有血出即活若舌下血出多者以亂髮燒灰同豬脂少許和塗之聖惠云看齒根有黃筋兩條以葦刀

惡汁爲佳若服一蜆殼不吐卽不須更服不問
嬰兒虛實寒熱皆須服之心鑑曰古方書言嬰兒始生落草服汞粉
朱砂白蜜黃連牛黃欲下胎毒今人率承用之不知今人稟受攝養與古人不同其藥乃傷脾
敗陽之物若與兒服後必生異證只宜用淡豆豉煎濃汁與三五口其毒自下又能助養脾氣
或煎濃汁與三五口其毒自下又能助養脾氣
消化乳食○薛氏頂以甘草細切少許臨產時
以綿裹沸湯盞內覆溫收生之際以軟綿裹指
蘸甘草汁拭其口次用下胎毒諸法

豬乳法　嬰兒初生至滿月內常時時旋取豬乳

滴口中佳豬兒飲母次便提後脚離乳急捋之卽得

襁褓法　千金論云小兒用父故衣女用母故衣

勿使新綿切不可過厚恐令兒壯熱生瘡發癇
皆自此始巢氏云兒始生肌膚未成不可煖衣煖則令筋骨緩弱宜時見風日若不見風日則令肌虛脆軟便易損傷嬰兒常藏在幃幙之內重衣溫煖譬如陰地草木不見風日軟脆不任風寒煖無風之時令母常抱日中嬉戲數見風日則令氣和煖無風寒不致疾病又當習薄衣之法當從秋冬耐風寒不可於春夏卒減其衣令兒受風寒漸習之不可於春夏卒減其衣令兒受風寒漸月但當著夾衣及衲衣之類極寒則漸加以舊綿衣過厚適所以爲害也人家多愛子乃以綿人又當消息無令汗出汗出則致虛損便受風寒晝夜寤寐皆當戒之

乳哺法　湯氏曰小兒乳哺須要得法乳者乳也

哺者食也乳後不得便與食哺後不得便與乳小兒脾胃怯弱乳食相併難以耐化周歲以上方成乳癖于腹中作痰作熱痼病從此起也丹溪曰小兒腸胃尚脆而窄若稠粘乾硬酸醎甜辣一切魚肉水菓濕麪燒炙煨炒俱是發熱難化之物皆宜禁絕只與熟菜白粥非唯無病且不縱口可以養德此外生栗味醎乾柿性涼可爲長陰之助然栗太補柿太澁俱爲難化亦宜少與婦人無知唯務姑息長其啼哭無所不與積成痼疾雖悔何及所以富貴驕養有子多病迫至成人筋骨柔弱有食則不能忌口以自養居喪則不能食素以盡禮小節不謹大義亦虧可不慎與至于乳母尤宜謹節飲食通情慾中動乳脈便應病氣到乳汁必凝滯兒得此乳疾病立至不吐則瀉不瘥則熱或爲口廢或爲驚搐或爲夜啼或爲腹痛病之初來其溺必少便須詢問隨證治母母安亦安可消患於未形也

乳兒法　凡乳母氣血爲乳汁也五情善惡悉氣用狐臭癆瘵氣

血所生宜戒喜怒一切禁忌不用狐臭癆瘵氣嗽病者及身體疥癬頭瘡髮少唇緊音啞耳聾鼽鼻瘡病等方可乳兒　夏天盛熱時乳母浴後或兒啼不可與妳使兒胃有熱毒秋成赤白痢浴後可令定息良久乳之可無患也　聶氏曰盛暑不可食乳恐氣逆不順緊而爲數亦能

成疾。千金論曰。凡乳兒不可過飽。飽則溢而成嘔吐。若乳來多猛。取出授後。再乳。切須乳時。合先令提去宿熱乳。然後乳之。如乳母欲臥。寐當以臂枕之。令乳與兒頭平。母欲睡着時。即奪其乳。恐其不知飽足。亦成嘔吐。父母交合之間。兒臥于側。或驚起。不可乳。兒蓋氣亂未定。必能殺兒也。聖惠方云。醉淫喘乳。能殺小兒。聖濟經論。乳者。夏不欲熱。熱則致吐逆。冬不欲寒。寒則致下痢。母不欲怒。怒則令上氣顛狂。母不欲醉。醉則令身熱驚悸。或吐或瀉。手足時冷者。虛羸。母有積熱而乳。則變黃不能行。食。新房而乳。則瘦悴交脛不能行。

補兒法　錢乙云。兒多因愛惜過當。兩三歲猶未飲食。致脾胃虛弱。平生多病。半年後宜煎陳米稀粥。時時與之。十月後漸與稠粥爛飲。以助中氣。自然易養少病。惟忌生冷油膩甜物等。寶鑑云。兒五十日可哺如棗核。百日彈丸。早晚二哺。三歲未滿。勿食雞肉及子。恐腹內生蟲。

雜將護法　嬰兒百日任脈生。能反復。乳母當存節喜怒。適其寒溫。嬰兒半晬。尻骨已成。乳母當教兒學坐。嬰兒二百日外。掌骨成。乳母教兒地上匍匐。嬰兒三百日。臏骨成。乳母教兒獨立。嬰兒周晬。膝骨已成。乳兒不可過飽。飽則溢而成嘔吐。若乳來多猛。取出授後。再乳。切須乳時。合先令提去宿熱乳。然後乳之。如乳母欲臥寐。當以臂枕之。令乳與兒頭平。母欲睡着時。即奪其乳。恐其不知飽足。亦成嘔吐。父母交合之間。兒臥于側。或驚起。不可乳。兒蓋氣亂未定。必能殺兒也。聖惠方云。醉淫喘乳。能殺小兒。聖濟經論。乳者。夏不欲熱。熱則致吐逆。冬不欲寒。寒則致下痢。母不欲怒。怒則令上氣顛狂。母不欲醉。醉則令身熱驚悸。或吐或瀉。手足時冷者。虛羸。母有積熱而乳。則變黃不能行。食。新房而乳。則瘦悴交脛不能行。

獨立。嬰兒周晬。膝骨已成。乳母教兒行步。上件並是定法。世人不能如法。往往抱兒過時。損傷筋骨。切宜戒之。

柴歸飲　治瘡疹初起。發熱未退。無論是瘡是邪。疑似之間。均宜用此。平和養營之劑。以爲先着。有毒者可托。有邪者可散。實者不致助邪。虛者不致損氣。凡陽明實熱邪盛者。宜升麻葛根湯。如無實邪。悉宜用此增減之。小兒壯熱。呵欠頻悶。時發驚悸。或吐或瀉。手足時冷。面頰赤。嗽嗽者。爲瘡證也。呵欠頻悶。肝之證也。時發驚悸。心之證也。或吐或瀉手足時冷者。脾之證也。頰赤嗽嗽。肺之證也。腰痛喜寐。腎之證也。

升麻葛根湯　小兒初間發熱。壯盛爲風寒爲瘡疹。莫能辨的。此方穩當。

方見卷三上表散門

表熱壯盛。此邪實于表也。經曰。輕可去實。故用升麻葛根以疏表。甘草佐之。可以和在表之氣。芍藥佐之。可以和在表之營。去其實邪。和其營衛。風寒則解。痘疹則出。誠初間之良劑也。如至四五日。痘中夾疹者。亦此方主之。疹散只依常法治痘

疎邪飲　治痘疹初起發熱。凡氣血強盛。無藉滋補者。單宜解邪。此方爲主。以代升麻葛根湯及蘇葛等方。最爲穩當。

芍藥酒炒　柴胡倍用　甘草炙　蘇葉　荆芥穗減半　水煎服　無火者。加生姜三片　火盛內熱者。加乾葛。渴者。加乾葛。去蘇葉荆芥。加乾葛黃芩連翹名柴葛煎治痘疹表熱及瘟疫等證

參蘇飲　治痘證初起風寒壯熱體重頭痛痰嗽壅盛

方見卷五下表裏門

風寒客于外。故用紫蘇乾葛以發表。痰壅于內故用半夏前胡桔梗陳皮茯苓以安裏。邪去之後。中外必虛。人參甘草急固其虛。此則表和而痘易出。裏和而氣不虛。表裏無失。斯良劑矣

惺惺散　發熱之初。未明是痘。形體怯弱者宜之。

人參　白朮　甘草　細辛　白芍藥　桔梗各七分　粉白芍。所以和其陰。參苓朮草防其虛也。細辛桔梗所以疏其陽。花未出之時。惟恐誤藥。故云透邪煎　凡麻疹初熱未出之先。不宜用藥。然解利得宜。則毒必易散。而勢自輕減。欲求妥當。當先用此方爲主。

當歸二三錢　芍藥酒炒一二錢　防風八分　荆芥穗一錢　升麻三分　甘草炙七分　水煎服　如熱甚脉洪滑者。加柴胡一錢。此外凡有雜證俱可隨宜加減

麻黃湯　治痘疹天寒腠密表熱壯盛

方見卷三上表散門

解表之藥有三品。辛涼辛溫辛熱也。夏月表氣平調。宜用辛溫。若天易泄宜用辛涼。春秋表氣

寒之時表氣閉密。辛涼辛温不能解散。故以麻黄桂枝之辛熱者以主之。亦各當其可而已。佐以杏仁利其氣也。佐以甘草和其氣也。

加味葛根湯　凡小兒發熱。看有痘情。（耳冷。指冷。脚冷。眼如含水。懶于言笑。是也。）宜用此服至見點。

升麻　葛根　前胡　桔梗　山查　青皮
木通　荆芥　甘草　加燈心

高鼓峯曰。如服此湯而不見點。是毒盛也。其證必重。若熱甚氣悶譫語。腰無力。冬月可加麻黄四五日。重證已見。而舌灰白色者。亦須以石膏合麻黄用之。夏月蘇葉薄荷。俱可進退用之。

成方切用（製）卷一一上　加味葛根湯　八

一錢　夏月加石膏一錢。甚者加至二錢。（如冬月熱甚過後宜用。）如見點三日。痘已齊而大熱不退。此是毒盛。危候見矣。須以涼藥涼血。紅花湯去升麻撫芎山查加生地丹皮與之。然此是乾紅候。百不一活。（如熱微者不妨。）紅花湯去升麻撫芎山查木通殭蠶大力子。名桔梗湯。（六日已過。痘脚已齊。欲行者宜之。）又

三日發熱起頂。濃漿至矣。當用木通殭蠶荆芥連翹花粉丹皮丹參等。以和其毒。其有變白色而發癢者。氣血虧也。五味異功散（見卷一上四君子湯附方。）加白芍以救其元氣。虚甚者。參朮加至五六錢大劑用之。自然有救。或泥于庸醫發未盡而禁補。或反咎發表欠透。以致今日內陷者。此殺人之論。不可信也。信手大補。不二三劑。必然窠下漿來。生氣勃然矣。即有撏揸破者。亦自循皮爛臭而回生。

羌活透肌湯　治痘出見點未盡。

羌活　陳皮　柴胡　前胡　半夏　茯苓
甘草　桔梗　川芎　當歸　山查

表氣未疏則出有不盡。故用羌前以疏表。裏氣未利。則出有不速。故用二陳桔梗以調裏。當歸活表裏之血。山查消表裏之滯。血活滯消。則痘之出也易易耳。

透肌散　治氣弱痘出不盡。

紫草（二錢）　木通（一錢五分）　白芍藥（酒炒）　人參　蟬脫　升

麻　甘草五分　人參甘草能益氣而補中。紫草木通能透肌而起痘。升麻蟬脫能退熱而消風。用芍藥所以調陰氣而和營衛也

紫草化毒湯　治痘已出未出。熱甚不快

紫草二錢　陳皮一錢　升麻　甘草五分　如小便赤。加木通

紫草活竅利血化毒。陳皮快膈消痰利氣。升麻消風發散瘡痍。甘草補虛和中解熱。木通加之為導熱邪由溺而泄爾。

成方切用　卷十

煎　解痘疹熱毒熾盛。紫黑乾枯。煩熱便結

純陽等證

紫草　地骨皮　牛蒡子　黃芩　木通　連翹　蟬退　芍藥　水煎　渴者。加花粉麥冬。腸乾結。臍腹實脹者。加大黃芒硝。血熱妄行。陽明熱甚。頭面牙齦腫痛者。加石膏知母。大便　小水熱閉者。加山梔車前子。柴胡一錢　防風七分　生犀角　黃芩五分　牛蒡子麥門冬。療風痰而清肺熱。荊芥防風散風邪。而升麻。甘草桔梗。黃芩。利咽喉而清氣

涼血養營煎　治痘瘡血虛。血熱。色紅熱渴。或色燥不起。及便結溺赤。凡陽盛陰虛等證

生地　當歸　白芍　甘草　地骨皮　紫草　黃芩　紅花　水煎服。量兒大小加減　渴。加天粉　肌熱無汗。加柴胡　血熱毒不透者。加犀角

毒熱甚者。加牛蒡子　木通連翹之屬

甘桔湯　治痘疹咽喉腫痛。

方見卷八下瀉火門

消毒飲　治痘疹咽喉腫痛。膈上熱盛

牛蒡子二錢　荊芥穗一錢　防風　生甘草五分

牛蒡子疏喉中風壅之痰。荊芥清膈間風壅之熱。生甘草緩喉中風壅之氣。防風散諸風不去之邪

加味如聖散　治痘疹痰嗽風熱聲啞喉痛

桔梗二錢　牛蒡子　麥門冬一錢半　甘草　元參　荊芥一錢　防風七分　生犀角　黃芩五分

牛蒡子麥門冬。療風痰而清肺熱。荊芥防風散風邪。而升麻。甘草桔梗。黃芩。利咽喉而清氣

熱犀角元參涼心腑而療結熱熱去則金清金清則聲啞瘧矣

前胡化斑湯 治痘疹中夾斑淡紅色（淡紅色斑之輕者也其原由初間不能清熱解毒之故。治痘中之斑。與傷寒之斑。宜主寒涼。痘中之斑。補瘡中之斑。不熱。誠調衛。不寒。不熱之理也。）

酒紅花 當歸一錢 前胡八分 荊芥四分 白芷 甘草一節 赤芍 陳皮五分 鬱金七分 酒浸 胡葵子三十粒

紅花當歸赤芍所以活斑中之血。前胡白芷陳皮荊芥所以利表裏之氣。胡葵甘草鬱金所以

皮荊芥所以利表裏之氣。胡葵甘草鬱金所以散滯氣爾。

活血散 治痘證氣血凝滯。

木香二錢 當歸尾酒浸焙乾 赤芍酒浸炒 川芎 紫草 酒紅花五錢 血竭一錢 每服三錢

氣實利而不實滯。血實活而不實凝。木香川芎調其氣滯。赤芍歸尾紫草紅花血竭理其血凝。

尾角地黃湯 治痘疹血熱。及諸失血證

方見卷一下理血門

心生血。生地黃所以涼心血。肝藏血。白芍藥所以去血中之火。以和肝血。火能載血。牡丹皮所以解諸經之熱。熱能動血。生犀角所以解諸經之熱。四順清涼飲 治實熱內壅。腹脹秘結。痘不能出。

大黃 當歸 芍藥 甘草

痘以熱而出。固不能以無熱。若實熱內壅。腹脹秘。則三焦之氣不化。而痘不能以出矣。故用大黃通其滯。當歸活其血。芍藥養其陰。甘草調其胃。通利之後。表裏氣血皆承順矣。故曰四順。

黃連解毒湯 治痘疹裏熱壅盛。

方見卷八下瀉火門

無熱固不化毒。熱壅則毒亦不化。故用黃連瀉心火。黃芩瀉肺肝之火。黃柏瀉腎火。梔子瀉上下之火。無他證而惟熱壅。故用藥亦精專焉。

人參白虎湯 治痘證裏熱渴甚。

方見卷八下瀉火門 白虎湯附方

石膏清胃熱。胃清則不渴。人參知母甘草化氣

而生津液。液生則熱自除。

七正散　治痘證小便秘澁。

車前子　赤茯苓　山梔仁　生甘草梢　木通　扁蓄　龍胆草

治痘必欲利小便者。水循其道而後地平天成故也。是方也車前能滑竅。赤苓能滲溼。木通能通滯。山梔能瀉火。草梢能通莖。扁蓄能利水。膽草能利熱。七物者。導其熱邪。正其中氣。故曰七正。

加味導赤散　治痘疹小便黃赤。口乾煩渴。

生地黃　人參　麥門冬　木通　甘草　竹葉　燈心

內熱故用生地黃。小便黃赤故導以木通竹葉、燈心。口乾煩渴故潤以麥冬人參甘草。乃氣化而津液自生也。

辰砂益元散　治痘疹裏熱小便黃赤。神氣不清。方見卷七上消暑門六一散附方

滑石清利六腑。甘草解熱調中。辰砂安神去怯。

去甘草滑石辰砂各一錢水飛過加冰片三厘。每用冷水調服一錢。名退火同生散。治痘證血滯枯澁。火炎則水乾。是故枯澁用滑石辰砂導去其熱。此釜底抽薪之意。入冰片者。欲其速達而無壅滯也。

當歸黃連湯　治痘瘡毒盛灰白色不痒。

當歸　黃連　丹皮　殭蠶　荊芥　牛蒡子　花粉　銀花　生地　加燈心

保元湯　自行起發至頂已起矣。而因氣虛有險證者宜此。

人參　黃耆　甘草　加生薑。

氣虛頂陷者。此方主之。汪機曰。薑山魏直著博瘡雖有順險逆三證。順者爲吉。不用藥。逆者爲凶。不必用藥。雖險乃悔吝之象。宜以藥轉危爲安。此方原出東垣治慢驚土衰木旺之法。今借而治痘。以其內固營血。外護衛氣。陰助陽。陽作爲膿血。其證雖異。其理則同。去白芍藥。加生薑。名保元湯。爲長光澤。頂陷者。人參二錢。炙甘草一錢。生薑一片。水煎服之。險證者。初出圓暈乾紅。少潤也。將起。光澤。頂陷不起也。繼出雖起。慘色不明也。漿足光潤不消也。漿老渥潤不斂也。結痂而胃弱內虛也。痂落而口渴不食也。痂後生瘡毒也。膿腫潰而斂遲也。凡有諸證。並宜此湯。或加芎藭官桂橘米以助之。嘉謨曰。人參補屯黃耆實表。凡內傷脾胃。發熱惡寒。吐泄怠臥。脹滿痞

成方切用　卷一一上　十二味異功散　九味異功散　六物煎　六氣煎　一四七

男婦陽氣虛寒等證
黃耆　肉桂　右咬咀水煎服　加減法照前六物煎
白朮茯苓澤瀉湯　治痘證水泡（中有實熱膈有停水涇熱外行初則痘色晶亮頭則痘皆水泡矣此乃水不能潤下竈底燃薪釜中發泡之義）
白朮　茯苓　澤瀉
白朮甘而燥能益土以防水茯苓甘而淡能益土以決防澤瀉鹹而潤能潤下而利水水利溼消泡自瘡矣

補中益氣湯　治中氣虛弱痘不起脹（難經曰氣者噓長萬物者也氣之弱也痘不起脹氣之弱也故主呴之）
方見卷一上治氣虛
參耆朮草以補氣升柴以升陽當歸以活其營
陳皮以利其氣
四物湯　治痘證根淡血弱（痘至五六日氣尊血弱故用當歸活血川芎行血熟地補血芍藥斂血）
方見卷一下理血門
當歸活血湯　治痘瘡色紫色枯用此涼血活血

生地　當歸　川芎　赤芍　紅花　紫草
色紫爲血熱色枯爲血潛熱者涼之枯者澤之調血之道也生地涼血之品餘藥皆活血之品血涼而活瘽熱可除矣
內托散　治表虛裏實氣血皆弱（色淡爲血虛若息重氣粗則爲裏實）
人參　黃耆　甘草　當歸　川芎　白芍
厚朴　防風　白芷　肉桂　木香　桔梗
紅深黑陷屬熱毒者去桂加紫草紅花黃芩

淡白灰陷屬虛寒者加丁香溫裏肉桂溫表
當實膿而不貫膿者倍參耆當歸加糯米煎熟
入人乳好酒
氣虛故用參耆甘草血虛故用歸芍川芎然防風白芷肉桂能引諸藥自內而托之于外木香桔梗厚朴能調瘽實以歸于和
八珍湯　治氣血兩虛（醫貫未然之防痘證難順若氣體虛弱不補恐有後失故用四君以補氣四物以養血）
方見卷一上治氣門四君子湯附方

附子理中湯　治胃中虛寒或又誤服凉藥瀉而手足厥冷者
方見卷六下祛寒門理中湯附方
十全大補湯　治瘡證十日以上血氣虛弱者
方見卷一上治氣門四君子湯附方
止痛活血散　治瘡癤已潰血滯瘀痛不可忍者
白芍藥（酒炒二錢）爲細末酒調下
諸病痒者爲虛痛者爲實痒宜補而痛宜瀉此痛爲血實而滯故用芍藥以平血酒調以行滯

亦從汗解。乃屢驗者。（有一等小兒痧門見潤燥不必盡以清火爲主。兼解可也。緣小兒稟質尚弱。神氣有限。如遇粗工不審虛實。發散過多。必致正氣虛脫。而不可救者多矣。有一等小兒痧。一日可用石膏黃連。如水濟火。要知是莎毒痰火壅結上焦之故。宜用瓜蔞霜枳殼花粉金沸草。清痰清火。如挾氣虛者。加人參立應。莎證多泄瀉自止。慎勿止瀉。惟用升麻葛根黃連甘草。則瀉陽明邪熱得解。是亦表裏分消之義。莎後泄瀉及便內陷故也。大忌止瀉。惟宜升散。仍用升麻葛根湯。加黃連扁豆若便膿血。加滑石末。必愈。）

治瘡瘡溼爛方
或以敗草灰敷之或以蠶繭灰入枯礬少許敷之或以牆上白螺螄殼燒灰敷之或以蛤粉敷之四法者皆是溼者燥之之意。

莎證初起方
升麻　葛根　芍藥　甘草　桑皮　地骨皮
桔梗　牛蒡　荊芥　連翹
莎證即疹子。又名瘡子。不宜依證施治。惟當治本。本者。手太陰足陽明兩經之邪熱也。解其邪熱。加滑石末。必愈。

卷十一下 方二十六 門方七

癰瘍門 正方 附方

皂莢丸 皂蛤九 桔梗杏仁煎 腸癰秘方 金銀花酒 回毒金銀花酒 四仙飲 真人活命飲 托裏金銀花膏 托裏散 芎藥薤白煎 當歸蒺藜煎 灸法 芙蓉外敷法 見本草從新卷芙蓉條 百草煎 蠟礬丸 雄礬九 托裏溫中散 托裏黃耆湯 螵蛸散 槐花蘗 托裏十補散 托裏散 棉花瘡點藥 又武定侯方

當歸補血湯加防風連翹方 十全大補湯 方見治氣門 連翹金貝煎 連翹歸尾煎 降癰散 後方止痛當歸湯

成方切用

癰瘍門

外科方證。至爲繁多。不能盡錄。茲量血托裏之劑。多散見於諸門。雖在用者之圓神而已。○內經曰。營氣不從。逆於肉理。乃生癰腫。又曰。諸痛癢瘡。皆屬心火。丹溪曰。癰疽皆因陰陽相滯而生。蓋營行脈中。衛行脈外。相並周流。寒與濕搏之。則凝滯而行遲。爲不及。熱與火搏之。則沸騰而行速。爲太過。氣得邪而鬱。津液稠粘。爲痰爲飲。積久滲入脈中。爲瘀血。得邪而鬱。隧道阻滯。或溢或結。積久滲出脈外。氣爲之亂。此陰陽滯於陰地。百病皆由於此。不止癰疽爲然。

皂莢丸 金匱

治肺癰。欬逆上氣。時唾濁。但坐不得眠。肺者。五臟之華蓋。處於胸中。主氣。候在皮毛。出惡風。咳嗽短氣。鼻塞項強。胸脇脹滿。久久不瘥。則成肺癰。風傷皮毛。熱傷血脈。風熱相搏。氣血稽留。蘊結於肺。則成肺癰也。口乾喘滿。咽燥而渴。甚則四肢微腫。多吐涎沫。而無膿血。胸中隱痛者。肺癰也。咳吐膿血。胸中隱痛者。肺癰也。痿爲正氣虛。癰爲邪氣實。

皂莢 刮去皮 弦酥炙 爲末。蜜丸。以棗膏和湯服三丸。

喻嘉言曰。火熱之毒。結聚於肺。表之裏之。溫之清之。曾不少應。堅而不可攻者。令服此丸。庶幾

無堅不入聿成洗蕩之功。不可以藥之微賤而
少之也。
加蛤粉等分爲末名皂蛤丸每服二錢。酒下。治
婦人風邪客於乳房。而成癰癰。此藥能導其乳汁。散其風邪。汗出而自愈矣
桔梗杏仁煎　治咳嗽吐膿痰中帶血或胸膈隱
痛將成肺癰者。此方爲第一。此桔梗湯之變方也。
桔梗　杏仁　甘草一錢　阿膠　麥冬　百合
金銀花　夏枯草　連翹二錢　貝母　紅藤三錢　枳

殼一錢半
腸癰秘方　凡腸癰生於小肚角。微腫而小。腹隱
痛不止者。若毒氣不散。漸大內攻而潰。則成大
患。急宜以此藥治之。
水煎食遠服。　火盛兼渴者加天花粉。
聖藥甘草亦扶胃解毒之上劑也
金銀花二兩　甘草一兩　黃耆四兩　酒一升。重湯煮服。名
回毒金銀花湯。治痛瘍色變紫黑者。又黃耆當
歸金銀花甘草大劑煎服。名四仙飲。治氣血俱
虛服之未成即消。已成即潰。已潰即愈
附長春藥酒　黃耆十二兩蜜炙煎膏　大生地六兩銅刀切片　金

銀花當歸各四兩　甘草去皮炙四兩　陳皮去白一兩　用白糯米二斗。做酒釀一埕。將前藥後六味用綿包好。入埕內。隔湯煮三炷香。將黃耆膏傾入。再煮三炷香。將埕埋地下三尺餘深七日七夜取起。濾清。聽用。此酒不特外科虛證極妙。凡勞傷虛損服之。無不神效。所以蘇州陸德敷家。以此酒馳名于天下也。

附金銀花膏　冬膏。名忍冬。

酒任點服。養陰退陽。補虛療風。尤宜於火熱熾盛之人。永無疔疽之患。膏酒亦佳。花葉同功。而花香尤勝。

填入活命飲　治一切癰疽腫毒初起未潰者。

金銀花五錢　陳皮去白當歸酒洗錢半　防風七分　白芷　甘草節　貝母　天花粉　乳香一錢　沒藥二味另碾。候藥熟下　皂角刺五分　川山甲三片剉。炒。去粉　好酒煎。善飲者多飲酒以行藥勢。忌酸物。鐵器。酸性收斂。凡藥皆忌鐵。

金銀花散熱解毒。癰瘡聖藥。故以為君。花粉清痰降火。白芷除濕祛風。並能排膿消腫。當歸和陰而活血。陳皮燥濕而行氣。防風瀉肺疏肝。貝母利痰散結。甘草化毒和中。故以為臣。乳香調氣托裏護心。能使毒氣外出不致內攻。沒藥散瘀消腫定痛。故以為佐。穿山甲善走能散。皂角刺辛散剽銳。皆厥陰陽明正藥。能貫穿經絡。直達病所。而潰壅破堅。故以為使。加酒者。欲其通行週身。使無邪不散也。此藥當服于未潰之先。未成者。散。已成者潰。若已潰後不可服

托裏散　治一切惡瘡。發背。疔疽。便毒。始發脈弦洪實數。腫甚欲作膿者。脈弦洪實數。乃實熱堅滿之證。故宜下之。

金銀花　當歸一兩　大黃　牡蠣　皂角刺三錢　黃芩

半酒半水煎

金銀花清熱解毒。癰瘡主藥。當歸赤芍。調營血。大黃芒硝。蕩胃熱。黃芩清肺火。牡蠣軟堅痰。連翹花粉。散結排膿。角刺鋒銳。直達病所。而潰散之也。東垣曰。瘡瘍及諸病面赤。雖伏火熱毒。禁不得攻。裹為陽氣怫鬱。邪氣在經。宜發表以去之。故曰火鬱則發之。雖大便數日不見。宜發散陽氣。少加潤燥藥以潤之。如見風脈風證。只宜發表風藥。便可以通利大便。若止乾燥秘濇。尤宜潤之。慎不可下。下之則愈網目曰。大便不利。瘡瘍鬱冒。皆不可下汗之。實不知其氣不降也。便以為實而行大黃。些少寒藥不知其氣血不和也。故以為臣。乳香調氣托裏護心。能使毒氣外出不致內攻。沒藥散瘀消腫定痛。故以為佐。穿山甲善走能散。皂角刺辛散剽銳。皆厥陰陽明正藥。能貫穿經絡。直達病所。而潰壅破堅。故以為使。加酒者。欲其通行週身。使無邪不散也。此藥當服于未潰之先。未成者。散。已成者潰。若已潰後不可服有外感而行表散。如此害人最速

芍藥蒺藜煎　治通身溼熱瘡疹及下部紅腫熱痛諸瘡神効外以螵蛸粉敷之

龍膽草　梔子　黃芩　木通　澤瀉半錢　芍藥　生地二錢　白蒺藜連刺搗碎五錢甚者用一兩　如火不甚者宜去龍膽草梔子加當歸茯苓米仁之屬如溼毒盛者加土茯苓五錢或一二兩

當歸蒺藜煎　治癰疽瘡疹血氣不行邪毒不化內無實熱而痛腫淋漓者悉宜用之此與芍藥蒺藜煎相爲奇正也當酌其詳

當歸　熟地　芍藥酒炒　何首烏二錢　甘草炙　防風　川芎　白芷　荊芥穗一錢　白蒺藜炒搗碎三錢或五錢

或水或酒煎然水不如酒或以水煎服後飲酒數杯以行藥力亦可　陽虛不能化毒者加桂枝甚者再加乾薑附子　氣虛不化者加人參黃耆　毒陷不能外達者加穿山甲或皂刺

灸法　治一切癰疽惡瘡

凡人初覺發背欲結未結赤腫燬痛以溼紙覆其上先乾處即癰頭也取獨頭大蒜切片安于頭上用艾灸之三壯換一蒜片痛者灸至不痛不痛者灸至痛時方住最要早覺早灸爲上若有十數頭者即用蒜研作餅鋪頭上聚艾于上燒之若初發赤腫一片中間有黃粟米頭子便用獨蒜片安于頭上着艾灸十四或四十九壯使毒氣外出則易愈

芙蓉外敷法　見本草從新卷三下木芙蓉條

百草煎　治百般癰毒諸瘡損傷疼痛腐肉腫脹或風寒溼氣留聚走注疼痛等證無不奇効

百草　凡田野山間者無論諸品皆可取用然以山草爲勝辛香者佳冬月可用乾者不及鮮者力速須預爲採取之　右不論多少取以多煎濃湯乘熱薰洗患處仍用布帛蘸熨良久務令藥氣

蒸透。然後敷貼他藥。每日二三次不拘。但以頻敷爲善。蓋其性之寒者。可以除熱。熱者可以散寒。香者可以行氣。毒者可以解毒。無所不用。亦無所不到。湯得藥氣。則湯氣無害。藥得湯氣。則藥力愈行。凡用百草以煎膏者。其義亦以此。此誠外科中最要最佳之法。亦傳之方外人者也。若洗永鼓膨脹。每次須用二三十斤。煎濃湯二三鍋。用大盆盛貯。以蓆簟遮風。薰洗良久。每日一二次。內服藥消飲分利等劑。妙甚。

蟾蜍丸　治一切瘡癰惡毒。先服此丸。護膜。托裏成方切用瘍科卷十六　蟾蜍　九

使毒不攻心。或爲毒蟲蛇犬所傷。並宜服之。

黃蠟二兩　白礬一兩　先將蠟溶化。候少冷。入礬和勻爲丸。酒下。每服十丸。二十丸。漸加至百丸。則有力。瘡愈後。服之亦佳。加雄黃名雄礬丸。治蟲毒蛇犬蟲咬毒。

托裏十補散　局方卽外科精要十宣散

邪高痛下。瘡盛形羸。脈無力者。△癰疽不因膏深勞氣鬱者。止宜補形氣。調經脈。自當消散。不待开之下之也。

當歸　黃耆　人參　二錢　川芎　桂心　白芷　防風　厚朴　桔梗　甘草一錢　每服二錢。加玉六錢。熱酒調下。千金加芍藥連翹木香乳香沒藥亦名托裏散。治發背疔瘡。

參耆補氣。芎歸活血。甘草解毒。桂心白芷桔梗排膿。厚朴瀉實滿。防風散風邪。爲表裏氣血之成方切用瘍科卷十六　托裏十補散　托裏溫中湯　九

藥。其成助陽內托之功也。丹溪曰。冬月腫瘍用之。以桂朴之溫散。佐以防風白芷。吾恐雖有參耆。難爲倚伏。世人不分冬夏。無論經絡。不能無悞也。機要曰。治瘍須明托裏。疎通腠腑。調和營衛。三法。內之外者。其脈洪實。發熱煩躁。外無瘀赤。痛深于內。以絕其源。外之內者。其脈沉細。外顯。恐邪氣極而內行。當先托裏。內外之中者。外無瘀惡之氣。內亦臟腑宣通。知其在經。當和營衛。用此三者。雖未卽瘥。必無變證。

托裏溫中湯　治瘡瘍爲寒。變而內陷。膿出清解。皮膚涼。心下痞滿。腸鳴切痛。大便微溏。食則解逆氣短呃。逆不得安臥。時發昏憒。△此孫彥和治王伯祿臂瘍

方也。六脈沉微。色變膚涼。加以呃逆。胃中虛寒極矣。遂于盛夏用此大辛熱之劑。蓋拾時從證之變法也。

附子炮四錢　乾薑炮　羌活三錢　茴香　丁香　沉香　益智仁　甘草炙　陳皮一錢　木香錢半　生薑五片

衛生寶鑑曰。經云。寒淫于內。治以辛熱。佐以苦温。附子乾薑大辛熱。温中外發陽氣。自裏之表。爲君。羌活味苦辛温。透關節。炙草甘温。補脾胃。行經絡。通血脈。胃寒則嘔吐不下食。益智沉香丁香大辛熱。以散寒邪爲佐。瘡氣內攻。聚而爲滿。木香茴香陳皮辛苦温。治瘡散滿爲使。

托裏黃耆湯總錄　陰陽兩竭。宜大補氣血。

治諸瘡潰後膿多內虛。潰後膿出多。

黃耆　人參　當歸　桂心　茯苓　遠志　麥冬　五味子　等分爲末。每服五錢。食遠服。

人參黃耆補氣固衛。當歸桂心活血生肌。茯苓麥冬清熱補肺。遠志辛散。專理癰疽。澁澁健脾。五味酸温。善收腫大。丹溪曰。癰疽潰後。補氣血理脾胃。實爲至要。否則數月半年之後。虛證仍見。轉成他病矣。

螵蛸散　治溼熱破爛。毒水淋漓。等瘡。或下部諸瘡。無不神效。

囊足股腫痛。下部諸瘡。無不神效。以百草濃煎湯。乘熱薰洗。後以此藥澆之。如乾者。以麻油或熬熱豬油或蜜水調塗之。若腫而痛甚者。加冰片少許更妙。若溼瘡膿水甚者。加蜜陀僧等分。或煆過官粉亦可。

槐花散　治楊梅下疳神方。

凡棉花毒。或下疳初感。或毒盛經久難愈。用新槐花揀淨。不必炒。每食前。用清酒送下三錢許。早午晚每日三服之。服至二三升。則熱毒盡去。可免終身餘毒之患。亦無寒涼敗脾之慮。此經驗神方也。如不能飲。即用糜水鹽湯俱可送之。但不及酒送之功捷也。

棉花瘡點藥

杏仁取霜　眞輕粉等分爲末　敷瘡上二三日。即痂落。

又武定侯方

雄黃一錢半　杏仁三十粒去皮尖　輕粉一錢　爲末。以雄豬膽汁調敷之。二三日。即愈。天下第一方。

當歸補血湯加防風連翹方　治瘡瘍有血無膿
撥癢不止（有血無膿表氣不足也）
諸瘡屬虛虛者可補。
當歸　防風（二錢）　黃耆（五錢）　連翹（二錢）
當歸黃耆大補其氣血連翹解諸經之客熱防
風引歸耆直達于表二物得之而效愈速也（此藥
服之數劑諸瘡化毒生膿膿滿毒盡則去病根
而無溫瘧之患。○若膿日久不乾者去黃耆加
白朮茯苓以燥之如治爛瘡之法則善矣）

十全大補湯　治氣血虛弱頸面腹背皆瘡者（瘡
生于手足者爲輕生于頸面腹背者乃氣
血虛羸之甚小人道長之象故宜大補）

方見卷一上治氣血門四君子湯附方
四君同黃耆以大補其氣四物同桂心以大補
其血氣血得其補則腹背之瘡先愈而君子道
長小人道消矣。參苓白朮散亦可酌用（見補養門）

連翹金貝煎　治陽分癰毒或在臟腑胸乳肺膈
之間者此方最佳甚者速用數服無有不愈

金銀花　土貝母　蒲公英　夏枯草（三錢）　紅藤
（七八錢）　連翹（一兩或五七錢）　好酒二碗煎一碗服服後
次盛煩渴氣腫者加天花粉（若陽毒內熱或在頭項之間者宜用水煎
連翹歸尾煎　治一切無名腫毒丹毒流注等最
宜用之。

連翹（七八錢）　歸尾（三錢）　甘草（一錢）　金銀花　紅藤（四五錢）
好酒煎服如前　如邪熱火盛者加槐蘆二
三錢

降癰散　治癰疽諸毒消腫止痛散毒未成者即
消已成者斂毒速潰可愈若陽毒熾盛而疼痛
勢凶者先宜用此方其解毒散邪之功神效。

若堅頑深固者用後方。

薄荷葉（新者）　芽根　野菊花（連根葉各一握）　土貝母（減半）
右薄荷野菊乾者可爲末鮮者可搗爛同貝母
研勻外將芽根煎濃湯去渣用調前藥末乘熱
敷患處仍留前剩湯頓煖不時潤於藥上但不
可用冷湯冷則不散不行反能爲痛約敷半日
即宜換之眞妙方也

後方　凡疽毒堅頑深固及結核痰滯宜用此方。

生南星　土貝母　朴硝（等分）　薄荷（倍用）　石灰（風化者倍）

用或再倍用之　右同爲末用鹽湯杵稠粘敷患處經宿乾則易之不必覆頭若膿成者覆頭亦可或炒熱攤絹上隔絹貼之亦可或用麻油調或用熱茅根湯調亦可若欲止痛速效加麝香或冰片少許更妙

止痛當歸湯 總錄 治腦疽背疽穿潰疼痛

當歸　生地黃　芍藥　黃耆　人參　甘草　炙　官桂

當歸生地活血凉血人參黃耆益氣補中官桂解毒化膿毒化成膿則痛自止芍藥和脾酸以斂之甘草扶胃甘以緩之則痛自減矣齊得之曰世人皆謂乳没珍貴之藥可住疼痛不知臨病制宜非一端熱痛凉之寒痛温之風痛除其風濕痛導其濕燥痛潤之塞痛通之虛痛補之實痛瀉之膿鬱而閉者開之陰陽不和者調之經絡閉澁者利之惡肉敗潰者引之不可執一而無權也

吳氏醫學述第四種成方切用目錄
卷十二上
眼目門 正方一十九 附方六
人參益胃湯　雞子黃連膏方　圓明膏　兎矢湯　滋陰地黃丸　消風養血湯　金露散　補陽湯　益陰腎氣丸 方見補養門 駐景丸 加味駐景丸　定志丸 張子和定志丸方　地芝丸　眞人明目丸　防風飲子 神效明目丸 又法二百味草花膏　飛絲墜足　益氣聰明湯 見補養門

吳氏醫學述第四種

武原吳儀洛遵程輯　門人　周蘭九生庭　殷豫龍浩如同較

成方切用

眼目門

上目雖爲肝竅而五臟六腑之精氣皆注于目而爲之精精之窠爲眼骨之精爲黑眼血之精爲絡氣之精爲白眼肉之精爲約束裹撓筋骨氣血之精而爲之主筋之精爲瞳子上屬于腦後出于項中脈幷爲系上屬于腦故其證多而方亦廣此則眼之五臟六腑也故其證多而方亦廣茲錄數方以備採用其疏風燥溼瀉火養血之劑見于各門可以通用○目有五輪屬肺金故獨堅青睛爲風輪屬肝木丙包膏汁涵養瞳神目角大小皆爲肉輪心包相火小皆屬心君火大皆赤者爲實火小皆屬脾土土藏萬物故包四輪開動爲陽爲應用閉靜爲陰則睡矣目中有神膏此由膽中滲潤精汁積而成者能涵養瞳神有神水先天真氣所化潤澤之水也有神光原於命門通於心是火之用也有眞血肝中升運滋目經絡之血也有眞氣目之經絡中往來生用之氣也有眞精先後天之元陽也有眞液等而上貫于睛爲天之元陽也有眞精先後天之氣所化精汁起于腎施于膽而及瞳神也目有堅殼數重眞血滋神水神水包神膏膏中一點青瑩乃膽腎所聚之精華唯此一點鑒照萬物空洞無窮爲水輪屬腎水人之邪正壽夭貴賤皆可驗目而得之。

人參益胃湯　治勞役飲食不節內障目病

內障者睛裏暗與不病之眼無異惟瞳神內有隱隱青白者○東垣曰五臟六腑之精氣皆禀受於脾胃而上貫于目脾者諸陰之首也目者氣血之宗也故脾虛則五臟之精氣皆失所司不能歸于目矣心者君火也主神宜靜而安相火代行其令相火者包絡也主百脈皆榮于目既勞役運動勢乃妄行及因邪氣所幷而損其血脈故諸病生焉醫者不理脾胃及養血安神治標不治本不明正理也

黃耆　人參　甘草炙　白芍藥　黃檗酒炒　各一錢　五味子二十粒　麥門冬去心　陳皮　升麻　柴胡各三錢　生薑三片　大棗二枚

水二盅煎一盅空心服。

成方切用　卷三十八　人參益胃湯

參耆甘草大補中氣以强脾胃蔓荊升清陽而通九竅白芍入厥陰而和營血日得血而能視黃檗除溼熱而瀉相火婁全善曰治日不明氣虛而有虛無火連檗等涼劑不可施矣使精氣足而清陽升則藏腑和而障翳退矣

雞子黃連膏　治火眼暴赤疼痛熱在膚腠淺而易解者用此點之即可愈若熱由內發火在陰分者不宜外用涼藥非惟不能去內熱且以閉火邪也

用雞子一枚開一小孔單取其清盛以磁碗用黃連一錢研爲末摻於雞子清上以筯徹底連打沫得數百使成浮沫約得半盞許即其度矣安頓少頃用筯撥開浮沫傾出清汁用點眼眥

勿得緊閉眼脆擠出其藥必熱淚擁出數次卽愈　內加冰片少許尤妙　若雞子小而清少者加水二三匙同打亦可

羊肝丸　類苑　治目疾內障倪仲賢曰經曰心者五臟之專精目者其竅也五內挾心火爲勢妄行火炎不制神水受傷上爲內障此五臟病也諸脈皆屬于目相火者心包絡也主百脈上榮于目火盛則百脈沸騰上爲內障此虛陽病也膀胱小腸三焦膽脈俱循于目其精氣亦上注爲目之精四府一衰則精氣盡敗邪火乘之上爲內障此六府病也神水黑眼皆法於陰白眼赤脈皆法於陽陰齊陽佯故能爲視陰微不立陽盛則搖經曰壯火食氣壯火散氣上爲內障此弱陰病也四者皆爲陰弱不能酝陽也

夜明砂　淨　蝉蛻　木賊　去節　當歸　一兩　酒洗　以羊肝四兩煮爛搗用治肝經有熱目蚊食血之蟲夜明砂皆蚊眼也故能散目中惡血而明目蝙蝠食蚊而眼不化其矢爲夜明砂木賊輕揚而善磨木故能平肝散熱而去障蝉性善蛻故能退翳當歸能入厥陰養血而和肝用羊肝者羊性屬火取其氣血之屬能補氣血引諸藥入肝以成功也羊肝九之方頗多茲量錄其一二

濟生羊肝丸　黃連一兩　羯羊肝一具去筋膜生用搗爛和丸本事方煮爛搗用治肝經有熱目赤睛痛及內障青盲目全善曰誠哉河間之言皆由玄府閉塞而神氣出入升降之道路不通利也故先賢治目昏花如羊肝丸用羊肝引黃連等藥入肝解肝中諸鬱蓋肝主目肝鬱解則目之玄府通利而明矣黃連之類解熱鬱也椒目之類解氣鬱也芎歸之類解血鬱也羌活之類解經鬱也慈石之類解頭目鬱墜邪氣使下降也蔓青下氣通中理亦同也凡此諸劑皆治氣血鬱結目昏之法河間之言信不誣矣至于東垣丹溪用參者補氣血亦能明者蓋目主氣血盛則玄府得利出入升降而昏此則必用參者四物等劑助氣血運行而明也

圓明膏　東垣　治內障生翳及瞳子散大因勞心過度飲食失節柴胡　麻黃　黃連　生地　五錢　訶子　澀紙裹煨杵　甘草　二錢　歸身　三錢　以水二碗先煮麻黃至一碗去沫入後藥同熬至滴水不散去渣入蜜少許再熬點之柴胡麻黃發表散邪當歸生地和肝養血黃連清肝火甘草和中州瞳子散大故加訶子以收

之也。

兎矢湯 治瘡疹入眼及昏瞖障翳

兎矢二錢 茶清調或吞服須待瘡疹痊後服之

兎者明月之精得金之氣其矢名明月砂能解毒殺蟲故專能明目又可兼治勞疳也。

滋陰地黃丸 一名熟地黃丸東垣 治血弱氣虛不能養心。心火旺盛肝木自實瞳子散大視物不清心母肝為子能令母實故心火旺則肝木作實肝主風心主火躁子散大風火動搖之徵也水不能制火則清和之氣乘亂而精液隨之走散矣精液走則光華失故視物不清也。綱目曰心脈挾目系肝脈連目系手足少陽之脈絡于目外小眥風熱從此道上攻頭目致偏頭痛腫瞳子散大血虛陰弱故也宜涼滋陰地黃丸

熟地 一兩 酒洗 **生地** 一方兩半 酒洗五錢 **黃連** 酒炒五味子 地骨皮 天門冬 枳殼麩炒甘草炙人參二錢 **柴胡** 八錢 **黃芩** 酒炒 **當歸** 酒洗

熟地當歸養血。生地地骨涼血。黃芩瀉肺火。黃連瀉肝火。天冬清肺而滋腎。柴胡散肝而升陽。五味收耗而斂散。人參甘草以益氣補中。枳殼以利氣行滯也。

消風養血湯 治目赤腫痛風熱傷血則赤風作實則腫。風熱則痛。○目外向面者為外背上為外背下為內目痛赤腫從上下者為內近鼻者為內太陽證宜溫之散之從下上者為少陽證宜和解之。

荊芥 蔓荊子 菊花 桃仁去皮尖 紅花酒炒 川芎五分 當歸酒洗 白芍酒炒 草

決明 石決明 甘草一錢

荊芥防風麻黃白芷甘菊蔓荊輕浮上升。並能消風散熱桃仁紅花川芎歸芍辛散酸收並能去血活血則腫消風散熱除則痛止又目為肝竅瘀痛也保命集云目病在府則為表當除風散熱養血安神暴發者為表易

療久病者在裏難治

金露散 治目赤腫痛翳障諸疾。

天竺黃新者 **海螵蛸**不必浸洗 **月石**二兩 **硃砂**飛片子者佳煅童便淬七次飛淨八錢 **蘆甘**

為極細末磁瓶收貯每片少許諸目疾皆妙

若治外內瞖障取一錢許加珍珠八釐（須放豆腐巾蒸熟用）膽礬三釐（若爛弦風眼每一錢加銅綠飛）丹各八釐（如赤眼腫痛每一錢加乳香沒藥）各五釐

補陽湯　治青白目（茅陽不勝其陰則生目翳所謂陰盛陽虛則九竅不通乃陰埃障日之象也）

人參　黃耆炙　白朮炒　茯苓　甘草　陳皮　柴胡　羌活　獨活　防風　知母炒　當歸酒洗　生地酒洗熟地　白芍酒炒　澤瀉　肉桂去皮

參朮苓草黃耆陳皮甘溫益氣之品也固所以補陽羌獨柴防辛溫散鬱之品也亦所以升陽二地歸芍知母澤瀉乃陰分之藥亦所以濟夫羌防柴獨使不散其真陽爾用肉桂者取其辛熱熱者火之象可以散陰鬱辛者金之味可以平肝木蓋眼者肝木之竅也

益陰腎氣丸（東垣）　治腎虛目暗不明

方見卷二上補養門六味地黃丸附方

精生氣氣生神故腎精一虛則陽光獨治陽則壯火食氣無以生神令人目暗不明壯

獨治則壯火食氣無以生神令人目暗不明壯水之主以制陽光故用生熟地黃歸梢五味山萸澤瀉丹皮味厚之屬以滋陰養腎（滋陰則火自降養腎則精自生）山藥所以益脾而培萬物之母茯神所以升陽而致神明之氣于睛明之竅也（孫思邈云中年之後有目萬世之曠矣東垣此方其近之）

駐景丸　治肝腎陰虛兩目昏暗（目爲肝竅瞳子腑光屬腎故肝腎陰虛則目昏暗）

枸杞子　車前子二兩熟地黃五兩菟絲子八兩酒浸

蜜丸酒下

熟地枸杞補肝滋腎菟絲益精強陰車前利水而瀉肝腎邪熱也（車前子清肝明目利小便而不走氣以此瀉邪則補藥更爲得力張子和曰赤屬陰肝經風熱是厥陰肝經風熱）

加當歸五兩和氣血以益肝五味二兩斂耗散而助金水（能斂肺金滋腎水收攝神散大川）

定志丸（局方）　治目不能遠視能近視者（海藏曰目能近視者）

椒一兩補火以逐下焦寒濕名加味駐景丸

其有水。不能遠視。責其無火。法當補心。

遠志　菖蒲二兩　人參　茯苓　一兩　蜜丸。硃砂爲衣。張子和方。無菖蒲。加茯神柏子仁酸棗仁亦名定志丸。酒糊丸。姜湯下。安魂定魄。

人參補心氣。菖蒲開心竅。茯苓能交心氣于腎。遠志能通腎氣于心。硃砂色赤。清肝鎮心。心屬離火。火旺則光能及遠也。

地芝丸　東垣　治目能遠視不能近視　海藏曰。目能遠視。責其有火。不能近視。責其無水。法當補腎。

生地黃　天冬　四兩　枳殼　甘菊花　二兩　蜜丸。茶清或酒下。茶者。欲火熱之下降。酒者。欲藥力之上行。

生地涼血。生血。血天冬潤肺滋腎。枳殼寬腸去滯。甘菊降火除風。

眞人明目丸　治腎水虛竭。肝有風熱。目昏多淚。

腎主目之瞳子。腎水虛竭。則目昏。肝之液爲淚。肝有風熱。則淚出。

熟地黃　生地黃　川椒去目及閉口者。微炒　蜜丸。桐子大。每服五十丸。空心鹽飲吞下。

熟地所以補腎。生地所以涼肝。川椒味辛而熱。可以瀉肝腎之痺。又于空心以鹽飲吞之。宜其直達肝腎矣。病在標而治其本。可謂神于病情者。所以爲眞人之方與。江陵傅氏。目昏多淚。

家貧。潛紙爲業。性喜雲水。見必邀迎。一日有客方巾布袍過之。授以此方。服之不一月。目明夜能視物。

防風飲子　治倒睫拳毛。倒睫之故。也。蓋伏熱內攻。睛氣外行。當去其肉。熱併火邪。使眼皮緩。則眼毛立出矣。

黃連　炒　甘草　炙　人參　一錢　當歸　一錢半　葛根　防風　五分　細辛　蔓荊子　三分　服後避風寒溼熱。

參甘以補其氣。當歸以潤其血。黃連以清其火。防葛以散其風熱。細辛入少陰而潤腎。蔓荊走頭面而升陽。

除人參當歸黃連。加黃耆名神效明目湯　東垣　治目赤流淚。或痛或痒。晝不能視。夜惡燈光。

前證兼赤爛昏痛。冷淚多眵　眵音鴟。眼脂。又法摘去拳毛。以虺血點數次。卽愈。

二百味草花膏　趙謙　治目赤流淚。或痛或痒。晝不能視。夜惡燈光。

血熱則目赤。肝熱則多淚。熱微則痒。熱甚則痛。赤腫昏眵。故晝不

羯羊膽　蜂蜜　入蜜膽中蒸熟候乾細研爲
膏每含少許或點目中又法臘月入蜜膽中紙
籠套住懸屋簷下待霜出掃取點眼
羊膽苦寒益膽瀉熱蜂蜜甘潤補中緩肝曰二
百味草花膏者以羊食百草蜂採百花也時珍曰肝
開竅于目膽汁減則目暗目者肝之外候膽之
精華也故諸膽皆治目疾點服說云病有內外
治各不同內疾既發非服不除外疾既成非點
不退內疾始盛濬流不如塞源伐株不如去根
灌鏡垢須磨不點而去者未之有也若內障不
服而外點反激其火動其血氣無益反損若外
障已成雖服藥不發而所結不除當內外
兼攻方盡其妙

飛絲芒塵入目方

陳墨　濃磨點之

明目六事方

損讀書　減思慮　專內觀　簡外事　早起
晚　夜眼早

晉范寧常苦目疾就張湛求方湛書此六事仍
尾之曰右方宋陽子少得其術以授魯東門伯
次授左卯明遂世世相傳以及卜子夏晉左太
冲凡此諸賢並有目疾得此方之用烝以視火
下以氣篩蘊於胸中七日然後納諸方寸脩之
一時近可數其目睫遠可察夫簾垂長服不已
洞見牆壁之外非但明目乃亦延年許學士評
之曰審如是而行之非可謂之啣謊眞明目之
奇方也

目疾者戒沐頭宜濯足

此二句者先賢之格言也太極之道動而生陽
靜而生陰沐頭則上動矣必生陽而損目況夫
溼氣難乾乘風而梳拂不已則風溼襲于首而
併於目甚者至於喪明此沐頭之宜戒也然何
以宜濯足也足太陽之經根于足之小指端上
貫于睛明足少陽之經根于足大指岐骨間上
貫于瞳子窮足陽明之經根于足中指內間上
貫于承泣易曰水流溼火就燥若以温水濯其
兩足則頭目間之熱邪亦能引之而下況夫温
濯之餘腠理疏泄又足以溉瀉經中之邪是亦去
病之一助也故曰宜濯足

卷十二下
救急門 正方三十 附方二十三
六君子加天麻方 四君子加薑汁竹瀝方 獨參湯 五磨飲 方見氣門 治火酷薰鼻法 禮拜法
附子理中湯 方見寒門 生脈散加香薷方 脫陽脫陰 縊死 溺死
魘死 中惡 蠱毒 鹽滷毒 訛毒 諸菌 蠱毒及蟲蝕入腹 服鉛粉 蛇蟲犬齧傷 蛇傷三方 蜈蚣傷二方 壁虎齩 蝎子螫 瘋狗齩 常犬齩 湯泡傷 又法 刀斧傷 骨哽 魚骨哽 雜骨哽諸骨哽 誤吞銅鐵金銀 吞髮繞喉不出 頰車開不能合 呃逆不止 又方三方 舌脹滿口 乳蛾喉痺 又方 又喉閉 霍亂攪腸沙 鼻衄不止 又方 蟲入耳中 跌打損傷 產婦血運 產後子陽不收

武原吳儀洛遵程輯
門人 周蘭九生庭
周夢魁應元同較

成方切用

救急門

凡人以疾病死而得終其天年者雖之遭大如縊溺砒蠱蛇犬之傷小如骨哽刀斧湯火之害此等死者則非正命矣君子順受其正胡然而以非命歸耶茲採數方以備急用而臨用之際其要在隨證制宜以施活人手眼方爲應變之才爾

方見卷一上治氣門四君子湯附方

六君子加天麻方 治暴死

卒然而倒不省人事口噤吐沫風燥則筋急故命口噤吐沫風盛氣湧使然乃風來潮泗之邪故氣盛身體溫煖風爲陽邪氣盛故身體溫煖脈來虛大而正氣虛也

脈虛而以辛散之劑驅風則懾懾之氣必絕非其治也故用參朮苓草之甘溫者急固其氣復用半夏陳皮之辛利者以平其沫天麻之加定風邪爾

四君子加薑汁竹瀝方 治暴死有痰

方見卷一上治氣門若痰聲漉漉隨息潮至而聲者名曰痰厥氣已脫也不治

痰厥者。頑痰窒其清陽呼吸之道也。痰既塞之。氣欲通之。故令喉中有聲。經曰。壯者氣行。則愈怯者着而成病。故用參术芩草之温補者。以壯氣佐之。竹瀝薑汁以行痰。

獨參湯　行立之間。暴眩仆絶。喉無痰聲。身無邪熱者。陰虛陽暴絶也。此方主之。

人參二兩去蘆煎

陰陽之在人身。互爲其根。而不可離者也。若陰道虧乏。則孤陽無所依附。亦自飛越。故令人暴

仆眩絶。過不在痰。故無痰聲。病不因感。故無體熱。斯時也。有形之陰血不能急生。無形之呼吸。所宜急固。況夫陰生於陽。又太極之妙乎。故以獨參主之。取其爲固元益氣之聖品爾。

五磨飲子　治暴怒暴死。名曰氣厥。宜扶正坐使氣順。即稍安

再用皂角末吹鼻令嚏。

方見卷一上治氣門四磨飲附方

怒則氣上。氣上則上焦氣實而不行。下焦氣逆而不吸。故令暴死。氣上宜降之。故用沉香檳榔

氣逆宜順之。故用木香烏藥佐以枳實破其澼也。磨以白酒。和其陰也。若挾虛者。用四磨飲。

火酷薰鼻法

凡感臭穢瘴毒暴絶者。名曰中惡。不治即死。宜燒炭火一杓。以醋沃之。令患人鼻受醋氣。則可復甦。既甦。以薑香正氣散主之。

方見卷五上和解門

禮拜法

凡遇屍喪。翫古廟。入無人所居之室。及遊天地鬼神壇場。歸來暴絶面赤。無語者。名曰尸注。亦

曰鬼注。即中崇之謂也。進藥便死。宜移患人東首。使主人焚香。北面禮拜之。更行火酷薰鼻法。則可復甦。否者七竅迸血而死。

附子理中湯　腹痛。額頭黎黑。手足收引。脈來沉下。無氣以息者。中寒暴死也。腹痛病因。固有數種。但額頭黎黑。手足收引。脈來沉下。則中寒之驗也。所以無氣以息者。呼出主陽。吸入主陰。三陰受其真寒。則病不能吸。吸亡則呼不能。獨存矣。故令人暴死。此方主之。祛寒門薑附湯等方。俱可酌用。

方見卷六下法寒門理中湯附方

寒者温之故用附子乾薑乃人參白朮甘草所以生其呼吸之氣也進藥後更着艾灸其關元此內外交治之法是證也有死一日夜而治之復甦者幸勿因其危而輕棄之凡冬月凍死有氣者以灰炒熱盛囊中熨其心頭冷即易之若遽以火烘冷與火爭必死浴以熱湯亦死或用薑汁熱酒各半温服

生脈散方見卷七暑門加香薷方　人本陰虛復暑途倦困勞倦暴仆昏絶者此方主之人本陰虛則暑途則陽易亢加之饑困勞倦則陰益虧所以暴仆昏絶者一則陰虛而孤陽欲脫一則暑邪乘虛而犯神明之府也

用人參益元而固脫香薷辟邪而卻暑麥冬之清所以扶其不勝之肺五味之酸所以斂其欲脫之真凡人平素體氣不虧暑月道中中熱卒倒路上熱土圍臍令人尿其中即活薑湯童便皆可灌之或置日中或令近火以熱湯灌之即活切忌冷水及臥冷地正遠近火即死

凡男婦交感而死在男子名曰脫陽在女子名曰脫陰男子雖死陽事猶然不委女子雖死陰戶猶然不閉俱不治若男女不曾離能緊緊抱住以口接氣緩氣呼通開有得生者但臨時慌忙焉知料理所以多死　亦有夢中脫死者其陽舉其陰必泄尸容有喜色為可辨也皆在不救

縊死　切不可割斷繩索急用手畧衣物緊蓦穀道抱起解繩安放平正揪髮向上採其項痕捻圓喉管腳踹兩肩以兩管吹氣入耳內或刺鷄冠熱血滴口中男用雌女用雄鼻即氣轉再屈伸其手足將手摩之若氣不接將腰打三四拳或以皂角末搐鼻雖旦至暮身冷猶可活

溺死　急倒提出水用牛一頭令橫臥以腹合牛

背上牽牛徐行令吐出腹中之水以老薑擦牙無牛以鍋覆地將溺人臍對鍋臍俯臥以手托其頭水出即活或俯臥橈上腳後稍高鹽擦臍中待其水自流出或用皂角末綿裹納下部出水即活切忌火烘逼寒入內以致不救

魘死　如原有燈即得切忌火照但痛咬其腳跟或咬大拇指而唾其面或以皂角末吹入鼻中得嚏即醒

中毒　凡中蠱毒。令嘗白礬不澁。食黑豆不腥。卽是中毒。可濃煎石榴皮汁飲之。或熬茶化胆礬五分。探吐出惡毒。或米飲調眞鬱金末三錢。令下。　凡中砒霜烏柏樹根葉汁。或藍汁。令服。或刺羊血熱服。中鹽鹵毒。縱飲生豆腐漿解之。　中諸菌蕈毒服鉛粉　以麻油調蜂蜜。加飴糖與服。及蟲蜞入腹。黃土和水飲下之。　綠豆湯。甘草湯。能解百毒。

蛇蟲犬咬傷　凡惡蛇傷。急于傷處上下紮縛。使毒不散走。隨浸糞缸內。食蒜飲酒。令飽。使毒不攻心。或礬石甘草等分。冷水服二三錢。更搗蒜敷患處。加艾圓灸之。　百蟲毒敷　又方。五靈脂一兩。雄黃五錢。爲末。酒調。服淨。敷患處。又方。貝母爲末。酒調。盡醉飲之。頃久。酒自傷處。爲水流出。候水盡。以藥渣敷瘡上。垂死可活。　凡蜈蚣傷。取大蜘蛛放傷處。吸去其毒。急投蜘蛛于水中。令吐毒。以全其命。又方。鹽水洗淨。鷄糞塗之。　壁虎咬。用桑柴灰水煎數沸。濾濃汁。調白礬末塗之。　蜗子螫。用白礬半夏等分。醋調塗之。　外螫之物。切不可起。　凡遇一切毒蟲之物。切不可起惡念向之。亦不得殺之。若觸殺之。後必遭螫。愼之。　凡瘋狗咬傷。用番木鱉半個。碎切。斑蝥七個。去頭翅足。若過一日。加一個。糯米一撮。慢火炒脆。去斑蝥。取米研末。好酒調服。取下惡物。多日卤者。頭上有紅髮三根。抜去之。若仍卤。腹內有狗聲者。再加木鱉一個。斑蝥廿一枚。如前製法與服。　服後以黃連甘草湯解之。三月不可聽鑼鼓聲。再發則難治。終身不得食羊犬肉。稍輕者。急于無風處。揑去毒血。孔乾者。針刺出血。用小便或鹽湯洗淨。搗葱貼上。若常犬咬者。淨洗血水。用虎骨煆研敷患處。或爛嚼杏仁敷之。

湯泡傷　鷄子清。調大黃末塗之。炒黃檗末亦可。

刀斧傷　一法以冷燒酒澆淋甚妙。

骨哽　海螵蛸末傅之。血立止。古墻石灰爲末。亦可。金瘡血出不止。用原鼈蜈蚣炒爲末敷之。　凡魚骨哽。食橄欖卽下。如無鮮者。用橄欖

核磨水飲之（橄欖木作舟楫魚觸着即死物之相畏有如此者）又猫涎亦能下魚骨哽　凡鷄骨哽用野苧根搗爛如龍眼大鷄湯化下一足取其涎徐徐嚥下或用砌砂井花水洗化下或醋煎威靈仙嚥下（或加砂糖凡以類推如鷄鵝獺掌治魚哽慈石治針哽髮灰治髮哽虎犬治骨哽亦各從其類也）諸骨誤吞銅鐵金銀　但多食肥肉自隨大便而出吞針者煮蠶豆同韭菜食針菜自從大便下而出誤吞銅者食荸薺茨菰即化

噦逆不止　用紙撚刺鼻中得嚏即止

吞脹滿口　以生蒲黃末塗之（或加乾薑末）

乳蛾喉痺　凡乳蛾水漿不入先用皂角末點破再取杜牛膝汁和醋含嚥又法艾葉搗汁口含良久腫自消（冬月無葉掘根用之）又喉閉者取山豆根汁含嚥即開有藥不能進者急取病人兩臂捋數十次使血聚大指上以髮繩扎住捋指針刺指甲縫邊出血（指甲縫邊乃少商井穴）如放沙一般左右手皆然其喉即寬

霍亂攪腸沙　以針刺手指近甲處一分半許出血即安仍先自兩臂捋下令惡血聚于指頭後刺之

鼻衄不止　亂髮燒灰存性細研水服併吹入鼻中又方白及末新汲水調下又法紙數十層水浸溼安頂中以火熨之紙乾立止又法用線扎

中指中節左孔出血扎左指右孔出血扎右指兩孔出血則俱扎之又法以大蒜搗餅貼足心

蟲入耳中　以猫尿滴耳中蟲即出（以生薑擦猫鼻猫即尿）

跌打損傷　韭汁和童便飲散其瘀血骨折者蜜和葱白搗勻厚封酒調白及末二錢服

產婦惡露　卒時昏運藥有未及煎燒炭沃醋或以醋塗口鼻令酸氣入神收即醒或用破舊漆罐或乾漆燒煙熏之使鼻受其氣（產後血既脫去察其面白眼閉口開手冷脈微氣脫詩也速用人參一二兩急煎濃湯灌之）兒產後血

運。本屬氣虛。而血壅痰盛。亦有之。如果形氣脈氣俱有餘。胸腹脹痛上衝。血逆證也。宜用失笑散。若痰盛氣粗。宜二陳湯。如無脹痛氣粗之類。悉屬氣虛。宜大劑芎歸湯。八珍湯之類主之。

產後子腸不收　醋三分。冷水七分。和嘿其面。一嘿一縮。三嘿即收。又法。革麻仁二兩。搗膏塗頂心。收即去之。又法。皂角末吹鼻中。嚏作立上。

成方切用 元一 卷末 目錄

吳氏醫學述第四種成方切用目錄

卷末

勿藥元詮 正論二十六 附論四十八

上古天眞論 老子論 廣成子論 又老子論 方揚論 鬱眞人

昇 又上古天眞論 白樂天論 淮南子論 柳論

論 金丹大要論 張虛靜論 呂純陽論 胎息經

金丹 胎息銘 張紫陽論 李東垣省言箴 疏五

過論 龍虎經 經脈篇 陰

陽應象大論 釋氏戒慾論

又上古天眞論 四氣調神論 又上古天眞論

論陰陽應象大論 吳氏論 又四氣調神論 又四氣調神論

藏器法時論 又藏器法時論 又四氣調神論

古歌 老子論 晉道成長生養性論 蔣氏

蘇氏養生訣 李氏十六字訣 彭

南華經 王龍 勞心勞力 須調息

莊子 李東垣論 人

溪論 讀書家宜習養精力 小週天 道經六字

以保元氣 尤須愛養精力

生法 醫家

金一秤訣 金丹祕訣 按摩導引諸法 羅先生論

養生宜節飲食 瘧疾尤宜節飲 脾胃爲養生之本 草頭藥汁

痰飲痞積等證宜灼艾 素有濕熱飲食宜

不可服 蟲癇酒癉諸病初愈 藥時不可驟服滋補 僧論鄭子 元心疾

清勝 病中不可偏信師巫 問疾來者勿得 眞空寺老

武原吳儀洛遵程輯　門人　同邑殷豫龍　洛溪周蘭九
雲間周夢魁　同較
硤川倪希賢

成方切用

勿藥元詮

攝生尚元。非崇異也。生身以養壽。養壽以御病。病爲先。養身以御病爲惑。經曰。我命在我。不在于天。昧用者天。善用者人。人之所生。神依于形。形依於氣。氣存則榮。氣敗則滅。形氣相須。全在攝養。設早使氣衰而形無所依。神無所主。致殂謝爲命盡。豈知命者哉。

成方切用元本卷末

上古天眞論

夫胎息爲大道根源。導引宣揚要術。人能養氣以保神。氣浩則神爽。運體以御病。體活則病離。規三元養壽之方。絕三尸九蟲之害。丙宛中黃妙貞。外契大道元言。則陰陽運用。皆在人之掌握。豈特遐齡可保。卽元妙上乘。罔不由茲始矣。噫。願人之精進何如爾。

素問上古天眞論曰。上古之人。其知道者。法於陽和。法於術數。上古。太古也。道。造化之名也。老子曰。有物混成。先天地生。寂兮寥兮。獨立而不改。周行而不殆。可以爲天下母。吾不知其名。字之曰道。者是也。法。取法也。和。調也。術數。脩身養性之法也。言既法陰陽而又濟之以術數。蓋陰陽之道。逆之則災害生。從之則苛疾不起。此知道者必法則之。如下文所云者是也。飲食有節。起居有常。不妄作勞。故能形與神俱。而盡終其天年。度百歲乃去。飲食有節。節。則腸胃

爲漿以妄爲常。醉以入房。以欲竭其精。以耗散其
眞。多欲不節。則精竭。精竭則眞氣隨之而散。盡精
能生氣。氣能生神。神能生形。形全則能生
生者。必寶其精。精盈則氣盛。氣盛則神全。形神俱
強。老而益壯。皆本乎精也。廣成子曰。必靜必清。無
勞女形。無搖女精。乃可以長生。正此之謂。不知持滿。不時御神。持盈精如
恐其傾覆。四時調神。以
防災患。其不能
者反此。務快其心。逆於生樂。起居
無節。故半百而衰也。長心事過。終必爲殃。是逆于
生。衰也。起居無節。半百而衰。
天年也。老子曰。生之徒十有三。死之徒十有三。民
之生。動之死地。亦十有三。○樂音洛。○又曰。夫上古之
其今人之謂蚊。○一切四時之
上古天眞論

今時之人不然也。以酒
作勞。則血氣
年者。天畀之

成方切用　卷末

形勞而不倦。內機息。故少欲。外紛靜。故心安。物我
兩亡。起居有適。雖形
氣從以順。各從其欲。皆得所願。氣得所願。則自逸也。
從欲以不妄求。故無難得。故美其食。精盈皆甘也。任
其服。便美惡隨
其俗。與天和者。樂天之時。與
人和者。樂人之俗也。高下不相慕。其民故
曰朴。高忘其貴。下忘其分。兩無所慕。是以嗜欲不
皆歸于朴。知止所以不殆也。
能勞其目。淫邪不能惑其心。嗜欲人欲也。目者。精
視則嗜欲不能勞心。神既朴
而與元同。則淫邪不能惑。愚智賢不肖。不懼于
物。故合於道。無論恩智賢不肖。皆合養生之道矣。所
以能年皆度百歲而動作不衰者。以其德全不危
也。執道者德全。德全者形全。形
全者聖人之道也。又何危焉。○
古有眞人者。提挈天地。把握陰陽。呼吸精氣。獨立
者不假脩爲。天眞俱全。天地陰陽
唯其閑閑握持。其道法之神也。故通乎
氣。吸接於地。故
守神。肌肉若一。呼接於天。故通乎精。有道獨
外馳。故曰守神。神守于中。形全于
道。故曰肌肉若一。即首篇形與神俱之義。言不壞
也。○按精氣神乃人身之三寶。以形象
家得理諸論。採附于左。以形象
喬赤松。吸陰陽之氣。食天地之精。呼而出故。吸而
入新。方楊曰。凡亡于中者。求有不取足于外者也。
故善養生者守根。善養生者守息。此言養氣當從
呼吸也。○曹眞人曰。神是性。今若
烝自走。張虛靜曰。神若出。便收來。神返身中。烝自
囘。此言守神以養氣也。○淮南子曰。事其神者神
淡。省音
恬音
甜。儋音
杳。是以志閒而少欲。心安而不懼。

去之休其神者神居之。此言靜可養神也。金丹大要曰。炁聚則精盈。精盈則氣盛。此言精氣之互根也。○弄秘圖曰。坎爲水爲月。在人爲腎。腎藏精精中有正陽之氣。炎升於上。離爲火爲日。在人爲心。心生血。血中有眞一之液。流降於下。此言坎離之交媾也。○呂純陽曰。精養靈根氣養神。此眞之外更無眞。此言脩眞之要在于精氣神也。○胎息經曰。胎從伏氣中結。氣從母胎中息。氣入身來爲之生。神去離形爲之死。知神氣可以長生。固守虛無以養神氣。神行即氣行。神住即氣住。若欲長生神氣須注。心不動念。無來無去。不出不入。自然長住勤而行之。是眞道路。胎息銘曰。三十六咽一咽爲先。吐雜細。納唯綿綿。座臥亦爾。行立坦然。放於噎離。忌以腥羶。假名胎息。實曰內丹。非只治病決定延年。久行之名列上仙。此言養生之道在乎存神養氣也。○張紫陽曰。心能役神。神亦役心。心不動念。則心靜而神亦靜矣。

此言存神在心。而靜心在目也。又曰。神有元氣。精得無元精乎。蓋精依氣生。精實而氣融。元氣生。則元精產。此言元氣元神者。求精氣之初也。○李東垣省言箴曰。氣乃神之祖。精乃氣之子。氣者。精神之根蒂也。大矣哉。陰氣以成精。積精以全神。必清必靜。御之以道。可以爲天人矣。有道者能之。余何人哉。切宜省言而已。此言養身之道。以氣爲本。故號五過論曰。氣生神之理。夫生化之道。以氣爲本。故號五過論曰。氣有二。曰先天氣。後天氣。先天氣者。眞一之氣。氣化于虛。因氣化形。此氣自虛無中來。後天氣者。血氣之氣。氣化于穀。因形化氣。此氣自調和中來。此也。蓋精爲天一所生。有形之祖。龍虎經曰。水能生萬物。聖人獨知之。經脈篇曰。人始生。先成精。精成而腦髓生。陰陽應象大論曰。精化爲氣。氣化爲精。後天之氣。精化爲氣。氣散先天之氣。氣化爲精。後天之氣。精化爲氣。氣散先天之氣。氣化爲精。後天之氣。精化爲氣。氣散先天之

於世。而舉動則不欲觀於俗。以視於俗。則外而勞形。內而一想。不觀則無此患矣。**以恬愉爲務。以自得爲功。形體不勞。精神不散。亦可以百**歲。恬。靜也。愉。悅也。敝。壞也。不勞形。則身安內無思想。則心靜。恬愉自得。適心而動。內外俱有節。則外而形體不敝。內而精神不散。故○恬音甜。愉音俞。**其次有賢**人者。法則天地。之。次聖人者。謂之賢人。賢。善也。才德圓地方。天高地厚。天覆地載。天動地靜。乾爲天。乾者。健也。坤爲地。坤者。順也。君子之自強不息。安時處順。能包能容。可方可圓。可動可靜。是皆效法天地之道。**象似日月。**象。放也。似。肖也。日爲陽精。月爲陰精。月以夜見。日以晝明。日中則景。月盈則虧。賢人象其照臨。**辨列星辰。**辨。別也。列。分解也。二十八宿。爲星之綱。經有度數之常。緯有進退之變。

日月所會謂之辰。辰有十二舍之次。會當朔晦之期。次定四方之位。賢人則辨列之。**逆從陰陽。**逆。反也。從。順也。陽生陰死。陽主長。陰主消。陽主升。陰主降。升者其數順。降者其數逆。然易中有陰。陰中有陽。陰中有陽。亦順陽而在外。中有陰。則其支干而逆從之。賢人則因其節序。**將從上古合同於道。亦可使益壽而有極。時**將從上古。由敎以入道。亦可使益壽。但終有極盡之時耳。嗚呼。人操必化之權。託不停之運。鳥飛兎走。誰免之。獨怪其貪得者忘始。自棄者失時。時不待人也。若之何盡不及耳。回頭而效法乎賢人也。

素問四氣調神論

黃帝曰。春三月。此謂發陳。春月陽和發動。生有庶物。陳其恣容。故曰發陳。**天地俱生。萬物以榮。**萬物一於生發。**夜**

臥早起。廣步於庭。廣。大也。所以布發生之氣也。**被髮緩形。以使志生。**緩。和緩也。舉動和緩。以應春定而志生。是即所以使也。後放此。**生而勿殺。予而勿奪。賞而勿罰。**皆所以養生之德也。故殺。壞也。不勞形。則身安內無思想。則心靜。恬愉自得。適心而動。內外俱有節。則外而形體不敝。內而精神不散。故○恬音甜。愉音俞。**此春氣之應。養生之道也。逆之則傷肝。夏爲寒變。奉長者少。**逆。不順也。奉。承也。肝屬木。王於春。春火所養。故肝傷。肝傷則心火失其所生。故當夏令。則火有不足。而寒水侮之。因爲寒變。寒變者。承生氣而夏長者少矣。**夏三月。此謂蕃秀。**蕃。茂也。正所以養生氣者。**天地氣交。萬物華實。**歲氣陰陽盛衰。其交在夏。故曰天地氣交。斯時也。陽氣長於前。陰氣收成於後。故萬物華實。**夜臥蚤起。無厭於日。**起臥同於春時。不宜藏也。凡此應夏養長氣也。**使志無怒。使華英成秀。**長夏火土用事。怒則肝氣易逆。脾土易傷。故欲使志無怒。則華英成秀。華英。言神氣生疏泄。時令發揚。亦順陽而在外也。**使氣得泄。若所愛在外。**故所愛。亦順陽而在外。**此夏氣之應。養長之道也。逆之則傷心。秋爲痎瘧。奉收者少。**心屬火。王於夏。心傷則暑氣乘之。至秋而金氣收斂。暑邪內藏於是陰欲入而陽拒之。故爲熱。金火相爭。故寒熱往來。而爲痎瘧。夏長既逆。承長氣而秋收者少矣。**冬至重病。**痎瘧者。火病也。畏水也。**秋三月。此謂容平。**秋平而定也。故曰容平。**天氣以急。地氣以明。**風氣勁疾。曰急。萬物色清。曰明。**蚤臥蚤起。**

與雞俱興早臥以避初寒。使志安寧以緩秋形。陽日退陰寒日生。故欲令志安寧以避新殺之氣。收斂神氣使秋氣平。無外其志使肺氣清。使肺皆所以順秋氣。欲收斂神氣者。正此應秋氣收斂氣也。逆之則傷肺冬爲飧泄奉藏者少。肺屬金。王於秋。秋失所養。故傷肺腎屬水。王於冬。冬失所養。故飧泄。奉藏者少。傷則腎虛飧泄。飧泄收氣而冬藏者少矣。飧音孫　水冰地坼無擾乎陽。坼裂也。天地閉塞。故不可擾以泄陽氣。坼音策　蟄蟲伏若匿若有私意若已有得。皆所以法冬令。欲其自重。無妄動也。去寒就溫無泄皮膚使氣亟奪。汗也。陽氣在內。汗之則不密溫媛無身亦是如此。歸時紛擾則動皆能中節故開子以主敬爲本。其理一也。亟音棘　此冬氣之應養藏之道也。凡此順冬氣者正所以養藏氣也。

逆之則傷腎。春爲痿厥奉生者少。腎屬水。王於冬。冬失所養。故傷腎腎傷則肝木失其所生。肝主筋。故當春令而筋痛爲痿陽欲藏。故冬不能藏。則陽虛爲厥。冬藏既逆。承藏氣而春生者少矣。○天氣清靜光明者也。天氣唯清淨亦則象曜光明也人本一致也。藏德不止故不下也。聰明而神慧。天德不爽故日德。運而不止。故天之夢其陽德。運而不止。故能驗象於上。悠久而不下也。在人之身能純全其

陽則亦可以長生而不壞修身之士可不知所藏德乎。天明則日月不明。邪害空竅。惟天藏德。不自爲用。故日往月來。寒往暑來。以成陰陽造化之道。設使天不藏德。專其明。是大明見則小明滅。日月之光隱矣。晝夜所以大明之義。此所以不可不藏也。所喻之意。蓋謂人之本元不固。發越於外。而空竅疎則邪得乘虛而害之矣。空孔同　陽氣者閉塞。地氣者昌明。邪害空竅。不通陽氣閉塞矣。而地氣反上加於天。而昌蔽乎陽明矣。雲霧不精。則上應白露不下。霧者雲之類。露者雨之始。雲霧不精。則雲氣不下。而不升。雲氣不升。而雨露不降。此地氣上爲雲。天氣下爲雨。雨出地氣。雲出天氣。若上下不隔。而氣交通。不表萬物命。故不施。不施則名木多死。陽不生。陰不成。若上下不交。則陰陽乘而生化。惡氣不發。風雨不節。白露不下。則菀藁不榮。菀。鬱閉也。閉塞冒明也。風雨不節。即交通不表也。白露不下。亦上文所云者。菀菀藁不榮。抑菀枯藁。無所榮養也。菀。鬱同藁音縞　貶風數至。暴雨數起。天地四時不相保。與道相失。則未央絕滅。央。中半也。陰陽既失其和。則賊風暴雨數爲殘害。天地四時。不保其常。是皆與道相違。故凡稟化生氣數者。朔望之謂。順陰陽四時而不逆。從之謂。順陰陽四時而不逆。則身無奇病。萬物不失。生氣不竭。不逆地。無奇

病。謂無不變。疾瘧。痰泄。瘍之類也。萬物不失謂時生。一物勿殺。夏時使華英成秀。秋時綏於秋刑。冬時若閉若藏。若已有得。一身內猶萬物得所而無失也。生氣不相離。謂生長收藏。各得其養。其機生而不揭。謂生長收藏。各得其養。其機生息也。

逆春氣則少陽不生。肝氣內變。氣。春夏為陽。秋冬為陰。春夏主生長。秋冬主收藏。春令屬木。肝膽應之。藏氣法時論曰。肝主春。足厥陰少陽主治。故逆春氣。則少陽之令不能生發。肝氣被鬱。內變為病。此不言膽而止言肝者。以藏氣為主也。

逆夏氣則太陽不長。心氣內洞。夏令屬火。心與小腸應之。藏氣法時論曰。心主夏。手少陰太陽主治。故逆夏氣。則太陽之令不長。而心虛內洞。諸陽之病生矣。後放此。

逆秋氣則太陰不收。肺氣焦滿。秋令屬金。肺與大腸應之。藏氣法時論曰。肺主秋。手太陰陽明主治。故逆秋氣。則太陰之令不收。而肺熱葉焦。為腹滿也。

逆冬氣則少陰不藏。腎氣獨沉。冬令屬水。腎與膀胱應之。藏氣法時論曰。腎主冬。足少陰太陽主治。故逆冬氣。則少陰之令不藏。而腎氣獨沉。藏者藏于中。沉者沉于下。腎氣不蓄藏。則等病生矣。

夫四時陰陽者。萬物之根本也。各因時以受氣。夫陰根於陽。陽根於陰。陰以陽生。陽以陰長。所以聖人春夏養陽。秋冬養陰。以從其根。所以從其根也。今人有春夏不能養陽者。每因風涼生病。有秋冬不能養陰者。每因緩熱傷此陰氣。以致春夏多患火證。此陽勝之為病也。善養生者。宜切佩之。

故與萬物沉浮於生長之門。逆其根則伐其本。壞其真矣。萬物生長收藏。於四時聖人養陰陽。是與萬物浮沉於生長之門。

若不能養以從其根。則拔伐其本源。敗壞其真元矣。

故陰陽四時者。萬物之始。陰為終。四時陰陽之理。陽為始。冬為終。死生之序。春為始。陰為終。死生之道分言之。則得其陽者生。得其陰者死。合言之。則陰陽和者生。陰陽離者死。故為萬物之終始。死生之本也。

逆之則災害生。從之則苛疾不起。是謂得道。

苛疴同。苛疾病也。

道者聖人行之。愚者佩之。故能行之。愚者信道不篤。故但佩服而已。夫既佩之。已距無悟而尚稱為愚。今有井陰陽不知。而曰醫者。又何如其人哉。老子曰。上士聞道。勤而行之。中士聞道。若存若亡。下士聞道。大笑之。不笑不足以為道。正此謂也。

從陰陽則生。逆之則死。從之則治。逆之則亂。反順為逆。是謂內格。順四時陰陽以養身。而生長收藏。各得其道。又何者之不治乎。

反順者。反常也。為逆。逆者行逆也。內格者。拒格於天道也。言陰陽內外。皆相格拒也。是內性。格者。拒也。

聖人不治已病治未病。不治已亂治未亂。此之謂也。

此承前篇而言。二句是古語引之。以結言之。治未亂之防也。

夫四氣調神乃聖人未病之治。未亂之防也。

病已成而後藥之。亂已成而後治之。譬猶渴而穿井。鬬而鑄兵。不亦晚乎。

渴而穿井。鑄兵。無及于飲。鬬而鑄兵。誠哉晚矣。

而病不早為之計者。亦猶是也。觀扁鵲之初見齊桓侯曰。君有疾在腠理也。湯熨之所及也。在血脈。鍼石之所及也。在腸胃。酒醪之所及也。其在骨髓。雖司命無奈之何矣。後五日桓侯果作。使人召扁鵲。而扁鵲已去。桓侯遂死。夫桓侯

不早用福鵲之言。及其病深而後名之。是即渴而穿井。鬬而鑄兵也。故在聖人。則當用意於未病未亂之先。所以災禍不侵。身命可保。今之人多見病勢已成。猶然隱諱。及至不可爲。則雖以扁鵲之神。亦云無奈之何。而醫非扁鵲。又將若之何哉。嗟夫。禍始于微。危因於易。能預此者。謂之治未病。不能預此者。謂之治已病而已矣。

素問遺篇刺法論曰。所有自來腎有久病者。可以寅時面向南。淨神不亂。愿閉氣不息七遍。以引頸嚥氣順之。如藏甚硬物。如此七遍後。餌吞下津令無數 凡修煉性命者。嚥氣令腹中鳴至臍下。子氣見則天上返本還原。久餌之。令深根固蒂也。故嚥氣精者。名天池之水。資精氣血。蕩滌五藏。先漑元海。一名離宮之水。一名玉池。一名神水。

不可唾之。但可餌之。以補精血。可益元海也。○按人生之本。精與氣耳。氣能生精。精亦能生氣。氣聚精盈。則神王。氣散精衰。則神去。故修真諸書。無非聚精會神。凝氣成胎。煉精化氣。煉氣化神。煉神還虛。還虛合道。其要達其神理。胸膈腎明。精氣神三字而已。尤先於氣。故悟真篇曰。道自虛無生一氣。便從一氣產陰陽。又古歌曰。氣是添年藥。精爲續命芝。世上慢郎兼慢走。不知求我更求誰。盖以天地萬物。皆由氣化。氣存數亦存。氣盡數亦盡。所以生者由乎此。所以死者亦由乎此。此氣之不可不寶也。能寶其氣。則延年之道也。故吾道成論長生。養性之肯曰。其要在於存三。抱元守一。三者。精氣神其名曰三寶。抱元者。抱元守一者。神靈也。神在心。心有性屬陽。是爲南方丙丁之火。腎者能生元陽。爲眞氣。其眞氣之謂性命。爲三一之道。在於存想。下入丹田。抱守元陽。過三五年。自然神定氣和。功滿行畢。其道家護論備多。無非翻述本經精氣之說。篇蘇氏養生工夫。惟蔣氏調氣篇。其下手訣。李眞人長生十六字訣。皆得其法。足爲入門之階。如蔣氏調氣篇曰。天地虛空中皆氣。人身虛空中皆氣。故呼出濁氣。身中之氣也。吸入清氣。天地之氣也。人在氣中。如魚遊水中。魚腹中不得水出。人腹中不得氣出入。亦死。其理一也。善攝生者。必明調氣之術。當設密室。閉戶安牀。凝席偃臥。閉去耳目口鼻之氣。如前閉之。始而十息。或二十息。不可忍。漸漸腹滿。及閉之久。不可忍。乃從口細細吐出。不可一呼即盡。氣定復吸。亦如前閉之。如此七八十息以上。則臟腑胸膈之間。皆清爽。百病消滅矣。凡調氣之初。務要體安氣和。不可言之。狀其美。有不可言之。狀其快。其快其美。所閉之氣。漸漸消。則恍然復舊。此道以多爲貴。以久爲功。但能于日夜間行得一二度。久耳目聰明。精神完固。體健身輕

相見。注曰。右十六字。仙家名爲十六錠金。乃至簡至易之妙訣也。無分在官不妨政事。在俗不妨家務。在士不妨本業。只於二六時中。略得空閒。及行住坐臥。意一到處。便可行之。口中先須漱及三五次。舌攪上下腭。仍以舌抵上腭。滿口津生。連津嚥下。洞然有聲。隨于鼻中吸清氣一口。以意會及心目。寂地直送至腹臍下一寸三分丹田。丞海之中。略存一存。謂之一吸。隨用下部輕輕如忍便狀。以意力提起。使氣歸臍臍連及夾脊雙關腎門。一路提上。直至後頂玉枕關透入泥丸頂內。其升而上之。亦不覺氣之上。似前洞然有聲嚥下。鼻吸清氣。送至丹田。稍存一存。又自下部如前輕輕提上。與臍相接而上。所謂氣歸臍壽與天齊矣。凡嚥時口中有液愈妙。無液亦要洞然有聲嚥之。如是一嚥。或三五口。或七或九。或十二。或二十四口。要一提止。只要不忘。作爲正事。不使間斷。方爲精進。如有瘟疾見効尤速。久久行之。卻病延年。形體不變。百疾不作。自然不餓不渴。安健勝常。行之一年。永絕感冒。痞積逆滯。不生癰疽瘡毒等疾。耳聰目明。心力强記。宿疾俱瘳。長生可望。所謂造化吾手。宇宙吾心。功莫能述也。按此三家之法。當向晦時耳無聞。目無見。四體無動。心無思慮。如種火相似。先天元氣元神。停育相抱。眞意綿綿。老子曰。綿綿若存。開閤自然。與虛空同體。故能與虛空同壽也。世人終日營擾。精神困憊。夜間靠此一點靈光。盡爲後天濁氣所掩。是謂陽陷於陰也。李東垣曰。夜半收心。靜坐片時。此生發週身元氣大要也。凡勞心勞力之人。須隨時偷閒調息。以保既耗之元氣。蓋氣根于息。息調則氣調。氣調則身中無不流通。四達而百脈安和。神情清泰。雖勞不甚苦人矣。調息之法。端默靜坐。調和鼻中徐呼徐吸。任我自然。勿得作意思爲。着力太重。反使本來不息之眞窒而不利。讀書者必須養生法。不唯于身利。更于心利。學其要。莫先于心。心者。有云赤龍攪水泥。神水滿口勾者。皆言津液也。有云赤龍攪水泥。神水滿口勾者。皆言陽氣欲其自下而升。以溫元海三焦也。再如或曰龍虎。或曰鉛汞。或曰坎離。或曰夫婦。或云導引。或云栽接。跡其宗旨。無非此耳。雖其名目極多。而可以一言蔽之者。則曰出。少入多而已。醫道通仙。斯其爲最矣。

調息　調息一法。貫徹三教。大之可以入道。小用亦可養生。故迦文垂教。以目視鼻端白。數出入息。爲止觀初門。莊子南華經曰。至人之息以踵。王喆溪曰。古之至人有息無睡。故大易隨卦曰。君子以嚮晦入宴息。宴息之法。當向晦時。耳無

自然交利矣。然少暗之工有六。靜而勿躁。一也。疎遠房室。二也。常收此心于腔子中。三也。深夜勿寒勿餒。四也。行住坐臥。不忘調息。五也。每當日晡時。神氣昏陷。輒偷閑一憩。六也。醫者尤須加意調攝。愛養自家精力。精力不足則倦。倦生厭。厭生躁。躁厭相乘。則審脈辨證處方。皆苟且而無誠意矣。息欲救死全生。庸可期乎。今之醫者。鮮克不以奔競爲專務。徒勞苦而不自知。大戒也。

調息之法。不拘時候。隨便而坐。平直其身。縱任其體。不倚不曲。解衣緩帶。（腰帶不寬則上下氣不流通。）務令周適。口中吞攪數遍。微微呵出濁氣。（不得有聲。）鼻中微微納之。或三五遍。或二十遍。有津嚥下。叩齒數十。從十至百。數至數千。攝心在數。勿令散亂。如心息相依。雜念不生。則止勿數。任其自然。名曰隨息。隨息與息俱出復與俱入。隨之不已。一旦自住。不出不入。忽覺此身。從毛竅中。八萬四千。雲蒸雨散。諸病自除。諸障自滅。坐久愈妙。若欲起身。須徐徐舒放手足。勿得遽起。能勤行之。靜中光景種種奇特。道可明心悟道。（靜能生慧。）不但卻病延年而已也。（息有四相。呼吸有聲者。風也。守風則則結。不聲不滯。而往來無形者。氣也。守氣則勞不聲不滯。出入綿綿。若存若亡。神氣相依。是息相也。息調則心定。眞氣往來。自能奪天地之造化。息。息。歸。根。命。之。蒂。也。）

小週天　先要止念。身心澄定。面東跏坐。（平坐亦可。但前膝不可低。腎子不可着物。）呼吸和平。用三昧印。（指無名指。）按于臍下。叩齒三十六遍。以集身神。赤龍攪海。內外三十六遍。（赤龍。舌也。內外。齒內外也。）雙目隨舌轉運。舌抵上腭。（抵。閉。吸。也。）靜心數息三百六十週天畢。待神水滿。漱津數遍。用四字訣。（攝。抵。閉。吸。也。提。穀道。舌抵上腭。目閉。上視。鼻吸。）

呼。從任脈攝過穀道。到尾閭。以意運送。徐徐上夾脊。中關。漸漸速些。閉目上視。鼻吸莫呼。撞過玉枕。（頸骨後。）將目往前一忽。直轉崑崙。（頂。）倒下鵲橋。（舌也。）分津送下重樓。入離宮。（心也。）至氣海。（坎宮丹田。）略定一定。復用前法連行三次。口中之津。分三次嚥下。所謂天河水逆流也。靜坐片時。將手左右擦丹田一百八下。連臍抱住。放手時。將衣被圍住臍輪。勿令風入。（古云。養得丹田煖煖。得熱。此是神仙眞妙訣。）次將大指背擦熱。拭目十四遍。（去心肝火。）擦鼻三十六遍。（潤肺。）

擦耳十四遍。（補閉。）擦面十四遍。（脫。）雙手掩耳鳴天鼓。徐徐將手往上卻朝天揖。如是者三。徐徐出濁氣四五口收清氣。雙手抱肩。移筋換骨數遍。擦玉枕關二十四下。擦眼一百八下。擦足心各一百八下。

道經六字訣呵。呼。吹。音脆。嘻。音戲。噓。每日自子至巳。爲六陽時。面東靜坐。叩齒三十六通。舌攪口中。候水滿時。漱鍊數遍。分三口嚥下。（人一身之水皆穢。惟舌下華池之水甘淡。一秤金訣曰。噤下咽喉響。百脈自調勻。）以意送至丹田。微微撮口念呵字。呵出心中濁氣。念時不得有聲。反損心氣。卽閉口。鼻吸清氣以補心。吸時亦不得聞吸聲。但呼出令短。吸入令長。如此六次。再念呼字六遍以治脾。再念呬字六遍以治肺。再念噓字六遍以治肝。再念吹字六遍以治腎。再念嘻字六遍以治三焦。客熱。並如前法。謂之三十六小週天也。（詩曰春噓卽日木扶疎。呬。至夏呼。心火自閑秋呬。定收金氣潤。冬呵。唯要坎中安。三焦嘻。卻除煩熱。四季長呼。脾化食。切忌出聲聞兩耳。其功尤勝保神丹。）

金丹秘訣曰。一擦一鳴。左右換手。九九之功。氣陽不走。戌亥二時。陰旺陽衰之候。一手兜外腎。一手擦臍下。（丹田）左右換手。各八十一。半月精固。久而彌佳。凡大小便之時。咬緊牙齒。解畢方開。亦最能固精。

髮宜梳。面宜多擦。目宜常運。耳宜常彈。（將兩手心按兩耳以指彈腦。名鳴天鼓。）吞宜抵腭。齒宜數叩。津宜數嚥。濁宜常呵。清宜常吸。背宜常煖。胸腹宜常護。常摩。穀道宜常撮。肢節宜常搖。手心足心宜常擦。皮

膚宜常乾。沐浴。（即按摩也。）大小便宜閉口勿言。夜寢宜側。

羅先生曰。收拾一片真正精神。揀擇一條直捷路徑。安頓一處寬閒地步。共好朋友。洒泳優游。忘年忘世。俾吾心體段。與天地爲徒。吾心意況。共鳶魚活潑。其形雖止七尺。而其量實包太虛。其

齒雖近壯衰。而其真不減童穉。每讀一過。頓開無限心胸。勝服百劑清涼散也。（此下數條。無非教人勿藥之意。）

養生者固宜節食。尤宜節飲。食傷人所易知。飲傷

人都不覺不特茶湯漿酒以及冰泉瓜菓之傷
謂之傷飲即服藥過多亦謂之傷飲其見證也
輕則腹滿腸鳴爲嘔爲吐重則腹急如鼓爲喘
爲呃甚則緊閉牙關涎流口角昏憒不省人事
狀類中風患此証者滔滔皆是或未有識不得
不爲來者言之世俗謂病瘧之人忌茶忌藥否
特詞未之達耳所謂忌茶者非忌茶也忌茶湯
也忌藥者非忌藥也忌湯藥也蓋病瘧之人中
宫多滓若更過飲茶湯恣投湯藥則以滓助滓
鮮有不敗脾元而成中滿之候者孰謂恒言無
補于世哉

脾胃者養生家第一要具也不可使之熟生物熱
冷物軟硬物凡草頭藥汁最能傷脾敗胃斷不
不死胃氣終難可讓服胃氣虛者服之必死縱或
真誤中殺人之毒於頃刻間而莫之救者矣歷
有明驗之言之係人。

凡胸腹中有痰有飲有積有痞或脹或痛或酸或
慣或吐或瀉一二證時止時作經年不瘥者急
須猛意以圖全愈毋俟他日別病相加墊肘莫
措然治之之法則灼艾先而藥石次蓋灼艾之
功遠勝草根木皮萬萬也（唯陰血虧損者不可
再用艾火傷陰）灼

又後雖節飲食爲首務不
可變餐厚味致傷胃口

素有溼熱之人飲食之間最宜清勝若厚味釀酒
縱肆無節必多痰火癰疽卒中之患須戒之（凡癰
病痔病酒病瘧病。初愈時。斷不可服滋補藥
蓋此數病以溼熱爲原。滋補之藥乃助溼熱
尤者變爾服之。鮮不致害。

人當臥病務須常存退步心心能退步則天寬地
曠世情俗味必不致過戀于心可計日而起矣
不則今日當歸芍藥明日甘草人參是以江河
填漏扈雖多無益也先儒有言曰予臥病時常

於胸前多書死字每書數過頓覺此心寂然不
動萬念俱灰四大幾非我有又何病之足慮哉
雖然此唯可與達者言也（鄭子元由翰林補外
嘗笑僚無聊遂成心疾每疾作輒昏憒如夢或
發譫語有時不作無異平日或曰眞空寺老僧
不用符藥能治心疾往叩之老僧曰貴恙起于
煩惱生于妄想夫妄想之來其幾有三或追憶
數十年前榮辱恩讐悲歡離合及種種閒情此
是過去妄想也或事到眼前可以順應若乃畏
首畏尾三番四復循豫不決此是現在妄想也
或勘日後富貴榮華皆如所願或期功成名遂
告老歸田或期子孫登榮以繼書香夫不可
必成不可必得之事此是未來妄想也三者妄
想忽然而生忽然而滅禪家謂之幻心能照見
其妄而斬斷念頭禪家謂之覺心故曰不患念

起。唯患覺遲。此心若同太虛。煩惱何處安脚。又曰。貴恙亦原于水火不交。凡溺愛冶容而作色荒。禪家謂之外感。二者之欲。綿縲染着。皆消耗元精。若能離之。則腎水滋生。可以上交于心。至若思索文字。忘其寢食。禪家謂之理障。經綸職業。不告勿勤。禪家謂之事障。二者之障雖非人欲。亦損性靈。若能遣之。則心火不致上炎。可以下交于腎。故曰塵不相緣。根無所偶。返流全一。六慾不行。又曰。苦海無邊。回頭是岸。子元如其言。乃獨處一室。掃空萬緣。靜坐月餘。其病如失。

病中但可安分調攝。不可偏信師巫。殺害生命。不惟損貲造業。更使心志狐疑。溺情鬼窟。而切身珍愛之圖。反置勿問。愚孰甚焉。

凡有問疾來者。勿得與之相接。一人相接。勢必人人相接。多費語言。以耗神氣。心所弊者。又以憎而生嗔。甚或坐盈一室。聲起談風。縱不耐煩。又不敢直辭以去。嗟嗟病人力克幾何。而堪若此。恐不終朝而病已增劇矣。智者於此。休將性命。狥人情。

病加於小愈者。因小愈而放其心也。天下事。處逆者恒多易。處順者反多難。病當未愈而求愈。欲不得遽。志不得肆。凡語言動止。饑飽寒温。以及情性喜怒。無不小心翼翼。自然逆可爲順。而愈矣。則此心不覺自慰。保護漸疎。落口吻也。爽而煩惱也。廣應酬而不自知勞。且傷也。其病豈有不加者乎。因憶孟夫子生於憂。憂死於安樂之說。信不可不書紳而銘座右也。

有人素不服藥者。不爲無見。但須知得病從何來。當從何去。便是藥爾。如饑則食。食即藥也。不饑則不食。不食即藥也。渴則飲。飲即藥也。不渴則不飲。不飲即藥也。惡風知傷風。避風便是藥。惡酒知傷酒。戒酒便是藥。逸可治勞。靜可治躁。處陰以卻暑。就煖以勝寒。養于精者寡以慾。耗於氣者守以默。怙於神者絕以思。無非對病藥。惟人惟不自知爾。

周禮分醫為四有疾醫食醫瘍醫獸醫後乃有十三科而未聞走方之名也物原記岐黃以来有鍼灸厥後巫彭製藥丸伊尹創煎藥而未聞有禁截諸法也晋王叔和纂脉經敘陰陽內外辨部候經絡臟腑之病為最詳金張子和以吐汗下三法風寒暑濕火燥六門為醫之關鍵終未聞有頂串諸名也有之自草澤醫始草澤醫乃世所謂走方也人每訶詆之謂其遊食江湖貨藥吮舐行則類丐挾妓翹病貪利恣睢

心又類盜且剽竊醫緒倡為詭異敗草毒劑悉曰仙遺劑滌魘迷詫曰神授輕淺之疾或可貪天沉痼之灾烏能起廢雖然是誠有焉不可槩論也為問今之乘華軒繁徒衛者皆能識諸症知脈辨藥通其元妙乎則儼然我高冠竊虛譽矣今之遊權門享厚奉者皆能決死生達內外定方劑千全無失者乎則儼然踞高座侈功德矣是知笑之為笑而不知非笑之為笑也予幼嗜岐黃家言性尤好奇閱書自霊素難經而下旁及道藏石室考穴自銅人內景圖而下更及

太素奇經傷寒則仲景外編及金匱本草則細目外遠及海錄丹房有得輒抄忘倦不自知結習至此然聞走醫中有頂串諸術操技神而奏效捷以此獲食其徒侶多動色相戒秘不輕授又多一知半解罕有通貫者以故欲宏覽而無由焉宗子柏雲挾是術且老矣戊寅航海歸過予質其道皆有奥理不悖于古顧其方旁涉元禁瑣及游戲未免誇新鬥異為國醫所不道因取其所授手抄重加芟訂存其可濟于世合予平昔所錄奇方悉依原次彙成一編曰串

雅不欲泯其實也并矯奇而俾歸于雅使後之習是術不致為庸俗所詆忌殆亦柏雲所心許者昔歐陽子暴痢幾絶乞藥于牛醫李防禦治嗽得官傳方於下走誰謂小道不有可觀者與其亦善用斯術也可乾隆己卯十月恕軒趙學敏序

緒論

夫行醫周遊四方俗呼為走方其術始于扁鵲華陀繼之故其所傳諸法亦與國醫異治外以鍼刺蒸灸治內以頂串禁截取其速驗不計萬全也

手所持器以鐵為之形如環孟虛其中竅置鐵丸周轉搖之有聲名曰虎刺乃起于宋李次口次口走醫也行深山有虎齧刺于喉求拔之以咨置此器于虎口為拔其刺後其術大行名聞江湖祖其術者率持此器即呼虎刺云

三才藻異作虎撐

李容齋說今為次口

呂莊　緒論　一

所提藥囊曰無且囊云秦無且所用者鍼曰鈹鍼有小袋曰羅星袋有小尺曰分脈尺有藥點之鏡曰語魅有馬口鐵小箇用以取牙名曰折脆所作偽藥皆曰何首草藥曰夾艸持竿布賣膏藥曰貨軟作道妝僧服曰游方用鍼曰挑紅用刀曰放紅撮痧曰標印艾火曰秉離水調曰填冷與人治病曰打樁兩人合治曰攏工共分酬金曰破洞賺人財帛曰撈險曰出洞如此之類不能悉載畧舉一二焉

串莊　緒論　二

古汗吐下三法也然有頂中之串三中之頂藥更元妙用意入神則又不可以常格拘也

藥有常用之品有常棄之品之症有罕見之症走方皆收之病有常見難識症難非通乎陰陽察微妙安能使沉疴立回名醫拱手誰謂小道不有可觀者然則今之煦煦惟利是視言偽而辣開方則筆似懸槌臨症則昧昧是視言偽而辣開

日如柏炭直謂之醫奴可耳

藥有奇性不必醫皆知之而走方不可不知脉有奇

經不必醫盡知之而走方不可不知用奇乘間一時之捷徑也得心應手平日之熟練也古人出則行道入則讀書蓋醫學通乎性命知醫則知立命而一切沴戾不能中之可以却疾延年否則已身難免于危又烏能救人之危耶

醫本期于濟世疾能治則治之不必存貧富之見近率以醫為行業謂求富者莫如行醫于是朋黨角立趨利如騖入主出奴各成門戶在延醫者每以病試醫在醫病者又以藥試病兩相茫然迄無成

效幸而偶中則偽竊標榜走方之術類聚既非鄉里論道罕見精微惟各挾一長以遨遊逐食忌則相賊合則相呼如雀集之交謹詘莫定有似此者勿讀吾書

藥有最驗者曰丹頭即刮劑是也病除後必不可再用走方多挾此以博效人每詑奇絶此後再求餘藥則授以丸曰除餘疾也輒索高價不知此即市于藥肆中所棄根渣不論寒熱温和槩取而剉製為丸以賤售而貴取所謂撈爪是也有似此者勿

讀吾書

醫者意也用藥不如用意治有未效必以意求苟意入元微自理有洞解然後用藥無不立驗今則每持祖方為長技用而偶驗則留根不除俟再發而再獲也用而不驗則率用猛毒之藥以攻之所謂下殺手也在實症或間有轉機而虛人不旦立斃乎彼不知用意在平日羣居科諢入市招搖貪饕沉酗不知潛心理道者勿讀吾書

截法中有點金藥攔江網八面鋒如鯽魚霜中分散截骨移毒皆點金藥也黄雀丹青囊丸皆攔江網也兎金鯉鯪皆八面鋒也俱不可不知

走分于內科有變病法如約脾丸中之用木瓜露以閉溺竅掩月散中之用鯉脊鱗以遞瞳神取貝母中之丹龍睛以弛髓脈剔刺投中之連環骨以縮骨筋外科則用白硃砂以種毒蛇蕈灰以種瘡即九種十三根之類更有合扁豆膏以留癘愛陀酒以留癩甚則醉獸散之可以病馬牛金鍼丸之可

以困花木種種不仁愈降愈甚良由操技不精欲藉此遂其罔利之心耳余雖盡刪其法而不能盡絶其傳也故述其槩亦不可不知

凡例

一是編分内外二種首列其要次及其餘合之諸法畢備分之仍各有妙用有流別知所先後則近道矣

一醫方必分症類次茲則從法集方有一病而諸門俱入者以其各有治法槩其成其法也

一柏雲手抄有市語宗派神用運收一參言多不經且啟人漁利之私急為芟削間採一二入緒

論中以廣知焉

一頂串中截為走醫一大法以譬三才也末流輒妄定成数有九頂十三串七十二截等目每自誇于人輒曰某ニ得幾頂幾串幾截其法甚秘云罕有全知者不知以類統計詎止區ニ者余欲矜長良由濟世一端多ニ益善也外有九種十三根等法能拔骨髓諸毒外出然不肖瘍科每竊以取利種毒留根變小成大實則為利淺而受害深也寧棄而

不錄

一禁法之大莫如水法次則祝由茲錄其小者絶無妨于大雅其有近于巫覡所為者概在所擯

一方用单行奏功最捷藥有製品取效更神鍼灸輔藥力所不及也故列藥外百物又推思所宜及也故列醫外奇病所以備其法藥戲所以博其趣皆以神妙用而奏厥功也因並存之

一藥品尚真奚錄偽焉曰所以著奸也知其術始不受其愚而作偽者更無以巧取厚利殆猶刪詩不去鄭衛之意矧其中有可用者若假象皮膏之收口假乳香之定痛著效更捷於真亦方術所不廢也至若蒙汗麻藥等方予皆有之而不備錄者恐易以啟奸且已列腫聖整骨諸術矣何多贅焉

一取蟲為走醫第一要法而選元有起死回生之術無此二門則無由見神故並存不廢

一是書初著尚有靈穴經奇脈經靈車經識症論變症論及陽取陰取隔二隔三諸法當另為一編以問世

一是書採錄得於柏雲手抄者十之三養素園及江闌方本者十之三其一則傳於世醫者悉彙而成帙蓋筌蹄由始例得並誌焉

中雅内編總目
卷之一
截藥
總治門
黃鶴丹
鯉魚鮫丸
普濟丹
發汗散
仙桃丸

青囊丸
蜜犀丸
蓬萊丸
松梅丸
允金丸
餘糧丸
花蕊石散
紫陽塞鼻丹
截藥
内治門
通真子救苦丹
治傷寒結胸
宣本散
辟瘟丹
八仙丹
三黃丸
神仙太乙膏
半分散
拿瘧
升陰陽
截頭風

頭痛
痰火神方
保靈丹
治尸厥
膈氣暫開關方
坎離丸
解惡仙丹
安寐丹
鬼毒風氣
靈寶化積膏
蠶奩散
回癲湯
逐呆仙丹
啟迷丹
摩腰丹
威喜丸
蟲臟
分水神丹
靈寶化積膏
蠶奩散
回癲湯
逐呆仙丹
啟迷丹
摩腰丹
威喜丸
蟲臟
分水神丹
燒鍼丸
截癲
妝呆至神湯
起迷奇效湯
起痿神湯
貼腰膏
截臟
血臟
疝氣神方
鶴頂丹
時行痰嗽
六感丹
獨步散
起癈神丹
元德膏
治老人不寐
鴻火聖神湯
截酒積

千金不傳韋氏方　去鈴九
腹內龜病　逗蕖丹
鐵刷九　截瀉九
寧堂和暖膏　截水腫
截黃　截痢
加味綠礬九　貼目取翳
治目多淚　倣西洋眼藥
二百味花草膏　截障
開聾　耳聾開竅奇方補藥方

截藥
外治門　散毒仙丹
陰陽黃　癸背膏藥
一筆消　大提藥方
白霊藥　白降丹
四金剛　五虎下西川
離宮錠　坎宮錠
鐵井闌　代刀膏
生肌散　開刀麻藥
換皮麻藥　瘡毒
決膿妙法　立消散
霊異膏　千里光膏
萬寶代鍼膏又　吹消散
護心散　透骨散

通耳神丹　喉風閉塞吹喉藥
黑龍膏　永梅丸
中分散　仙傳急驚散
神穴丹　陳氏神效小紅丸
稀痘丹　梅花丸
換痘丹　釘胎丸
治傷寒　千金硝石丸
珍珠滾痰丸附接骨仙桃草

醉仙散
大麻瘋
乳香散
聚疔毒
瘭癧奇方
提氣湯
消瘭瘧痰核
神授五公散
破癭點藥
再造散
秘練楊梅瘡藥
取疔膏
消疔
生肌膏
三妙散
提瘧丹
三品錠子
治火丹
擦瘡成水
七製松香膏
破棺丹
諸般瘡疥加鍼法
截癬
日本國癬藥
飲瘤膏
治流方火方
點痣藥
點黑痣
透骨丹
松肉蔥白膏
拶傷
截骨神方
接骨至神丹
美首膏
治陰蝕
免喉内生蛾
治癜瘡
勝金丹
整骨麻藥
小金蓮
天下第一金瘡藥
陰囊爛盡
手足皸裂
治體氣方
痘後生翳
取箭鏃
黑髭仙方又
受打不痛
面黑令白
脚減
悅容丹
誤吞鐵石
足趾雞眼
治瘡二法
掃疥
諸瘡膠藥
一擦光又
小金絲膏
九熏丹
枯瘤散
治瘤
取痣餅藥
取牙鯽魚霜又
黑髭倒捲簫
取輕粉毒

卷之三
截藥
雜治門

紅玉膏
中河魷毒
白菓丸
神效乾丹
洗瘡立興神丹
養龜立大方
頂藥
巴霜頂
牛郎頂
竹木刺
虎傷
禿雞丸
內造白虎丹
仙方紅緞膏
展陽方
黃甲串
烏龍串
犀黃串
牽牛串
龍腦串
車螯串又
瀉腋氣
發背初起
絞腸痧
巴豆串
輕粉串
天一水
雙斗串
五香串
八寶串
腹脇痞
逐黃散
串
硫黃頂
輕粉頂
截瘧頂
金線頂
皂礬頂
吐盡
倒頑痰法
串藥
牛郎串
黑鹽頂
羊羔頂
三奇頂
砒霜頂
碧霞丹
灰蒂散
陰陽湯
御霜串
四寶頂
青綠頂
單方
總治門
金液丹
都梁丸
卷之四
單方
內治門
金粟丸
青藤膏
煖益膝
白虎丸
腰
神傳膏
雞子飲

白虎歷節風
乾血病
癆疾又
心疼
筋骨疼痛
哮喘又
酒積
積塊黃腫
洗眼中星

骨蒸勞病
治大風
卒心急痛
水腫
痰飲飲水
酒積酒毒
風眼赤爛
眼紅
睡起目赤

消渴飲水
止呃逆
治痢初起
夢泄
乳汁不通
烏紗驚風
小兒舌筍
狐臭
神仙外應膏

稀痘神方
單方
外治門
國老膏
消瘤酒
惡瘡打毒
壽星散
疔瘡
橫痃便毒

目生翳膜
驚風失音
小兒舌膜
鼻中肉墜
瀉鼻出涎
耳內腫痛
疹脹腹痛
痞塊
治痞積

喉風
咽中結塊
鼻血不止
噴嚏丸
耳鳴
風熱牙痛
暑天怕風
腸氣
盜汗

烏龍膏
止腫毒
快馬瘡
多骨瘡
起杖瘡疔皮
一切瘡疽

脫疽
諸瘡芻肉
瘧腫無頭
腋下瘤癭
乳瘧又
瘰疽毒瘡
鷲掌風
散毒
瘰核

串雅內編 總目

喉鷲
金瘡
金刃不出
乳岩又
火燒爛
湯火傷
水腫脚氣
一抹膏
疔瘡走黃
指生天蛇
棉花瘡
消癤
頭瘡生蛆
乳頭裂破
甲疽延爛
腿臂生瘡
洗癩頭
咽舌生瘡

十一

跌打損傷
擷撲欲死
被斫斷筋
火燒瘡
火燎傷
癬
口吻生瘡
肛門痔痛
蒿背陰毒
項下氣癭
單方
禁治門
誤吞銅錢
竹木刺眼
齒黃
小兒初生膚無
固齒灰
實女無竅
拔白換黑
食生米
飛絲入眼
嗜酒不已
禿髦髮稀
丈夫陰痿

十二

呂雅內編 總目

小兒鱗體
猘犬齕傷
百脚齕
蝎毒螫傷
毒蛇傷
婦人乳癰
面上黑氣
誤吞針刺
奇病
小兒陰被蚓吹腫
蛇虺齕
蜈蚣齕
誤食膝黃
精清不孕
截瘧
搽魚骨鯁

猴子痃
產後肉線
截腸怪病
灸瘡成蝶
血瘕怪病
臍蟲悞病
熱毒怪病
病笑不休
睛垂至鼻

山鞠散
髮癥飲油
米瘕嗜米
伐毛丹
眉毛動搖
筋肉化蟲
蟲出怪病
灸瘡出血
離魂
大腸蟲出
便後出血
脈溢怪症
蕩穢散
肉瘭怪病
活水止蟲丹
杜隙湯
救割全生湯
臂生人面
氣奔怪病
細縊結
頭腦鳴響
爛瘡生疽
石室秘丹
腹中生蛇
化蠱湯
體中蚓鳴
舌縮入喉
舌血
男子乳腫
指縫出蟲
糞門生蟲
黃雷丸
喉中物行
病蛾
蛇蟲
渾身燎泡
足釘怪疾
熱毒濕瘡
貓眼睛瘡
消指散
祛火丹
消濕化怪湯
掌高一寸
指甲盡脫
糞門出蛇
眼內肉線
手皮現蛇
病蝦
上水魚
惡肉毒瘡
肉錐怪病
走皮趨瘡
咽喉怪症
肉人怪病
脣瘡生齒
手足脫下
附錄緒論

錢塘趙學敏恕軒纂

截藥

總治門

黃鶴丹　乃缽衣翁在黃鶴樓所授故名

香附一斤黃連半斤洗曬為末水糊丸梧子大如外感香附一斤炒黃連半斤洗曬為末水糊丸梧子大如外感葱湯下內傷米飲下氣病木香湯下血病酒下痰病薑湯下火病白湯下餘可類推

青囊丸　乃郤應節真人遺母病方士所授

香附一斤炒黑藥五兩三錢署泡為末水醋煮麵糊為丸隨證用引如頭痛用茶下痰氣薑湯下血病酒下為妙

按飛霞子韓悉昔游方外治百病男用黃鶴丹女用青囊丸此二藥游方之祖方也

鯉鯪丸　治一切無名腫毒瘰癧尤效

歸尾五錢大黃　荊芥　桔梗　乳香灸　沒藥灸各二錢黃芩　連翹各三錢　防風　羌活各二錢五分　全蠍六錢蝉退二十个去頭　僵蠶二十五條　牛皮膠一兩土炒雄黃分用金頭蜈蚣四條去頭足　分作四樣法製一條用薑汁搽焙乾一條用香油搽焙乾一條用醋搽焙乾一條用酥搽焙乾再用川山甲四兩亦作四製一兩用紅花五錢煎湯煮焙乾一兩用牙皂五錢煎湯煮焙乾一兩用紫草卸五錢煎湯煮焙乾一兩用蘇木五錢煎湯煮焙乾共用為細末米醋打糊為丸每丸一錢二分硃砂一錢五分共為衣瓶收貯內放麝香五分以養之每服一丸滾酒送下未成內消已成出膿

神效

蜜靡丸　治半身不遂口眼喎邪語言不利小兒驚風發搐

槐花炒四兩　當歸　川烏　元參炒各二兩　麻黃　炙苓拌乳防風　薄荷　甘草各一兩　猪牙皂角去皮弦子炒五錢　冰片五分另研　先以前十味為末後入冰片和勻蜜丸

櫻桃大每服一丸小兒半丸細嚼清茶下

普濟丹　治一切瘟疫時氣惡寒發熱昏迷頭疼等症

大黃製熟一兩五錢　生大黃一兩五錢　僵蠶三兩　生薑汁搗糊為

九重九分七分五分三等遇瘟疫時症取無根井花水即井中取起不落地之水服之視人老幼強弱為多寡之數

蓬莪丸　治男婦老幼一切感冒瘟疫時症大人一丸小兒孕婦及吐血虛人只服半丸

蒼术八兩米泔浸炒　厚朴薑汁炒　陳皮去白炒　枳實炒　羌活　蘇葉　木通各四兩　山查炒　菜菔子炒各六兩　共為末新荷葉煎湯和藥晒乾加神麯六兩打糊為丸重三錢硃砂五錢雄黃一

兩研末為衣頭骨疼發寒熱葱姜湯下咳嗽痰喘薑汁湯下中暑香薷扁豆湯下瘡疾冲薑汁服紅白痢木香檳榔湯下霍亂吐瀉藿香砂仁湯下腹痛水瀉赤芍車前湯下飢悶陳皮木香湯下不服水土廣藿香湯下山嵐瘴氣蠱毒蠱積檳榔湯下諸症不識病原滾白水服忌食生冷麵食

發汗散　途路急用要藥

菉豆粉　麻黃　甘草各一兩　為細末每服一錢冷水送下即時汗出

松梅丸　健陽補中強筋潤肌大能益人用松脂以長流水桑柴煮拔三次再以桑灰滴汁煮之次拉拔更以好酒煮二次仍以長流水煮二次色白不苦為度每一斤入蒸地黃末十兩烏梅末六兩蜜丸梧子大每服七十丸空心鹽湯送下

仙桃丸　治手足麻痺或癱瘓疼痛腰膝痺痛或打撲傷損悶肭痛不可忍

生川烏去皮五靈脂各四兩　威靈仙五兩　洗晒為末酒糊丸梧子大每服七十丸至十丸鹽湯下忌茶此藥

常服其效如神

有黑白二種藥共十四兩

白丑黃者二兩去殼麄極細末　大黃二兩　川連三錢　雄黃二兩　膽星五錢　神麯六兩　金凡

黑丑生二兩去殼麄極細末　大黃二兩　蝦蟇極大者用一具　須要黃者　神麯七味　神麯五錢　黑丑炒黑者二兩去殼麄極細末

為黑丸用銀礬入內用油蓋蓋住鐵絲扎好外用炭火煅須要黃者以下五味不宜健行倘乃脹慕下注

出黑烟至黃烟為度放地上冷透出火毒勞開如墨者良如小者用兩具五月五日午時煅青黛二兩石膏一兩滑石一兩胡連三錢神麯五錢右二種凡藥俱用生研水法為凡如米粉大每歲各一

丸勻服早晚每進一次

餘糧丸　治脫力勞傷

皂礬八兩用紅醋二茶杯煅至通紅色放地上出火毒　餘糧石四兩醋煅七次砂仁四錢炒　姜汁炒黃豆甄四錢炒　厚朴四錢炒　廣皮三錢　乾漆一兩炒到煙盡　白芷二錢　川貝二錢　鐵梗二錢　茵陳五錢　海金沙一錢　益母草一錢　廣木香二錢　地骨皮一錢　各為末黑棗為丸燒服七分夜服八分重症每服一二錢好酒下症朝服七分夜服八分重症每服一二錢好酒下

此方不獨治腫脹如婦女乾勞產後朝涼暮熱男婦反胃噎膈腹痛小兒喫泥生米等物及積年虛黃脫力黃疸等症極重者服至六兩全愈孕婦忌服服此藥須忌河魨終身蕎麥當忌

八仙丹　家傳秘方不拘小兒百病皆治

巴霜一錢一硃砂五分麝金五分乳香二分沒藥三分沉香五分木香四分雄黃六分

右為末滴水為丸如粟米大每服二三丸隨宜引

驚癇發搐金子湯下潮熱變蒸燈心湯下傷風傷寒薑湯下痰涎勦黏薑汁竹瀝湯下食積肚痛山查麥芽湯下瘧疾燈心竹葉麥芽湯下痢疾泄瀉

薑汁湯下

花蕊石散　治一切金刃箭鏃傷及打撲傷損狗齕至死者急以藥摻傷處其血化為黃水再摻便活更不疼痛如內損血入臟腑煎童便入酒少許熱調一錢服立效畜牲抵傷腸出不損者急納入桑皮線縫之摻藥血止立活婦人產後敗血不盡血運惡血犇心胎死腹中胎衣不下至死但心頭溫暖者急以童便調服一錢取下惡物如豬肝終身不患血風血氣若膈上有血化為黃水即時吐出

或隨小便出甚效

硫黃四兩　花蕊石一兩　並為末拌勻膠泥固濟日乾瓦罐一个盛之泥封口焙乾安西方磚上磚上畫八卦五行用炭一称簇四邊從巳午時自下生火煅至炭消冷定取出為細末瓶收用

三黃丸　療男子五勞乂傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱瀉五臟火

春三月黃芩四兩　大黃三兩　黃連四兩　夏三月黃芩六兩　大黃三兩　黃連一兩　冬三月黃芩六兩　大黃三兩　黃連乂兩　秋三月黃芩六兩　大黃三兩　黃連一兩

月黃芩三兩大黃五兩黃連二兩三時隨時合搗下篩蜜
丸烏頭大米飲每服五丸日三不知增至七丸服
一月病愈久服走及奔馬人用有驗忌猪肉

紫陽真君塞鼻丹

沈木乳沒四味香牙皂華撥大良薑官桂細辛各
等分巴豆川烏好麝香又加雄黃硃砂等血竭硇
砂共裹勒丸頭一粒指頭大呼吸臭氣病離床心
疼肚痛塞鼻孔臟脹痧氣不須忙水泄痢疾時間
住牙痛見了笑一場赤白痢下俱瘥可渾身疼痛

即安康紫陽真君無慮語妙藥傳施普八方好將
一粒隨身帶途中百病亦無妨

神仙太乙膏　治一切癰疽瘡毒已未成潰者如發
背先以溫水洗淨軟絹刷乾用雄帛攤貼更為丸
冷水送下血氣不通溫酒下赤白帶當歸酒下咳
嗽及喉閉纏喉風並用新綿裹置口中嚼化一切
風赤眼担作小餅貼太陽穴更以山梔子打撲傷
外貼內服橘皮湯下腰膝疼痛貼患處鹽湯下吐
血衄血破湯下以蛤粉為衣其膏可收十餘年不壞

又治瘰癧並用鹽湯洗貼酒
爛尤效婦人經脉不通腹痛
經行痛止一切疥瘡用麻油
犬蛇蝎傷刃斧傷皆可服貼

元參　白芷　當歸　赤芍
地各一兩　麻油二斤入銅鍋內
二兩丹煎摘水捻軟硬得中
將痛加乳香沒藥製用法黃
用滾水一桶泡之再汲涼水

肉桂　大黃　生
煎濾去渣入黃丹十
即成膏矣腫毒跌撲
丹先炒紫色傾缸內
滿缸用棒常攪浸一

宿去水再炒如前二次方研
令細用

截藥

內治門

通真子救苦丹　治大人小兒感胃風傷寒

麻黃去根節洗淨晒乾兩研極細末溫水浸用細布取汁餘渣再搗再浸取汁必要潔淨細研極細末溫水浸一晝夜取出焙乾研末此藥髓有厚薄味有清濁故用水溫涼而多寡不同各味浸透濃釅精細共合一處細羅過篩再濾三五遍陰乾研醋糊為丸黍米大每服一丸雄黃五分研極細新汲水半盞調雄黃連藥送下用厚被蓋蹉處香燒三寸汗出即愈重者二丸即效製藥用庚申甲子日淨室中莫令雞犬婦人見之

半分散　治傷寒頭痛身痛發熱惡寒無汗

雄黃　南星　半夏　川烏　草烏　硃砂　丹加

一味號天麻薑葱酒調送下傷寒無汗被蓋之萬兩黃金無價

右藥共為末每服半分出汗如神

治傷寒結胸

瓜蔞一枚搥碎入甘草一錢同煎服之

食結在胸非大黃芒硝枳殼桃柳厚朴之類可能祛逐必浮瓜蔞始浮腦之入于脾中尤恐其過于下也少加甘草留之且浮甘草之和不到十分推蕩此變症而用變法真勝于用正也

拿瘧

黃丹五錢生用　白明礬三錢生用　胡椒一錢五分為末　麝香半分為末各為末臨發時對日坐定將好米醋調藥末男左女右傳手心外將絹帕緊紮待藥力熱方行出汗為度如無日脚下用火此藥一料能治三人年老怕服藥及弱者用之

宣木散　專散肝木中之火肝火既達則諸經中之火盡散

白芍三錢　柴胡二錢　丹皮二錢　元參三錢　冬三錢　荊芥三錢　生

地三錢梔子炒三錢防風一錢天花粉二錢水煎服
升陰陽　李東垣製補中益氣湯凡陽虛下陷用以
升提而陰虛下陷者不及令增之凡陰虛脾泄歲
久不止或食而不能化或化為溏泄以此方主治
方失載

辟瘟丹
以蒼术為君倍用羌活獨活白芷香附大黃甘松
三奈赤箭雄黃各等分為末麪糊丸如彈子大黃
丹為衣晒乾焚之

截頭風　治偏正頭風百藥不效一服便可天下采
一方也
香白芷二兩五錢炒川芎炒甘草炒川烏頭半生半熟
為末每服一錢細茶薄荷湯調下

頭痛　無治腦疼
川芎一兩炒蔓荊子二錢細辛五錢水二碗煎八分
加黃酒半碗調勻早晨服之一劑永不再發

鶴頂丹　治痰氣結胸不問陰陽虛實妙過陷胸瀉
心等藥

銀硃錢五明礬一兩同研以熨斗盛火无盛藥鎔化急
刮梳九每服一錢真茶入薑汁少許服之心主隱
隱有聲結胸自散不動臟腑不傷真氣明礬化痰
銀硃破積故也

痰火神方
牛黃　硃砂各一兩　氷片五厘　麝香三厘　將蝦蓂取膽和
前四味末藥收碾將古尖刺破點藥其痰即時下
行妙

時行痰嗽　面目浮腫終夕不寐
蚌粉少許加青黛用淡鹽水滴麻油數點調服三
錢

保灵丹　治蠱毒諸毒一切藥毒
大山豆根錢五雄黃一兩硃砂一兩研細
麝香　班蝥去頭足各二錢半　糯米半生半炒　赤足蚯二條一生一炙
川巴豆肥者取肉不續隨子生杵末二錢半
去油二錢半
右藥入乳鉢研細末和勻端午重陽臘日修合宜
避婦人及雞犬用糯米湯和丸如龍眼核大陰乾
磁盒收每一丸好清茶盡下不得嚼破須吞毒物

下藥丸凝血並下以水淨收可救三人

交感丹　治一切名利失意抑鬱煩惱七情所傷不思飲食面黃形羸胸膈諸症極有神效

香附末二斤用尾器炒令微黃為末一斤茯神去皮末四兩右為末煉蜜丸彈子大每服一丸空心細嚼白湯下或降氣湯下

附降氣湯　虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛

蘇子一錢五分　厚朴　陳皮　半夏　官桂　前胡各一錢

錢甘州五分　水二鍾姜三片煎服

治尸厥　凡見鬼者無治之

蒼术三兩切片水六碗煎三碗澆之盡必吐後即愈

獨步散　治心脾氣痛凡入胸膛軟處一點痛者多因氣及寒起或致終身子母相傳俗名心氣痛非也乃胃脘有滯惟此治之妙

香附米醋浸容炒為細末　高良姜酒洗七次焙炒　俟各對收用凝者姜二錢附一錢因寒者附二錢姜一錢因氣與寒者各等分和勻熟米湯入姜汁一起鹽一捻調下

立止不過七八次除根

腦氣暫開關方

荔枝一个將蛭蟠一條放在荔枝肉裏好仍放在荔枝殼內拷在蛭蟠上即將荔枝扎好即令病人含在口內有冷涎水滲出可徐徐嚥下俟一時許蛭蟠即化完亦無水拷出令病人連殼吐去即服一次可以立愈進飲食四五月但不可令病人知之恐其嫌穢不肯吃也

起癆神方　治癆病久不效服之神效

參冬各一兩熟地一斤玄參七兩五味子一兩水三十碗煎六碗早晨服三碗下午服二碗半夜服一碗一連二日必能坐起後改用熟地八兩參冬四兩元參三兩北五味三錢山茱萸四錢牛膝一兩水十碗煎二碗早晨服一碗晚服一碗十日即能行步一月即平復如舊矣

坎離丸　此藥取天一生水地二生火之意藥輕而功用大久服而取效速先賢王道之藥無出于此大能生精益血升水降火故能治虛損

當歸三全用好酒浸洗劉碎川芎大者用清水白芍温水洗淨劉碎一兩用好酒浸乾劉去毛與黃柏熟地黃八兩淮慶者佳厚黃柏去皮一兩用好酒浸乾炒仁壺二兩鹽水煮乾去二味共研為末蜜丸每日四十丸空心鹽湯下冬用温酒下

右六味修製明白和合一處平鋪三四分厚夜露日晒三日夜以收天地之精日月之華研細末用正冬蜜一斤八兩加水半碗共煉至滴水成珠再加水一碗煎一滾和前藥丸桐子大每服八九十丸

元德膏　治閨閫雷即昏倒不省人事此心氣怯也

人參　麥冬各二兩　五味子錢五用水一斗煎取五升煎取二升合熬成膏每服三匙白湯調水服盡一斤閨雷自若

解惡仙丹　治中惡中痰

人參錢三　茯苓錢五　天南星錢三　附子一錢虛人多加人參水煎服即甦

治老人不寐

六味地黃丸一料加麥冬四兩炒棗仁五兩黃連三錢肉桂五錢當歸三兩要家園自種者白芥子二兩共研為末蜜丸每日白滾水送下五錢服後用飯此方老人可常服可至百歲

安寐丹　治怔忡不寐等症

人參三錢　丹參二錢　麥冬三錢　甘草一錢　棗仁五錢　菖蒲一錢　當歸三錢　五味子一錢　水煎服

瀉火聖神湯　治各經之火

梔子　丹皮　元參各三錢　白芍五錢　甘草一錢　水煎服

心火加黃連一錢　肺火加黃芩一錢　胃火加知母一錢　黃柏一錢　大腸火加地榆一錢　小腸火加天冬麥冬各二錢　膀胱火加澤瀉三錢

鬼毒風氣

獨頭蒜一枚　和雄黃杏仁研為丸空心服飲下三丸靜坐少時當下毛出即安

戒酒積　治飲酒過度頭旋惡心嘔吐及酒積傷于胃閒遇飲即吐久而成癖

雄黃皂角子大六个巴豆連皮油十五个蝎稍十

十五个同研入白蜜五两半滴水丸豌豆大将乾入蜜内炒香将一粒放水内试之浮则取起收之每服二丸温酒下

靈寶化積膏　治積聚

巴豆仁　草麻各一百粒　五灵脂四两　阿魏化醋煮　當歸各一两　乳香法油炒　没藥去油各五錢　麝香三分　松香一斤半　芝麻油五两　除麝香松香阿魏乳香没藥外餘藥俱飲片浸油内三日用砂鍋煎熬藥焦黑色去滓入松香少煎一飯時再入乳香没藥麝香攪匀勿令枯用狗皮攤貼患處每日以熱鞋底熨令藥氣深入為妙

燒鍼九　鳳尾藥清鎮專墜吐逆

香取起入水中抽洗金黃色煎時以桃柳枝不住手攪勻勿令枯用狗皮攤貼患處每日以熱鞋底熨令藥氣深入為妙

黃丹不拘多少研細用去皮小紅棗肉九黃子大每用鍼簽于燈上燒過入乳汁下一丸

參蓋散　治山野人好醬蝕腹中生長遂成蝨瘕久則死

敗梳敗篦各一　各破作二分燒以一分用水五升煮取一升調服即下出

截癲　治失心癲狂

真鬱金二兩　明礬三兩　研為末薄糊丸如梧子大每服五十丸白湯下有婦人癲狂十年至人授此初服心胸有物脫去神氣洒然再服而甦此驚憂痰血絡聚心竅所致鬱金入心去惡血明礬化頑痰故也

回癲湯　治羊癲症忽然倒卧作羊鳴之聲口中吐痰如湧痰迷心竅因寒而成感寒則發也一劑全

愈永不再發

人參三錢　白朮一兩　茯神　茯仁各三錢　山藥　半夏各三錢　肉桂　附子各一錢　水煎服　此症得之小兒之時居多内傷脾胃外感風寒結成在胸膈之中所以一遇風寒便發舊痰令純用補正之藥不盡祛痰轉能去其病根也若作風痰治之雖亦奏功終不能一止而不再發

寐呆至神湯　呆病鬱抑不舒憤怒而成者有之蓋

人參　柴胡　當歸各一兩　白芍四兩半夏二兩甘草五錢
生棗仁一兩天南星五錢附子一錢葛蒲一兩神麯五錢茯苓
三兩薑金五錢水十碗煎一碗灌之彼不肯飲以雙手
執其頭髮兩人拿其左右手以一人托住下頦一
人將羊角去尖挿入其口一人以手拿其住頭一
人傾藥入羊角內灌之倘或吐出不妨益妙盡灌
完為至彼必罵詈罵少頃人困欲睡聽其自醒切勿
驚動使彼自醒則全愈驚醒則半愈矣
逐呆仙丹　呆病如癡默默不言如飢而慾默默如失

意欲癲而不能心欲狂而不敢有時瞤數日不醒
有時坐數日不眠有時將已身衣服密密縫完有
時將他人物件深深藏掩與人言則無語而神游
背人言則低聲而泣訴與之食則厭薄而不吞不
與之食則吞炭而若快此等症皆由痰氣若以尋
常二陳湯治之安得獲效

人參一兩南星錢五鬼箭錢三半夏錢一附子錢一
胡三錢白芍錢三菖蒲錢二丹砂末錢二先將前藥煎二椀
分作二服將丹砂一半調入藥中與病人服之彼
不肯服即以炭灸之彼必欣然服之索炭也不妨
仍與之炭第二服亦如前法則彼不若前之欣然
令人急灌之不聽不妨打之以動其怒氣怒則肝
木火起以生心反能去痰矣

愈矣

啟迷奇效湯　治癲癇經年不愈者

人參一兩南星錢五鬼箭錢三半夏錢一附子錢一肉桂錢一柴
胡三錢白芍錢三菖蒲錢二丹砂末錢二先將前藥煎二椀
分作二服將丹砂一半調入藥中與病人服之彼
不肯服即以炭灸之彼必欣然服之索炭也不妨
仍與之炭第二服亦如前法則彼不若前之欣然
令人急灌之不聽不妨打之以動其怒氣怒則肝
木火起以生心反能去痰矣

啟迷丹　治發厥口不能言眼閉手撒喉中作痰聲痰甚盛有一日即死者有二三日而死者因素有痰氣而發也

生半夏五錢五人參五錢五菖蒲二錢二鬼絲子兩甘草三分茯神三錢皂莢一錢生姜錢水煎服

起痿神湯　治痿症

元參一兩熟地三兩麥冬四兩山茱萸一兩沙參三兩五味子五錢水煎服

摩腰丹　治寒濕腰痛

附子尖　烏頭尖　南星　硃砂　乾姜各一錢　雄黃　樟腦　丁香　麝香各五分

右爲末麥烙九圓眼大每服一丸姜汁化開加厚粥烘熱置掌中摩腰上令盡粘著內烘綿布縛定腰熱如火妙間三日用一丸或加茱萸桂

貼腰膏　治腰痛

生姜一斤取汁四兩　真水膠一兩用煎成膏摩紙攤貼腰服甚效

蟲臌　小兒作痛四肢浮腫面色黃紅黑如蟲蝕之象眼下無臥蠶微腫之形此是蟲臌也

雷丸三錢當歸一兩鱉甲一兩醋炙地栗粉二兩鮮者取汁一茶甌　神麯三錢茯苓三錢車前子五錢白礬三錢水煎服

血臌　跌閃而血瘀不散或憂鬱而結血不行或風邪而血畜不發遂至困頓日留在腹中致成血臌飲食入胃不變精血反去助邪久則脹亡則成臌

流夢寐多驚頻亡遺泄婦人白濁帶皆除

黃蠟四兩白茯苓去皮四兩切塊用豬苓一分于器內同煮二十餘沸取出日晒不用豬苓右以茯苓末溶黃蠟丸彈子大每服一丸空心細嚼津液嚥下以小便清為度忌米醋

截臌　治水臌氣臌

活黑魚一尾重又八兩去鱗甲將肚剖開去腸入好黑礬五分松蘿茶三錢男子用蒜八瓣女又瓣共入腹內放磁器中蒸熟令病人喫魚連茶蒜喫更妙藥從頭上喫起病從頭上消從尾上喫起病在足上消立

水蛭三錢炒黑大約一兩
炒未用三錢當歸二兩雷丸三錢紅花
枳實　白芍　牛膝錢半三桃仁四十粒去皮尖碾爛
水煎服一服而下血斗餘再服血盡而愈

分水神丹　治水瀉
白朮二兩車前子錢五煎湯服之立效

疝氣神方　其病甚至氣上衝如有物築塞心藏欲死手足冷者三四服除根
硫黃火中溶化即投醋中去研細荔枝核炒黃為末各等分為末
飯丸桐子大每服十四丸酒下其疼立止目覺疼

甚不能支持畧用六丸不可多

千金不傳韋氏方　治疝及腎大如斗日三服除根
八角大茴香　青皮　荔枝核各二炒黃色烟盡
為度置土上以碗覆之少時取出研末每服二錢
無灰酒下清晨午後臨睡各一服

去鈴丸　治脾虛弱小腸疝氣神效
大茴香二生姜四連皮兩同入坩堝內淹一伏時慢火
炒之入鹽一兩為末丸梧子大每服三五十丸空
心鹽酒下

腹內龜病
詩云人間龜病不堪言肚裏生成硬似磚自死僵
蠶白馬尿不過時刻軟如綿神效

返魂丹　治五色諸病
零陵香草去根以蓋酒浸半月炒乾每兩入廣木
香一錢半為末裹急後重者用冷水服一錢半止病只忘生梨一
枚三四次用熱米湯服一錢半止病只忘生梨一服如神
味

鐵刷丸　治一切痢下初起一服如神

百草霜三錢京墨一錢半夏大分巴豆煮十四粒研勻黃蠟三錢同
香油化開和成劑量大小每服三五丸或四五十
丸薑湯下

截瀉丸　治一切久瀉諸藥無效服此一服自愈
黃丹飛過枯礬　黃蠟各一兩　石榴皮八錢炒　將蠟溶化
小銅杓再以丹礬三味細末投入乘熱為丸如豆
大空心服五丸紅痢清茶下白痢薑湯下

寧和堂暖臍膏　治水瀉白痢神效孕婦忌貼
香油一斤一方用麻油　生薑一斤切片搥爛布貼臍上　黃丹飛過半斤熬膏

有紅藥丸

附紅藥丸　硫黃三錢一方不用一母丁香錢麝香三分加獨頭蒜數枚一不搗如泥再入前三味研勻成桐子大飛過硃砂為衣毋丁香四粒麝香一分土木鼈一个研末噀津為丸如芡子大納臍中外用膏藥貼亦可治小兒痢

截水腫　遍身腫滿手按之仍起者是

葶藶炒四兩　為末棗肉為丸梧子大每服十五丸桑

皮湯下人不信試之自驗

截黃　治脾積黃疸

青礬四兩煅成赤珠子　當歸四兩酒醉浸七日焙百草霜三兩為末以浸藥酒打糊丸梧子大每服五丸至七丸溫水下一月後黃去立效此方祖傳七世

斷痢

木鱉仁六个研泥炙焦一个切作二分麪餅一个作兩半只用半餅作一劑納藥在內乘熱覆在病人臍上一時再換半个熱餅其痢即止遂思飲食

加味綠礬丸　治大小男婦黃病皂礬八兩用麪觔和作餅入皂礬在內火煨焦為度蒼朮厚朴姜汁新會皮甘草各八兩川椒炒去汁目右研為末用紅棗三斤煮熟去皮核胡桃三斤去殼同搗成膏和藥九桐子大每服七八十九酒服初服時覺此藥甘美服至病將愈反覺藥臭矣大率四兩藥可治一人

點目取翳

鷺不食草搗汁熬膏一兩炉甘石火煅童便淬三次

次三錢上等硃砂末一錢半熊胆二錢硇砂少許為末和作膏貼在翳上一夜取下用黃連黃柏煎湯洗淨看如有丹貼

治目多淚

鯽魚胆七个人乳一盞和勻飯上蒸一二次點眼其淚自收

仿西洋眼藥

豬苦胆取汁東丹拌勻加水片青黛各少許攪成條子能于盤中分墨市中賣者用此

二百味花艸膏　治目病面臉赤濕流淚或痛或痒
晝不能視夜不能見燈名爛緣風
羯羊膽去其中脂而滿填好窠拌勻蒸之候乾即
入瓶細研為膏以窠採百花羊食百草故名
截障　治眼中芽肉
蛇蜕一條　麻油三錢炒黃色　菉豆三合炒　砂糖一碗　共煎
七分食遠服立退二三年者可治兩服即愈
開聲
小蝎四十九个生薑如蝎大四十九片　同炒薑乾為度研為細
末温酒服之到一二更時再進一服至醉不妨次
日耳中如窪簧聲即效十年腎虛聾者服二服可
愈

耳聾開竅奇方
活鯽魚一尾不拘大小劈開取腦髓盛飯上蒸出
油来將茶匙挑滴入耳內數次自然開竅後服補
藥收功

補藥方
破故紙　黑芝麻　童便各一斤　火酒二斤

取右四味同煮乾取出晒燥再將黑芝麻同故紙
等共炒香乳故紙為末不用芝麻以老米醋打糊
為丸菉豆大每服二錢用杜仲炒去知母煎湯送
下服一半即效

通耳神丹
鼠胆一枚　龍盬一分　氷片　麝香　硃砂各半
潮腦分各半
右藥各研末人乳為丸如梧子大外用絲綿裹之
塞耳深處至不可受而止塞三日取出即耳聰永
不再聾

喉風閉塞
臘月初一取猪膽不拘多少大五六枚用黃連
青黛　薄荷　僵蚕　白礬　朴硝錢各五裝入胆
內青紙包了將地掘一孔方深各一尺以竹横懸
膽在內以物蓋定候至立春日取出待風吹去胆
皮青紙研末盛狀每吹少許神驗

吹喉藥　治急緋喉風乳蛾喉痺
白礬三錢　巴豆五粒去壳用鉄杓將礬化開投巴豆在內

攀乾了取出巴豆將攀狀貯過喉痛者以蘆管吹之

黑龍骨　治九種喉痺急喉纏喉風結喉爛遊毒乘飛燄入口

蝶重舌木舌舌腫出口

大皂角四十挺切水三斗浸一夜煎至一斗半入人參末半兩甘草末一兩煎至五升去渣入無灰酒一升釜煤二七煎如餳入瓶封埋地中一夜每温湯送下一匙或掃入喉內取惡涎盡為度後含甘草片

串雅內編　卷一　內治　三九

串雅內編　卷一

內治

水梅九　治喉痺十八種俱效

天南星五錢鮮者二十個切片　大半夏五十個鮮者佳切片　皂角去弦淨四兩

白礬　鹽　防風　朴硝各四兩　桔梗二兩　陳七分熟

梅子大者一百个先將硝鹽水浸一周時然後將各藥研碎入水拌勻方將梅子置水中其水過梅子三指為度浸七日取出晒乾又入水中浸透晒乾為度候藥水乾方將梅子入磁器密封之如霜衣起愈妙用時薄綿裹嚥口內令津液徐徐嚥下痰出愈一梅可治三人不可輕棄

中分散　治驚風定搐

螳螂一个蜥蜴一條赤足蜈蚣一條各中分之隨左右研末記男用左女用右每以一字吹鼻內搐之右即定左即左定

仙傳急驚散　治大人中風中痰服之立效濟人甚妙不可受謝

生石膏十兩辰砂五錢共研細末和勻大人每服三錢小兒一歲至三歲一錢四歲至七歲一錢五分八歲至十二歲二錢十三歲至十六歲二錢五分用

串雅內編　卷一　內治　三十

生蜜湯調下累用累驗

神穴丹　治驚風癇痌

紫色蛇黃四兩煅過　猪屎二兩小者泥固煅　鐵粉一兩　硃砂五錢麝香一錢為末糯米粉糊丸芡子大漆盆晒乾看之每丸有一小穴故名每服一丸薄荷酒化下立醒痌熱冷水化下

陳氏神效小紅丸　治小兒一切咳嗽驚癇發搐發熱齁喘痰涎上湧痰厥卒倒等症

全蝎去刺洗淨炒一兩　南星一兩　硃砂四錢半　珠子一錢巴豆霜

去沖淨二錢半右為細末糯米糊為丸如菜子大週歲者每服五十九二週者百九凡看小兒大小壯實用燈心煎湯送下此吳中陳氏治急驚風秘方也

赤豆黑豆粉草各一兩為末用竹筒刮去皮兩頭留節一頭鑿一孔以藥末入筒中用杉木塞緊黃蠟封固外以小繩繫之投入臘月厠中滿一月即取出洗淨風乾每一兩配臘月梅花片三錢和勻若得雪中梅花落地者不著人手以針刺取者更妙急用入紙封套內晝烘即乾兒大者用一錢小者五分俱以霜後絲瓜藤上小絲灰煎湯調空心服湯宜多服忌葷腥十二日僻出黑糞為驗一次可愈三次不出每年服一次

梅花丸　治小兒瘡瘍起死回生之病

臘月取梅花不計多少陰乾為一兩外用當歸一錢五分茯苓一錢升麻五分竹茹八分甘草三分水一鍾半煎八分至溫熱時將梅花拌浸一日取出晒乾研為末如小兒病用雄雞一隻帛起左足良久將竹鎗入雞喉內取血盞調梅花末為丸如菜子大滾水送下二丸即刻見功如小女兒病用老雌雞吊起右足取血製造晒乾以好磁器收貯不計遠年近日聽用此方濟人萬無一失小兒臨危任是毒甚畧有微氣用滾水送下不拘時只不宜多服

換瘡丹　凡瘡瘢如蚕種皮毛一片者服此毒便解即變換另發一層好瘡起死回生

犀角　梅蕊　煅灰各一兩　雄黃一錢　硃砂二錢　滑石一錢　麝香三分

右為末用麻黃膏丸如芡子大每服一丸酒漿化下

釘胎丸　治頻慣墮胎三四月即墮者于兩月前合此服之

杜仲八兩糯米煎湯浸透炒去煙為末以山藥五六兩為末作糊丸梧子大每服五十丸空心米飲下

治傷寒
糯米粽無粟者和滑石末砸成錠曝乾燒炭浸酒
去炭熱飲之不論七日內者即汗之日外者次日
汗
千金硝石丸　止可磨塊不令困人須量虛實
硝石六兩　大黃八兩　人參　甘草各三兩
石為細末以三年苦酒置器中以竹片佳準每入
一升作一刻先入大黃不住手攪使微沸盡一刻
乃下餘藥又盡一刻微火熱便可丸桐子大每服

三十丸服後下如雞肝米泔赤黑色等物為效下
後忌風冷宜軟粥調理
珍珠滾痰丸　治小兒痰塞心胸服之立效
牛夏三十粒　巴豆三十粒去殼　同牛夏煮待牛夏熟爛取
起去巴豆止用牛夏炕乾為細末米糊為丸如菜
子大用硃砂為衣晒乾用蘿蔔汁吞服之丸大人
倍之
接骨仙桃草　葉如石榴葉實如桃子內有小蟲真
取實連蟲用

金橘核　福橘核　畢澄茄
蒺藜大專治肝氣胃小腸疝重者兩服斷根

錢塘趙學敏恕軒纂

截藥

外治門

散毒仙丹　治瘡瘍銀花二兩生甘草一兩當歸一兩黃芩一錢蒲公英一兩乳香一錢

右為末先將前藥用水五碗將乳香末調飲之神效

消毒散　治癰疽癤毒及初生多骨疽

大黃一兩芙蓉叶晒乾為末一兩廣香二分冰片二分五倍子一兩藤黃三錢生礬一錢

右為末米醋調成如厚糊塗于多骨疽之四週中留一頭如豆大以醋調用鵝翎不時掃之若不掃任圍則無益一日夜即內消其餘癰亦以此數之

錦紋大黃不拘多少一半生用一半煨熟水甘草節等分為細末每服二匙空心溫酒調下一二服疏利為度

五毒丹　創于瘍藥谷孫知默一切癰疽無不神效

丹砂養血益心　雄黃長肉補脾　礬石理腎通骨液　磁石滋肝　膽治筋助肺　石鍾乳治肺　石膏治胃　石決明治肝　青礞石治痰　硫黃補命門　白礬治痰　硼砂治痰　硇砂治痰　水銀治痰　雌黃治痰　青鹽治痰　硝石治痰　朱砂治痰　雄精治痰　雲母治痰　金箔治痰　銀箔治痰　銅綠治痰　鐵粉治痰　鐵銹治痰　鐵落治痰　鐵精治痰　鐵華粉治痰　鐵漿治痰　鐵砂治痰　鐵屑治痰　鐵衣治痰　鐵鏽治痰　鐵花治痰　鐵液治痰　鐵水治痰　鐵汁治痰　鐵粉治痰　鐵末治痰　鐵塵治痰　鐵灰治痰　鐵渣治痰　鐵滓治痰　鐵垢治痰　鐵銹治痰　鐵花治痰　鐵液治痰　鐵水治痰　鐵汁治痰　鐵粉治痰　鐵末治痰　鐵塵治痰　鐵灰治痰　鐵渣治痰　鐵滓治痰　鐵垢治痰

右藥各等分入陽城罐鹽泥固濟煆煉取飛霜收用

發背膏藥　此方甚奇以千金得之用無不效

滴乳香四兩箬包燒出研碎去油淨沒藥照前式去油四兩　鮮油血竭四兩白色兒茶四兩上好銀硃四兩上好黃丹四兩上銅綠三錢

以上俱各另研無聲為極細末共一處臨時照患大小夾連四油紙一塊以針多刺小孔每張稱藥末五錢用真正麻油調攤紙上再用油紙一塊蓋上周圍用線將二紙合縫一處貼患上用軟綢紮緊自然止痛化腐生新過三日將膏藥翻過用針照前多刺小孔貼之因藥品甚貴取其又得一面之藥力也無火之人內服十全大補湯有火之人內服

陰陽黃　治發背癰疽疔瘡惡癤一切無名惡瘡腫毒燃熱疼痛初起未潰者

神效

減去肉桂薑棗煎服熟以飲食滋補無不取效至重者用膏二張百無一失

大黑虎膏　癰疽發背跌撲損傷折骨疔瘡並皆治之

白芷　大黃　黃連　白芨　白歛　黃芩　木鱉　黃柏　羌活　獨活　金毛狗脊　杏仁　當歸　芍藥　肉蓯蓉　生地　前胡　柴胡　肉桂　荊芥穗　黃芪　連翹　防風　草蔴子各一兩　乳香　沒藥　血竭各一兩　樟腦　血餘各四兩　香油三斤　飛丹一斤　麝香三錢　梔柳枝各二兩

右乳香等細藥另研聽用餘藥入油熬黑枯色濾去渣再熬滴水不散入飛丹以梔枝不住手攪入水和軟不斷不粘住火入乳沒血竭三味次入樟腦麝香攪勻收用攤貼一筆消

雄黃二兩　麝香三錢　藤黃一兩　人中白五錢　硃砂二錢　蟾酥一兩

白芨二錢　生白礬二錢　共研末用廣膠二錢烊化和藥末為錠遇毒用此藥磨醋水塗之

移毒方　凡毒在緊要處移在閒處庶不傷命

地龍裝在絲霜然依內煅搭焦連依為末每依末三錢入麝香二分乳香　沒藥各五分雄黃錢一蟾酥一分黃蠟兩一共為末蠟九每服三分上部要處甘草麻黃桂枝煎酒下即移在左手上而散如在背上羌活防風姜煎湯下移在臂上如下部木依牛膝雲仙陳皮煎湯移在足下神效

太提藥方　用數初起對口發背惡疽四五日即消

雄黃　藤黃　真當門子各一錢　硃砂三分　草麻子肉三錢　紅昇藥一錢五分　如用一錢則藥緩難效　先將草蔴子研如泥後和各藥研爛用象牙匣封藏外用虎皮包好則不泄氣

黃提藥方　治一切惡毒未成可消已成用之化腐疔毒更妙

麝香　雄黃各一錢　牛黃　蟾酥　硃砂　麝香　冰片各五分　巴豆肉八錢　草蔴肉各一錢　研末振磁遇症放膏藥上少許貼之

白霣藥

蘆甘石一兩黃連一錢黃柏　黃芩各二錢將甘石放銀罐內燒紅收汁約九次以甘石酥為度晒乾研細加水汁五分治口碎點眼甚妙加珠子少許治下疳可生肌長肉凡有熱毒配三白昇藥人乳調數立愈

紅昇藥　治五靈昇藥

水銀　白礬各五錢　雄黃各二錢五分　火硝八錢右照昇藥法昇之凡一切無名腫毒如潰久內敗四邊紫色黯色將靈藥水調研細以雞毛掃于黯肉上立刻紅活死肉脫去再上生肌散即收功凡通腸痔漏將此藥以紙捲成條插入管內七日其管即隨藥條脫去

白降丹　治夏冰對配丹

水銀　淨火硝　白礬　皂礬　炒白鹽各九錢　煉法將藥共研至不見水銀星盛于新大傾銀罐內以微火溶化大急則水銀上昇走爐須用炉炭為妙熬至罐內無白烟起再以竹木枝攪之無藥屑攪起為度則藥吸于罐底謂之結胎成用大木盆一个以木盆內水及鉄盆之半腰為度然後將前結就之胎連罐放于鉄盆內之居中以鹽水和黃土封固罐口勿令出氣出氣即走炉將用淨水灰鋪于鉄盆內及罐腰將灰按平不可枉動約罐恐傷封口即要走炉鋪灰畢取燒紅炭攢圍罐底用扇微扇煉一炷香謂之文火再畧重扇一炷香謂之武火炭隨少隨添弗令間斷而見罐底再煉一炷香即退火待次日盆灰冷定用帚掃去盆灰并將封口土去

淨開看鉄盆內所有白霜即謂之丹將磁瓶收貯待用愈陳愈妙其罐內原胎研粉癬癩神效若恐胎結不老罐放盆內一遇火煉胎落鉄盆便無丹降亦為走炉法用鉄絲作一三脚小架頂炉內撑住丹胎最為穩要此丹如遇癰疽發背疔毒一切惡瘡用一厘許以津唾調點毒頂上以膏藥蓋之次日毒根盡拔于毒頂上結成黑肉一塊三四日即脫落再用紅昇藥數次即收功此丹用蒸粉糕以水少潤共和極勻為細條晒乾

收竹筒內名為錠子尼毒成管即約量管之深淺
插入錠子上蓋膏藥次日擠膿如此一二次其管
即化為膿管盡再上昇藥數次即收功矣此丹比
昇丹功速十倍但性最烈點蟲甚痛法用生半夏
對攪再加冰片少許能令肉麻不痛

五寶霜　治癰疽楊梅諸瘡

水銀一兩　硃砂　雄黃各二錢半　白礬　綠礬各二兩半研勻
勻碓感灯盞蓋定鹽泥固濟文武火煉升罐口掃
收每以三錢入乳香沒藥各五分酒太乙膏上貼

之絕效

四金剛　治無名腫毒

銀花一兩　生甘草二錢　當歸八錢　黃芪錢五　用水一碗煎酒
一碗合煎空心服

五虎下西川　治無名腫毒癰疽瘡發背等症三日即
愈神方

川山甲炙研　白芷　當歸　生地各三錢　黃酒
二碗或酒水各半煎一碗服在頭面上者加川芎
五錢身體中者加杜仲五錢在兩腿者加牛膝五

錢在肢臂手足者加桂枝五錢

雞宮錠　治無名腫毒

蟾酥　血竭　膽礬　硃砂各三錢　京墨一兩　麝香一錢
五分各研末和勻入糊研極勻作筋粗寸長錠晒乾
清茶研敷

坎宮錠　治一切赤熱腫痛并痔漏諸毒用冷水磨
如墨以筆掃藥塗之立愈

京墨　熊膽　胡連　兜茶　牛黃各三錢　氷片一錢
麝香五錢研末用猪膽汁加生薑大黃水浸取汁釀
醋各少許相對和藥為錠

鐵井闌　治癰疽腫毒

重陽前芙蓉葉研末端午前蒼耳燒存性研末等
分麥水調塗四圍其毒自不走散故名鐵井闌

代刀膏

桑木灰一斗　礦子灰五錢　蕎麥稭灰　茄科灰各一兩　放
鍋內水五碗滾十數次用布袋濾去渣將水從新
用鐵杓熬一小杯存用如腫毒數日內有膿不得
自破其頭如瘡大者將此藥在頭上畫一十字即

出膿諸般大瘡有疔角腐肉不脫者用此藥水洗之即去又點面上黑痣准斑神效

生肌散　治海龍粉

龍骨　血竭　紅粉霜　乳香　沒藥　海螵蛸　赤石脂各一分　嫩石膏二分為末敷上極效

大凡生肌散內要配紅粉霜若要去腐肉每一兩配入粉霜或三分五分如治下疳等瘡每兩配一二分

開刀麻藥

串雅內編

川烏　草烏　半夏　生南星　蟾酥各一錢　番木鼈　白芷　牙皂各三分共為末臨時水調敷一飯方開刀不疼

換皮麻藥　凡癮疹去皮之瘡癬先服此藥使其不知然後開刀糝生肌藥

羊躑躅三錢　茉莉花根一兩當歸一兩菖蒲三分水煎服一碗即人如睡寢任人刀割不痛不瘡換皮後三五日以人參五錢生甘草三錢陳皮五分半夏一錢白微一錢菖蒲五分茯苓五錢煎服即醒

陽毒陰毒一服立消已潰者即飲

金銀花四兩蒲公英一兩當歸三兩元參一兩水五碗煎八分肌服一劑盡化為無有矣切勿嬉其藥料之重減去分兩則功亦減半矣

決膿妙法　治癮膿不出

人乳汁和麴數之比曉膿盡出不可近手

立消散　治便毒癮腫如神

全蝎炒核桃去殼肉只用隔膜炒等分為末空心酒調下三錢午再服三日全愈

靈異膏　治患毒疽不愈者以此貼之即愈勿用鐵鍋煎

防風　梔子　黃芩　當歸　生地　甘草　苦參　銀花　大黃　赤芍　黃柏　連翹　荊芥　海風藤　白蘞　梗枝各二兩　何首烏　鉄牛膝各一兩　于白芷　杏仁　地榆各一兩　木通　山豆根　川芎　蒼术　獨活　羌活　蜂房　蟬蛻　僵蠶　白蘞　麻黃　丹皮各五錢　乳香二兩　沒藥　元茶　螵蛸　龍骨各一兩　赤石脂二兩

麻油浸三日熬枯黑色去滓每油二碗配千里光膏一椀再熬滴水成珠飛丹收成膏入乳香沒藥各一兩輕粉三錢梗枝攪勻收用

萬寶代鍼膏　治諸惡瘡核赤暈已成膿不肯用鍼以此藥代之但用小針點破瘡頭貼上膏藥膿即自潰

蓬砂　血竭　輕粉各一錢半　金頭蜈蚣一个　蟾酥五分　雄黃一錢　麝分一氷片少許為細末用蜜和成膏看瘡有

頭處用小針挑破以藥少許放紙上封貼早次其膿自出如腋下有妥孩兒名暗疔瘡或有走核可於腫處用針挑破如前用之忌雞羊酒麪等物吃白粥三日為妙

又方

用磨刀泥白丁香麝香巴霜火上燒灰研細過一切腫毒津唾和搽少許一週時其頭即破吹消散

乳香　麝香　蟾酥　辰砂　兜茶　沒藥各等

分研極細水用一小分彈封膏上貼之立消腫毒
護心散　又名托散乳香萬金散凡有疽疾一日
至三日之內宜連進十餘服方免變症使毒氣不
出外稍遲毒氣內攻漸生嘔吐或臭生瘡茴不食
即危矣四五日後亦宜間服之
蒺豆粉兩乳香酥燈心同研和勻以生甘草濃煎
湯調下一錢時時呷之若毒氣沖心有嘔逆之症
大宜服此蓋蒺豆能熟下氣消腫解毒乳香消諸
瘡腫毒服至一兩則香徹瘡孔中真聖藥也

透骨丹　治跌撲損傷深入骨髓或隱疼痛或天
陰則痛或年遠四肢沉重無力此藥主之真神方
也
開楊花子一兩火酒浸炒三次　乳香　沒藥不去油
真血竭各三錢二次焙乾　為末研勻再加麝香一分同研磁瓶
收貯封固每服三分壯者五六分不必用衣飯須
臨好方服酒可盡量下服後避風有微汗出為要
忌房事酸寒茶醋等　弱者間五日一服壯者間
三日一服

醉仙散　治癇風
胡麻仁　牛蒡子　枸杞子炒各五錢　蔓荊子炒防
風　水蕎根　白蒺藜　苦參各五錢
右為末每一兩半入輕粉二錢拌勻大人用二錢
空心日午臨卧各服茶湯調下服後五日間先于
牙縫內出臭涎水渾身覺疼昏悶如醉利下臭屎
為度量大小虛實加減與之證候重而急者須先
以丹造散下之候補養得完復與此藥服須斷鹽
醬醋諸般肉魚腥椒料水果煨燒炙煿及茄子等
物只宜淡粥熟煮時菜食之或酒煮熟食之以助力可也
再造散　治癇風
錦紋大黃一兩皂角刺一兩半獨經年大黑者生
頭末六錢半生半熟
右為末每服二錢臨卧冷酒調服一云日未出面
東服以淨桶伺候泄出虫如虫赤色是謂之近三四日又進一服直候無虫則絕根矣後用通聖散調理可用三棱針刺委中出血

終身不得食牛馬驢騾等肉大忌房事犯者必不救

大麻風

活穿山甲一个揀最大者用生桐油一斤如小者桐油半斤加雄黃末一錢沒藥末七分黃柏末一兩共攪入生桐油使勻將穿山甲架起下用炭火熏令其口渴口自張開將藥末和藥油灌入口內不喫再烘儘油吃完為度再加大火將穿山甲炙酥研為末另加百草霜一兩共研細收入瓷瓶內

封嚢口神膠 破沙罐末 草鞋灰 黃泥 傾銀罐末 燒鹽糞各一兩為極細末用鹽滷調和如膠丹入乳缽內擂細用抿子挑封罐口

乳香飲 治折傷損腰神驗

酒浸虎骨敗龜版黃芪牛膝萆薢續斷乳香各等分煎服

取疔膏

乳香一粒 麝香米大一粒 黃連末 連翹末 桃仁二个去皮同蝦蟇肝腸肺三味共一處入乳缽內擂如泥白皮紙一小刀攤貼患處三四日連疔揭去

聚疔毒

鉄繡不拘多少研為末醋調塗毒上須臾毒自出并治瘡癤膿水不乾及難收口者即效

大赦 砂五錢

秘煉楊梅瘡藥

辰砂 雄黃 白礬炒 綠礬炒 煅硝各一兩 硼砂

消疔

人指甲炙為末放患處將核桃平破取肉嚼爛安半殼內合住不可露氣一飯頃即消

瘰癧奇方　亦可消瘤去痣

石灰半斤研細末大黃四兩同入鍋內炒通紅去大黃取石灰聽用　又將洗碱四兩和水四五碗桃杷葉七片共煮水乾至一半入前石灰攪勻再煮水將乾聽用又以蛇合石二兩醋煅七次為末又以菟花五錢漸漸加入攪勻成膏每膏一兩加蟾酥麝香各二分為九胡椒大未破者將一九粘核上其九自入以淡猪肉湯洗過又粘又洗如此三次其核自動將皮掰開以銀鉤取出核即貼生肌膏

生肌膏

蘇油一斤化胎髮一團熬水成珠龍骨煅黃占熟猪油赤石脂　沒藥　輕粉　象皮煅各一錢俱為細末入油內攪勻成膏攤貼一日一換仍以猪肉湯洗三四次即平半月收口取核時先服提氣湯

人參　白芷　生地　龍膽草　柴胡　乳香　甘草　貝母　橘紅　香附　桔梗各等分姜棗水煎服

三妙散　治結核瘰癧遍滿脖項神驗此方雖平易實屢試屢驗

夏枯草　金銀花　蒲公英各五錢　水酒各半煎服多用極驗

消瘰癧痰毒　未穿破者為瘰核已破者為瘰癧三五个連者為痰串用羊角數對威灵仙四兩共入瓦罐內加清水煮數沸候冷軟取出切薄片用新磚燒紅將冷鋪上焙燥過研細每次一兩加廣木香一錢白芥子三錢共為末煉蜜為丸用柾柳煎湯下或夏枯草湯下亦可服至七日後大便下如黑羊屎小便出黑水自消婦人如爛開兩脇服之亦效忌生冷煎炒房事

提癆丹　取瘰核

水銀　硼砂　火硝　明礬　皂礬　食鹽各一錢　硃砂二錢

用粗瓦盆放前藥上合粗碗一隻鹽泥封固炭火煉三炷香先文後武冷定取出昇在粗碗上將白米飯搗丸菉豆大硃砂為衣每用一丸放瘡上棉紙封二三層一日夜急揭起則核隨紙帶出丸可再用

神授五公散　治漏孔并諸瘡眼久不斂者痔瘡亦效

大五指子一个（蜈蚣一條去頭足）將梢子開一孔入蜈蚣濕紙包（煆）存性煆為末先以蔥湯洗瘡淨務前藥再

用膏藥貼之每日一換即飲口如神

三品錠子

上品錠子　專治痔漏一十八症

紅礬二兩　乳香　沒藥　硃砂去鉄各三錢　牛黃五分

中品錠子　專治龜花瘻瘤等痔

白礬二兩八分　乳香　沒藥各五錢　硃砂五錢　牛黃五分

下品錠子　專治疔瘡發背等症

四分　石胆一錢半　金信一兩五錢以火煆盡　硃砂生半錢　黑烟盡用淡清烟

研

紅礬三兩二錢　乳香六錢　沒藥五錢　硃砂三錢　牛黃四分　五厘　石胆砂二錢四分　牛黃三兩半生半熟　白信三兩半日取火煆黑烟盡起方可用　各依法製末用麪糊和勻撚成錠子着痔漏大小深淺插入錠子如肉內黑色勿上生肌散只待黑肉落盡方可上若瘡無頭太乙膏一个加後藥一粒貼之

白礬二兩　乳香三錢二分　硃砂四分　牛黃五分　沒藥三錢又分　薑黃二錢半順的用　白丁香一錢五分　巴豆三錢去油淨用　為末或唾沫調敷瘡一日三次但瘡破插上前錠子

破瘻點藥

水銀一錢　硼砂一錢　輕粉一錢　鵝糞一錢　鷰糞一錢　氷片五分　朝腦五分　綠礬一錢　皂礬一錢　麝香三分　為細末用針刺一小孔然後乘其出血之時將藥點上則粘連矣約一分用以人乳調之點上大如芡實一日點三次第二日必然流水流水之時不可再點、則遇疼轉難收口矣一日後必然水流盡而皮寬如袋後用煎方自然平復如故

煎方　人參三錢　茯苓五錢　薏苡一兩　澤瀉二錢　豬苓一錢　黃芪

（一兩）白芍（五錢）生甘草（一錢）陳皮（一錢）山藥（三錢）水煎服十劑全消如故但是症患房事一月餘無所忌若犯房事必破不能收口終身成漏矣

瘡疽核膿　此方甚奇頑瘡可用

瘡疽不破或破而腫硬無膿用班蝥為末以蒜搗膏和水一豆大許貼之少須膿出即去蒜

治火丹

絲瓜干（一兩）紫胡（一錢）元參（一兩）升麻（一錢）當歸（五錢）水煎服一劑即消

治瘡二法

頭面上瘡用銀花二兩當歸一兩川芎五錢蒲公英三錢生甘草五錢桔梗三錢黃芩一錢水煎服一劑輕二劑全消不必三劑

身上手足瘡用銀花三兩當歸一兩生甘草三錢蒲公英三錢牛蒡子二錢芙蓉葉又（無葉用梗三錢）天花粉五錢水煎服一劑即消二劑全愈

擦瘡成水　人有病手足生瘡變成大塊不必刀割只用小刀畧去其皮一分以此藥數之即化為水

人參（三錢）甘草（一錢）硼砂（一分）冰片（一分）輕粉（五厘）各為末糝之即化為水矣人更有肚上生瘡結成頑塊終年不去者亦可治之立效

掃疥　治諸疥瘡熱瘡遍身癩瘡神效

大黃　蛇牀子　黃連　黃柏　夠脊　苦參（各五錢）為末入硫黃水銀（茶末殺之各四錢）雄黃　黃丹（各二錢半）輕粉（一錢）大楓子（去殼）木鱉子（去殼）各五錢同煎藥細末杵勻用猪脂調洗浴後搽瘡上此藥宜晒合之不見火塗瘡疥立效

又製松香膏　治濕氣第一神方

松香（三斤又製第一次用姜汁煮第二次蔥汁煮第三次白礬仙汁煮第四次燒酒煮第五次開揭花汁煮第六次南陸根汁煮第又次紅醋煮）　桐油（三斤）川烏　草烏　白芥子　草麻子　乾薑　官桂　蒼术（各四兩）血餘（八兩）共入桐油熬至藥枯髮消滴水成珠濾去渣入牛皮膠四兩炸化用前製過松香漸漸加入收之離火加樟腦一兩好麝香三錢用厚紙攤之貼

患處

諸瘡糝藥　治天泡瘡更效

煅熟石膏兩一 松香 白芷錢各三 樟腦錢二 輕粉少許
片分為細末熬熟豬油調搽
破棺丹 治癌氣入腹危者
大黃二兩半熟 甘草 芒硝各一兩 為細末蜜丸彈子
子大每服半丸食後溫酒化下或童便半盞研化
之忌生冷水
一掃光 治疥癩及婦人陰蝕瘡漆瘡天丹諸惡
瘡神效
蛇床子 苦參 蕪荑各一兩 雄黃錢五 枯礬一兩 硫
五錢

又方
黃 輕粉 樟腦錢各二 大楓子取內川椒錢各五 為末
生豬油調敷
又方
蛇床子 硫黃 黃柏各一兩 太楓子 川椒 雄
黃錢各五 枯礬二兩 輕粉另研二錢入 牛皮岸薰牛皮烟岸
代炉岸黃丹各一兩 為末生豬油調敷
又諸般疥瘡加減法 腫多加白芷鮮石 痒多加枯礬
濕多香油調 乾痒出血加太黃二連豬油調
盡多加蕪荑錫灰梹榔梨蘆斑蝥
青色加青黛
小金線膏 治一切疥癬毒
瀝青 白膠香各二兩 乳香二錢 沒藥一兩 黃蠟三錢又以
香油三錢同熬至滴水不散傾入水中扯千遍收貯
每捻作餅貼之
截癬 牛皮風癬

川槿皮一兩 大楓子仁十五个 半夏五錢 河井水各一盞浸
露七宿入輕粉一錢入水中禿筆掃塗霞以青衣
數日有臭涎出妙忌浴澡夏月用尤妙
九熏丹 治癬
好銅青二三兩研細 好燒酒拌之須不乾不濕塗于粗
盞底內翻轉合地上以磚墊露一線下以薪艾熏
之再拌再熏如此九次少亦要七次約以青色帶
黑為度然後再研細將燒酒拌做成錠子用時以
醋磨搽每日三五次五日後若覺乾裂以菜油少
許潤之七日愈

日本國癬藥

黑沙糖四　吳雄黃三錢　西瓜一個二川椒五錢燒酒一斤調搽立愈

枯瘤散

灰莧菜晒乾燒灰半碗　萬年青燒灰半碗　風化石灰一碗　和一處淋汁三碗　油胡椒十九粒去粗皮　明雄黃一錢　入言為末入前藥和勻以磁瓶收貯不可見風以滴醋調勻用新羊毛筆蘸藥點痛上癌大則點如龍眼核大若茶杯大則點如雞卵點之其瘤乾枯自落如

血瘤破以髮灰糝之瘤破以白蘇皮燒灰糝之外以膏護好自能飲口收功

飲瘤膏　治癭瘤枯落後用此搽貼生肌收口

海螵蛸　血竭　輕粉　龍骨　象皮　乳香　各一錢　雞蛋五个煮熟用黃油一小鍾　右各研細末將蛋油調勻用甘艸湯洗淨患處以雞毛掃敷再將膏藥貼之

治瘤

水銀一錢　兒茶一錢三分　硇砂一錢　麝香三分　血竭一錢三分為細末將此藥撚于瘤上之根處隨擦隨落根小者無不落也

治流火方

鮮紫蘇　鮮鳳仙花　二味洗淨連根葉搗爛放水盆內以滾水沖入將腳架盆上熏至可洗以軟綿洗之立愈數十年者不過洗三四次不發矣

取疣餅藥

糯米百粒　石灰大拇指　巴豆三粒去殼　研為末入磁鈃同膏三日每以竹筌挑粟許點上自落

點痣藥　一切痣疣及瘡內雞眼桑柴灰　風化石灰各一分　鮮蔴雷仙六兩煎濃汁淋二灰取汁熬成稀膏磁器收貯用點患處不必挑破應手而除

點黑痣

杏子仁為末雞蛋清調點一宿自落

治臁瘡

先將綿紙看瘡大小裁成塊十二張四角以紙撚釘住聽用蘇油二兩川椒四十九粒入銅杓內煎

黑色取起次入楤枝一寸長者四十九根再煎枯
黑取起次入黃蠟一兩半研細輕粉三分姑攢一
錢候溶化即以前煎入油內少煎即起但令油涔
透勿使紙焦黃貼時先將楤枝葱椒煎湯洗瘡用
綿拭淨後將所製紙膏香貼之面用油帛蓋一張
外用紅絹繫傳每週時去紙一張待紙取盡則瘡
自愈矣

透骨丹

蟾酥　硼砂　乳粉　巴豆　蝎牛各二　麝香分一

先將藥研細後入巴蝎再磕磁瓶收貯每用少許
乳汁化開將瘡頭輕輕撥破挑藥如米許大納于
瘡口外以膏藥蓋之

勝金丹　治跌打損傷神效

血竭　乳香　沒藥各三錢　地龍酌　自然銅一兩　無名
異五錢　木鱉子五個為末每服五分熱酒調
化下一丸如不打用紅花蘇木煎湯服即解

松肉葱白膏　治杖瘡

豬肉不精不肥二片去皮骨　加葱白要一斤半再加明松香三兩研
極細末以節節過方可連葱放在肉內斬為極細
攤敷患處以布脚帶紮緊不可寬至週時皮肉還
原與不打無異狀上忌放鬆皮等物須切記若膿
血水任其流放不妨

小金蓮　女兒纏腳方也

乳香　沒藥各去油一錢　草蔴仁去殼及內外筋膜二十个
共研為細末將肥皂去弦心馬　草烏各五錢
婦人金蓮數在足骨上過一夜次日洗去足軟如
綿

拶傷

指上拶過有四痕用銀硃和酒磨濃依痕圈之自
復

整骨麻藥

草烏三錢　當歸　白芷各二錢半　為末每服五分熱酒調
下麻倒不知痛然後用手如法整理

截骨神方

川山甲一兩　虎骨三兩　銀香去殼一斤　大棗去核半斤　如人傷只
好服三錢六分用細酒沖服

天下第一金瘡藥　凡刀斧損傷跌朴打碎敷上即時止痛止血更不作膿勝于它藥多矣其傷處不可見水

公猪油一斤四兩　松香六兩　面粉四兩炒黃　麝香六分　黃蠟六兩　樟腦三兩　冰片六分　血竭一兩　兒茶一兩　乳香一兩　上烘去油　沒藥一兩全　上製

以上藥研極細先將猪油松香黃蠟三味熬化濾去渣待冷再入藥末攪勻磁器收貯不可洩氣接骨至神丹　治跌傷打傷手足斷折急以杉板夾住手足扶正湊合再用此藥

羊躑躅三錢炒黃　大黃三錢當歸　芍藥　丹皮各三錢　生地五錢　土狗十个搥碎　土蛀三十个搥爛　先將前藥酒煎然後入自然銅末一錢調服連湯吞之一夜生合神效不必再服止服二劑可也

陰囊爛盡　止留二子者為末麻油調敷即便生肉

鳳仙花子甘草等分為末　治小兒白虎瘡癩瘡

美膏膏　治小兒白虎瘡癩瘡

百草霜一兩　雄黃一兩　膽礬六錢　輕粉一錢　榆樹皮三錢　用石灰窯內燒紅流結垂渣四兩共為細末猪膽汁調剃頭後搽之神方也

手足皸裂

大蘿卜一个內雕空放入柚油錢五安炉火上熬熟候冷取油擦患處即愈

治陰蝕

蚯蚓三四條炙　葱數條火上炙乾為末　麝香少許研　共搗爛為丸如龍眼大者一枚　巴豆去殼一枚研　膽礬一塊煮將藥搗千

出牡蛎內編　卷二　外治　三十

田螺大者一枚　巴豆去殼一粒研　膽礬一塊研　麝香少許研　共搗爛為丸　將螺用水養三日去泥　土蜈蚣一條　入礬豆麝末在內以線拴住置磁器中次日化成水五更時將藥水以手自抹兩腋下不住手抹直待腹內欲行却住手先擇深遠無人空地內去大便黑糞極臭是其驗也以上蓋之勿令人知不盡再抹藥水又去大便次用白礬一兩　蛤粉五錢　樟腦一錢為末搽之永絕病根

瘡後生腎

水銀一錢　硫丹錢五　研末作六七丸　掐糊定火煅一日取出薄綿裹之左鼻塞右耳右鼻塞左耳自能墜下

免喉內生哦

喉中窘痛即用燈草一把煎湯沙糖調飲一日即止痛立愈

活雄鯽魚一尾約四五兩白礬六錢將礬末入魚腹中待肉爛去礬不用只用淨魚膏晒乾為末每用米粉大小許敷患牙根上自落

取箭鏃方

用天水牛一个獨角小者以小甌盛之硼砂一錢研細用水些少滴在內浸自然化水以藥水滴傷處箭頭自出

黑鬚倒捲簫

大馬琪二三十條竹筒裝之夜置露處受氣餓過

七日以雞冠血磨京墨與食過四五次後陰乾將猪脛骨打斷放進其內仍合定鐵線纏住塩泥塗之乾時放地上火煅五寸香二次退開三寸火又放五寸香三次再退遠火又五寸香取出為末將猪膽皮包指承末搽鬚稍即倒上也

黑鬚仙丹

熟地一斤　萬年青三片小用五片　桑椹一斤黑芝麻八兩　山藥二斤　南燭皮四兩　花椒一兩　白果四兩　巨勝子三兩　連壳窯丸早晚酒送下各五錢忌食蘿蔔

呂雅內編　卷三　雜治　二

又方

熟地一斤　薏仁　山茱萸　桑葉各八兩　何首烏各三兩　巨勝子　白果各三兩　白术　生赤一斤花椒一兩烏頭皮四兩胡桃肉三兩加參片三兩亦可　黑芝麻四兩　山藥

丸每服五錢

取輕粉毒

出山黑鉛五斤打一把盛燒酒十斤　納土茯苓半斤乳香三錢封固重湯煮一日夜埋土中出火毒每日早晚任性飲數杯後用瓦盆接小便自有粉出為驗服

主筋骨不痛乃止

受打不痛

用血管鷲毛七根地龍七條煅過用煅乳香同白蚵為末好酒送下

悅容丹

白瓜仁五兩　桃花四兩　白楊皮二兩為末食後飲服一匕每日三服欲白加白瓜仁欲紅加桃花三十日面白五十日手足俱白一方用橘皮無楊皮面黑令白

呂雅內編　卷三　雜治　三

真女菀三分　鉛丹一分為末醋漿服一刀圭日三服十日大便黑十八日面如漆二十日全白便止過此則大白矣三十後不可服忌五辛

誤吞鐵石

王不留行黃柏等分為末湯浸蒸餅丸彈子大青黛為衣線穿挂風處用一丸水化灌之

腳膁藥

葱根掌薺搗汁一碗再取松香四兩蘇油再煎滴水成珠方入前汁攤膏藥貼即落

足趾雞眼

作痛作癢地骨皮同紅花研細敷之次日即愈

戴毛蟲傷

春夏月樹下牆壁間雜色毛蟲極毒人觸著者則放毛入人手足上自皮至肉自肉至骨皮肉微痒以漸至痛經數日痒在外而痛在內用手抓搔或痒或痛必至骨肉皆爛有性命之憂此名中射工毒諸藥不效者

好豆豉約一碗清油半盞拌豉揭爛厚薄痛痒處經一時久豉氣透骨則引出蟲毛紛；可見取下豆豉理土中煎香白芷湯洗痛處如肉已爛烏賊骨為末傅之即愈

又方

鍋底黃土為末以醋摶成團子痒痛處擦轉其毛皆出在土上痛痒立止神效無比

紅玉膏　治女人面脂

輕粉　滑石　杏仁去皮等分為末蒸過入腦麝少許以雞子清調勻洗面畢傅之旬日後如紅玉

竹木刺

鮮蝦黃雀囊共搗罨上即出

治中河鮀毒

大紅降香為末極細以索粉水調服錢許吐出毒物即愈神效

虎傷

被虎齩傷血必大出傷口立時潰爛疼不可當急用猪肉貼之隨貼隨化隨易一斤為末加三七末三兩苦參末四兩和勻糝之隨濕隨糝血即止痛即定

頂藥

巴霜頂丹溪喉閉丸
治纏喉風喉閉先胸膈氣緊驀然咽喉腫痛手足厥冷氣不能通頃刻不治
雄黃錢一　麝金五分　巴豆七粒去殼皮　冰腦各少許　為末醋和
九如麻子大清茶下五分噤喉塞用竹管納藥入喉中須臾吐痰立解未吐再服
四寶頂狗寶丸
丁丹崖祖師傳治噎膈氣緊驀然咽喉腫痛翻胃

硫黃　水銀各一錢同炒成金色　狗寶三錢為末雞子去白一枚
留黃和藥攪勻紙封泥固煻火煨半日取出研細每
服燒酒調五分不過三服效驗
牛郎頂牛郎丸
治氣蠱奔衝不可忍蕪追蟲取積亦治水腫
黑牽牛五錢炒　檳榔二錢　枳殼五分為末每服一錢紫蘇湯送下蟲積及水腫用酒下
青綠頂　治頑痰不化
石青一兩　石綠五錢並水飛為末麴和丸荳蔻大溫水下十丸吐去痰一二碗不損人
綠二兩乳細水化去石慢火熬乾取辰日辰時辰位修合再研入麝香一分糯米粉糊丸彈子大陰乾卒中每丸作二服薄荷酒研下餘風硃砂酒化下吐出青涎瀉下惡物大效小兒用銅綠研粉醋麴糊丸芡子大每服薄荷化酒水下一丸須臾吐涎如膠神效
硫黃頂　治腰痛如神
黑丑半生半炒　取頭末水和丸梧子大硫黃末為衣空心鹽酒送下五十丸
玉環來笑丹　治疝氣癩腫並諸氣腫痛
荔子核四十九粒　陳皮連白九錢　硫黃四錢為末鹽水打麵糊丸菉豆大痛時空心酒服九丸良久再服不過三服神效
黑鹽丸
鹽一升納粗瓷瓶中實築泥頭初以煻火燒漸加炭火勿令瓶破候赤徹鹽如水汁即去火待凝破瓶取出豉一升熬煎桃仁一兩和麩炒熟巴豆

熟即小力生又損人四物搗勻入蜜丸梧子大每
服三九平旦時服天行時氣豉汁及茶送下心痛
酒送下入口便止血痢飲下初變水痢後便止鬼
瘧茶飲下骨蒸蜜湯下忌久冷凝水合藥久則稍
加之凡服藥後吐利勿怪吐利若多服黃連汗止
之或遇殺藥人藥久不動者更服一兩丸藥後忌
口二三日其藥膩月合之瓷瓶蜜封勿令洩氣一
劑可救百人或在道途村落無藥可求但用此藥

即敵大黃朴消數兩曾用有效小兒女子不可服
被欖作也
輕粉頂　治小兒涎喘
無雄雞子一个取清入輕粉抄一分拌勻和銀器
盛置湯瓶上蒸熟三歲兒食盡當吐瘦或泄而愈
實者乃可用
羊奚頂　治骨蒸傳尸
羊肉一拳大煮熟皂莢一个炙以無灰酒一鉢銅
鐺內煮三五沸去渣入黑錫一兩令病人先啜肉

汁乃服一合當吐蟲如馬尾為效
截瘧頂　治三日大瘧
活大烏龜二个連殼左右各肩上各攢一孔近尾處
亦攢一孔以明雄黃九錢研細每孔摻入三錢外
以甕黃泥包固勿令泄氣炭火上煅存性研細每
服一錢空心陳酒送下二三服即止
又方　陳香橼一只去頂皮大者每只加明雄黃三
錢中者二錢小者一錢研細摻入香橼內炭火中
煅存性再研極細末每服七分用腐衣分作六七

包乾咽下此日不可喫湯水任其嘔去頑痰即愈
三奇頂　治小兒天哮神效
經霜天燭子臘梅花各三錢水蜒蜒一條俱預收　水煎服
一劑即愈
金線頂　凡一切要吐痰涎之症用代尿蒂最妙
金線重樓俗名金線蝪蝦墓採得去外黑皮用石搥打碎勿犯鐵
器晒乾為末小甕瓶收貯用之治風痰結胸取一
錢陰陽水和服吐去痰即愈傷食成瘧臨發時空
心水和服一錢吐即愈噤口痢疾涼水和服一錢

即愈

砒霜頂　治嗽須三年後可用

精猪肉三十兩切研細末拌在肉上令作骰子塊信一兩研細末拌在肉上令匀用紙筋黃泥包之令乾白炭火于無人處煅青烟出盡為度研細以湯浸蒸餅丸如菜豆大食前茶湯送下大人二十粒小兒四五丸量虛實與之

齁喘痰積　凡天雨便發坐卧不得飲食不進乃肺竅久積冷痰遇陰氣觸動則發也用此一服即愈服至七八次即出惡痰數升藥性亦隨而出即

斷根矣

江西淡豆豉一兩蒸烟入砒霜末一錢枯礬二錢丸菜豆大每用冷茶冷水送下七丸甚者九丸小兜五丸即高枕仰卧忌食熱物等

皂礬頂稀散涎　凡人羣中風昏如醉形體不收或倒或不倒或口角流涎斯須不治便成大病此證風涎潮于上胸痺氣不通用此吐之

皂礬末一兩生礬末半兩臘粉半兩水調一二錢過咽即吐涎用礬者膈下涎也

碧霞丹　凡中風痰厥癲癇驚風痰涎上壅牙關緊急上視搐搦並宜主之

烏頭尖　附子尖　蝎稍各七個　石綠研幾度飛過十兩　為細末麵糊丸芡子大每用一丸薄荷汁半盞化下更服温酒半合須臾吐出痰涎為妙小兒驚癇加白僵蠶等分

吐蠱　人頭面上有光它人手近之如火熾者此中蠱也

蒜汁半兩和酒服之當吐出如蛇

斥蕃散　治痰涎頭目濕氣皮膚水疱濕熱諸症

斥蕃二錢半熬黃赤小豆二錢五分為末每用一錢以香豉一合熱湯七合煮糜去渣和服少少加快吐乃止

風癇喉風咳嗽及遍身風疹急中涎潮等症不拘大小此藥不大吐逆只出涎水斥蕃為末壯年服一壹字老少半字早晨井水下一食頃含沙糖一塊良久涎如水出年深者出黑涎有塊布水上也涎盡食粥一兩日如吐多人困

甚取鬱香泡湯一盞飲之即止宜吐之症必須看光者放心吐之餘則皆忌亮光者如蝸牛之涎一樣光亮也但看見光亮者無論其痰上中下此光亮之色必須候其痰積乾而分辨之不可攙其濕痰時而即以為光亮也

倒頓痰法　治痰結胃中不能吐出狂言如見鬼狀時發時止氣塞胃肝

牛肉五斤水二斗煎湯飲之至不可食而止以鵝翎探吐必吐至黃色頓痰而止前病頓失後以陳皮茯苓甘草白术湯徐徐飲之平復如故

陰陽湯　治凡有上焦欲吐而不能吐者

滾水涼水各一碗均之加炒鹽一撮打百餘下起泡飲之立吐吐而愈

牛郎串（丹仙）　治鄉塾上攻痰涎壅滯胸胃吐食十膈五噎鼡哈酒積蟲積血積氣塊諸般痞積癖熱腫或大小便不利婦人女子面色癍黃鬼產癥瘕癆食可看去後之物此藥有疾去疾有蟲去蟲不傷元氣臟腑小兒減半孕婦忌服

白鼸牛頭末四兩五錢　白梹榔一兩　茵陳五錢　蓬术五錢　醋煮三稜五錢　醋煮牙皂五錢　炙去皮

右共為末醋糊為丸如菉豆大依前數服行後隨以溫粥補之忌食他物

梹霜串（必勝）　治遠年近日大麻風症癩瘡三服即愈

大黃　梹榔　白鼸牛鉸各五錢　粉霜五分　各為細末分作三服用生薑四兩絞汁入沙糖半酒盞水調勻于晚臨睡腹中稍空卧床上服之至三更遍身手足俱麻木如針刺頭目齒縫俱痛此藥尋病之功取下二便或青或白或黑或黃或紅蟲之類此乃病根也二十日內服三次漸瘥眉毛鬚髮俱生肌膚

如舊或齒縫出血漱齒藥列于後

漱藥　貫仲　五錢　黃連　五錢　為末用水一鐘煎四五沸入冰片少許攪勻漱口每日一服煎漱忌動風油膩之物一月愈

黃甲串　倫刀　治橫痃便毒未成者內消已成者膿從大便下

散

生大黃　二錢　白芷　二錢　穿山甲　二錢　煆存性為末服三錢空心酒送下

巴豆串　治痢疾

蒼术　十二兩　泔水浸一宿去毛　陳皮　十二兩　厚朴　十二兩　姜汁炒　蓬术　六兩　歸身　六兩　枳殼　八兩　黃連　八兩　土黃連　一兩　三稜　六兩　木香　五錢　天竺黃　五錢　陳米一斗　巴豆　四百九十粒內將一半去油用　米盒同炒黃色為度　揀去豆不用　共為末和勻每服一錢二錢三錢視病之輕重空心午後晚每日三服忌㊀生冷油膩滑腸之物茶水忌之㊁紅色甘草湯下

選下　白色姜湯送下　氣滯木香湯送下　白(紅)相魚甘草姜湯送下　噤口人參白朮湯送下

無極丸　治男女諸病婦人經血不通赤白帶下崩漏不止腸風下血五淋產後積血癥瘕腹痛男子五勞七傷小兒骨蒸潮熱其效甚速宜六癸日合大黃斤分作四分一分用童便一碗食鹽二錢浸一日切晒一分用醇酒一碗浸一日切晒再以巴豆仁三十五粒同炒黃去豆不用一分用紅花四兩泡水一碗浸一日切晒一分用當歸四兩又淡醋一碗浸一日去當歸切晒為末煉蜜為丸梧子大每服五十丸空心溫酒下取下惡物為驗未下再服

倏急丸　治心腹諸疾卒暴百病

大黃　巴豆　乾薑　各一兩　搗篩蜜和丸小豆大每服一丸凡中客忤心腹脹滿痛如錯刀氣急口噤卒死以暖水或酒服之或灌之未知更服三丸腹中鳴轉以吐下便愈若口已噤者灌之即瘥

烏龍串　一粒金丹　又名提虎丹　治風寒暑濕腳氣不問遠年近日一切走注疼痛不可忍臨發時空心服一丸趕到足面上赤腫痛不散再服一丸赶至腳心中出黑汗乃除根如病在上食後臨卧酒送下自然

汗出定痛為癒驗中風癱瘓痲痺不仁手足不能
屈伸偏枯酒下二丸初中風不醒人事牙關不開
研一丸酒調灌下(亦)驗
白膠香研草烏(去皮臍)五靈脂(去土)地龍(去土)木鱉子(去油)
各一兩沒藥當歸各七錢五分麝香二錢五分京
墨(燒)酒燒酒浸一宿(去)共為末和勻粘米粉為丸芡實大
温酒研化一丸神效
輕粉串治小兒喫泥
輕粉分一砂糖和丸麻子大空心米飲下一丸良久
物尋常行氣每服十丸妙
禹功散治諸水飲病

泄出泥土瘡
犀黃串辟瘴明目
犀角　黃芩　朴硝　梔子　大黃各一兩
升麻　犀角
豉二升微熬同搗末蜜丸梧子大覺四肢大熱大
便難即服三十丸取利為度四肢小熱只食後服
二十丸非但辟瘴甚能明目
天一水串白雪霞製通利水道
燈心一斤米粉漿染晒乾研末入水
共五兩滑石水飛取浮者晒乾二兩豬苓二兩澤瀉三兩人參一斤切片熬膏

黑犛牛頭末四兩苗香一兩炒為末每服一二錢
以生姜自然汁調下當轉下氣也
雙牛串(齊)散治一切瘡疽發背無名腫毒年少氣壯
者
黑白犛牛(各一合)色雄(布)碎以好醋一碗熬
次日五更温服以大便出膿血為妙
龍腦串治疽瘡黑黯
生猪油一斤(擩)龍腦半分温酒和服
又方用(獵)猪第二番血清半盞酒半杯和勻入龍

腦一分溫服良久利下瘀血一二行瘡即紅活醫所不治百發百中

五香串　治腹心氣脅痞積一切痛症立效

沉香　下香　木香　檀香　乳香去油巴豆霜各三錢　大黃　甘草　鬱金蒼术　五靈脂　陳皮厚朴　雄黃各五錢　豆蔻仁六錢共研為細末醋糊為丸梧子大硃砂二錢為衣每服五丸重者七丸九丸或至十一丸摠取單數勿雙空心熱酒送下忌生冷物油膩等

車螯串　名轉泰散　治瘧背癰瘡疽不問淺深大小利去病根則免傳變　此草方

車螯即蠣蛤固濟煅赤出毒研末燈心三十莖　粉五分為末每服四錢用梧楼一个酒二盞煎一盞調服五更轉下惡物為度未下再服甚者不過二服

又方　車螯一个黃泥固濟煅赤出毒研末燈心三十莖　栝楼一个取仁炒香甘草節炒二錢　二盞煎半盞去滓入蜂蜜一匙調車螯末二錢膩

薏仁一兩山藥四錢陳皮五錢白芥子一錢水煎服一劑即愈忌食鹽者一月犯則無生機矣先須斷明然後用藥治之

瀉腹氣

精猪肉二大斤以甘遂末二兩拌之　夾腹下至天明以生甘草一兩煎湯飲之良久瀉出穢物須在荒野處恐穢氣傳人三五次即愈虛弱者間日為之

腹脅瘡塊

雄黃一兩白礬一兩為末麪糊調膏摊貼未效再貼

大便数百斤之狀乃愈

發背初起　疑似者以秦艽牛乳煎服得快利三五行即愈

逐黃散　治小兒黃疸眼黃脾熱

萎蕤焙炒研一錢　水半升煎七分卧時服

瀉下黃物立可

絞腸疫

馬糞一兩炒黑　入黃土一撮微炒　黃酒乘熱服五錢一劑即

痛去如失非吐即瀉氣一通而痛定矣

單方

總治門

金液丹　治男子腎腎火冷心腹積聚脇下冷痛腹中諸蟲失精遺尿形羸力劣腰膝痛弱冷風頑痺上氣衄血欬逆寒熱霍亂轉筋虛滑下利又痔瘻濕蟲生瘡下血不止及婦人血結寒熱陰蝕疽痔用硇黃十兩研末用瓷盒盛以水和赤石脂封口鹽泥固濟日乾地內先埋一小罐盛水令滿安盒內用泥固濟慢火養七日七夜候足加頂炭一斤煆

俟冷取出研末每一兩用蒸餅一兩水浸為丸如梧子大每服三十丸侵晨空心米飲下又治傷寒身冷脉微或吐或利或自汗不止或小便不禁併宜之身熱脉出為度

蝮蛇膏膝

硇黃半斤　桑柴灰五斗　淋取汁煮三伏時以鐵匙抄于火上試之伏火即止候乾以大火煆之如未伏更煮以伏為度煆了研末穿地坑一尺二寸投水于中待水清取和硇黃末坩鍋內煎如膏鐵鏟抄出

細研飯丸麻子大每空心鹽湯服十丸極有效驗

都梁丸　治頭風眩運女人胎前產後頭痛傷風皆洗晒不見火蜜丸彈子大每嚼一丸

效

香白芷一味為末

以清茶或荊芥化下

白虎丸　治疒痧症初覺頭疼惡心遍身腹腰作痛不思飲食即進一服當時青筋血散若過三五日青筋已老多服取效南名疒痧症北名青筋此藥能順氣下血化痰消滯之治心腹痛崩漏帶下久患

赤白痢疾打撲內傷血不能散或因氣惱致病服之神效

千年石灰洗淨刮去垢為末水飛過晒畧乾量可丸如梧子大每服五十丸看輕重加減燒酒送下

三丸五丸甘草水服之服後睡良久

仙傳膏　治血症

荊草一斤洗淨晒乾為末入生蜜二斤和為膏以器盛之不得犯鐵器一日一蒸一晒共蒸晒丸天乃止病人五更起面東坐不得語言以匙抄藥四匙食之良久以稀粟米飯壓之藥只冷服米飲亦勿火熱或吐或否不妨久病損肺咯血凡一服愈尋常嗽血妄行每服一匙可也此藥絕妙

青藤膏　治一切風疾

單方

內治門

舍粟丸　治久嗽暴嗽

葉子雄黃一兩研以紙筋泥固濟小盒子一个令乾盛藥水調赤石脂封口更以泥封待乾架在地上炭火十觔簇煅候火消三分之一去火待冷取出當如鏡面光明紅色缽內細研蒸餅丸米大每服一

青藤出太平荻港者上
二三月間采之　不拘多少入釜内微火熬
七日七夜成膏及入甕器内用時先脩梳三五把
量人虚實以酒服一茶匙畢將患人身上拍一掌
其後遍身發痒不可當急以梳之要痒止即飲
冷水一口便解風病皆愈須避風数日
雞子飲　治狂走傷寒
出過小雞的蛋殼泡湯服即瘥
白虎歷節風　感風濕而成遍身掣肘疼痛足不能
履地二三年百葉不效身體羸瘦

木通二兩切細取長流水煎汁服之後一時許週身發
痒或發紅點勿思上下出汗即愈
骨蒸勞病
石膏十兩研和乳粉水和服方寸匙日再以身凉
為度
乾血勞　過三年者不治
白鴿一隻去腸淨入血竭一年者一兩二年者二兩三
年者三兩以針線縫住用無灰酒煮數沸令病人
喫之瘀血即行如心中恍亂者食白煮肉一塊即
止
治大風　七惡疾勢不可救者用此藥救之
皂角去皮三斤洗淨為麄末蒸一二次晒乾末研濃煎食
遠加大黃錢調白湯服鬚髮更生
癘疾　不拘遠近
鯽魚草帶根七个好酒煎滾露一宿次早晨復熱
滾向東下兩服即愈
又方
薏仁一兩煎好酒半壺露一宿浸晨熱滾水去米

仁飲下神效
卒心急痛　牙關緊閉欲絶
老葱白五莖去皮鬚搗膏以韭送入咽中灌以麻
油四兩但得下嚥即甦少頃蟲精皆化為黃水而
下永不再發累得救人
心疼
香樟樹皮取去面上黃内第二層皮擣碎煎湯服
下即止永不再發
腰腿疼痛

掃帚子三錢炒為末黃酒送下即止

筋骨疼痛　如夾板狀不可忍者

騾子修下蹄爪甲燒灰存性研末或黃酒或湯調服立愈

水腫

田螺不拘多少水漂加香油一盞于水內其延自然吐出取涎曬乾研為細末每遍不過三分酒調下水自小便下氣自大便出腫即消再服蒸胃脾藥全愈

嗽喘

鴿糞將瓦燒紅放鴿糞在上自然成灰研細末好酒送下立止

又方

殭蚕七條焙黃為末或米湯或茶酒送下即愈

酒積　年久者飲腸即痛即止

桃奴不拘多少為末酒服三錢效驗如神

酒積酒毒

天南星一斤土坑燒赤沃酒一斗入坑放星盆覆泥固濟一夜取出酒和水洗淨切片焙乾為細末入硃砂末一兩薑汁麪糊丸如梧子大每服五十九姜湯下

積塊黃腫

年久砂鍋研末水飛過作丸每酒服五錢

風眼赤爛

明淨皮硝一盞水三盞煎化露一夜濾淨澄清朝夕洗目三日其紅即消半世者亦愈

洗眼中星　久不能去止可去暫時者

白蒺藜三錢水煎洗之三日即無星

眼紅

荸薺汁塗上即好

疽入目中

猪血點之即不生翳

又方
鱔魚血點之即移開
睛起目赤 腫起良久如常者血熱也肝則歸于肝
故熱則目赤腫良久血散如常也 生地黃汁浸
粳米半升晒乾三浸三晒每以米煮粥食一盞數
日即愈
目生翳膜
細料白瓷鐘一个大火煅過研末紙篩加雄黃二
分為末早晚各點少許不可多用牛角鐍發出翳
膜為妙若紅用人退末點四角即愈

咽喉風
木鼈用椀片刮去皮毛取仁切薄片浸冷水內三
个時攪開病人口連水滴下口內潤主嗄間立時
見效
驚氣失音
蜜鮑僧末一錢茶調服即愈
咽中結塊 不通水食危困欲死
百草霜蜜丸芡實大每新汲水化一丸灌下甚者
不過二丸名百靈丸
小兒舌膜 初生小兒有白膜皮裹舌或遍舌根可
以指甲刮破令血出以燒礬末半菜豆許敷之若
不摘去兜必啞
鼻血不止
蒜一枚去皮研如泥作錢大餅子厚一豆許左鼻
血出貼左足心右鼻血出貼右足心兩鼻中俱出
俱貼之立瘥
鼻中肉墜 卷生經驗合集內載此名

藕節有毛處一節燒灰存性為末吹患處
噴嚏丸 治中風不語尸厥等症中惡中鬼俱妙
生半夏三錢為末水丸如黃豆大入鼻孔中必噴嚏
不已水飲之立止
灌鼻出涎方 治遠年近日風癇心恙風狂中風涎
潮牙關不開破傷風痼者用皂角不蛀肥者勿去
弦切碎以酸漿水煲春秋三四日夏一二日冬七
日撲撈去滓將汁入銀器或砂鍋慢火熬以槐柳
枝攪成膏取出摊厚紙陰乾收頓用時取手掌大

一片温浸水化在盞内用竹筒灌入病人鼻孔内良久涎出為驗欲涎出止服温盆湯一二日即止忌雞魚生冷温麪等物

耳鳴

生地黄切斷紙包火煆塞耳數次而愈

耳内腫痛

瓦松搗汁灌之

風熱牙痛

犀角散治一切牙痛去口氣大效

大黄納内燒存性為末早時揩去牙漱去

痰脹腰痛

凡痰脹夏月多患此症面色紫赤腹痛難忍使飲熱湯便不可救即温湯亦忌如遇此症速取生黄豆咀嚼嚥下約至數口立刻止痛平人食生豆寂引吐惡心止有痰脹人食之反覺甘甜不知腥氣此方既可療病且可辨症真奇方也

痞塊

八月白露節後收糯稻上露水晚作二服喫下即消

腸氣

壁虎二條雄一雌一先將小竹筒二个置真麻油入虎浸一宿放在古瓦上慢火炙脆取末每一錢加麝香三分和勻每服只用一分二釐作三次服下一次五厘二次四厘三次三厘燒酒送下即開關先進稀粥三五日後方可喫飯如初起者一服即愈久者二服全愈

治痞積神方

陳核桃燒存性如患痞者小兒每歲服一釐十歲以上只可服一分果得多服大人亦服一分滾湯

調服每日如數服須秤極準分量不可多少服至二三日便泄黑糞十日以後必出臭紅一次患者勿思此是藥驗也必待黑糞變為黄糞痞漸消小然後停藥勿服此方百發百中

盜汗

五梓子去蛀末炙乾研末男用女唾女用男唾調厚糊填臍中外用舊膏藥貼之勿令泄氣兩次即愈

消渴飲水

蜜陀僧二兩研末湯浸蒸餅丸梧子大濃煎黍繭
鹽湯或茹根湯或酒下一日五丸日增五丸至三
十丸止不可多服五六服後以見水惡心為度惡
心時以乾物墜之日後自定甚奇

白濁

羊角火煆刮灰末三錢酒送下立除

止呃逆

刀頭子燒存性白湯調服二錢立止

變通丸　治赤白痢日夜無度及腸風下血

黃連二兩吳茱萸二兩泡七次湯同炒香揀出各自為末粟
米飯丸梧子大另服每服三十丸赤痢甘草湯下
黃連丸白痢乾姜湯下茱萸丸各用十五丸赤白相兼

送下

治痢初起　不問男婦室女妊娠小兒皆治之白
蘿蔔二三斤洗淨連皮放石臼內搗碎絞取濃汁
如十歲以內小兒每日喫一飯碗大人每日喫二
三飯碗俱要冷喫不必見火忌葷腥葅味并治疫
痢如神

血崩　諸藥不效服此立止
甜杏仁上黃皮燒存性為末每服三錢空心熱酒
調下

夢泄

紫花地丁草搗為膏貼臍上立止

紅白淋濁

蓮蓬三十个連根蓮子取食將十根蓮殼用水五
碗煎至三碗如止不必喫不止再服一劑三服除
根

乳汁不通

白蠶為末酒服二錢少頃以暖腊麻茶一盞投之枫
頭數十遍奶汁如泉也

生乳

產後無乳汁萬萱三五枚一味煎湯服乳汁自淋
漓

烏紗驚風　遍身都烏者急推向下
黃土一盌搗末入久醋一鍾炒熱色定熨之引至
下足剌破為妙

急慢驚風　弔眼撮口搐搦不定
代赭石火燒醋淬十次研為細末水飛晒乾每服
一錢或五分煎真金湯調下連進三服兜腳脛上
有赤斑即是驚氣已出病當安也無斑點者不可
治
小兜舌筍　小兜不喫乳啼哭者即看舌上起白泡
一粒即名舌筍如不治即死
鮮生地取汁無生者以乾生地涼井水浸開搗爛
取汁塗患處數次立愈

蜆子水　痘後以此洗面漸生肌肉無斑痕
活蜆子不拘多少以水養五日每日取此水常洗
手面
狐臭
鳳仙花不拘紅白搗成大丸挾腋下待乾再換每
日易三四次二三日內腋下結有墜以壙灰調水
點去永斷根矣
驗胎散　婦人經水三月不行欲知是胎與否以此
驗之
川芎末一匙煎靳艾湯空心調服一錢腹內微動
是有胎不動者非也
神仙外應膏　治筋骨疼痛手足拘攣
川烏一觔為細末隔年陳醋入砂鍋內慢火熬如
醬色敷患處如病有一年者敷後一日發痒；時
令人以手拍以不痒為度先用升麻皮硝生薑煎
湯洗之然後上藥不可見風
臭中出血
大蒜搗爛貼定足心立止即拭去余聞有人以髮
浸冷水內即止

稀痘神方
凡嬰兒無論男女用肥大光潔川練子一歲至三
歲者七个白內搗爛水三碗新砂鍋煎濃傾入盆
內避風處將新稀白布一方蘸水自頭至足遍身
洗擦不留餘空仍用布拭乾避風一刻四五歲者
用川練子九个水五碗六七歲者用川練子十五
个水七碗八歲至十歲川用練子二十个水九碗
十一歲至十五歲用川練子三十个水十五碗照
前煎濃擦洗搗藥忌鐵器非但不出痘還能免瘡

瘡若不信或手或足留一處倘出時必聚一堆此係
神效仙方凡洗浴須擇七个除日洗七次如五月
至八月初止內有七个除日俱在熱天更妙

單方

外治門

國老膏　治一切瘡疽諸毒預期服之能消腫逐毒使毒不內攻功效甚大

大橫紋粉草二觔搥碎河水浸一宿揉取濃汁再以蜜絹濾過銀石器內慢火熬成膏以瓷罐收之每服一二匙無灰酒或白滾湯下曾服丹藥者亦解之

烏龍膏　治一切瘡腫發背無名腫毒初發燃熱未破者取效

隔年小粉愈久愈佳以鍋炒之初炒如湯久炒則乾成黃黑色冷定研末陳米醋調成糊熬如漆瀝礁妝之用時摊紙上剪孔貼之即如冰冷疼痛即止少頃覺痒乾亦不能動久則毒自消藥力亦盡而脫落甚妙

消癰酒　方出千金

萬州黃葉子半觔緊重者為上　如輕虛是他州所產力慢用須加倍取無灰酒一斗投藥入中固濟瓶

口以嫦火燒一復時待酒冷乃開時：飲一盞不令絶酒氣經三五日後把鏡自照覺消即止勿飲不爾令人項但

止腫毒

蓖麻仁擣敷即止

惡瘡疔毒

過岡飛絲大蜘蛛擂爛以熱酒化服下管取毒氣立消

㾦快馬癮

山藥磨沙糖水搽圍即散

毒星散　專治惡瘡痛不可當者糝之不痛不痛者知痛

天南星一味為末如背瘡大痛者遍撒于上即得安卧不痛者糝之如痛即可治也

乳岩

用桑葉腊不拘頭二葉摘去半段取後半段腊三分黄柏八錢水煎乾止用三分飯鍋蒸一次夜露一宿塗患處雖爛見骨者亦能收口平復

多骨癮

送下

一切癮疹

赤小豆七十粒為末水調塗之無不愈者但其性粘乾則難揭入芎根末粘而不粘此法尤佳

脫疽　此症發于脚趾漸上至膝黑色内痛不可忍逐節脫落而死亦有發于手上者

土蜂窠研細醋調搽應手而愈

指生天蛇

雞子開一孔將指入内待蛋化水又換一个如此

三枚而已天蛇痛臭甚者黑豆生研末入蘭内籠之

諸瘡努肉　如蛇出数寸者
硫黄末一兩肉上薄之即縮
棉花瘡
逼蛇草葉搗取汁好酒冲汁送下瘡毒上将渣敷上即消
瘡腫無頭
黄葵花子研酒服一粒則一頭即破兩頭粒即兩頭大

破如神
消瘤
極細臟鐵屑醋拌放銅杓内煆乾則再拌如此三次研細再用醋調敷便覺患處不甚適意過一宿剥去再敷以平為度
腋下瘤癭
長柄葫蘆燒存性研末搽之以消為度
頭瘡生蛆
以刀切破擠綿灰葉汁搽之蛆出盡絶根

乳瘡
佛手山葉搗敷患處圍露出頭次日即出膿消去最驗
又方　一醉消
茗膏煆紅出火毒研每服三錢温酒下添酒盡醉睡覺再進一服
乳頭裂破
秋月冷露茄子裂開者陰乾燒成性研末水調塗之即愈
癟疽毒瘡　肉中忽生黶子如粟豆大者如梅李或赤或黒或青或白其中有核有根深根應心腫泡紫黒色能爛筋骨毒入藏腑殺人宜灸黶上百壯以酸模葉擣其四面防其長也内服葵根汁其毒自愈　根葉花形同羊蹄但葉小味酸為異其根赤黄色
甲疽延爛　瘡腫黄水浸淫相染五指俱爛漸上脚陝沱漿四邊起如火燒瘡日夜怪憎醫不能療
緑礬石五兩燒研末色如黄丹收之每以鹽湯洗拭用末厚敷之以軟帛綾裹當日即汁斷瘡乾每日

一遍鹽湯洗濯有膿處使淨敷其痂乾處不須近
但有急痛者塗酥少許令潤五日即覺上痂起依
前洗敷十日痂漸剥盡軟處或更生白膿泡即擦
破傅之自瘥神驗

鵝掌風

香樟木杵碎煎湯每日早晚温洗三次洗半年愈
兩腿兩臂彎生瘡痛痒經久不愈
多年風窩上蟲殼燒灰以醃猪油同搗如泥塗之
經宿即愈

散毒　圍諸般腫毒

柳枝尖頭十數舂入鍋内熬膏如砂糖樣加蜜半
舩熬以覓器貯用

洗癩頭方

蝸牛數十條洗之二次全愈神妙

痰核

整个五棓子入砂鍋炒黄為末以好醋調膏摊貼
患處易五七次即愈不論新舊俱驗

咽舌生瘡

吳茱萸末醋調貼兩足心移夜即愈蓋引熱下行
也

喉鶚　人已氣絶心頭微熱者藥入口聽有聲能下
者無不治
三九冬天取老婆猪糞放在屋上日晒夜露七八
日取下在炭火上煆至烟盡為度以水調如糊徐
徐灌之

跌打損傷

蒼蝿老虎數个搗爛好酒送下即好

金瘡

圓眼核不拘多少用火燒枯存性研末糁之即愈
如治無名腫毒水調塗俱妙

攔撲欲死　一切傷損從高墜下及木石所壓落馬
撲車游血凝滯氣絶欲死者
淨土五升蒸熱以故布重裹作二包更互熨之勿
大熱恐破肉取痛止則已神效

金刃不出　入骨脈中者

半夏　白斂等分為末酒服方寸七日三服至二

十日自出蘇景中療奴有效者

破斫斷筋　此方出蘇景中療奴有效者
旋菖根搗汁瀝瘡中仍以渣敷之日三易半月斷
筋便續

乳巖　硬如石者
槐花炒黃為末每服二錢好酒調下須日日服
中一粒大如豆漸：大如雞蛋七八年後方破爛
一破即不可治矣宜服此藥　生癬殼數十枚放
砂鍋內焙焦為末每服二錢好酒調下須日日服

之不可間斷　得活蠅所脫之殼尤效

火燒瘡

管仲一味煆灰油調塗之立刻止痛

火燒爛　此症切不可浸冷水中熱毒內攻必爛至骨

好酒一二觔傾入浴缸內畧燒溫令患者坐酒中浸之極重者不死神妙

火燎傷油燒傷皮爛大痛者

好酒一鱓雞子清三个攪勻入溫湯內頓攪如稀糊候冷用軟筆刷患處半日即疼：後以曉楊梅樹皮燒存性為末香油調敷

湯火傷

秋葵花瓣不拘多少真菜油調和如厚糊裝入瓶內收貯次再花瓣腐爛方用愈陳愈妙湯火傷者傳之

癬　身面上如錢大者擦之如神

巴豆五六个去皮打碎包絹內擦之不可擦好肉上

水腫腳氣　未全消者

甘遂末塗腹繞臍令滿內服甘草水其腫便去

口吻生瘡

砂仁殼煆研抹之即愈

一抹膏　治爛弦風眼

真麻油浸原蠶沙二三日研細以筯子塗患處不問新舊隔宿即愈

肛門疼痛

水蠲仁帶潤者雌雄各五个乳細作七丸綿覆濕

處勿令乾每以一丸自消

疔瘡走黃

陳年苔菜研末敷上即消腫收口而愈試過無不
不效

發背陰毒　不燃腫者是
雄雞冠剪冠尖少許懸脚向下滴血瘡上血盡換
不過五六雞止痛消毒不數日自愈
項下氣癭

自然銅貯水甕中逐日飲食皆用此水其癭自消
或燒烟氣久久吸之亦可

單方

禊治門

誤吞銅錢　韭菜切斷煮熟團成食之明日屎出錢在大便出時最良
古文錢十个白梅肉十个淹過即爛搗丸菉豆大
每服一丸流水吞下即吐出
又誤吞銅錢及金銀羊脛骨灰三錢米湯調下次
早由大便解出

拔白換黑

老薑刮取皮一大升于火用油膩鍋內不須洗刷

固濟勿令通氣令精細人守之文武火煎之不得
火急自旦至夕即成矣研末拔白後先以小物點
麻子大入孔中或先點鬚下然後拔之以指撚入
三日後當生黑者神效

小兒誤將竹木刺眼

白頭蝨蚐捏斷滴血入眼物留滯腸胃遂至生
食生來　男子婦人因食生熟不潔燋悴萎黃不思
蟲久則好食生來否則終日飲食

蒼术米泔水浸一宿刮焙為末蒸餅丸桐子大每
服五十丸食前米飲下每日三服即愈
齒黃
糯米糠燒取白灰旦旦擦之
飛絲入眼
京墨點眼以燈草撩去若入口以紫蘇葉細嚼白
滾湯送下又荷花缸內細泥汁點之即刻消愈
小兒初生無膚皮亦因受胎未得土氣也
車轄土研敷之三日後生膚

嗜酒不已
檀中蒼耳子七枚燒灰投酒中飲之即不嗜
固齒灰
臘月醃猪羊骨煆細研每晨擦牙不可間斷至老
而其效益彰頭上齒骨亦佳
禿鬢髮稀
川椒四兩酒浸密室內日日搽之自然長出
實女無竅
鉛作鍼逐日紝之久則自開
小兒鱗體 皮膚如蛇皮鱗甲之狀由氣血否澀亦
曰胎垢
白僵蠶去嘴為末煎湯浴之一方加蛇蜕
兜陰被蚓吹腫
雄鴨涎抹之即消
猘犬咬傷
七日一發三七日不發乃脫也急於無風處以冷
水洗淨即服韭汁一碗隔七日又一碗四十九日
共服七碗須百日忌食酸鹽一年忌魚腥終身忌

食狗肉方得保全否則十有九死
蛇虺咬
看傷處有竅是雄蛇無竅是雌蛇以鍼挑破傷處
成竅然後取野苧麻嫩頭搗汁和酒服之三盞紋剩
渣傅傷口能令毒從竅中出傷愈將渣去水中永
不復發
百脚齧
燈草燒灰敷齧傷處止痛
蜈蚣齧

噀香附塗之立效

蝎毒螫傷

猫溺塗甚妙　用蒜片擦猫牙溺即下

誤食臙黃

噙海鮑即解

毒蛇傷

急飲好醋一二碗令毒氣不隨走或飲香油一二盞然後用藥須要將繩紮定傷處兩頭次用白芷為末白水調下半兩許服之頃刻齩處黃水出盡

腫消皮合而愈

精清不孕

凡煮米粥滾鍋中面上米沫浮面取起加煉過塩少許空心服下其精自濃即孕矣

婦子乳癰

用本嫗梳上垢刮下為丸滾水送下

截瘧　舉子廷試用之

臨期用銀杏五十枚清晨煎湯飲之便可終日不瘧

面上黑氣

半夏焙研米醋調敷不可見風不計遍數從早至晚如此三日皂角湯洗之面瑩如玉也

舌腫　舌忽腫口外是受蜈蚣毒

雄雞血一小杯浸之即縮

誤吞針刺

田雞睛一對冷水囫圇吞之其針兩頭穿珠立刻吐出如冬天無尋處在桑樹下掘深三尺必有

搽魚骨哽

五日午時韭菜地上面東不語取蚯蚓糞泥藏之圓如碎珠粒；成塊為妙遇魚骨哽喉用此少許擦咽喉外皮

猴子疳　是症從肛門或陰囊邊紅暈爛起漸至皮膚不結靨或眼稍口角亦紅若不早治必至爛死凡見此症切忌洗浴只用軟帛蘸甘草湯揩淨用藥雖蔓遍身可保立愈此方極秘已救人無算

菉豆粉一兩　標硃一兩　冰片二三分　輕粉五分　為細末將金汁調鵝毛蘸數上如無金汁雪水亦可或用燈心甘草湯亦可

山鞠散　治婦人產後乳忽細長小如腸垂過小肚痛不可忍名曰乳懸

芎藭　當歸各一斤　以半觔剉散於瓦石器內用火濃煎不拘多少頻服仍以一觔半剉塊于病人桌下燒烟令將口鼻吸烟用盡未愈再作一料仍以蓽麻子一粒貼其頂心

產後肉線

產後用力垂出肉線長三四尺觸之痛心引心腹欲絕一人令買老薑連皮一觔搥爛入麻油三觔拌勻炒乾先以熟絹五尺折作方緒令人輕輕盛

起肉線使之屈曲作三圍納入產戶乃以絹袋盛薑就近熏之冷則更換熏二日夜縮入大半二日盡入也云乃魏夫人秘傳怪病方也但不可使線斷，則不可治

髮癥飲油

病髮癥者欲得飲油用油一觔入香澤煎之盛置病人頭邊令氣入口鼻勿與飲之疲極眠睡蟲當從口出急以石灰粉手捉取抽盡是髮也初出如不流水中濃菜形

又治胸喉間覺有癥蟲上下嘗聞葱豉食香此乃髮癥蟲也二日不食開口而卧以油煎葱豉令香置口邊蟲當出以物引去之愈

又有飲油五升以來方快者不爾則病此是髮入于胃氣血聚之化為蟲也雄黃半兩為末水調服之蟲自出

截腸怪病

大腸頭出寸餘痛苦乾則自落之後出名為截腸病若腸盡即不治但初覺截時用器盛脂麻油坐浸

之飲大麻子汁数升即愈
米瘕嗜米　有人好啞米久則成瘕不得米即吐出清水得米即止米不消化久亦斃人白米五合雞尿一升同炒焦為末水一升頓服少時吐出瘕如研米汁或白沫浚水乃愈
灸瘡成蝶　灸火瘡痂退落瘡内鮮肉片子飛如蝶狀騰空飛去痛不可言是血肉俱熱怪病也
朴硝　大黄各五錢　為末水調下微利即愈
伐毛丹　治鼻中毛出晝夜可長一二尺寸漸漸粗圓

如繩痛不可忍摘去復生此因食猪羊血過多所致
生乳香　硇砂各一錢　為末飯丸梧子大每空心臨卧各服十丸水下自然退落
血壅怪病　遍身忽然肉出如錐既痒且痛不能飲食名血壅不速治必潰膿血
赤皮葱燒灰淋洗飲豉湯数盞自安
眉毛動摇　目不能交瞤喚之不應但能飲食蒜三兩杵汁調酒飲即愈

臍蟲怪病　腹中如鐵石臍中水出旋變作蟲行繞身匝痒難忍撥掃
蒼术濃煎湯浴之仍以蒼术末入麝香少許調服筋肉化蟲　有蟲如蟹走于皮下作聲如小兒啼為筋肉之化
雄黄　雷丸各一兩　為末糁猪肉上灸熟喫盡自安
熱毒怪病　目赤鼻脹大喘渾身出斑毛髮如鐵乃因中熱毒氣結于下焦
滑石　白礬各一兩　作一服水三盆煎減半不住飲

奇病

之
蝨出怪病　臨卧渾身蝨出約至五升隨至血肉皆壞每宿漸多痛痒不可言狀惟喫水卧床晝夜號哭舌尖出血不止身齒俱黑唇動鼻開
鹽醋湯飲十数日即安
病笑不休
滄鹽煆赤研入河水煎沸啜之探吐熱疲数升即愈
灸瘡出血　灸火至五壯血出不止如尿冷欲絕

黃芩二錢炒為末酒服即止
晴垂至鼻人晴忽垂至鼻如黑角塞痛不可忍或
時ㇾ大便血出痛名肝脹以芩活防風益服愈盛念
離魂凡人自覺本形作兩人並行並卧不辨真假
者離魂病也
辰砂 人參 茯苓濃煎日飲真者氣爽假者化
也
精女離魂湯用人參龍齒赤茯苓各一錢煎湯服
大腸蟲出不斷ㇾ之復生行坐不得

天名精錢五為末水調服自愈
氣奔怪病忽遍身皮底混ㇾ如波浪聲痒不可忍
抓之出血不能解謂之氣奔
苦杖 人參青葙 細辛各一兩作一服水煎細飲
盡便愈
便後出血小便後出鮮血數點而不疼如是一月
飲酒則甚
鏡面草搗汁一器入蜜少許進兩服即愈
細縐結瘧後口鼻中氣出盤旋不散凝如黑蓋

蕩穢散婦人月事退出作禽獸之形欲來傷人先
將綿塞陰戶乃頓服沒藥末一兩白湯調下即愈
爛痘生蛆
嫩柳葉鋪席上卧之蛆盡出而愈
肉壞怪病凡口鼻出腥臭水以椀盛之狀如鐵色
蝦魚躍捉之即化為水此肉壞也多食雞饌而
愈
石室秘丹凡人無故見鬼如三頭六臂者或如金
甲神或如斷手無頭死鬼或五色之狀皆心虛而

崇禮之

白朮　蒼朮　各三兩　木戟　山茨菇　各一兩　天南星三錢

附子錢半　夏一兩　各為細末加麝香一錢為末成餅子

更妙于嵗金錠凡遇此病用一餅薑湯化開飲之

吐頑痰碗許而愈

活水止蟲丹　凡人背脊裂開一縫出蟲干餘万腎

中有風得陽氣吹之不覺破裂而蟲現

熟地　山茱萸各三兩　杜仲一兩　白朮錢五　防已錢一　茆蒼

草錢三　二劑蟲盡死

又方

萆麻三粒　研成膏用紅棗三枚搗成為丸如彈子大

火燒之熏衣上則蟲死而縫合

腹中生蛇　此乃毒氣化成或感山嵐水瀼之氣或

四時不正之氣或感尸氣病氣而成也

雄黃一兩　白芷錢三　生甘草二兩為末端午日修合丸如

桐子大粽子米和而丸之飯前食之食後必痛用

力忍之切不可飲水一飲水則不效矣

又方

白芷一味為丸每日米飲送下五錢即全愈

杜隙湯　人足上忽毛孔標血如一線者此乃酒色

不禁恣意縱慾所致流血不止即死米醋三升煮

滾以足浸之即止血後用人參一兩當歸三兩川

山甲一片炒為末煎參歸湯後以川山甲末調之

而飲即不再發

化癆湯

人覺腸胃中癢而無處扒搔者乃火鬱結不散

柴胡錢三　白芍一兩　甘草錢二　梔子炒　天花粉各錢三　水煎

服即愈

救割全生湯　凡人身先發癢以錐刺之再癢以刀

割之快甚少頃癢甚刀割覺疼必流血不已

人參一兩　當歸三兩　荆芥三錢　水煎服三

平貧者無力買參以黃芪二兩代之

體中蚘鳴　凡人皮膚手足之間如蚯蚓唱歌者乃

水濕生蟲也

蚯蚓糞敷患處即止鳴再用白礬五錢　薏仁一兩　生甘

草錢三　黃芩錢二　附子三分　防風一分　水煎服即愈

臂生人面　且能呼人姓名乃寃結所成此奇病也

人參半斤貝母三兩白芥子三兩白朮五兩生甘草　青鹽各三兩白蜜半夏各二兩

右為細末米飯為丸每早晚白湯送下五錢自然漸小而愈

舌縮入喉　不能語言者乃寒氣結子胃腹附子一錢人參三錢白朮五錢肉桂錢乾薑錢治之則舌自舒矣

舌血　出如泉者乃心火旺極血不藏經也六味地黃湯加楓花三錢飲之立愈

掌高一寸

附子一个煎湯以水手漬之至涼而止如是者十日掌即平矣

男子乳腫

金銀花　蒲公英各一兩　天花粉　白芥子各五錢　白芍　通草各三錢　皂角刺三錢　木通　香附子各一錢　柴胡二錢　炒梔子三錢　茯苓三錢　水煎服

指甲盡脫　不痛不痒乃腎經火虛又于行房之後以涼水洗手遂成此病

先用木耳一兩煎洗；後將冰片一分研末而掃之掃盡即縮而愈奇神效驗

糞門生蟲

蛇床子　楝花樹根各三錢　生甘草一錢為末以蜜煎成為勢一條導入糞門聽其自化一條即止痒而愈

眼內肉線

冰片　黃連　硼砂　甘草各一分　各為細末用人乳調點一時收入而愈更用白芍錢柴胡　甘草

各一錢　茯苓　炒白术　梔子　各三錢　陳皮一錢　白芥子三錢　水煎服

黃雷丸　治人身忽長鱗甲于腹脇者乃龍化人與婦人交即成此症而男子與龍合亦間生鱗甲也以速治為妙遲則人變為龍矣

雷丸　大黃　白礬　鐵衣　雄黃　各二錢　研為末棗肉為丸酒送下三錢立時便下再服則鱗甲盡落矣

手皮現蛇　人手上皮上現蛇形一條痛不可忍以

刀刺出血如墨汁用白芷為末糝之少愈如是二次化去先刺頭後刺尾不可亂也

噎中物行　人食生菜時有蜈蚣在葉上悞食之乃乃生蜈蚣于胃口之上入胃則胃痛上噎則喉痛飢則痛更甚

雞一隻煮熟五香調治乘人曙熬將雞列病人口邊則蜈蚣自然外走倘得走出立時拿住戕一條或數條出盡自愈後以生甘草三錢薏仁　當歸黃芪各一兩　茯苓三兩　白芍五錢　荊芥一錢　陳皮一錢　防風五分　水煎服十劑自愈

病蝦　手背脚背腫大有赤痕如蝦子狀名病蝦證用油鹽糟令香以熱湯淬之泡湯藥熱淋洗之即消要服雄煬藥

病蜮　瓦屋骨處結毒如桃李之大紅赤嫩痛不能行動名病蜮芙蓉葉搗泡炒縛爛者以蜮尾殼火煅存性為末麻油調搽即愈大效

土水魚　膝內臁近摺文之處結核腫痛核形如魚狀名上水魚以針刺惡血以柊柘雷霆藤山樟

子葉搗糟炒縛之　又用山雷霆藤山蘇木赤半膝柊柘搗炒縛之　又用山雷霆藤根皮柊柘搗糟炒縛之　又用七聖膏敷之却以九金六馬散服之

蛇蟲　遍身風疹疥丹之狀色白不痛搔痒抓之起白瘡名曰蛇蟲

用油榨田肥株山樟子葉樟樹葉柏葉煎水入些醋洗之

又方只用柏葉一味煎水洗更速也要服苦參丸

蠟丸金銀皂角丸

惡肉毒瘡　一女年十四歲腕軟處生物如黃豆大半在肉中紅紫色痛甚諸藥不效水銀四兩白紙二錢揉熬黜水銀擦之至三日自落而愈

渾身燎泡　如棠棣狀每个出水有石一片如指甲大其泡復生抽盡肌膚肉即不可活京三棱蓬莪茂各五兩研為末分三服酒調連進愈

肉錐怪疾　手足忽然巖巖生肉刺如錐痛不可忍食葵菜而愈

足釘怪疾　兩足心凸腫上生黑豆瘡硬如釘脛骨生碎孔髓流出身發寒顫惟思飲酒此是肝腎玲熱相吞用炮川烏頭末敷之內服韭子湯效

走皮趨瘡　滿頰滿項浸淫濕爛延及兩耳痒而出水發歇不定田野名悲羊瘡

凌霄花并葉煎湯日洗之

熱毒濕瘡　遍身生瘡痛而不痒手足尤甚粘著衣被曉夕不得睡以菖蒲三斤日乾為末布蓆上臥之仍以衣被覆之既不粘衣又復得睡不五七日其瘡如失神驗

血餘怪病　手十指節斷壞惟有筋連無節內蟲出如燈心長數尺遍身綠毛卷名曰血餘狀苓　胡黃連煎湯飲之愈

貓睛眼瘡　身面生瘡似貓兜眼有光采無膿血但痛痒不常飲食減少名曰塞瘡多食雞魚葱韭自愈

肉人怪病　人頂生瘡五色如櫻桃狀破則自頂分裂連皮剝脫至足名曰肉人常飲牛乳自愈

消指散　有人腳板下忽生一指痛不可忍者乃濕熱之氣結成

硼砂一分　丹蔥一兩　冰片三分　人參一錢為末以刀輕刺出血敷之以血盡為度痛亦少止再用人參三錢白朮五錢生甘草牛膝草薢白芥子各三錢半夏一錢薏仁一兩水煎服四劑可全愈而指盡化為水矣外用天師膏藥加生肌散敷之即愈

脣瘡生齒　有人脣上生瘡久則瘡口生齒於脣上者乃七情憂鬱火動生齒奇症也

柴胡　白芍　當歸　生地各二錢　川芎　黃芩　黃連各一錢　天花粉一錢　白果什水煎服外用冰片一分　僵蠶末一錢　黃柏炒為末五錢　麝之立消　法火丹　人腳板中色紅如火不可落地終年不愈　熟地三兩　山茱萸　茯苓各五錢　北五味　牛膝　丹皮　澤瀉　車前子各三錢　草薢二錢　甘菊花五錢　元叙石斛各一兩　水煎服十劑消二十劑永不發

全愈須忌房事三月否則必發難治矣

手足脫下　又仍不死乃患處傷寒時口渴過飲涼水遂至四肢受病手足墮落矣

薏仁三兩　炙苓二兩　肉桂　白朮各一錢　車前子五錢　水煎服一連十劑永無後患

消濕化怪湯　治脚肚腫瘍

白朮　薏仁　芡實各一兩　澤瀉五錢　肉桂五分　車前子　人參　草薢　白蘞　陳皮　白芥子各三錢　牛膝　半夏各二錢　水煎服二劑後用蚯蚓糞一兩炒　水銀一錢　冰片五分　硼砂一分　黃柏五錢　兒茶三錢　麝香五分　為細末研至不見水銀為度　名一日全消矣

卷一
禁方
藥禁
李子建殺鬼丹
時疫大作
嫁腋氣
斷酒不飲
禁蛙鳴又
辟疫
截瘧
香草散
取蛇牙
猫鬼野道
一
化金蠶
除蟲蟻
辟蠅蚊又
滅蝨除蚤
除竈上螻蟻
驅蠅又
除臭蟲
嗜茶成癖
驅螞蟻
辟水毒
禁蝎螫
除花地不生蟲
除竈上蟑螂竈雞
除跳蚤又
辟痘入目
斷蜒蚰
禁蚊又
辟漆氣
驅蛇蟲
小兒夜啼又
蜈蚣螫
絶一切毒蟲
治骨哽又符二
止燕窠
化骨
骨哽
治湯火咒
禁鬼
禁蛾入火
小兒腹痛
字禁
避祟
小兒口瘡
辟蠅蚊又
除蟲
辟蜒蚰
截瘧又四
辟蛇蟹
辟蛇又
蜂螫
辟臭蟲
令病不復
小兒夜啼
辟凍瘃
二
禁蛾
小兒口瘡
辟蠅蚊又
除蟲
辟蜒蚰
截瘧又四
辟蛇蟹
辟蛇又
蜂螫
辟臭蟲
驅蛇蟲
小兒夜啼又
蜈蚣螫
絶一切毒蟲
治骨哽又符二
術禁
釘毒
白虎病
身面疣目
釘瘧
灸牙痛
卵癭偏墜

眼生偷針
小兒遺尿
人身上結筋
疾患疼痛
咒餅除癚
百蟲傷
禁鼠
驅蚊又三
滅尸蟲
串雅外編　總目
選元
起死門
雷真君治五絕
懸雞法
溺死
卒中惡死
還魂湯
打死
解藥毒死
消努肉
小兒夜啼
破傷風
夜卧禁魘
咒梨除癚
咒棗治病
蜂蠆螫傷
驅蛇蟲又
滅臭蟲
騎牛法
揷鵝法
救誤死
人卒暴死
血風攻死
小兒驚死
產後暈絕
喉痺垂死
急疹將死
援絶神丹
保生門
損目破睛
腦破骨折
肩傷
接舌神丹
卒心急痛
串雅外編　總目
奇藥門
立泯傷腫
接骨散
瞌聖散
長齒法
逐火丹
彭祖接命丹
芙蓉散
長髮方
金瘡腸出
擦落再臬
兒不啼乳
落眉復生
痘瘡壞症

拔毒異法
壬子丸
卷二
藥外
針法
糊猴勞
喉痺
消癖神針
灸法
治諸毒不收口
內府磁壺酒解方葉
桃悶疹子
百發神針
陰症散毒針
鵝掌風
牛皮癬
久病截瘧
蟲牙
喉痺
小兒脫肛
疥瘡
手足痛風
破傷風
蜈蚣咬
口眼歪斜
痘不脫靨
頭風揷耳
喉症開關
霍亂轉筋
癰疾頑風
拳毛倒腚
咳嗽熏法
雞爪風
附子灸
灸癬
疝氣偏墜
胡桃灸
苦蚘灸
艾灸
麻葉灸
女人病邪
舌脹吞出
熏嗽
艾太醫桃葉蒸
貼法
小兒赤眼
小兒重舌
收陰症傷寒
截驚法
醫小兒
乾霍亂死灸
黃蠟灸
灸耳聾
灸癰疽
雞子灸
桑木灸
灸目
熏法
喉閉
手汗
青布熏
痢疾塞肚
男女勞怯
止自汗
嬰兒瘧疾

隔皮取膿
牙齒疼痛
貼膪截瘧
如神丹
水瀉不止
小兒口内流涎
蒸法
癮風
脚氣腫痛
串雅外編　總目
珊瑚蒸
阮河南桃葉蒸
蒸脚氣
洗法
洗頭明目
洗癩頭
洗凍瘃
洗青盲
熨法
痞塊
截瘧丹
難產仙方
地黄膏
痢疾禁口
牙痛
骨蒸發熱
風濕痰病
千金神草方
鹽沙蒸
荆葉蒸
小兒咳嗽
洗癰疽
五枝浴
楊枝浴
痞積
吸法
還毫丹
傷寒咳逆
燒香治勞
一切咳嗽
頭風苦痛
單鵝
雜法
串雅外編　總目
痔瘡坐袋
鈎骨丸
香橼皂法
産婦血暈
掌中取積
縮賢瘤
彭膪官鈎骨法
膨脹取水
赤腫法
引火法
濕瘡踏袋
黄疸取黄
耳鳴塞耳
消毒燈炷
神燈照法
柳皮熨
青火金針
水腫上氣
冬月喉痺
碧雲散
石南葉散
倒睫拳毛

鈒血
卷三
僞品門
假冰片
假雄黃
假胡椒
假象皮膏
製品門
法製

法製青皮
白豆蔻
法製檳榔
香茶又
法製川芎
法製桃仁
三奇麵
藥品
霣砂

紫雪

溫膕種子
樟冰又二
假膽礬
假乳香

烏龍膽
法製橘紅
法製牙茶
法製枳實
法製人參
造櫻珠

紅雪
消石
礬石
土黃
取菜豆油
雲母粉
造海石
臭烟
水銀霜

石菖蒲酒
少陽丹
齒藥
造礬精礬華法
食品
茶鬆
茯苓酥
香橙湯
仙人粮
碧雪
石脾
飛黃
元霜
油臙脂
取砂永
取草永
雞子雄黃
大玉容丹
代茶湯
固齒延壽膏
屠蘇酒又
醉茶
絡索米
邊巡酒
栝蔞粉

瓊玉膏
止瘧果
金枣仙方
養元散
川芎茶
蓮花肚
藥肺
九仙王道糕
桂漿渴水
串雅外編　總目
用品
螢火丹
五色蟾墨
紫霞杯
灌頂油
八白散
七物虎頭圖
蚊烟法
雜法
糟川芎
三仙酒
藥梅
龍液膏
五香鴨
香鰻
長壽粉
三仙糕
八仙茶
十
取蟾寶
烏鬚鉛梳
香肥皂
烏頭麝香油
香身丸
女廉藥枕
一枝梅
紫金錠
雁腹丹
十香丸
白沙藥
軟脚散
蟾酥丸又
梅蘇丸
參杏丹
串雅外編　總目
玉泉丸
卷四
醫外
醫禽
鶴脛折斷
南禽發風
鴿病
鸚鵡病
鷄子病
七聖紫金錠
雞子丹
觀音救苦丹
神妙痧藥
望梅丸
火龍丹
白梅丸
龍腦雞酥丸
上清丸
十二
太倉丸
鶴病
金雀
孔雀病
畫眉病
了哥病

黃頭病
雞瘦
雞哮
雞瘟又
醫獸
馬證
羊證
猫證
猿猴病
串雅外編 總目
象生瘡
醫鱗介
魚病
龜病
醫蟲
蟋蟀病
救蠅溺死
醫花木
花遲不發
雞一切病
雞水眼
鵪鶉病
牛證
猪證
狗證
鹿病
十三
駝病
魚生蟲
蠶病
毒蛀
落毛蟲
疔生稗
薔薇腦生蓼
皁角無實
樹生癩
出櫻桃蟲
桃自落實
桑癩
花衾麝冲
串雅外編 總目
銀杏不結子
樹老
蘭泣
取蟲
牙齒蟲痛
齒蟲并蟲
烟熏臭蟲
風蟲牙痛
寸白虰蟲
曲樹令直
桃樹永年
蘿蔔諸菜生蟲
取牙蟲
牙齒蟲牙痛
蟲牙作痛
蟲牙
寸白蟲痛
建蘭生蟲
茉莉根生蟻
菖蒲無力萎黃
果樹生蟲
解樹藥釘
桃皮作脹
楠病
蘿蔔空心
木樨受蛀
十四

下蚘蟲
腹中蟲病
小兒蟲瘡
取足瘡蟲
積年骨疽
痿瘡有蟲
吐蟲
取疳眼蟲
五色帶下

取心氣蟲痛
一切蟲痛
取癮癖蟲
取疽瘡蟲
消渴有蟲
聤耳有蟲
瘻瘍有蟲
三十六黃
癘瘡蛀爛

癘瘡生蟲
痔漏有蟲
下部蟲痒
三木節散
脾勞發熱
大風癩蟲
大風癘蟲

取痔蟲
腸痔出血
下部蠶蟲
肝勞生蟲
追勞取蟲
癘風有蟲

韓湘子脫衣方
煮白石法
行路不飲水不渴
千里醋
漿衣不透雨
寒月入水
見鬼丸
女人去面毛不用線
寫字去墨又三
洗字不見
起字法
灰種仙菜法
驅鼠烟
聚蝶
漿衣去蝨
造白雀法
擦銅如銀
點斑竹

韓湘子煮袍鞋法
行路不喫飯自飽
千里酒
千里鞋
暑天穿襖
造夢法
剃頭不用刀
飲酒不醉
洗字法
去珠法
墨名不染紙
驅除虎蛇神烟
掃蚊蟲烟
拍掌喚蝶
醉雀米 別
鳶頭散
擦錫如金
點磁石

磨鏡丹藥
點藥鏡
頃刻成碑
夏月作氷
春球
葫蘆相打
佳人變鬼 刪
吽人放屁 刪
手帕盛酒

串雅外編 總目

長明灶

寫字入石
稜碗膠
瘦米
巧洗油跡
斟酒不溢
木狗自走
佳人移眉 刪

錢塘趙學敏恕軒纂

禁方

禁藥

李子建殺鬼丸 辟瘟疫殺一切鬼魅魍魎
藜蘆三兩 虎頭一兩 五錢 雄黃 鬼臼 天雄 鬼英
蕪夷各五錢
右為末蜜丸 如皁子大熱病時氣燒一丸安牀頭
辟疫

人凡入瘟疫之家以麻油塗鼻孔中然後入病家
去則不相傳染既出或以紙撚探鼻深入令嚏之
方為佳

時疫大行
自家水缸內每早投黑豆一把全家無恙

截瘧
端午七姓人家粽尖獨囊蒜七枚雄黃三錢巴霜
一錢去油搗為末小丸硃砂為衣用臨發日未來
時綿裹塞鼻孔內男左女右過夜即止去葉或用

膏藥收口須將藥貼眉心止即去之

嫁胺氣

桔枸樹鑿孔取汁一二碗用青木香東桃西柳七姓婦人乳一處煎一二沸就熱於五月五日雞叫時洗了將水放在十字路口速回弗顧即愈只是他人先過者必帶去也枸桔樹即枳椇也

香草散　截瘧

香附醋浸透銅鍋炒一兩草烏麵同炒去麵五錢為末每用一分臨發先時含舌上滾湯下老弱者

七八厘小兒五厘極重二服即愈

斷酒不飲

酒七升硃砂半兩瓶浸緊封安猪圈內任猪搖動七日取出頓飲

取蛇牙　蛇毒螫傷牙入肉中痛不可忍者勿令人知私以荇葉覆其上穿以物色之一時折牙自出也

禁蛙鳴

野菊花連梗葉研末順風撒去其聲即止

又方

以牛膽塗紙置水中亦不鳴

猫鬼野道

相思子草麻子巴豆各一枚研砂末蠟各四銖合搗丸如麻子大服之即以灰圍患人面前着一斗灰火吐藥入火中沸即畫十字於火上其猫鬼者死也

化金蠶

雷丸三錢為末同白礬少許調勻見金蚕出見時以

末少許參之立時蠱化為紅水如血蠱神必震恕作祟倘空中有聲即將藥末聽其聲响處望空洒去神必大罵負心而去永不再至矣

辟水毒

蛇莓根搗末服之并導下部亦可飲汁一二升更無所畏又辟射工家中以器貯水浴身亦宜投少許蛇莓就地引細枝三葉；有齒刻四五月間小黃花五出結寔鮮紅狀似覆盆而面與蒂不同

驚蟄日用石灰糝門限外免蟲蟻出

禁蝎螯

咒曰玉女傳仙攝勅斬蚣蜥滅
右如有蝎螯之人求治者於患處望而取氣一口
默念七遍怒着作法咬蝎處其痛即止用法之人
忌五厭肉

辟蠅蚊

楝樹一枝將酒糊塗之懸掛空處蠅飛上不能走
收過二三次即無放蠅必瞋野不可打死訣曰甘

草蓂蘆李子花更兼一味夜明砂每日清晨燒一撒
蠅蚊只在兩隣家

禁蚊

端午日取浮萍一把鬧楊花一把為末於清明日
取鱉血和二味調勻搽在房門上則蚊虫一室俱
無矣

又

新造屋內柱下四隅裡蒲扇蚊永不入
滅蟲除蚤

百部　水銀　茶葉錢各一　黑棗枚三研和布包帶身
不出蝨

鴿糞　水龍骨　風茄花葉三打和燒煙蛇蚤是蟲
絶根

除花菜地不生蟲

棟樹根燒灰盛布袋待露水濕撒之即除

除竈上螻蟻

芥菜子　巴豆　搗爛灑竈上即除

除竈上蟑螂竈雞

密陀僧　狼毒　研碎洒竈上即除

驅蠅

臘月取鱖魚一枚懸廁上則一家無蠅乾者亦可

又

臘月八日懸猪睪於廁上則無蠅

除蚤蝨　蛇蟲諸毒

樟冰芜茅山蒼朮　石菖蒲各錢三　共為末糝牀褥
間及壁角諸處則絶

又

芥菜子　辣蓼　樟腦各一錢　燒烟薰之即除

除臭蟲

硫黃數錢為末和棉花子燒烟熏二三次即絶

辟瘡入目

凡瘡初起將獨女臙脂揩眼眶則瘡不入目一見瘡時牛蒡子不拘多少其母嚼碎貼兜顋門則瘡不入目

嗜茶成癖

一人病此方士令以新鞋盛茶令滿任意食盡再

盛一鞋如此三度自不嗜也男用女鞋女用男鞋用之頗驗

斬蜒蚰

白礬水洒其來處　又用酒脚糊窓紙則蜒蜒不敢食

驅馬蟥

二麥桿頓棲水上流水入池中可祛馬蟥

辟漆氣

人有見漆多為漆氣上騰着人而生漆瘡者川椒三四十粒搗研塗口鼻上則不為漆所害

禁鬼

埋瓦石于宅四隅槌桃核七枚則鬼無能為殃

令病不復

取女中下裳帶一尺燒研米飯服既免勞復

禁蛾入火

取燈草用冬雪水浸七日取起陰乾暑月燃燈凡一切蟲蛾即不奔赴

又方

清明日早晨取井水一盆不可落地折柳枝一條同燈草浸其中取起陰乾暑月燃之可免蟲蛾撲

小兒夜啼

取井邊草私着席下勿令母知或雞窠猪窠中草皆可

小兜腹痛

取樹孔中草暗着戶上即止

辟瘡瘃

人日午時取獨蒜搗爛塗面皮手脚一年不生惡瘡及冬月不作凍瘃不可多擦神驗

禁方

字禁

避祟

小兒額上寫八十字此乃旃檀王押字鬼祟見則遠避

截瘧

每逢發期先將後開名字用硃筆寫就男左女右縛于臂上即止

一六日田良二七日孟逢春三八日季天緑四九

日謝閒遊五十日任牙生

又以左右一箇月用墨書寃圓；行路非難捉取瘧鬼送與河官書了收向患瘧者懷裏行欲發時取出擲向水中便歸即效

又橘葉七片每片硃書一字甩跑驢驅驅驅驅驅將葉焙乾為末未發時白湯吞之

又病人走到背立褪露左肩上寫管仲午三字寫完即走在外不要回顧凡用此法須預先叮囑病人走到竟自袒肩寫畢竟去不可開口

小兒口瘡
湯瓶內鹼為末醋調臨卧時書十字於兒兩足心即愈

辟蛇蠍歌
端午日將硃砂寫茶字倒貼辟蛇蠍

又辟蜢蚊
書風字閒字貼窻壁下無蚊

辟蠅蚊
端午日寫白字倒貼或寫儀方亦可

辟蛇
於四壁柱下用劍流水研墨書龍字貼之蛇見自畏

多用輒瓦寫儀方二字置四處蛇見字畏避之

除蟲
名五字符吸北方煞氣一口啧筆尖上書欽深淵默漆五字于黃紙上貼于綴衣帳牀褥閒其蟲自無

蜂螫
蜂螫人就地以竹寫丙丁火三字七遍取土揩螫處

一法掐劍訣向空書子丑寅卯辰巳午未申申字之豎直豎至地取土搽之即愈

辟蜒蜿
端午日書滑字及辟蚊蚋書風烟字閒貼窻壁

辟臭蟲
用紙書云欠我青州木爪錢將此字貼于牀脚上忽然不見一云張三賢買了木爪不完錢

一去三十年寫此貼牀脚上亦驗一法買木爪一箇臨卧時以手拍爪口念云張世緣張世緣欠了河南木爪客人錢木爪客人今在此速去速去速去來還錢臭蟲自遁也

驅蛇蟲
藏經有偈云苦求：不得多求致惡憎梵求菩提徹老不相見依此寫倒貼四壁外蛇自不入

正燕窠
書戊字貼至處又用白紙朱書鳳凰二字貼於巢窠

上即去

小兒夜啼

用火柴頭一箇長四五寸削平面用硃砂寫云檢火杖撿火杖將來捉神將捉着夜啼鬼打殺不要放急〻如律令

又將硃砂書甲寅二字貼牀頭即止

化骨

左手三山訣執淨水一碗右手劍訣二指于水面止寫龘虎急化四字字畫分明患者呑服

蜈蚣螫

畫地作王字取土糝之即愈

骨哽

用碗水虛空以手指寫天上金雞叫地下草雞啼兩雞并一雞九龍下海喉嚨化如滄海二十五字口誦七遍飲此立愈

又書鳥飛龍下魚化丹丘亦可

絶一切毒蟲

五月五日午時書此貼壁毒蟲永絶　署

治湯火咒

龍樹王如來授吾行持北方壬癸禁火大法龍樹王如來吾是北方壬癸斬天下火星辰千里火星辰必降急〻如律令手握真武印吹之即用少許冷水洗雖有火燒手足成瘡皆可療

治骨哽咒

紅引登樓問此星我出直人問此人太上老君急〻如律令勅一氣七遍呵入茶酒中飲之立愈

治骨鯁

龘喉內卡骨用此字如利害者照此字寫七箇或九箇如喫飯即在飯碗面上喫酒即在酒杯面上寫〻畢飲之效

又

龘喉卡魚骨用此字如利害者照前法效

禁方
術禁
釘毒
治一切腫毒瘡癰若患三日内者釘便散若已成即易瘥囫濃壘好者依此法於土牆上高處書之以竹釘就中間釘之先令病人嗽一聲便吸氣吹於竹釘上七釘止仍不得移動須至誠則神驗

釘癆
水鑑仙人歌曰癆是邪風寒熱攻直須術治免成

空常山刻作人形狀釘在核兇土氣宮如金生人金在巳即釘巳上木生人釘亥上火生人釘寅上水土生人釘申上也

白虎病
江東人呼為歷節風是也置此于病者前自愈亦厭伏之意也白虎糞神名狀如猫埽糞門下令人病此療法以雞子揩病人痛處咒願送於糞堆之頭上勿反顧
取土甩年深既古且潤三角甩一塊令三姓童子

候星初出時揩第一星下火於尾上炙
卵墮偏墜
雙蒂茄子懸房門上出入用眼視之茄萬患亦萬茄乾患亦乾矣又双茄懸門上每日抱兒視之二三次釘針于上十餘日消矣

身面疣瘊
七月七日以大豆拭疣上三過使本人種豆於南向屋東頭第二溜中豆生葉以熱湯沃殺即愈

消腎肉

凡人身有努肉可聽人家釘棺下斧聲之時便下手擦二七遍以後自消平產婦勿用

眼生偷針
布針一個對井睨視已而折為兩段投井中勿令人見

小兒夜啼
以撥火杖一根以劍訣手書敕令默咒曰撥火杖撥火杖玉皇命你做丞相拏住夜啼鬼打死打死永不放吾差三十六神將將鉄棍銅槌祛邪歸正

吾奉太上老君急々如律令勅

小兒遺尿

紅紙剪馬四疋令兒自安身下每夜如之

破傷風

火命婦人取無根水一盞入百草霜調捏作餅放

患處三五換如神

人身上結筋 轉

用木杓打之三下自散

夜臥禁魘

凡臥時以鞋一仰一覆置牀下則無惡夢夜魘

疾患疼痛

咒曰金木水火土五行助力六甲同威天罡大神收入橐心橐入腸中六腑安寧萬病俱息急急速求榮 用棗子一枚念咒一遍吸罡氣一口入橐中男去共女去蒂用水嚼下忌獸物七日

百蟲傷

先問被傷甚蟲傷來默念火德真君黑煞攝吹在被傷處如此七遍被傷人自麻不痛

蜂蠆螫傷

足摩其上唾一七遍置足於故處

禁鼠

逐月旦日取神后方土泥屋之四角及塞鼠穴一年鼠皆絕

跡此李處士禁鼠法也神后正月起申順行、十二

惟食瘡鬼塞咒三遍吹于梨上書勅殺死三字令病人臨發前食之

咒餅除瘡

咒法先面東燒香虔誠於油餅中心書一摧字不用糖餅書字如錢大仍須新筆淨墨 以筆圈之從左邊圈三次持餅於香上誦乾元亨利貞七遍發日早搗去所書字用棗湯嚼餅食之

咒棗治百病

咒曰華表柱念七遍望天罡取氣一口吹于棗嚼吃湯水下華表柱鬼之祖名也

辰

驅蛇蟲

黃紙硃書三字符志誠於土地前焚香將符貼土地堂內則蛇蟲不復出現而潛去矣如值夜行或草路中畏蛇蟲當道則頻會此三字并依法掐訣即無見矣用左手剔面掐己為訣方書三字符

麥當龍當龍

一法用儀方儀康四字

驅蚊

收東方青炁咒七遍嚥入水碗中將水以口吸而噴四壁各處其蚊自去咒曰天上三足烏嘴利如鎚啄不食人間五穀只食蚊蟲骨髓急〻如太上老君律令

又咒曰天地太清日月太陰陽太和急〻如律令敕面向太陽念七遍吸氣吹燈草上夜點之辟蚊蟲

又於除夕五更使一人堂中向南扇一人問云作何事答云扇蚊子問答乃已永無蚊蟲

又端午正午時望太陽將水咒曰天上金鷄唼蚊子腦髓吸太陽氣吹燈心上咒七遍遇夜將燈心點照避蚊

滅臭蟲

霖除元煞　咒曰日出東方壁單元藏天煞地煞月煞時煞二十四煞七十二煞一切煞星惡煞盡皆煞除臭蟲滅跡

滅尸蟲

春正上甲乙日視歲星所在焚香朝〻禮拜祝曰

臣願東方明星君扶我魂接我魄使我壽命歸長如松柏願臣身中三尸九蟲盡消滅頻〻行之吉

選元

起死門

雷真君傳治五絕方 乃縊跌魘淹壓等死

先書符一道于黃紙上焚化在熱黃酒內攙開牙關灌入喉中後再用藥九調黃酒內以人口含葱管送入死人喉內少頃即活

招魂符式 此符無咒一心對雷真君天醫使者書之靈驗無比

藥凡名救絕仙丹

山羊血二錢 菖蒲二錢 人參三錢 紅花一錢 皂角刺一錢 製半夏三錢 蘇葉二錢 麝香一錢 各為末 蜜九龍眼核大 大酒化開 以端午日脩合妙 每料約十九 此方神奇之至不但救五絕凡有邪祟昏迷一時猝倒者皆可起死回生

騎牛法 專救溺死

凡人溺水中救起 以身俯伏于黃牛背上手足用人扶另用一人牽牛緩行有五里之久自活

懸雞法 專救縊

凡人縊者將人解下輕扶仰卧將活公雞倒懸流出口涎入人口內自活

捕鵝法 治自縊

用老鵝一隻將香油抹鵝嘴上插入糞門內一二時自活若過一二時辰則不救矣

溺死 即死半日一日者皆可救

以所溺之人扶在椅上將其左右手腳不住運動復將其口耳鼻竅道寒住兩眼亦包住用舊藍布撚繩燒煙先以竹管呼烟吹入鼻孔水即自鼻出俟有微氣即以布繩烟熏其鼻孔即活

救誤死

凡人無病或坐卧或酒後陡然即死者名旺痧將本人口內用鉄器撬開以銀簪刺舌下小青筋血出即活不可刺正中又方以悶醋灌下即刻活矣

卒中惡死 或先病或平居寢卧奄息而死皆是中惡

急取葱心刺入鼻孔中男左女右入七八寸鼻目血出即甦

人卒暴死
搗女青一錢安咽中以水或酒送下立活
還魂湯　治一切卒死
麻黃三兩去節杏仁七十箇去皮共甘草一兩水一碗煎一碗去滓灌之
血風攻死　婦人血風攻腦頭旋悶絶忽死倒地不知人事者
蒼耳草嫩心陰乾為末酒服一大錢其功甚速此物善通頂門連腦

起死門　二十二

事雅外編　卷一

打死
松節搥碎一二升入鉄鍋内炒起青烟為度以老黃酒二三升四圍沖入即濾淨候半熱開牙灌入即活
小兒驚死　大吐一聲就死者名曰驚
以散麻纏作脇下及手心足心灯火燃之用老鴉蒜曬乾車前子等分為末水調貼手心仍以灯心燃手足心及肩膊眉心臭心即醒也
解藥毒死　只要心閉温暖者乃是熱物犯之防風一味擂冷水灌之
產後暈絶　此扁鵲法也
半夏末冷水和丸大豆大納鼻中即愈
喉痺垂死　止有餘氣者
巴豆去皮線穿内入喉中牽出即甦
華陀危病方　治纏喉風喉閉其症先兩日胸膈氣緊出氣短促驀然咽喉腫痛手足厥冷氣閉不通頃刻不治
巴豆七枚三生四熟生者去殼研熟者去殼炒去油存性　雄黃皂子大者研　醫金

起死門　二十三

事雅外編　卷一

一箇蝉肚者研細　共為細末每服半匙茶調細呷如口噤咽塞用小竹管納藥吹喉中須臾吐利即醒如無前藥用川升麻四兩剉碎水四碗煎一碗灌入又無升麻用皂角三錠槌碎擂水一盞灌之或吐不吐即安
急疼將死
將口撑開看其舌處有黑筋三股男左女右刺出紫血一點即愈刺血忌用針須用竹箸嵌碎磁碗共為妙中開一筋切不可刺

急救方

獐雄狐膽收藏年二月遇暴亡之人以溫湯細研灌下即活

援絶神丹　凡人患痢便血一日閒至百十次不止者至危急也即以此藥援危又不損傷氣血痢止身亦健

白芍二兩　當歸二兩　枳殼二錢　檳榔二錢　甘草二錢　滑石末三錢　廣木香一錢　蘿蔔子一錢　水煎服一劑輕二劑止三劑全愈

金瘡鉄扇散

象皮五錢　黄色以乾為度　龍骨五錢　白蠟一兩　山陝等省無之　乾薄片用小鍋焙研細末　老材香一兩　即松香中黑色者　飛礬一兩　將白礬入鍋內熬化即是　共為細末貯磁罐中遇有刀石破傷者用數瘡口以扇向傷處揚之立愈忌卧熱處如傷處發腫前黄連水用鎖毛蘸塗之即消蓋傷處喜涼惡熱夏月宜卧涼地冬月忌卧熱處傷口不必用包裹以致過煖难于結痂并忌飲酒以致血熱妄行至數藥之時若血流乃用扇搧之倘不流血即不必搧

選元
保生門
損目破睛
牛口涎每日點兩次須要避風黑睛破者亦瘥
金瘡腸出
小麥五升水玖升煮取四升綿濾取汁待極冷令病人卧席上含汁噀之腸漸入噀其背並勿令人知及傍人見榜人語即腸不入也乃揩席四角輕搖使腸自入十日中但畧食美物慎勿驚動驚動即殺

卒心急痛　牙關緊閉欲絶
老葱白五莖去皮鬚擣膏以麻油四兩但得下咽即甦少頃蟲積皆化黃水而下永不再發累得救人
瘡瘡壞症　身如黑圍之氣口不能言食不能下皆由氣虛而火不能發也毒留於中而不得洩形狀如死者
人參三錢　元參三兩　荆芥一錢　金銀花一兩　陳皮三分　水煎五分灌之下喉而眼閉少頃而身動久之而神氣回

口能言食能下矣不必再服他藥瘡瘡自回而生全至奇之方也

人
臘破折骨
龍齒透明者三錢　冰片三分　人參透明者三錢　象皮一錢　生地三錢　土狗三箇去頭翅　地蟲二十個　先將人參各項研末用土狗地蟲搗爛入前藥搗之佩身上三日乾為末瓶貯遇有此等病醫之可也並可接骨服下神效骨斷者服一錢即愈

落眉復生
桑葉七片每日洗之一月重生如舊髮滴落亦然

選元

奇藥門

立泯傷腫　治打撲有傷或青腫紫硬此藥泯之熟麻油和酒飲之以火燒熱地卧之覺即疼痛俱消

探生散　治小兒急慢驚風諸藥不治以此定其死生

雄黃　沒藥各一錢　乳香五分　麝香二分半　共為末用少許吹鼻中如眼淚鼻涕皆出者可治

接骨散　凡跌損骨節脫臼接骨者用此則不知痛也

茉莉根酒磨一寸服則昏迷一日乃醒二寸二日三寸三日

縮陽秘方

水蛭九條入水碗養至七月七日取出陰乾秤有多少入麝香蘇合香三味一般細研為末密少許為餅遇陽興時即將少許擦左脚心即時痿縮遇日復興再擦

生舌神丹　凡人舌被人咬斷不能生者以此藥蘸之則生

先以人參一兩煎湯含嗽半日乾吃再用龍齒末三分人參末一錢蟾酥冬末一錢血竭三分冰片二分土狗一個地蚰十個各火焙為末放地上一刻出火氣將末藥乘人參漱口完時即以此末自己用舌蘸之使令遍不可將舌即縮入口中放在外半刻至不能忍然後縮入可也三次則伸長矣

長齒法

雄象脊骨 全用餘骨不用尾亦不用頭亦不用骨碎補三錢炒為末 鹿骨香一分熟地身懷之令乾不用 夏布包定甘草二分榆樹皮三分搥之諸藥俱忌鉄器當歸一錢青蓋二錢杜仲一錢各為細末鼠骨新瓦焙乾為末不可燒焦乘其生氣也用一磁瓶盛之每日五更時不可出聲將此藥輕擦無牙之處三十六擦任其自然咽下不可用水漱口一月如是日間午間擦之更佳亦如前数

瀉毒神丹　瀉砒毒

大黄二兩生甘草五錢白礬一兩當歸三兩氷煎数碗飲之立時大瀉則生否則毒入于臟無可救矣

逐火丹　治湯火傷

大黄五錢當歸四兩荆芥三錢炒黑生甘草五錢黄芩三錢防風三錢黄芪三兩茯苓三兩水煎服一劑痛減半二劑全滅

斬鬼丹　治鬼胎如抱一甕

吳茱萸　川烏　秦艽　柴胡　白殭蠶為末煉蜜丸桐子大每服七丸酒下取去惡物即愈

彭祖接命丹

大附子重二兩二錢一箇或一兩六錢亦可切薄片　百兩甘遂二兩俱碾碎二味燒酒武火煮酒乾為度取起附子甘草甘遂不用加麝香三分錘千下作二丸陰乾一丸填臍内七日一換一丸放黑鉛盒内養之此丹煖丹田助兩腎添精補髓却病久固返老還童延年益壽

還元丹

安五臟消百病此藥大能令瘦者肥補虛損寔精髓固元氣

黄牛肉不拘多少去筋膜切作如棊子大片用河水洗数遍令血味盡仍浸一宿次日再洗水清為度用無灰好酒入鐺内重泥封固用桑柴文武火煮一晝夜取出焙乾為末如黄沙為佳焦黑無用每末半斤入山藥四兩重加葱薑為末白茯苓四兩堅實者蓮子四兩去心葱薑炒小茴香二兩去枝梗微炒香右共研為末和勻用紅棗

不拘多少湯藥大爛皮肉相離去皮核研為膏加好酒入前藥丸如桐子大空心溫酒下五十丸初服日進三服久則一服或丸如彈子大每日好酒空心細嚼一丸

芙蓉散

治室女無夫者思慾動火以致肉痛自汗頰赤脉亂

芙蓉花葉有花帶花有子帶子採一斛搗爛和井水濾去渣服之即效

開聰明方

荷花梗（含蓝）晒乾為末同何首烏（忌）煮水沖服當茶久則令人聰明雖至愚者亦心靈生慧也

長髮方

羊乳不拘多少納鯽魚腹中用尾缶固濟燒灰和香油塗髮數日髮漸長而黑矣

長鬚方

鹿角兴鎊細二錢阜角刺二錢牙皁二錢檄模煅灰存性四兩酸橘（橘）子一枚取汁生薑亦取汁共二

兩四錢和勻入磁器內收貯用柳木塞口重湯煮三炷香聽用每日晚間以肥皁水洗淨短鬚上藥擦之天明洗去至四十九日長尺餘如欲再長則再擦時每日喫胡桃一箇至二七日喫兩個三七日喫三個為例

拔毒異法

鐵屑研極細以好醋調之煎二三沸撈取鐵屑舖患處將上好磁石一大塊頻吸之則其毒自出也

治諸毒不收口

生鉛三分敲成薄片剪如香茶樣分三服每日用鉛一分拌核桃肉嚼好酒送下三日服完收口大便內出毒物而愈

壬子丸

依方修合此藥服之不過半月有孕

吳茱萸　白芨　白蘞　白芷　各一斤　細辛　各五錢　蒿蒲　白附子　當歸　各二兩　人參　各四兩　乳香　三兩　沒藥　四兩　右共為末煉蜜丸如

梧子大每服十九有效若男子服補益若孕婦服即生雙胎空心好酒下用壬子日修合勿令雞犬婦人見

內府磁壺酒

天仙子六兩　野菊花三兩　陳皮八兩　泔水浸製去白　甘草四兩　去皮　川烏十枚用草果去穰以川烏未入草果不出以上六味為九　鹿茸羊油炙　巷閭子　冬青子　沙苑蒺藜各一兩　聽用　晚蠶蛾十對全尾　酒浸各一兩　炙為末　蛤蚧一對　酒浸去頭爪　共六味為末　造麴用杏仁去皮　良薑　砂仁　半開紫赤茯苓　蒙山茶各一兩　右研為末用葡萄汁或梨汁和作小錢大薄餅舌下噙化一枚即餌

荊花　川椒　肉桂　五茄皮　紫稍花各一兩　蓼草六兩　共為末飛麪二斤米湯合為九如圓眼大放不見日陰乾聽用糯米一升煮爛粥用天仙子六味末用麴五兩和勻入瓶缸固七日成酒取出又入鹿茸等六味與酒拌和一處如乾加酥油與蜜為丸如圓眼大金箔為衣每一丸入磁壺內滾水一盞化開成酒服

解藥方

烏梅肉　柿霜各四兩　白並　南薄荷　硼砂各五錢

藥外

針法

猢猻勞　小兜有此症求食不止終夜不睡用針刺兩手面中三指中節能曲處週歲者用中號針六七歲用大號針刺進半分許遇骨微位即拔出不可誤針筋上若疳甚無水刺數日方有白水不甚者即有白漿刺數日隨有血一指有刺血傳此二指不刺若六指俱有血病痊不復刺矣凡刺須隔二日俟天晴雨則無益刺後即得瞎滅貪饞最忌棗栗乾甜果物則復發若初刺有血非此疾矣

挑悶疹子

分開頂門內有紅筋紅源挑破即止

喉痺

鼻紅上紅疙瘩用針挑破即愈

百發神針　治偏正頭風漏肩鶴膝寒濕氣半身不遂手足癱瘓痞堀腰疼小腸疝氣癱瘡發背對口瘰核初起不破爛俱可用按穴針之

乳香　沒藥　生川附子　血竭　川烏　草烏　檀香末　降香末　大貝母　麝香各三錢　毋丁香四十九粒　淨斬艾綿一兩或二兩作針

消癖神火針

蜈蚣一條　木鱉　五靈脂　雄黃　乳香　沒藥　阿魏　三稜　蓬朮　甘草　皮硝各一錢　開揚花硫黃　山甲　牙皂各二錢　麝香三錢　甘遂五分　艾絨二兩作針

陰症散毒針

乳香　沒藥　羌活　獨活　川烏　草烏　白芷　細辛　牙皂各五分　硫黃　山甲　大貝　靈脂　肉桂　雄黃各一錢　蟾酥三分　麝香三分　艾絨一兩作針

藥外
灸法

醫小兒　小兒目視不轉睛指甲黑哭作鴉聲是死形無可治惟用此法灸之十灸十生將左右兩手灣處各灸一穴左右兩脚指將第二脚指縫頭處亦必各灸一穴將瘀瀉出即回生奇妙不可言

雞爪風　婦人月家(產後)得此不時發手足及指拘攣拳東如雞爪頗疼痛急于左右膝骨蓋下兩傍各有一小窩共四穴俗謂鬼眼各灸三壯立愈

灸法　三

串雅外編

乾霍亂死灸法

心頭微熱者以塩填臍內用艾灸不計數以醒為度

附子灸　癰疽久漏瘡口冷膿水不絕內無惡肉以大附子水浸透切大片厚三分安瘡口艾隔灸數日一灸至六七次服內托藥自然長滿為末作餅用亦可

黃蠟灸　治癰疽等毒白麵水和成堀照毒根盤大小作圈厚一指高寸餘粘肉上外以絹帛護帛加濕布圍住將黃蠟搯薄片入麵圈內以熨斗火運徧蠟化即痛則毒淺若不覺至蠟滾沸逐漸添蠟俟不可忍沃冷水候凝取去瘡忽痛者毒盛灸未到也不妨再灸輕一二次重三四次忌房事氣惱發物

灸癬

日中時灸病處影上三灶灸之咒曰癬中蠱毛戎戎若欲治待日中

又法　八月八日出時令病人正向東南戶內長跪

呂祖外編　卷上　灸法　四

平舉兩手持胸兩邊取肩頭小垂際骨解宛：中灸之兩火俱下各三壯若七壯十壯愈

灸耳聾

濕土瓜根削半寸塞耳內以艾灸七壯每旬一灸乃愈

疝氣偏墜

淨草一條量患人口兩角為一則摺斷如此三則摺成二角如八字樣以一角安臍中心兩角安臍下兩旁尖盡處是穴若患在左灸右在右灸左兩

邊俱患兩穴皆灸艾炷　如麥粒大灸十四壯或二十一壯即安又灸兩足三陰交穴尤效

灸癮疹

男左女右以筷一根前齊中指端後至手腕橫紋凹中截斷為準却以竹一根兩頭閣起令病人騎之兩足不着地挺身正坐將前筷植於竹上以正頭植骨脊中盡處各開一寸名騎竹馬法灸七壯灸畢宜用乳香真菉豆粉為末水調服之以防火氣入心

胡桃灸　破傷風及瘋犬傷神效

胡桃殼半個填稠人糞滿仍用槐白皮襯扣傷處以艾灸之遍身臭汗出其人大困即愈遠年者將傷處如前灸之亦愈

雞子灸　凡毒初起紅腫無頭

雞子煮熟對劈去黃用半箇合毒上以艾灸三壯即散若紅腫根盤大似鴨蛋如法灸亦可

苦瓠灸　治癮癮

擇神人不在日空心用井花水調百藥煎末一椀

桑木灸　治癮疹發背不起發或瘀肉不腐潰及陰瘡瘡瘻流注癆瘡頑瘡惡瘡久不愈俱用此灸之未潰則拔毒止痛已潰則補接陽氣亦取其通關節去風寒火性暢達出欝毒之意乾桑木劈成細片紮作小把然火吹息灸患處每吹灸片時以瘀肉癢動為度內服補托藥誠良方也

灸目

正月十六日用川椒末一二分入頭垢和為蚕豆大四之似窩置於眼角別揉熟艾米粒大內四中

每眼角灸七壯或九壯如此俟清明日照前復灸之連灸三年則目加精采至老不昏

麻葉灸　治瘰癧瘡

七月七日採麻花五月五日採麻葉搗作炷圓灸瘡上百壯次燒胡桃松脂研敷即愈

鵝掌風

真蘄艾四五兩將水三四椀煮五六沸入大口瓶內盛之用麻布墊層縛袱口將手心放瓶口上熏之如藥水冷再熏如神

蜈蚣咬

杉木皮或枝燒烟熏立刻止痛比蜘蛛尤妙

牛皮癬

水銀一錢芸香一錢五分大棗七枚同搗爛為四丸每夜熏一丸速愈

口眼歪斜

巴豆三粒麝香三分共研將熱水一鍾藥藏鍾底放手心右斜放左手心左斜放右手心

久病截瘧

老薑二斤搗爛置於滾水一大桶內坐布帳中脫衣坐卧桶上熏透即愈第一禁風瘡不脫靨

燒乳香熏之

蟲牙

天仙子一撮入小口瓶内燒烟竹筒引烟入蟲孔内熏之即死永不發

又天仙子入瓶内熱湯淋下口合瓶口令氣熏之冷更作盡三合乃止有涎津可去甚效

頭風捶耳

黃蠟三兩溶化以白紙濶二寸長五寸在蠟上拖勻真蘄艾揉軟薄攤蠟上箸卷為筒捶耳内一頭火

熏燃烟氣透腦其痛即止左痛捶右耳右痛捶左耳至重不過二次

喉痺

蓖麻仁研爛紙卷作筒燒烟熏吸即通或取油作撚尤妙名聖烟筒喉痺緊急用此即破

喉症開關

牙皁 巴豆共為末米湯調刷紙上晒乾作撚子點火以烟熏鼻孔立能開口鼻流涕專治十八種

小兒脫肛

五棓子為末先以艾絨棓子末卷成筒放便桶内以瓦盛之令病者坐桶上以火點着使烟熏入肛門其肛自上隨將白礬末搽之其肛自緊再不復脫

霍亂轉筋 身冷心下微温者

硃砂二兩研 蠟二兩和丸着于火籠中熏之周圍厚覆令烟不洩兼牀下着火令腹微煖良久當汗出而醒

疥瘡

熟蘄艾二兩木鱉子三錢雄黃二錢硫黃一錢為末揉入艾中分作四條每一條安陰陽瓦中置被裏烘熏後服通聖散

癩瘰頭風 骨節疼痛下元虛冷諸風痿漏下血一切風瘡

川烏頭 草烏頭 兩頭尖各三錢 硫黃 麝香 丁香各一錢 木鱉子五箇為末以熟蘄艾揉軟合一處鈔底包裹燒熏病處名雷丸手足痛風 冷痛如虎咬者

樟木屑斗急流水一石煎極滾泡之乘熱安足于桶上熏之以草薦圍住勿令湯氣入目其功甚捷

拳毛倒睫

無名異末紙卷作撚點燈吹殺熏之睫自起

破傷風　口噤身强

肉蓯蓉切片晒乾用一小盞底上穿穴燒烟熏患處累效

咳嗽熏法

熏黃一兩以蠟紙條捲作筒十枚燒烟吸嚥取吐

止一日一熏椎食白粥七日後以羊肉羹補之

女人病卵　與邪物交通獨言獨笑悲思恍惚者

雄黃一兩松脂二兩溶化以虎爪攪之丸如彈子大夜燒籠中令女坐其上以被蒙之露頭在外不過三劑自斷仍以雄黃人參防風五味子等分為末每旦井花水服之

喉閉

竹紙滲　巴豆令滿作紙撚燃點燈旋吹滅之以烟熏喉間即吐惡血而消或刺入喉間出紫血亦愈

蓋烟喉病發于六腑者引手可探及刺破瘀血即已若發于五臟則受毒牢深手法藥力難到惟用紙撚為第一

舌脹出口

蓖麻取油醮紙撚燒烟熏之即腫脹皆消并治牛馬六畜舌脹

手汗

黃芪一兩葛根一兩荊芥三錢水煎湯一盆熱熏而濕洗三次即無汗

熏嗽　治風入肺久嗽者

鵝管石　雄黃　蔚金　款花為末和艾用薑一片置舌上以藥艾于薑上灸之取烟入喉中愈

青布熏

惡瘡防水青布和蠟燒烟筒中熏之入水不爛瘡傷風水用青布燒烟于器中以器口熏瘡得惡汁出則痛痒瘡膿瘡潰爛陳艾五錢雄黃二錢青布作大炷點火熏之熱水流數次愈

走太醫桃葉熏

水二石煮桃葉取七斗安牀簀下厚被蓋卧床上
乘熱熏之少時當雨汁汗遍去湯速粉之并灸大
椎穴此法治天行病宜用端午日合

串雅外編 卷二

藥外貼法

痢疾塞肚
菉豆粒七 胡椒粒七 麝香一厘 膠棗擘破一枚 共搗爛放瓶內
包好患者取一丸貼臍上宜用端午日合

小兒赤眼
黃連為末水調敷脚心

小兒重舌 又名雀舌
巴豆粒半 飯粘四五粒 共搗為餅如黃豆大貼眉心中

貼法

閒待四圍起泡去之即愈

妝妝陰症傷寒
雞子放臍眼內一時一換四五換即愈矣陰氣盡
妝子內

止自汗
鬱金末卧時調塗于乳上

截驚法
芭蕉油薄荷汁煎勻塗頭頂囟門塗四肢笛手
足心勿塗甚效

嬰兒瘧疾
代赭石五枚煆紅醋淬研末五分飛霜一豆大同以紙包七重打濕煨乾入麝少許為末香油調一字塗鼻兴上及眉心四肢神應

隔皮取膿　治諸般腫毒
驢蹄細切一兩炒蕎麥麵一兩白鹽五錢草烏去皮錢為末調作餅子慢火炙黃出火毒研末醋調成膏用白紙攤貼患處毒自毛竅而出其腫自退

瘡塊

紅芥菜子不拘多少生薑汁浸一宿大約芥子一酒杯加麝香一錢阿魏三錢搗爛如膏攤布上貼患處外用汗巾紮緊一宵貼過斷無不消

牙齒疼痛
輕粉一錢大蒜一瓣一杵餅安腦骨前陷中先以銅錢隔了用蜆蓋定紮住一宿愈左疼安右右疼安左

又左牙疼敷右大指腕上右疼敷左大指腕上

截瘧丹
班蝥　巴豆肉　硃砂錢各一　麝香二分　雄黃一錢搗酥五分黑棗二三箇擣丸如菉豆大貼眉心穴一周時揭下投長流水中

貼臍截瘧
胡椒　雄精　等分研末將飯研爛為丸桐子大硃砂為衣將一丸放臍中外膏藥貼之即止

難產仙方
草麻仁取白仁七箇麝香三分共一處搗如泥用絹帛包之勒在臍中即時產下如倒生者用穩婆送進片時即順下

如神丹　治難產
巴豆三粒去殼草麻子七粒去殼麝香許研成一餅貼臍上即產：下即去之

地黃膏　治眼腫立效
生地一兩寒水石錢五黃連一兩黃柏一兩為末生地汁調餅貼太陽上

水瀉不止
木鱉仁五個丁香五個麝香分研末米湯調作膏納臍中貼之外以膏藥護住

痢疾噤口
木鱉仁六個研泥分作二分用麵燒餅一箇切作兩半只用半餅作一窠納藥在內乘熱覆在病人臍上一時再換半箇熱餅其痢即止逐思飲食

小兜口內流涎
天南星一個為末醋調搽兩足心過夜即安然洗去

牙痛
蘿蔔子十四粒生研末以人乳和之左痛點右鼻右痛點左鼻

厲風
先將元參　苦參　沙參　荊芥　防風　厚朴　白芷　陳皮　蔓荊子　威靈仙　麻黃各一兩　桃枝柳枝煎湯洗之換一身新單青布衣服掘一地坑深尺許方廣約可容身臥者用栗炭四五十斤燒坑內極熱潑滾醋數十碗次去炭鋪草薦于內令病者臥于薦上厚蓋被取汗；出一瞬起別換衣進飲食後用五爪藤煎湯熏洗數次自愈服敗毒凡藥

骨蒸發熱
雄黃一兩入小便一升研如粉乃取黃理石一枚方圓一尺者炭火燒之三食頃濃淋汁于石上置薄氈于上患人脫衣坐之衣被圍住勿令泄氣三五度瘥

腳氣腫痛
樟腦二兩烏頭三兩為末醋糊丸彈子大每置一丸于

足心踏之下以微火烘之衣被圍蓋汗出如涎為效

風濕痰病

人坐密室中左用滾水一盆右用炭火一盆前置一桌書一册先將無油新巴豆四十九粒研如泥紙壓去油分作三餅如病在左令病人將右手仰置書上安葉于掌上心以盌安葉上傾熱水入盌內水涼即換良久汗出立效病右安左掌心一云隨左右安之

珊瑚蒸　治中風不語脉沉口禁

黃芪　防風　共煎湯數斛置牀下熏蒸藥入膝理周時可瘥

千金神草方　治風濕癱瘓手足不仁半身不遂周身麻木或酸疼口眼歪斜蛊皆神效

草麻子草一種秋夏用葉春冬用子俱得一二十斤入水甑內置大鍋上蒸半熟取起先將綿布數尺雙摺浸入蒸葉子湯內取出乘熱敷患處却將前葉子熱鋪布上一層候温再換熱葉子一層如此蒸換必以患者汗出為度重者蒸五次輕者蒸三次其病即愈內以疏風活血之劑服之

阮河南桃葉蒸　治發汗汗不出用此蒸之可救

燒地令熱去火以水少灑之布乾桃葉于上厚二三寸安席葉上臥温覆得大汗被中傳粉極燥便瘥凡柏葉麥麩蚕沙皆可如此用之

鹽沙蒸　治患風冷氣痺及癱瘓羞蓋蚕屬火性燥能勝風去濕

醇酒三升拌原蚕沙五斗甑蒸於暖室中鋪油单

上令患者就患處一邊臥沙上原厚蓋取汗若虛人須防大熱昏悶令露頭面一次不愈閒日再蒸無不效

蒸脚氣　服藥不效者

於地上掘作盆子深六七寸可容脚用炭火燒赤然後噴釀醋遍地鋪淨葱不去皮根貫小牀坐定用脚伸地盆內蒸候汗出如膠拭去忌房事不拘三次必愈神效

荆葉蒸　治　脚風濕痛不止

荊葉不限多少置大甕中其下着火温之病人置
葉中須臾當汗出蒸時常旋旋喫飯稍倦即止便
以被蓋避風仍進葱豉酒及豆酒亦可以癒為度
按此法止宜施之野人李仲南永類方云治脚氣
諸病用荊莖置鐔中燒煙熏涌泉穴及痛處使汗
出即愈此法貴賤皆可用

洗頭明目

鳳眼草即椿樹上叢生莢也燒灰淋水洗頭經一
年眼如童子加椿皮灰尤佳

正月七日　二月八日　三月四日　四月五日
五月二日　六月四日　七月七日　八月三日

洗法

九月二十日　十月二十二日
十二月十四日燒之或洗字之訛　十一月二十九日

洗癩頭

蝸牛數十條洗之二次必愈水三碗煎蝸牛三十
條足矣

洗癰疽

腫時用紫葛天蕎麥忍冬藤金絲草各等分煎湯
洗潰時白芷甘草羌活黄芩露蜂房赤芍當歸頭
先將猪前蹄一隻煮汁去油花取清汁煎藥去渣

洗法

小兒咳嗽

生薑四兩煎濃湯沐浴即愈

温洗以絹拭之

洗凍瘃

黃柏皮硝各等分研細末已破者柏七硝三未破者紅腫柏硝各半初起者硝七柏三皆用冷水調搽俟乾以熱水洗去再搽再乾再搽如此三遍一日定痛三日全愈此神方也

五枝浴　治大風年深不愈面毛脫落鼻梁崩損不蹤月取效如神

桃柳桑梶楮五般枝濃煎湯大缸浸坐沒頸一日

串雅外編　卷二　洗法　十三

俟湯如抽出浴安矣

楊枝浴　治痘瘡數日腦頂漿滯不行或風寒所阻者

水楊枝葉無葉用枝五斤流水一大釜煎湯温浴之如冷添湯良久照見纍起有暈絲者漿行也如不滿再浴之力弱者只洗頭面手足如屢浴不起者氣血敗矣不可再浴始出及痒塌者皆不可浴痘不行漿乃氣滯血滯腠理固密或風寒外阻而然浴令暖氣透達和暢鬱蒸氣血通徹每隨暖氣而發行漿貫滿功非淺也若内服助氣血藥藉此而升之其效更速寒風亦不得而阻之矣

洗青盲　昔武勝軍宋仲孚患此二十年用此法二年目明如故青桑葉新焙乾逐月按日就地上燒存性每以一合子磁器内煎減二分傾出澄清温熱洗目至百度屢試有驗

串雅外編　卷二　洗法　二十

正月初八　二月初八　三月初六　四月初四
五月初六　六月初二　七月初七　八月二十
九月十二　十月十三　十一月初二　十二月

藥外

熨法

痞積

艾綿四兩揑如患大川椒四兩拌艾中粗草紙包安癖積上以湯壺熨內有響聲即消

杉皮熨　治氣痛之病忽有一處如打撲之狀不可忍走注不定靜時其處冷如霜雪此皆暴寒傷之也白酒煮楊柳白皮熨之有赤點處饒去血妙凡諸

藥外

吸法

還魂丹　治急慢驚風吹鼻二寸蜈蚣一分麝香四兩白芷與天麻更加二字黃花子死在陰司要返家共為末吹鼻即甦

青火金針　治頭風火硝一兩青黛　川芎　薄荷錢各一　為末口含冷水用此吹鼻

傷寒欬逆　服藥無效

雄黃三錢酒一盞煎七分乘熱嗅其氣即止

水腫上氣　欬嗽腹脹　熏黃一兩一款冬花二分熟艾一分以蠟紙鋪艾灑二末于上荻管成筒燒煨吸嗓三十口則瘥三日一劑百日斷鹽醋

燒香治勞　元參斤甘松六兩為末煉蜜斤和勻入瓶中封閉地中埋窖十日取出更用炭末六兩蜜六兩同和入瓶更窖五日取出燒之常令聞香疾自愈

冬月喉痺　腫痛不可下藥者
蛇牀子燒烟于瓶中口含瓶嘴吸烟其痰自出
一切咳嗽　不問久近晝夜無時
佛耳草五十款冬花二百大熟地黃兩二焙研末每用二錢於爐中燒之以筒吸烟嚥下有涎吐出兩服
眼愈
碧雲散　治目赤腫脹羞明昏暗隱澁疼痛眵泪風痒鼻塞頭痛腦酸外翳扳睛諸症鵝不食草曬乾二錢為細末噙水一口每以米許嗑吸法

入鼻泪出為度
頭風苦痛
大蒜頭七箇去皮燒紅地以蒜逐個于地上磨成膏子却以殭蠶一兩去頭足安蒜上碗覆一夜勿令透氣只取蚕研末嗑入鼻內口中含水更效
石南葉散　小兒誤跌或打着頭腦受驚肝系受風致瞳人不正觀東見西觀西見東
石南一兩黍蘆三分瓜丁即瓜蒂五七個為末每吹少許入鼻一日三度內服牛黃平肝藥

單鵞
姜黃片紅棗去核巴豆三粒同搗如泥用口津調和分作二丸用絹包好線紮男左女右一捻手一塞鼻蓋被出汗即愈此藥治三人如乾用唾津拌勻包紮如法治之。倒睡拳因風入脾經致使風痒不住手擦目久則赤爛拳毛入內木鱉仁椎爛以綿帛包作條左患塞右鼻右患塞左鼻其毛自分上下再服蟬蛻藥自愈

藥外
雜法
痔瘡坐袋
乳香沒藥龍骨赤石脂海螵蛸輕粉木鱉各三錢
共為末以絹袋盛之每日坐不必洗坐二十一日
無不愈
濕瘡踏袋　治寒濕瘡并脚氣
川椒一斤盛粗布袋中放火踏上下用火烘跣足
踏其上蓋椒性熱而散加以火氣上逼寒濕自去

而愈甚妙
鈎骨丸
栗子肉上皮半兩為末鮎魚肺一個乳香二錢五
分同搗為丸桐子大看骨哽遠近以線繫線畢一
丸水潤吞之提線鈎出也
黃疸取黃
紅連紙一張裁為四條筆管捲如砲竹式口上糊
粘固外用黃蠟一兩鐵杓將紙筒四圍澆勻不可
使蠟入內患人仰卧筒套臍上外以麵作圈護定
勿倒頭上點火燒至麵所剪斷另換新筒看臍中
有黃水如雞子餅者取出輕者四五根重者六七
根取盡黃為度
香櫞包法　治頭風
香櫞不拘新舊一枚切開入香櫞內每邊包在太陽上得熱即愈
耳鳴塞耳　耳鳴晝夜不止者
烏頭燒灰石菖蒲等分為末綿裹塞之日再取為
效度

產婦衄血　口鼻起黑氣名胃肺敗
紅絲線一條本婦頂心髮二根紮緊中指節即止
消毒燈照　一切癰疽發背無名腫毒及對口諸瘡
已潰未潰無不神效
一二十年舊船底上石灰生青桐油調將光青布（苔者炒研細末水澄乾以清）
照瘡大小攤貼又用青布作撚蘸桐油點火在瘡
上打斡覺痒愛打不論條數灰乾換貼再打知痛
為度紅退毒消神效秘驗
掌中取積

甘遂巴豆甘蓳韭子檳榔各等分為細末米飯為丸如彈子大用時早晨花椒湯淨手將香油塗掌中次將藥擦一時便瀉欲止以冷水淨手即住大小胸中有積皆治

神燈照法　治疽癰瘍之極火到痒除

川椒　艾葉　紅棗　芫荽　茵陳　乳香　白芷梢　陳香橼　安息香共為末作紙撚熏照

縮髻瘤

甘草煎膏筆救之四圍上三次乃用芫花大戟甘遂等分為末醋調別以筆救其中勿近甘草次日縮小又以甘草膏救小暈三次如前仍上此藥自然焦縮

彭醫官釣骨法

鹽麩子根搗爛入鹽少許綿裹以線繫定吞之牽引上下便釣出骨也

提金散　大便閉塞服藥不通者

滄鹽三錢屋簷爛草節七個為末每用一錢竹筒吹入肛內一寸取通

脹取水

真輕粉二兩巴霜四兩生硫黃一錢加麝更妙同研成餅先以白帛一片鋪臍上以藥餅放外上用帛綁住約人行五六里自能瀉下黃水待至三五度除去藥溫粥補之久患隔日取日一餅可治二三十人病愈後忌飲涼水

黃疸取水

大鯽魚一個為鳥背者連鱗骨俱搗爛加麝香三分同魚熟搗成餅大其中再加麝二分入居餅中間貼在臍上將荷葉二三層貼餅上用布縛不及周時出黃水即消永不再發

刼腫法　治水腫及腫核腫毒

凡水腫脹藥末全消者甘遂末塗腹迭臍令滿內服甘草水其腫便去若腳氣上攻結成腫核及一切腫毒用甘草遂末水調傳腫處即濃煎甘草汁服其腫立散

頭痛

生蘿蔔取自然汁入生龍腦調勻昂頭使人滴鼻

竅右痛灌左鼻左痛灌右鼻俱痛並灌之其效如神

又法

莧麻子一粒搗碎同棗肉紫須同搗勻丸如黃豆大外用絲綿裹之內鼻孔少頃必有清涕流出即將丸藥取出其痛即愈永不再發

引火法　人病厥逆之症不敢用藥以此治之吳茱萸一兩為末以麵半兩水調成糊以布如鑽大攤成膏貼湧泉穴內則手足不逆矣

又法　治虛火沸騰

附子一個為末米醋調成膏貼湧泉穴上然後用六味湯大劑與之火不再沸

衄血

左鼻孔出血者以色線紮右手中指根右孔血出紮左手中指根兩孔俱出者紮二指根

溫臍種子

五靈脂　白芷　青鹽各二錢　麝香一分為末以蕎麥臍內微溫即愈不過二三度

錢塘趙學敏恕軒纂

假氷片

真片腦形如氷雪如假造者其性亦寒用之頗與同功往往欺人亦得高價用新磚一枚納於厠中一二月後取出用新汲水洗十分淨於室中陰處下用新磚蓋之待霜出如氷雪汝之如此数次霜盡而止用甕罐與潮腦同色取其香

氣智者辨之

樟氷

樟腦不拘多少研細同篩過壁土拄勻攤碗內以薄荷汁洒土上又以一碗合定濕紙條固縫蒸之少時樟腦飛上碗底即成氷片腦子

又樟腦每一兩用黃連薄荷六錢白芷細辛四錢荊芥甘蒙花二錢當歸槐花一錢以新上盆鋪杉木片於底安葉在上入水半盆洒腦于上再以一碗合住糊口安火煨之待水乾取開其腦自升于上以翎掃上形似松脂可入風熱眼藥人亦多以亂片腦不可不辨

假雄黃

荷葉灰頭髮灰桑木灰石灰各等分以上好石黃放灰內微煮数日取出透明即成雄黃

假膽礬

漆綠半斤以草麻葉一斗許搗汁淨猪胆四箇河水一大碗同煮將乾入硇砂一錢五分攪勻至乾為度每七兩用淨盆硝一斤一處以有嘴砂銚鎔開攪勻用

用明礬研碎入猪膽中陰乾取出如新膽如上法或牛膽

又朴硝入牛膽中陰乾陽平後取其色與胆礬同其

此升三次可充氷片也

攀亦相去不遠

假胡椒

用豌豆以蓼子草烏生薑三味切碎搗爛取汁浸豆蒸軟如此三度換新汁浸次用石灰末以文武火炒豆皮綴為度其味如真

假乳香

擇有癭松樹鋸開癭就上鑿一孔以糯米一斗作飯入鹽一斤拌勻再杵成糍入孔中却以元鋸下癭封之鹽泥固濟候百二十日足取出即成乳香

矣

假象皮膏　治蹼打及金刃傷血出不止者用之并汝口如神

蠶豆炒去殼取豆肉搗細和勻蠟鎔為膏攤貼如神

製品門

法製

法製青皮　醒酒益胃消食如神

青橘皮一斤湯去苦味去瓤揀淨白鹽花兩五錢甘草兩六錢茴香四兩甜水斗煮之不住攪勿令着底候水盡慢火焙乾勿令焦去甘茴只取青皮窖收用

烏龍膽　治一切喉症喉哦喉癰

明礬末盛豬膽中風乾研末每吹一錢取涎立效

白豆蔻　治吐逆消食下氣

白豆蔻一斤檀香五錢片腦一錢為細末甘草膏為衣不拘時細嚼

法製橘紅　治下氣止嘔消食化痰

橘紅十二兩檀香五錢白豆蔻五錢片腦一錢為細末甘艸為衣不拘時細嚼

法製檳榔　治消食除痰癖

檳榔一斤檀香五錢白豆蔻五錢木香三錢為細末同甘草膏為衣不拘時細嚼

法製芽茶　清熱化痰消食止渴

芽茶一斤檀香錢五白豆蔻錢五片腦錢一為細末甘草膏為衣不拘時細嚼

香茶

芽茶二兩麝一分硼砂五分兜茶末一兩訶子肉二錢五分共研末甘草湯為丸為片任意

又治痰火症及口臭口乾口舌生瘡皆驗

孩兜茶四兩木樨花晒乾一兩焙研薄荷葉晒一兩研硼砂去腳五錢為細末用甘草熬膏和藥作小片噙化嚥之

法製枳實　治消脹滿逆氣除胸脇痰癖

枳實一斤檀香錢五片腦一錢為末同甘草膏為衣隨時細嚼

法製川芎　治頭目不清上焦風熱

川芎一斤檀香錢五白豆蔻錢五片腦錢一為細末同甘草膏為衣不拘時細嚼

法製人參　補益元氣輕身延年

人參　檀香　白豆蔻　片腦　為末甘草膏為衣不拘時細嚼

法製桃仁　辟瘴癘山居尤宜佩之

桃仁一斤吳茱萸　青鹽各四兩同炒熟以新瓶密封一七取出揀去茱鹽將桃仁去皮共每嚼一二十枚

造櫻珠

好南參不拘多少碾為細末以胡桃仁松子同研和勻煉蜜丸如櫻子大每粒辰砂為衣取紅色用二顆沸湯點服

三奇麩

白麩什蒼耳草自然汁三升野蓼自然汁四升青蒿自然汁三升

法製

杏仁四升去皮尖赤小豆三升煮爛連汁研如造麩法晒乾次用甲寅戊寅庚寅乃藥汁拌麩三伏內上寅日將三奇日也此日脩合故名三奇神麩大有神效

製品門

藥品

靈砂　用新鍋安逍遥爐火窯指鍋底文火下燒入硫黃二兩溶化投水銀半斤以鐵匙急攪作青砂頭如有煙起噴醋解之待汞不見星取出細研盛入水火鳥內塩泥固濟下以自然火升之乾水十二盞為度取出如末鍼紋者成矣

紫雪　療陽寒温瘧一切積熱狂易叫走瘴疫毒厲

卒死脚氣五尸五蠱心暖諸痰痞刺切痛解諸熱毒邪熱發黃蠱毒鬼魅野道熱毒及小兒驚癎百病

黃金一百兩　石膏寒水石磁石各三斤　滑碎水一斛煮四斗去渣入犀角屑羚羊角屑青木香沉香各五兩　甘草炒四兩　丁香一兩　升麻各三人參二兩　于葉汁中微火煎之抑木不住前汁中煮取一斗五升去渣入煉朴硝一斤　消石三十兩　石膏寒水石各三兩　滑石二兩　

消石

石脾　芒硝　朴硝各一介　為末苦參水二斗銅鍋煎十沸入三物煮減半去渣煎着器中冷水漬一夜即成消石可化諸石為水

石脾

白礬　戎鹽各一介　為末苦參水一升鍮中煮五沸下三物煎減半去滓熬乾白如雪

礬石

新桑合槃一具于密室掃淨以燒地令熱洒水于上或洒苦酒于上而布白礬于地上以槃覆之四面以灰擁亢一日夜其石精皆飛于槃上掃取收之如前法數遍乃止可作服食

飛黃　治緩疽惡瘡蝕惡肉

瓦盆一個安雌黃于中丹砂居南慈石居北曾青居西礬石居上石膏次之鍾乳居下用瓦盆一個底下鑿一孔將瓶剔插於盆孔內用礬糠炭屑燒之其油即在箸頭滴出下以碗收之候出火毒用油抹黏瘡上二三次愈

土黃

信石一兩硇砂錢二木鱉子肉　巴豆肉錢各五以信硇砂研末以木鱉巴豆搗成膏入石腦油和作一堆油紙數重包裹埋于土坑內四十九日取出磁器收貯待用如無石腦油亦可

元霜　治癆火神藥

黑鉛一斤烊一薄餅中穿一孔以繩繫之將好米醋約寸許甕口用皮紙箬子紮緊再以磚石壓之勿洩氣放屋下陰處待數日取起鉛餅上有白霜拭

下每鉛一斤取霜二兩為止治嗽喘喝每服五分噙口內以白湯送下治痰火咳嗽每服三分照前法服

取菜豆油　治天泡瘡

菜豆裝入粗瓦瓶內以毛竹箸一把塞緊瓶口再用瓦盆一個底下鑿一孔將瓶倒插於盆孔內用礬糠炭屑燒之其油即在箸頭滴出下以碗收之候出火毒用油抹黏瘡上二三次愈

油胭脂　治手足開裂

生猪油去筋膜一兩入鍋熬淨再入黃占五錢白占三錢同化清入銀硃黃丹各五分攪勻以軟能攤開為妙敷之愈

雲母粉　治百病

雲母一斤拆開揉入火瓶內築實上澆水銀一兩封固以卞斤煆火煆赤取出却拌香葱紫連翹草二件合擣如泥後以夾絹袋盛于大水盆內揉取粉餘渣未盡再添草藥重擣取粉以水盤一面于灰上印一淺坑鋪紙傾粉在內候乾焙之以麪糊丸梧子大遇有病者服之無不效

取砂汞

瓷瓶盛硃砂不計多少以紙封口香湯煮一伏時取入水火鼎內炭塞口鐵盤蓋定鑿地一孔放盆一箇盛水連盤覆鼎於盆上塩泥固縫周圍加火煆之待冷取出汞自流入盆矣

造海石

苦瓜萎去皮搗碎連汁用煆過黃口蛤蜊粉拌勻作餅晒乾入藥用有等庸醫以海浮石作海石悞矣此藥最能去痰

取草汞

細葉馬齒莧乾之十斤得水銀八兩或十兩先以槐木搥之向日東作架晒之三二日即乾如經年久燒存性盛瓦甕內封口埋土坑中四十九日取出自成矣

臭煙

香白芷二分北細辛二分焙乾猪牙皁角二分焙乾研薄荷二分乾研末冰片三厘乾烟絲若味乾絲錢一福烟分許各為末酌量配合不拘分兩色如棧色者佳

雞子雄黃

雄黃一斤研細取新生雞子黃白和之置銅銚中以蓋覆之對固勿令出氣微火蓋上容得手不用太熱三日夜勿令火絕寒刀起之掠去上樸清者在下當涌：如水銀寒則堅着人氣復軟煉一斤得十兩盛以竹筒勿使見風服如麻子大使人肌膚潤澤冬則能溫夏則能涼辟除寒氣

水銀霜

水銀十兩硫黃十兩各以一鐺熬之銀熬黃消急傾為一鐺少緩即不相入仍急攪之良久硫成灰銀不見乃下伏龍肝末十兩鹽末一兩攪之別以鹽末鋪鐺底一分入藥在內又以鹽末蓋面一分以瓦盆覆之鹽土和泥塗縫炭火煆一伏時先文後武開盆扰下凡一轉後舊土為四分以一分和霜入鹽末二兩如前法飛之又以土一分鹽末二兩和飛如前凡四轉土盡更用新土如此七轉乃成霜用之按水銀霜即粉霜本以汞粉轉昇而成故名此乃崔氏法後人罕知者

大玉容丹　去雀斑皯瘭如神傳面如玉

白殭蚕三錢白丁香一錢五分白附子三錢白芷三錢三柰三錢滑石錢五硼砂三錢白荷花瓣三錢寒陀僧三錢白茉莉子研粉三錢菉豆粉二兩白冬瓜子三錢晒研白蜜一兩五錢為丸

石菖蒲酒　治三十六種瘋不能治者悉效

菖蒲三斤薄切日內晒乾以絹囊盛之好酒一罈懸菖蒲在內閉封一百日取視之如綠菜色以一升熱黍米納中封十四日開出飲酒

代茶湯　夏月服之代茶健脾止渴

白术一錢五分麥冬去心一錢煎作湯服

少陽丹

蒼术乃天之精也用米泔水浸半日刮去黑粗皮晒乾搗碎羅為細末一斤地骨皮乃地之精也新掘者以溫水洗淨用槌打匾去心止取嫩皮晒乾搗碎羅為細末一斤桑椹乃人之精也用黑熟者二十斤入瓷盆內以手搓揉揣爛入絹袋內壓汁去渣將前二味投入椹汁內調為稀糊傾入瓷罐

內封口置淨棚上晝採日精夜採月華專待日月自然煎乾為度擣羅為細末煉蜜丸赤小豆大每服十九無灰酒下日進一二服；一年髮白返黑三年面如童子益壽此葉總合恐陰雨損壞必須旋合旋晒一二日就乾採日精月華四十九日從新為末如法丸用縱使總合亦須用十數大盤分開晒一二日就乾免致雨壞

固齒延壽膏　常治齦宣齒稿黃黑腐敗風蟲作痛顋頰紅腫大有奇功久貼堅固牙齒驅逐垢膩益

腎氣長養津液壯骨強髓添精倍力

珍珠五錢（孔內以絹袋盛之）豆腐一方（中作一小孔將珠入腐蓋之）放鍋內用綿懸鍋上不可落底桑柴火煮為度（灶內外用鹽泥裹破取骨收之）聽用

雄鼠骨五錢（臑月內雄鼠一隻以麵作餅將鼠皮肉包裹在內外以鹽泥裹紅為度冷定打細）辛白芷五分（三錢香白芷五分秋石三錢破故紙妙香各五分）龍骨（煅火燒紅冷定取骨用五錢）入鹿骨霜製五錢（各一錢）沉香（各二錢）廣木香（各二錢）南川芎（各一錢）乳香（半錢）沒藥（半錢）白芍（各一錢）懷慶地黃（二錢）象牙末（二錢）白蠟（各五錢）

右各研細末俱作二分用蜜煎罐一個先將白蠟（蠟化開次後下一分藥麪桑柴文火溶開蠟將藥攪勻外用呈文紙二張將前藥一分散在紙上用手擦磨藥麪在紙上下周圍後將鑵內藥火化開攪勻傾在紙上用熨斗文火熨化上下周圍俱用藥汁走到切作條臨臥貼在牙上一夜明日清晨將藥條取出其條就黑牙齒堅固

齒藥　此方出西嶽蓮花峯神傳仙方向有碑刻今已斷碎無存

歌白猪牙皁角及生薑西國升麻熟地黃木律皁莲梗角子細辛荷葉（剪荷葉心子用）要相當青鹽等分同燒煆研細將來使最良揩齒固牙鬚鬢黑誰知世上有仙方

屠蘇酒

赤木桂心（七錢五分）防風（一兩）菝葜（五錢）蜀椒　桔梗　大黃（各五錢）烏頭（二錢五分）赤小豆（十枚四以三角絳囊盛之除夜懸井底元旦取出置酒中煎數沸舉家東向從少至長次第飲之藥渣投井中歲飲此水一

趣無病

又方

大黃（一錢六分）桔梗（去芦）川椒（去按各二錢八分）烏頭（去皮尖吳茱萸二錢防風（去芦一兩）白朮　桂心（一各一錢）片絳囊盛懸井中或水缸中除夕製元旦寅時取出以無灰酒煎四五沸取飲自幼至長

造蘞華蘞精法

新桑合槃一具封密室淨掃以火燒地令熱洒水于上或洒苦酒于上乃布白蘞于地上以槃覆之

四面以灰摊定一日夜其石精皆飛于上槩掃取
收上未盡者如前法數遍乃止此為礬精若欲作
水即以掃下礬精一斤納三斗中清之
號白礬華百日彌佳若急用之七日亦可

製品門

食品

茶鬆　白糖一斤南薄荷末一兩北細辛錢半茶末二兩拌勻任用或加片腦少許

醉茯苓　華山挺子茯苓削如棗大方塊安新甕內好酒浸之紙封一重百日乃開其色當如餳糖可日食一塊至百日肌體潤澤一年可夜視物火：腸化為

筋延年耐老面若童顏

茯苓酥　白茯苓三十斤去皮薄切暴乾蒸之以湯淋去苦味淋之不止其汁當甜乃暴乾節末用酒三石蜜三升相和置大甕攪之百匝密封勿洩氣冬五十日夏二十五日酥自浮出酒上掠取其味極甘美作掌大塊空室中陰乾色赤如棗飢時食一枚酒送之終日不食名神仙度世法

絡索米　治脾胃虛弱不思飲食：下不化病似翻

胃噎膈

清明日取柳枝一大把熬湯煮小米作飯麪洒成珠子晒乾袋懸風處每用滾水隨意下米：沉住火少時米浮取看無硬心則熟可頓食之久則麪散不粘矣名絡索米

香橙湯 寬中快氣消酒

橙皮二斤切片生薑五兩切焙擂爛入炙甘草末一兩檀香末兩半和勻作小餅每嚼一餅沸湯入鹽送下

逡巡酒 補虛益氣去一切風痺濕氣久服益壽耐老

丸

串雅外編 卷三 食品

臞仙神隱云用乾天冬十斤杏仁一斤搗末蜜漬每服方寸匕補中益氣

栝蒌粉 治消渴飲水

大栝蒌根去皮寸切水浸五日逐日易水取出擣研濾過澄粉晒乾每服方寸匕水化下日三服亦可入粥及乳酪中食之

瑞玉膏 常服開心益智變白返黑齒落更生辟穀延年治癰疽勞瘵咳嗽吐血等症

生地黃十六斤取汁人參末一斤白茯苓末三斤白沙蜜十斤正同前花和作趙紙包四十九日用時白水一碗麪一丸一塊封良久成矣如淡再造一丸

仙人粮 治虛勞絕傷羸老衰損偏枯不隨風濕不仁冷痺惡瘡癰疽等症

糟川芎 治牙齒疼痛

大川芎一個入舊糟內藏一月取焙入細辛同研末擦牙

止瘧果

大蒜薺將好燒酒自春浸至秋閒如瘧至不貪飲食二則服滿不下者每日服蒜薺兩個三日愈

三仙酒　治腎虛精冷之症
燒酒一罈十斤入龍眼肉一斤桂花四兩白糖八兩將泥封固愈久愈佳
金棗仙方　治水腫腹脹
紅牙大戟一斤紅棗三斤水煮一日夜去戟用棗晒乾食之立消
藥梅　治痢疾
木香　木通　黃芩　紫蘇　砂仁　薄荷各一斤
青梅十斤火酒十斤端午日入瓶內封固一月可用只

喫兩箇即愈
養元散
糯米一升水浸一宿瀝乾燥慢火炒令極熟磨細羅如飛麵將蓮肉去心三兩懷慶山藥三兩芡實三兩碾末入粉米內每日清晨用一盞再入白糖二匙或沙糖用滾湯調食其味甚佳可以常食不厭
龍液膏
堅白茯苓去粗皮焙乾為末擇取上好溪流水浸去筋膜渣淨煖焙乾貯罈甕中和以真蜂蜜頓銅釜中水煮一日火用桑柴水及藥鏹之半不可沒肩製成空心白滾湯服煩勞燥渴一切下部諸疾可除
川芎茶　治大人小兒感冒風寒頭疼鼻塞遍身拘急惡寒發熱等症
鮮川芎梗葉切碎如無乾者亦可生薑切絲蘇梗葉各等分切碎細茶與藥相對五月五日午時拌勻用盒蓋過宿使氣透次日取出焙乾磁瓶收貯用時以湯泡之一鍾乘熱熏鼻吸其氣復乘熱飲之汗出

即愈
五香鴨　治胃口寒痛手按之而稍止者是
人參一兩白朮一兩肉桂一錢肥鴨一隻將藥入鴨腹內煮之極爛外以五味和之蔥椒俱不忌更以腐皮同煮恣其飽餐食盡如不能盡亦聽之不必又食米飯也一餐而痛如失矣
蓮花肚　治脾寒而痛：在心之下與左右也
豬肚一個蓮肉一兩紅棗一兩肉桂一錢小茴香三錢白糯米一合將各藥同米俱入肚中以線紮口外用清水煮

之肚未入藥之前照常洗去穢氣入藥煮爛一氣頓食蘸甜醬油食之如來飽再用飯壓之而痛如失矣

香鰻　治瘧蟲

肥鰻一斤白薇一兩小茴香錢三甘草一錢苡仁錢五樝子個十去核同入砂鍋內用水煮爛加五味和之乘飢飽食一頓以食盡為度半日不可用茶水凡有瘧蟲盡皆死矣

葉肺　治患疫病久不愈者

豬肺一個蘿蔔子五錢研碎白芥子一兩研碎五味調和飯鍋蒸熟飯食頓食之一個即愈

長壽粉　治瘧瘧症

芡實八兩苡仁八兩山藥三斤糯米一斤人參一兩茯苓三兩蓮子肉一斤白糖半斤各為末每日白湯調服一兩如不欲調服以水打成丸如元宵服亦可上下午服一丸最妙

九仙王道糕　養精神扶元氣健脾胃進飲食補虛損生肌肉除濕熱

蓮肉　山藥炒白茯苓　薏仁各四兩麥芽炒白扁豆炒芡仁各二錢柿霜一兩白砂糖二斤右為末入粳米粉五升蒸糕晒乾任意食米飲送下

三仙糕　治內傷脾胃虛弱飲食不進主補養元氣

人參　山藥　蓮肉　白茯苓　芡仁各五兩芡實為末白蜜　砂糖屑各一斤糯米粉三升粳米粉亦為末拌勻蒸熟晒乾再為末每取一大匙白湯調下日三四次

桂漿渴水　夏月飲之解煩渴益氣消痰

桂末一大兩白蜜一升以水三斗煎取一斗入新磁瓶中乃下二物打二三百轉先以油紙一重加二重封之每日去紙一重七日開之氣味香美格韻極高令人多作之

八仙茶　延壽固壽腎種子

仙家別有一般茶盡是青龍白虎萊北海嬰兜能製造南山玉女採精華

杜仲四兩炒斷絲楚皮兔絲子一兩浸酒製如常五錢個甘草二兩去皮蜜炙廣木香一兩不見火小茴香錢五母丁香

大者一個用蒼朮一撮沈香一錢柯子四枚去核子去皮十四個鎖陽三錢青鹽八錢熟地二兩三錢酒浸一夜去皮六安茶二斤右藥與茶各為細末用甘草膏以火日修合將蒸籠一扇鋪絹一層將茶一層再放蒸籠一扇鋪絹一層照放絹一層將茶一層再放蒸籠一扇鋪絹一層照前攤蒸併盡蓋之周圍用紙封固慢火蒸一炷香取起乘熱為丸如芡子大入磁罐收貯以黃蠟封口埋地下一尺七寸取起每服一丸嚼化無子者用之更妙即如血哀髮白每日銜化一丸滿百日白髮返黑矣久服能除百病善祀痰動忘敗血諸物腦子三白酒莫食

製品門

用品

螢火丹

螢火一兩各一錢　鬼箭羽一兩各二錢　蔾藜一兩各一錢　雄黃一兩各二錢　羊骨煆五錢　俱為末以雞子黃丹雄雞冠一具和搗千下丸如杏仁作三角絳囊盛五丸帶于左臂上從軍繫腰中居家掛戶上甚辟盜賊

五色螵墨

消腫毒立效　雄黃　銀硃　胆礬　韶粉　滕黃　銅綠　硼砂各一砂各一兩　麝香一錢共用末用蟾酥為條如筆管大陰乾磨塗患處立消

烏鬚鋁梳

鋁叶二兩錫三兩婆羅綿三個針砂桃皮各一兩沒石子一詞黎勒皮各二錢慈石一阜礬一烏蘇油半各半為末先將鋁錫入末一半柳木攪勻傾入梳模子印成修齒餘末同水煮梳三日三夜水耗加之取出故帛重包五日每以熟皮襯手梳一百下須先以阜英水洗淨

紫霞杯

硫黃袋盛懸礶內以紫背浮萍同水煮之數十沸取出候乾研末十兩珍珠　乳香　琥珀　雄黃　硃砂　陽起石　赤石脂　片腦　紫粉　白芷　甘松　三柰　木香　血竭　沒藥　韶腦　安息香錢各一　麝香七分　金箔二十片　為末入銅杓中慢火溶化以好樣酒杯一個周圍以粉紙包裹中開一孔傾硫入內旋轉令勻投冷水中取出每旦盛酒飲二三杯百病皆除

香肥皂

肥皂一斤　紅甘松末　三柰末　北細辛末　各二錢　潮腦錢　紅棗二兩　先將肥皂去子搥研如泥加藥末搗為丸

灌頂油　治腦中熱毒風除目中翳障鎮心明目此大食國胡商方

生油二斤　故鐵鐸五兩　硝石五錢　寒水石一兩　馬牙硝五錢　曾青兩綿裹入油中浸七日每一錢頂上摩之及滴少許入鼻內妙

烏頭麝香油

香油二斤　柏油二兩　另放　訶子皮一兩　五錢　石榴皮　旱蓮臺各五錢　真膽礬錢一　藥煎兩共為末先將香油熬數沸然後將藥末入油鍋內同熬少時傾出油入罐內盛微溫入柏油攪入豬膽又攪令極冷入零陵香　甘松錢各三　麝香二錢再攪勻用厚紙封罐口每日早午時晚面各攪一次仍封之如此十日後先晚洗頭髮淨次早搽之不待數日髮黑紺光澤香滑永不染塵垢不須再洗用之後自見也黃髮亦黑旱蓮臺隨處有之科生一二尺高小花如菊折斷有黑汁名胡孫頭

八白散　金國宮女洗面方

白丁香　白殭蠶　白附子　白牽牛　白芨苓　白蒺藜　白芷　白芨　右件入味入阜角三定去皮用大豆少許為末常用香身丸　治遍身熾氣惡氣及口齒氣

丁香一兩　藿香葉　零陵香　甘松各三兩　香附子　益智仁各一兩　麝香　白芷　當歸　桂心　檳榔

五錢白豆蔻二兩右為末極細煉蜜為劑杵千下如桐子大每噙化五丸常覺口香五日身香十日衣香二十日他人皆聞得其香也

又物虎頭圓　辟瘟殺鬼除一切疫氣

虎頭骨　硃砂　雄黃各一兩半　鬼臼　皁角　蕪雌黃各一兩右為末溶蠟和丸如彈子大以紅絹袋盛一丸繫臂上男左女右又懸四角如值近境疫作晦望夜半各家當戶燒一丸晨起各人吞下小豆大一丸則不致傳染

用品

外加毒者八味以應八氣風烏頭　附子　藜蘆　皁角　蔏草　礬石半夏　細辛　右共三十二物各五錢為末和入枕匣外用布囊縫好枕過百日面有光澤一年體中風疾一切皆愈而且身香四年髮白變黑齒落更生耳目聰明神方秘驗此方乃女廉以傳玉清玉清傳廣成子聖：相傳不可輕忽常以袱包盖好勿令出氣

蚊烟法

粗茶一斤木鱉八兩雄黃四兩共為末醋丸彈子大每晚用一丸燒之去者去不去者亦不能嚙人

林柏木　蓋忘簑　女廉藥枕　香

五月五日七月七日取山林柏木鋸板作枕長一尺三寸高四寸以柏心赤者為之蓋厚四五分一製精密勿令走氣又可啟閉蓋上鑽米大孔三行每行四十孔凡一百二十孔內實藥物二十四品按二十四氣用川芎　當歸　白芷　辛夷　白朮　藁本　木蘭　蜀椒　官桂　杜蘅　柏實　秦椒　乾薑　防風　人參　桔梗　白微　荊實　薏苡　款花　肉蓯蓉　蘼蕪　白蘅　飛廉

雜品

一枝梅　硃砂錢三銀硃一錢五靈脂三錢麝香三分草蘇仁五分雄黃錢五巴豆仁五錢去油不午日午日用油脂為膏作小餅約小指大遇有重症先將此藥貼眉心正中移時揭去有紅色散漫者可治若係白色者即不可治矣

七聖紫金錠　治疔瘡癰氣時毒等症

上木香　苦花子　仙人薯　晚蚕沙　柏花各一錢硃砂　雄黃錢各三為末米糊為丸毛屎梯根磨硝麝攪勻傾銅盆內攤極薄片切作半粒米大放患處點火灸之毒大者五粒小者二三粒

紫金錠　治小兒一切危症各照引磨服

長砂　膽星各五錢蟬蛻　甘草各三錢麝香錢一蛇含石四一方加殭蚕　白附子白茯苓各四錢三錢白附子五錢減去甘草錢一為細末飯搗丸每錠重五分

雞子丹　久服長生延年

取雞雌雄純白者別養得其卵扣出黃白取丹砂細研和入卵中燉封其口還令白雞同子抱之待雞出藥成和以早服如黃豆大二丸日三

雁腹丹　除萬病延年

丹砂三斤治下篩盛以重練囊內雁腹中縫腹令合蒸黍米下炊以桑薪三日三夜出之以白蜜丸如黃豆大每服二九日三

觀音救苦丹

硫黃一錢硝一分麝香一分共為細末先將硫溶化後入

十香丸

乳香　沒葯　樟腦　花椒　硫黃錢各一水銀三錢用唾研如泥　麝香三分蛇床子炒五錢大楓子去殼二兩共研碎舊柏油燭或油胡桃作丸擦疥瘡神效

神妙痧葯

北細辛三兩荊芥錢半藿香末三錢麝金箔錢共為末每用一茶匙放舌上冷茶送下或津嚥下

痧藥

白胡椒一兩　牙皂一錢火硝　檀香末　明礬　丁香
蟾酥一錢各三　乳細辛二錢氷片　麝香各五分　金箔量加

望梅丸　能生津止渴旅行帶之每含一丸可代茶

鹽梅四兩麥冬去心薄荷葉去梗柿霜　細茶各一兩　蘇葉
五錢為極細末白霜糖四兩共搗為丸如雞豆大加
參兩更妙

軟脚散

歌白軟脚散中芎芷防細辛四味研如霜輕撒鞋

中行遠道足無箴泡汗皆香
防風　白芷各五錢　川芎　細辛各二錢五分　為末行遠
路者撒少許於鞋內步屢輕便不生蔵泡足汗皆
香

火龍丹即痧藥

牛黃一錢一百　麝香三錢氷片一錢　硃砂二兩研飛　華撥一錢真金箔
張　雄黃三兩研　火硝一兩　硼砂五錢　牙皁一錢各研細端
午：時冷如痧藥痧脹腹痛將此藥嗅鼻并放舌
尖上喫下亦可

蟾酥丸

雄黃三錢　麝香三分　木香　丁香各一錢
蟾酥為丸如小米大硃砂為衣如難丸少加
米飲每用二三丸放舌裏上化下如入西牛黃金
箔端午：時修合尤妙

又方

沉香雖細毋丁香　硃砂飛水雄黃各一錢　麝香三錢麝木
香一兩蒼术去茅山者米泔浸　蟾酥三錢倶不可見火蒼
术將火酒化蟾酥為丸如丸不就加米飲丸如米

大每二三丸放舌尖上化下

白梅丸　生津止渴

白糖三斤　白鹽梅一斤去核薄荷葉一兩　檀香六錢為細末滴
水丸苡實大每服一丸不拘時嚼化

梅蘇丸　生津止渴

白糖二斤　烏梅肉二斤紫蘇葉二兩炒　鹽一
水丸苡子大每服一丸不拘時嚼化　兩五錢為細末滴

龍腦雞酥丸　消渴涼上膈除邪熱止咳嗽吐血衄
血胃熱口苦肺虛氣損失聲並治之

銀柴胡　阿膠炒珠成　蒲黄炒人參　木通各二兩　生地黄六兩　麥冬四兩　炙甘草一兩五錢　黄芪一兩　薄荷葉一斤　右為細末蜜丸芡實大每服一丸食遠嚥化　參杏膏　止咳嗽化痰

人參　款冬花　訶子　貝母　五味子　桑白皮　紫苑　杏仁　阿膠　茯苓　甘草各五錢　右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一丸不拘時含化

上清丸　利咽膈清上焦熱口舌生瘡

薄荷一斤　防風　桔梗各二兩　川芎　砂仁　甘草各一兩　右為細末蜜丸芡實大每服一丸食遠嚥化

玉泉丸

塩霜梅肉一兩乾葛　桔梗　薄荷各二兩　訶子　烏蓋泥　元參各五錢　天花粉三錢　右為細末蜜丸如黄豆大每服一丸不拘時嚥化

太倉丸　治脾胃飢飽不時生病及諸般積聚百物所傷

陳倉米四兩巴豆二十粒去皮同炒焦去豆不用入去白擣皮四兩為末糊丸梧子大每姜湯服五丸日二服

錢塘趙學敏恕軒纂

鸛脛折斷　鸛脛至脆易折若犯此者用青竹比脛畧大截長三四寸手劈兩片地上掘白頸蚯蚓數條去泥土舖青竹管中用線紮定仍用數條啖之候飯頃即如舊此萬金不傳之方

鸛病　飼蛇鼠及大麥煮煨之

南禽發風　如鸚哥八哥白鸜鵒錦雞孔雀之屬發風不食尾尖上有一肉珠圓如豆大以針挑破之立愈

金雀

凡新捕到金雀必欲以水洗其足令十分乾淨却以舌於其頂上順舔之數十舔然後置籠中如此永不死如不然必致于死此妙法

鴿病

古牆中螺螄朽殼并續隨子銀杏搗為丸每餌十丸愈

鴿性嗜豆菜豆性冷多食則病受烟火之氣則病不見陽光則病不獲沐浴則病不得砂石則病熱病作喘冷病下希熱療以鹽冷療以甘草

孔雀病

飼以鐵水即愈如盛夏患眼病以鵝翎管灌清油少許清水洗之眼不開擘只啖小魚蝦及切翦少許啖之貴涼冷勿與鹹醋雜食

鸚鵡病　鸚鵡性最畏寒冷則發顫如瘴而疽飼以

餘甘可解

畫眉病

畫眉春蒼止當分對之時若入籠一年可矣即明春照前分對之時食不能食吐不能吐名發鼠籠內取出尾上騷尖擠出白漿過數日吐口如前仍然搧打

凡鳥喉啞用飼末一撮或右老錢或訶子任用一件入水汁內浸之飲其水聲亮如前

鷄子病　鷄子有病而不知何病

蜂蜜奶子油及鮮熟肉或小雞肉尤妙三樣和勻與食則愈鵝子或在手腕或在栖木屢次氣喘憂悶食少鮮肉後出糞黑臭因腹內有臭液或食惡肉或食野草之故宜用毛齒莧畧搗爛並奶子油羊羔肉和為食又方葡萄汁煎三分去二止留一分最甜者與鴿子飲間一日將此鴿給鵝子食之則愈凡瘦而憂悶反毛豎起者此方治之獲痊

凡試鵝子有病與否先置鵝子于足下後持肉高懸引教飛上撲食則無病否則有病或以銅末鐵末拌肉與食如食則五臟不住又宰羊羔肺帶熱與之食之肺而安必無恙食之不寧難化第二日有憂悶狀則有病一出糞不間斷不攔在架上安平嘴抹內翅自下而上其翅如擦油光潤大腿均平翅內兩脉平和以上皆無病之徵或因外熱而口開舌顫喘氣或因內熱而眼開脚爪一伸一縮毛豎起或因勞倦而口閉翅下垂鼻中呼氣一切皆有病之徵若出糞綠色在架拳曲不起乃死之徵也

雞瘧

了哥病　春月羽毛上生蟲多蛀死

吳茱萸煎湯放令浴之蛀蟲則死

黃頭病　黃頭有拔肚毛者

蛇殼焙燥研細拌粉內食之即愈

雞一切病

真麻油灌之

雞瘦

土硫黃研細拌食則肥

雞瘟

磨鐵漿染米與食愈

雞水眼

白礬傅之

雞嗂

芒硝一小塊如指大灌之即愈

鵪鶉病

白膜蔽眼者名水眼不治則瞎須常常看視若有此病飼以蚯蚓便愈後又飼以蜘蛛蒼蠅土蜂等物敗其餘毒而鬪亦多狠

巴豆一粒搗碎香油調灌入口即愈

又方

菉豆粉水和成條喂数次愈

熱蚘嗓黑汁臭有膿腔空喘水草不進用

黄芩葵根　貝母　桔梗　小青　吳藍　龍胆　梔子仁　大黄　白蘚皮　黄芩　鬱金各二兩　馬牙硝　黄柏各四兩　研末驗患相當及常要啣重者菉三兩地黄半斤豆豉二合蔓青油四合合齊前藥啣之至晚飼大效蟲嗓重者用葶藶子合炒

令紫色搗如泥桑白皮一大握大棗二十枚去核以水二升煮取一升去滓入葶藶末調勻適寒温而灌之隔日再灌重者不過三次若蟲嗓馬臭味出梁腫出起者不治

蟲嗓十年者醬清如膽汁者半合分兩服灌臭内每灌一兩日將息不得連灌即損馬也

急黄黑汗右割取上斷訖取膽靴頭皮水浸汁灌之如不效用大黄當歸各一兩鹽半盞以水三盞煎取半盞分兩服灌之如再不效針破馬尾尖出

血即效

起卧脆轉及腸結用　細辛　防風　芍藥各一兩　鹽一盞　水五盞煎取半盞分二服灌後灌前用芒硝鬱金　寒水石　大青各一兩　水五盞煎半盞以酒油各半盞攪勻分二服灌口中妙

脆轉欲死　小兎尿和水灌之立瘥搗蒜內小便孔中深五寸亦可

頰骨脹　羊蹄根四十九個燒灰熨骨上冷換之如無羊蹄根楊枝指大者炙熨之

後胯冷跌　葱薑各五兩　水五盞煮取半盞和酒灌之

治馬蛆蹄糟下立處掘一尺方埋雞子許大圓石子冷常立石子上一二日即瘥

騎馬走上坂用木于腹來去刮擦以手內後孔令探糞出即愈探法剪去手指甲以油塗手恐傷破馬腸

治疥　黃豆炒焦用生麻油搗爛傳之先以醋泔水洗淨

又方　先以皁莢水或米泔淨洗次用檫根末和麻油塗令中間少空放蟲不得多塗恐瘡大

又方　巴豆臘粉研細末麻油塗定日洗塗數日妙

目暈　用霜後乾穀樹葉為末一日兩度以蘆管吹眼中

治啞喘毛焦　大麻子揀淨一升飼之大效

諸瘡　昆沙夜合花葉黃丹乾薑各等分為末先用鹽湯洗瘡後用麻油加輕粉調傅

疥癩　杜蘅生搗搽或為末敷之亦可

又方　生胡麻葉搗汁灌之

又方　蒸麵末水調塗妙

鼻內癩病　蕎麥磨粉灌仍用麥稈飼之

傷水　先燒人亂髮熏兩鼻後用川烏白芷胡椒猪牙皁角各等分麝香少許為末用竹筒盛藥一字吹入鼻中須臾打噦清水流即放加水煮治一切中結病症

馬瘐　狗肉汁灌之

諸病　白鳳仙花連根葉熬膏遇馬有病抹眼四角上汗出即愈

馬後柚破　馬尾後抽為柚轡打破者以蛇蜕燒灰香油調敷或乾糞一二時即愈

發汗散　治騾馬久咳不止

川芎　陳皮　青皮　紫蘇　百合　當歸　附子　小茴各等薑七片　葱七莖　蓮鬚　生酒一斤煎熱候温灌下拴暖房用薦蓋之取汗後補藥再服三五劑

麻黄　桂枝　甘草　杏仁　天冬　蒲黄　桔梗　花粉　當歸　青皮　陳皮　鬱金　香附　生地　熟地　防風　荆芥　蘿蔔子　茴香　白芷　水酒各一鍾煎熱擂碎加真麻油一鍾窩一兩雞蛋二個同煎灌之連日服

治騾馬驢寒胃　檳鈴　甘艸　青皮　桑皮　連翹　梔子　苦參　天冬　麥冬　防風　荆芥　知母各一分三劑擂碎同灌

牛蝨

肩爛　舊綿絮三兩燒存性用麻油調傅忌水五日

漏蹄　紫礦為末豬脂和內蹄中燒鐵篦格之一切疥癩　杜蘅研為細末傅之或生搗塗搽亦可

又方　藜芦末水調塗之

傷熱　胡麻葉搗汁灌之立瘥

瘴疫　石菖蒲　淡竹葉　葛粉　鬱金　蒼术等分為末每用一兩芭蕉自然汁一升入蜜一兩黄蠟二錢調和灌之末解再灌熱極加大黄臭頭無汗加麻黄臭口出血加蒲黄

又方　夏茶二兩為末和水五升灌之

尿血　當歸　紅花為末酒煎一合灌之

腹脹　燕子屎一合水調灌之

噎　阜莢末吹鼻中以鞋底拍尾俾骨下身上生蟲　當歸搗爛醋浸一宿塗之

牛瘦　厚朴　陳皮　蒼术　烏藥　貫仲　甘草　黃芩　川芎　當歸　白术　茯苓　芍藥　熟地　枳殼　紫蘇各一兩　分為五劑研末水二碗酒二碗姜十片一日灌一劑服十日定壯

牛馬猪瘟　硃砂　麝香　潮腦　各等分為末猪吹左鼻牛馬吹右鼻

牛狗羸瘦　泥鰍一二枚從口鼻送入則立肥

牛不喫草　青木香四兩金銀花藤斤煎湯灌下即好

串雅外編　卷四　醫獸　十二

牛馬猪瘟　大黃　朴硝各五錢共泡湯一碗灌之鴻空餓半日用冷水一大盆令食之即好

羊證

失蹄　羖羊脂熬去渣取鐵匙子火燒令熱將脂勻匙上烙之勿令入水次日即愈

生癩　藜芦根不拘多少搥碎以米泔浸之瓶盛塞口置熱竈邊數日候味酸先以瓦片刮患處令赤用湯洗之去瘡甲拭乾以葉塗之兩次即愈若癩多逐漸塗之

又方　鍋底墨及鹽桐油各二兩調勻塗之

中水　先以水洗眼及鼻中膿污令淨次用鹽一大碗撮就將沸湯研化候冷澄取清汁注少許于兩鼻內五日即愈

猪證

猪病　割去尾尖出血即愈

瘴疫　蘿蔔或葉食之不食則難救

猪瘟　牙皁　細辛　川烏　草烏　雄黃　狗天靈蓋　燒灰研末吹入鼻中用五分即可牛羊亦可治加麝香五厘更妙

一方　牙皁三錢大煅北細辛三錢牙硝錢九共為末竹管吹三分入鼻內

貓證

煨火疲瘁　硫黃少許內猪腸中炮熟喂之或魚腸中飼之

誤為人踏死　蘇木濃煎湯灌之

畏寒　夏秋多以黃鱔肉飲之

貓瘦　鼈肉喂之又煎烏藥汁喂之

貓犬病　磨烏藥灌之愈犬子病灌平胃散
死胎不下　芒硝石末錢二童便温服無不效豐城
曾尉有猫孕五子一子已生四子死腹中用此灌
之即下

狗證

狗癇　身上發癩蟲蠅百部汁塗即除去
狗蝨　濃蘇油澤手擦其蠅即去
卒死　葵根塞鼻可活
一切病　水調平胃散灌之

呂氏家塾外編　醫獸

一方　用巴豆去殼和平胃散灌之
惡犬令馴　天獾肉一塊雁天獾也與食之即終身見
人不吠噬蓋以氣相制也

猿猴病

大蜘蛛研爛冷水調灌之百病愈　賈仲磨水灌
之并壁上蠨子與食百病愈
小猿宜餵人參黃芪大猿以薤餵之
猿性不耐着地着地輒瀉以死煎附子汁飲之即
愈

鹿病

鹽拌豆料餵之常以豌豆餵亦佳
象生瘡　滿身如馬生鼠瘡之狀
石蟹搗碎敷之

駝病　草脹豆脹

鬼曲　川山甲　滑石　木通各二為末小油半
斤温水三升飢灌之熱水生瘡　山梔　黃連
知母　貝母　遠志　甘草各三為末油半斤水
五升飽灌之

呂氏家塾外編　醫獸　十四

眼暈遮晴　烏魚骨　馬牙硝　銅青　白礬
青鹽　為末燈心點之
口瘡　菩薩石　桑皮　黃丹　等分青鹽少許
為末入蜜熬膏每服一兩半哺之
二便不通
桑皮甘草各五兩　大黃四兩　芍藥　滑石　木通各二兩
川山甲一兩為末水五升油灰汁各半斤灌之
力乏欲死　鹽和麵納入口中飼之則三日不飢
漏蹄　人髮灰　石灰　黃丹　瀝青　為末猪

脂熬膏貼之
胎衣不下小便秘澁　木通一兩朴硝四兩灰汁一升
大油一斤水二升飢灌之
駝瀉不止　炒鹽四兩生姜二兩白礬　天仙子　赤石脂　赤黍米各等分用醋同熬待飢灌之
淋瀝　牙茶四兩　大金子　赤麻子　通草　白丑黑丑各一兩為末磨汁合大油一斤藥四兩飢灌之

樹皮投水中則愈
金魚生蟲
新磚一碗入糞中浸一日取出令乾投魚缸內或用白楊或丹楓皮投缸中亦愈
鼈病
鹽拌料豆喂之常以潦豆草喂之為佳

魚病
池中遭毒翻白急疏出毒水另引新水養之搖芭蕉根或糞清澆入可解
魚生蟲
瘦而生白點者名蝨、如小豆大形似鱉凡山中暴雨入池帶惡蟲穢氣亦令魚生蟲凡取魚見魚瘦宜細視之有則以松毛遍浮池中則除或以楓

夫

醫外
醫蟲
蜚蠊病
積食　以水拌紅蟲飼之
冷病嚼牙　以帶血蚊蟲飼之
熱病　以菜豆牙共葉或棒槌蟲飼之
閉後糞結　以粉青小青蝦飼之
閉傷　以自然銅浸水點之
牙傷　以苓薑點之

串雅外編　卷四　醫蟲　七

咬傷　以童便調蚯蚓糞點之
併銷　用池邊水草內青白色小蜘蛛喂之
中秋後不上食者　菱米栗子煮熟喂之柿餅肉亦妙
牙損　菜園中泥塊內紅蟲喂之
深秋後老蛩受傷不上食者　惟蟹鉗內生肉以米飯同捻成小粒喂之
早秋蛩受熱　用廁上蛆蟲變成蛹兜內有小蟲名棒槌蟲喂解或用稍撮內蟲蒸熟于烈日中晒乾以麻黃根研細拌喂隨用水楊柳細鬚洗淨浸水飲之能解熱毒
蛩回缺水而色昏者　以水潤窩盆用青絹浸濕放于盆內使往來攢走則光彩勝舊
蛩色嬌嫩者　洋溝內紅蟲喂之次以盆傍于日影中照二三日自然色勝

蠶病

白殭　山蛩蟲燒灰拌之
蠶遇抓臭生人及穢體污厭則延亂不食如知之

串雅外編　卷四　醫蟲　八

急焚香楓箬葉以解之
熱病　臘月內搗磨乾桑葉成麯以麩收貯飼之
餘剩者做牛料甚美
救蠅溺死　蠅被水淹死用指輕輕撈起取香爐灰拌好置桌上久之即活自能飛去

醫花木

花遲不發

芝麻油醬馬糞二項入淡水和勻澆數次即開

毒蛀

花木有蛀孔小孔用鐵絲通死其蟲若孔大用火藥灌滿以火燒之烟入蟲自死以上半月為妙

落毛蟲

凡花果樹生楊剌子食葉：盡秋間發嫩來春必

死矣用指粗甘草二三寸長掘開土見老根將甘草緊貼老根埋之數日蟲則自落而死此法不許人見之則不驗蟲不死矣

建蘭生蟲

蘭葉上忽生白點謂之蘭蟲用香油入水噴之或魚腥水或煮蚌湯洒之則除

竹生稗

竹開花結實如稗次年必死治法於初花時擇一二大竿截去止留下三尺打通其節用糞填實之則花自止亦不敗矣

茉莉根生蟻

以烏頭煮湯冷灌之則絕

薔薇腦生蒡

以煎銀鋪中爐灰撒之蟲自死

菖蒲無力萎黃

鼠糞和水澆之即盛

皁角無實

根旁鑿一孔入生鐵屑三五斤泥封之即結角

果樹生蟲

以多年竹燈藥掛樹上則蟲自落

樹生癩

甘草削竹釘鍼之自消惟不可鍼蒲萄

解樹葉釘

凡木如肉桂作釘釘之即死用甘草水灌之復榮

被鳥賊骨釘之則翳以狗胆解之仍茂

出櫻桃蟲

櫻桃結實一經雨打則蟲自內生人莫之見須用

水浸良久候蟲出方可食

桃皮作脹

凡桃樹其皮作脹初生四年後用力自樹本監劃其皮至生枝處使膠盡出則皮不脹不死多有數年之活

桃自落實

桃生子多則墜者亦多于社日春粮下土石罅其枝則實便不落若生蟲以煮猪首淡汁冷澆之自絶

橘病

橘有四病畏寒畏旱生蘚生蟲是也冬須以犬糞壅其根稻草裹其幹則不凍死遇旱以米泔水澆則實不損落若見枝生苦蘚即刮去之有蛀屑飄出急用鐵絲通之再用杉木銜窒其孔

桑癩

蒲母草狀如竹葉以此草漫汁澆之若生桑蟲尋其穴桐油抹之即死

蘿蔔空心

蘿蔔鋤起切去葉止留寸許顛倒種土中直至過年永不空心

花被麝冲

凡花最忌麝冲爪大尤忌蒜遇麝不損　又法于上之須於根旁栽數株薤之即如舊

木樨受蛀

芝麻梗蒂殼束懸樹上風頭以艾和雄黄末焚

銀杏不結子

雌樹鑿一孔入雄樹木一塊以泥封之便生子

曲樹令直

凡樹木身曲者宜以力豎劃其四處則逐漸長直

樹老

凡樹老以鍾乳末和泥于根上揭去皮抹之樹復茂

桃樹永年

桃樹命最短俗呼為短命樹俟栽出二三年後以刀斫去根上長出再斫去則百年長盛

蘭泣

蘭者花之君子能知恩義有喜則報有哀則知所手植之人死必以衰麻一片挂於蘭上否則立稿名蘭泣

蘿蔔諸菜生蟲

苦參末撥之即死

取蟲

串雅外編

齒蟲痛

鏡面草半握入蘇油二點鹽半捻擂碎左疼塞右耳右疼塞左耳以薄泥餅貼耳門閉其氣仍側卧泥耳一二時去泥取草放水中看有蟲浮出久者黑次者褐新者白須于午前用之

取牙蟲

韭子一撮將碗底盛之寢水中用火燒烟外用小竹梗將下截劈開以紙糊如喇叭樣引烟熏蛀齒

取蟲

串雅外編

如下牙蛀者以韭子煎濃湯漱之蟲自出

齒蠹并蟲

雀麥一名杜姥俗名牛星草用苦瓠葉三十枚洗淨取草剪長二寸以瓠葉作五色包之廣一寸厚五分以三年酢漬之至日出以兩包火并炮令熱納口中熨齒外邊冷更易之取包置水中解視即有蟲長三分老者黃色少者白色多即二三十枚少即一二十枚此方甚妙

牙齒蟲蠹

韭菜連根洗搗同人家地扳上泥和敷痛處腮上以紙蓋住一時取下有細蟲在泥上可除根　又韭根十個川椒二十粒香油少許以水桶上泥同搗傅病牙頰上良久有蟲出數次即愈

烟熏蟲牙

瓦片煅紅安韭子數粒清油數點待烟起以筒吸引至痛處良久以温水漱吐有小蟲出為效未盡再熏

牙蟲作痛

魚腥草花椒菜子油等分搗勻入泥少許和作小丸如豆大隨左右塞耳內兩邊輪換不可一齊用恐閉耳氣塞一日夜取看有細蟲為效

風蟲牙痛

楊梅根皮韭菜根廚案上油泥等分搗勻貼乾兩腮上半時辰其蟲從眼角出也屢用有效

蟲牙

鮮猪肚裏面微洗用竹刀刮下末以稀紗裹末咬緊蟲牙上其蟲即鑽入紗內痛立止

寸白蚘蟲

酽石榴東引根一握洗剉用水三升煎取半盞五更温服盡至明取下一大團永遠絶根食粥補之　又榴皮煎水煮粥食之亦良

寸白蟲病

先食猪肉一片以沙糖水調黑鉛灰四錢五更服之蟲盡下食白粥一日

下蚘蟲　心痛如刺口吐清水乃蚘痛也

白艾一升水三升煮一升服吐蟲出或取生艾搗

汁五更食香脯一片乃飲一升當下蟲出

取心氣痛蟲

無問新久以生地黃一味隨人所食多少搗絞取汁搜麪作餌飢或冷淘食良久當利出蟲長一尺許似壁宮後不復患矣

腹中蟲病

大麻子仁三升東行茱萸根八升漬水平旦服二升至夜蟲下　又腹中有白蟲以馬齒莧水煮一盌和鹽醋食之須空腹下少頃白虫自出也

一切蟲病
狼毒杵末每服一錢用錫一皁子大沙糖少許以水花開卧時空腹食之次早即下蟲也

小兒蟲瘡
舊絹作衣化枏油塗之與兒穿着次日蟲皆出油上取下爐之有聲者是也別以油衣與穿以蟲盡出為度

取瘡避蟲
先於瘡上灸三壯然後用葉清作瘡口用新活鰿

魚截作一指大批開就掩在瘡口上少時覺瘡內痒急揭起魚覷魚上有細蟲如馬尾一節蟲出如捲三五次取盡蟲子後用飲瘡口藥

取足瘡生蟲
南方地卑濕人多患足瘡患久生蟲如蛭乃風毒攻注而然用牛或羊或猪肚去糞不洗研如泥看瘡大小入煖過泥磬半兩研勻塗帛上貼之須臾痒入心徐徐連帛取下火上灸之蟲出絲髮馬尾千萬或青白赤黑以湯洗之三日一作不過數次

蟲盡瘡愈

取疳疥蟲
生蘇油渣貼之綿裹當有蟲出

積年骨疽
一摶一汁出者熬飴鬠**鞠**瘡上仍破生鯉魚肠之頃時刮視蟲出更洗敷藥蟲盡則愈

消渴有蟲
苦楝根白皮一握切焙入麝香少許水二盆煎一盆空心飲之雖困頓不妨下蟲如蚘而紅色其渴自止消渴有蟲人所不知

癢瘡有蟲
八月中多取班蝥以苦酒浸半日曬乾每用五個銅器炒熟為末巴豆一粒黃犬背上毛二七根炒研硃砂五分同和苦酒頓服其蟲盡出也

聤耳有蟲
膿血不止用鯉魚酢三斤鯉魚腦一枚鯉魚腸一具洗切烏麻子炒研一升同搗入器中微火炙暖布裹貼耳兩食頃有白蟲出盡則愈慎風寒

吐蟲

吃白礬味甘嚼黑豆不腥者即中蟲也石榴根慶煎濃汁服即吐出活蟲無不愈者

蠷螋尿瘡

清明釀造春酒飲之至醉須臾蟲出如米也

取疳眼蟲　爛弦疳眼中有蟲

覆盆子葉咀嚼留汁入筒中以皁紗蒙眼滴汁漬下弦轉眄間蟲從紗出數日下弦乾復如法滴上弦又得蟲數十而愈或用覆盆子嫩葉搗汁點目皆

取蟲

三四次有蟲隨膠淚出成堆也無鮮葉以乾者煎濃汁亦可

三十六黃

雞子一枚連殼燒灰研酢一合和之溫服臭中蟲出為效極黃者不過三枚神效

五色帶下

以麪作煎餅七個安於燒赤黃磚上以黃瓜蒌傳麪上安布兩重令患者坐之令藥氣入腹熏之當有蟲出如蠶子不過三五度瘥

臁瘡蛀爛

鱔魚數條打死香油抹腹蟠瘡上繫定頃則痛不可忍然後取下看腹有針眼者蟲也未盡再作後以人脛骨灰油調搽之

臁瘡生蟲

小鰕三十尾去頭足殼糯米飯研爛隔紗貼瘡上別以紗罩之一夜解下掛看是小赤蟲即以蔥椒湯洗淨用舊茶籠內白竹葉墊大小剪貼一日二換待汁出盡逐日煎苦楝根湯洗之以好膏貼之

取蟲

將生肉勿換膏葉忌發物

取痔蟲

水銀棗膏各二兩同研綿裹納下部明日蟲出

痔漏有蟲

黑白牽牛各一兩炒為末以猪肉四兩切碎炒熟薦米食之食盡以白米飯三匙壓之取下白蟲為效

腸痔出血

桃葉一斛杵納小口器中坐蒸之有蟲自出

下部蟲痒
蒸大棗取膏以水銀和捻長三寸以綿裹夜納下部中明日蟲皆出也

下部蠶蟲 痛痒膿血旁生孔竅
蜣螂七枚五月五日收者新牛糞半兩肥羊肉一兩炒黃同搗成膏丸蓮子大炙熱綿裹納肛中半日即大便中蟲出三四度

三木節散 治風勞面色青白肢節沉重瞀悶痛或寒或熱或躁或嗔思食不能食被蟲侵蝕証狀多

端
天靈蓋酥炙研二兩牛黃人中白焙各半兩麝香二錢為末別以樟木瘤節皁莢木瘤節梗木瘤節各為末五兩每以三錢水一盞煎半盞去渣調前末一錢五更頭服取下蟲物為妙

肝勞生蟲 眼中赤脈
吳茱萸根為末一兩半粳米半合雞子白三個化蠟一兩半和丸小豆大每米湯下三十丸當取蟲下

脾勞發熱 有蟲在脾中為病令人東行茱萸根大者一尺火春子八升橘皮二兩三物叹咀以酒二斗浸一宿微火薄暖之絞去渣平旦空腹服一升取蟲下或死或半爛或下黃汁凡作藥時切忌言語

追勞取蟲
啄木禽一隻硃砂四兩精豬肉四兩餓令一晝夜將二味和服之至盡以鹽泥固濟煅一夜五更取出勿打破連泥埋土中二尺次日取出破開入銀

石器內研末以無灰酒入麝香少許作一服須謹候安排待蟲出速鉗入油鍋內煎之後服局方嘉禾散一劑

大風癩蟲
苦參末二兩猪肚盛之縫合煮熟取出去藥先餓一日次早先飲新水一盞將肚食之如吐再食待一二時以肉湯調無憂散五七錢服取出大小蟲一二萬為效後用不蛀皁角一斤去皮子煮汁入苦參末調糊下何首烏末二兩防風末一兩半當

歸未一兩白芍藥末五錢人參末三錢丸梧子大
每服三五十丸温酒或茶下日三服仍用麻黃苦
參荊芥煎洗之

瘋風有蟲
着落聲變用預知子雄黃各二兩為末以乳香三
兩同水二斗銀鍋煮至五升入二末熬膏瓶盛之
每服一匙温酒調下有蟲如尾隨大便而出

大風瘋蟲
黃蘗末皁角刺灰各三錢研勻空心酒服取下蟲

物亦不損人食白粥兩三日服補氣葉數劑如四
肢腫用針刺出水再服忌一切魚肉發風之物取
下蟲大小長短其色不一約一二升其病自愈

藥戲

大道丸　治荒
黑豆一升去皮貫仲　甘草各一兩　茯苓　吳朮砂仁各五
錢剉碎用水五升同豆熬煎火須文武緊慢得中
直至水盡棟去葉取豆搗如泥丸如芡子大磁器
盛之蜜封每嚼一丸則恣食草木苗葉可飽且無
毒其味與飯同
祖師修行方
白茯苓　甘菊花　松柏　香白芷各一兩　十共為末

蜜丸黃豆大每服十丸冷水送下百日不飢連服
三服永不飢也不信先將一丸與雞喫百日不飢
要開藥之日先喫米湯或菜湯亦可取下葉來

韓湘子脫衣方
五靈半夏及天仙狼毒雖兜也草烏等分全爛搗細
羅三四兩布用袍水七升煎輕〻慢火煎熬盡曬
燥將來雪後穿雖是一重單盖體勝如常着十斤
綿
韓湘子煮袍鞋法

茯苓　貫仲　天仙子　狼毒　草烏　白礬
五靈脂各一兩　共為細末用水一桶同葉末下鍋煮
袍鞋一雙汁盡晒乾冬不透風寒夏涼不漏水
煮白石法
七月七日取地榆根不拘多少陰乾百日燒灰猴
取生者與灰合搗萬下灰三分生末一分合之若
石二三十水浸過三寸以葉入水攪之煮至石爛
可食乃已
行路不喫飯自飽

芝蔴一升紅棗一升糯米一升共研為末蜜丸如
彈子大每服一丸水下可一日不飢
行路不飲水不渴
白沙糖　白茯苓　薄荷　甘州各四兩　共為末煉
蜜丸如棗大每服一丸噙化可千里之程不渴
千里酒
天仙子　川烏　貫衆各一兩　甘菊花三錢　陳皮錢五　甘
草錢為末糯米一升燒酒五碗煮作粥糜冷定入
前葉和勻瓶內封固五七日取出用麩一升炒黃

為末煉蜜為丸如櫻桃大抹酥油金箔為衣用時
投一丸於滾湯中即化成酒
千里醋
烏梅一斤拗許釀醋五升浸一伏時晒乾再浸再晒以
醋收盡為度搗為末醋浸蒸餅和之為丸如芡子
大飲食時投一二丸於滾湯中即成好醋矣
千里鞋　治遠行腳腫
草烏　細辛　防風　苓分為末糝鞋底內如草
鞋以水微濕糝之用之可行十里妙

凝衣不透雨
草烏　白芨　白茯苓　狼毒　天仙子　白礬
各一兩　共為末和入凝內凝衣不透雨
暑天穿襪
蒼术　白芷各四兩　切片真蘇油浸之過三宿炒乾
不用碾每至半夜子時食三兩以盡為度故有衣
不熱
寒月入水
端午午時取水蜈蚣不拘多少晒乾為末每服三

五錢暖酒送下不可冷嗽如冷食即瘡疥可以冬月入水無妨

造夢法

葛花陰乾百日㊟搗末日暮水服方寸七乃卧思念所欲事即於眠中醒卧也按葛花乃商陸花也

見鬼丸

生麻子　菖蒲　鬼血　等分杵丸彈子大每朝向日服一丸百日即見鬼也

剃頭不用刀

石黄　石灰各一兩　樟㊟為末水調塗卧時傳面上天明女人去面毛不用線

石黄三錢石灰二錢為細末水調臨卧時傳面上天明面毛盡去矣

飲酒不醉

赤黍漬以狐血陰乾飲酒時取一丸置舌下含之令人不醉

寫字去墨

滑石二兩石灰一兩烏羊骨一兩燒灰赤硇砂一兩共研細末

米泔水調勻磁礶收貯封口背陽曝乾用時清水調塗蓋字上候片時擦去

又方

山中活竹將一節開小孔括去青入砒末于內用生漆綿纏口待三五日後看竹外有霜掃下磁礶收搽字即去

又方

白羊骨煆一兩　白丁香一兩寒水石五錢生半煆紫鹵一兩為細末用雞蛋開一小孔去黄留白調藥摸入殼封

固入雞蛋內同抱以小雞出為度取出用水調搽立刻彈去

宮粉錢蔓荆七分龍齒三分白丁香三分紫丁香鴨屎也三分共為細末用皮木汁調勻以磚二碗燒滾候温將藥夾於中次早自乾仍研為末用時手指搭碎于字上其墨自落矣

洗字法

西瓜一個約重三斤半熟者蒂邊開一孔入官硼砂三錢五分砒三錢五分硇砂四錢共為細末入瓜孔內懸七日

白霜自出以翎毛掃下又一七收用時先將清水濕字以葉搽上待乾用翎掃去紙白如新

洗字不見

菖蒲根稻穀研末水調搽字上候乾擦去自然不見字形

去硃法

黃瓜一條蒂邊開一孔入官硼砂一兩研末入孔內懸取白霜以翎毛掃下先以水濕字以葉搽上待乾掃去紙白如新

起字法

明礬三兩鷹糞三錢石灰一兩官粉一兩雀糞三錢陽起石一兩鵪糞三錢透骨草一兩俱為細末童便調將竹筒盛挂陰處候發出霜取霜水調描字上墨自去

墨名不染紙

端午日午時用上好京墨一塊不拘大小入蝦蟇口中線縛定口於朝陽地上掘一坎深五尺不拘埋蝦蟇在內經四十九日取墨磨寫紙上一拂便落

灰種仙菜

術家用羊角馬蹄燒作灰撒勒俗呼為王母菜食之益人

驅除虎蛇神烟

鹿牛羊麂犀角各二兩烊炭黃雄黃二兩則蛇亦遠矣

驅鼠烟

桃頭椿樹皮絲瓜藤棟青葉信一錢燒之鼠即遠去

掃蚊烟

端午日多收浮萍晒乾研末各等分晒乾研末加骨信各許共研末燒一次七夜無踪

聚蝶

取百花心陰乾夜露蜜拌見有衆蝶飛舞將蜜塗兩手心立上風將兩手相合而搓相向而拍聲聞香皆來就矣

拍掌喚蝶

至春來採取諸花蕊用白馬尿浸三日曬乾研末

以川椒塗手上却于有蝶處立於上風拍掌即飛
来矣

漿衣去蝨

白果三二十立加水銀三分搗研野菊花三錢研
末同漿攪勻漿衣永不生蝨

造白雀法

雀方出殼未羽時以蜜和飯飼之則遍身生白羽
毛

鳶頭散　治鬼魅邪氣

東海鳶頭黃牙即金牙苴若子防葵為末酒服方
寸匕欲令病人見鬼增防葵一分欲令知鬼又增
一分立驗不宜多服

擦銅如銀

水銀二錢白礬一兩飛丹錢一兩研末為度以銅洗淨
前用藥擦之即紅銅亦如白銀

擦錫如金

膽礬一兩　白礬錢共為末搽之錫如金色鐵變紅色
點班竹

碗砂五錢研綠礬　膽礬各三錢　石灰錢五一處再研細
入濃灰汁調勻隨奇文點候乾揩洗其班如自然
者磁器竹水皆可用

又方

碗砂五錢　石灰　共米醋調點畫竹上

點磁器

白芨一兩為末雞子清調勻修補以線紮緊火上烘
乾如新水不壞忌用雞湯洗

磨鏡丹藥

水銀一兩上好錫夏秋七分春冬八分明礬夏秋一
錢二分春冬一錢半先將錫溶化入水銀攪勻冷
定同礬研細如飛麵大暑要不起霜礬少為妙加
鹿頂骨更妙一云鹿骨燒灰

寫字入石

鼈尿炭碗砂少許共為末入硯池水內煞後研墨
以新筆寫字在石上可透一分入石內若寫于水
上或門上可入透五分

點藥鏡

雌黃入紫粉霜硇砂細研用膠水調任意於鏡上
描畫鸞鳳花草候乾火燒片時以磨鏡藥磨去其
畫自見
稜碗膠
桐油熬熟入瀝青調稀入石灰調合作膠用
頃刻成碑
爐底不拘多少加白礬少許再用鵝蛋清調成錠
用
瘦米

採黑飯樹葉即南燭枝葉止菴按非也余曾見
（亦似南燭實圓紫如細珠味甘時人皆未之見故方書所載多候）
清水浸米九蒸九晒則米瘦如麻每石瘦至一斗
涼水一泡頃刻成飯且輕少利於持負

夏日作冰
以淨斫熱湯泡過盛以百沸沖湯將油丹紙數重
包定放井中半日取出即成冰也

巧洗油跡
如衣服被蘇油污垢加上桐油如被桐油污垢加
上蘇油後將細麵泡湯洗之如不淨加紫蘇湯洗
之如神

春耕
用濾淨柴灰湯三飯碗下鍋燒滾逐漸摻下松香
末約兩許急將箸旋糝旋攪再煎幾滾冷過用蔑
紮圈如茶杯口大熬湯洒空中結泡大如碗五色
飛揚可玩或用稻柴灰亦可

斟酒不溢
無名異磨盞口注酒雖浮於盞却不溢出

又法
用好沒藥一塊周圍抹杯口上將酒斟滿盈過此
椰一分其酒不溢出杯外

葫蘆相打
取一樣葫芦三個挖開大口以木末和膠調填在
內一個葫芦將蠟調針砂置口內將針砂葫芦磁
調膠置口內一個以水銀置口內將針砂葫芦磁
石葫芦放在一處兩個葫芦自然相打後將水銀
葫芦放于中間兩個葫芦自然放開

水狗自走
實草一段雕狗形以膠水并塩醋調和鐵屑搽在狗頭上候乾以上好磁石一塊暗藏于内引其狗走則隨手而来
金杯分酒
取獺膽塗犀角簪上將酒一杯斟滿將簪向杯中分酒其酒兩開矣
手帕盛酒
胡粉五錢槐膠二分雞蛋一個用清用水一碗拌勻以新手巾莊其葉内洗三四次熨開如故任意盛酒一滴不漏
葉盛　四十五
做大蛋
猪尿脬一個不落水將灰拌用脚踹踏至大不拘雞鴈鴨蛋一樣打破傾盆内隨多少調和裝入脬内紮緊口外用油紙包裹泥井底一夜次日取出煮熟剥開脬内黄白照旧如大蛋一般甚妙
長明灶
穀樹滋搽燈草陰乾又上硫黄少許一梗可點一更

光緒戊子年鐫

醫方論

上洋埽葉山房藏板

序

欲救人而學醫則可欲謀利而學醫則不可我若有疾望醫之救我者何如我之父母妻子有疾望醫之相救者何如易地以觀則利心自澹矣利心澹則良心現良心現斯畏心生平時讀書必且研以小心也臨症施治又不敢掉以輕心也夫而後以局外之身引而進之局內而痛癢相關矣故醫雖小道而所係甚重畧一舉手人之生死因之可不儆懼乎哉近年以來叠遭兵火老成多半凋殘學醫者紛紛日起吾恐其無有師承而果於自用也故於拙刻醫醇賸義中先標一醇字此非不求有功但求無過之謂若僅如是淺陋而已矣庸劣而已矣何足以言醇乎吾之所謂醇者在義理之的當而不在藥味之新奇如仲景三承氣湯頗爲峻猛而能救人於存亡危急之時其峻也正其醇也此吾之

所謂醉也夫學難蹤等而法有正宗初學者此法成就者亦此法先後其此一途行遠自邇不惑於他岐如是而已矣第書籍散失學者難於博觀而約取之卿曲之士每以醫方集解一書奉爲枕秘甫經臨症輒檢用之殊不知集中可用之方固多而不可用者亦不少漫無別擇草菅人命矣茲於所集各方之後逐加評論蓋欲爲初學定範圍非敢爲高明下針砭也且欲學者澹其謀利之慾發其救人之心猶前志云

同治四年十月武進費伯雄晉卿甫題於古延陵之寓齋

發凡

一是編專爲初學而設但取醫方集解所選之方逐一評論其餘概不旁及

一是編但載一方一論與原書對看自明其主治與註釋一概不錄以歸簡便

一學醫而不讀靈素則不明經絡無以知致病之由不讀傷寒金匱則無以知立方之法而無從施治不讀金元四大家則無以通補瀉温凉之用而不知變化集解所選之方原以仲景及四家爲宗其餘所收者不過張王許錢嚴陶數人而已本未嘗博採羣書也然於此而得其醇化其偏觸類引伸亦可以無大過有志之士欲求更上一層則自有由博反約之法在

一碓以駁駮下質何敢以管窺之見妄議古人然欲爲初學折衷一是則僭妄之罪所

不敢辭

武進費伯雄晉卿甫著

男應蘭編次 孫榮祖 承祖 紹祖 校字

六味地黃丸

地黃砂仁酒拌九蒸九晒八兩 山茱肉酒潤 山藥四兩 茯苓乳拌 丹皮三兩 澤瀉三兩 蜜丸

此方非但治肝腎不足。實三陰並治之劑。有熟地之膩補腎水。卽有澤瀉之宣洩腎濁。以濟之。有萸肉之溫澹肝經。卽有丹皮之清瀉肝火。以佐之。有山藥收攝脾經。卽有茯苓之淡滲脾濕。以和之。藥止六味而大開大合。三陰並治。洵補方之正鵠也。

附桂八味丸

熟地八兩 山茱肉四兩 山藥四兩 茯苓三兩 丹皮三兩 澤瀉三兩 附子一兩 肉桂一兩 蜜丸

附桂八味爲治命腎虛寒之正藥亦導龍歸海之妙法然虛陽上浮火無所附者必於脉象細黍或脈洪大而重按甚弱或寸關洪大而兩尺獨虛細者宜之否則抱薪救火必成燎原之勢矣

知柏八味丸

大熟地八兩　山茱肉四兩　山藥四兩　茯苓三兩　澤瀉三兩
牡丹皮三兩　知母二兩　黃柏二兩　蜜丸

知柏八味丸治

宜血虛者。尙宜酌量加減。

虎潛丸

黃柏鹽酒炒　知母鹽酒炒　熟地黃三兩　虎脛骨酥炙一兩　龜版酥炙四兩　琐陽酒潤　當歸酒洗一兩五錢　牛膝酒蒸　白芍酒炒　陳皮鹽水潤　鎖陽肉酒煮爛搥　先冬加乾薑一兩

虎潛丸。息肝腎之虛風。風從虎。虎潛則風息。也。惟知柏苦寒。用以洩腎經之邪火。則可若謂補腎滋陰。則予不以爲是。不如用枸兎等類爲佳。

天眞丸

精羊肉七觔去筋膜脂皮　山藥十兩　茯苓末　黃柏鹽酒炒　知母鹽酒炒　熟地黃　當歸酒洗　杜仲酥炙　牛膝酒浸　枸杞子　遠志去心　麥冬去心　人參　白朮各二兩　五味子酒煮米糊　菟絲子酒浸便溺　破故紙炒　補骨脂炒　胡桃肉搗　各一兩五錢　茴香炒　巴戟去心　肉蓯蓉酒洗　各一兩

此用血肉有情之品。以形補形。喜其不用地黃之滋膩。平調營衛。而不礙脾胃。故極爲妥善。

三才封髓丹

天門冬　熟地黃二兩　人參一兩　黃柏酒炒三兩　砂仁一兩　甘草炙七錢五分　麵糊丸用薤白五錢切片酒一大盞浸一宿煎湯送下

此方治龍雷之火不安。夢遺走洩則可若腎氣久虛。精宮不固者。豈得再用苦寒斷宜補腎納氣之法爲是。

大造丸

紫河車一具　敗龜版二兩　童便浸三日　酥炙黃柏鹽酒炒　杜仲酥炙一兩五錢　牛膝酒浸一宿　天冬去心　麥冬去心　人參各一兩　白朮二兩　茯苓砂仁同煮去之　夏加五味子酒煮米糊九

九女人去龜版加當歸乳煮糊九

方中用茯苓砂仁二味。製地黃最佳。但恐黃

柏苦寒傷脾胃漸致食少溏泄則金氣更傷此不可以不慮也不如減去爲佳

補天丸

紫河車一具黃柏酒炒龜版酥炙三兩南杜仲薑汁炒牛膝酒浸一兩陳皮一兩冬加乾薑五錢夏加炒五味子一兩酒糊爲丸

河車爲生人造命之原用之以補先天並非假後天以濟先天也加減之法頗隹但黃柏宜除去

人參固本丸

人參二兩天冬炒生地熟地四兩蜜丸

此方治火旺尅金者爲宜若脾胃虛弱宜參朮用培土生金之法

參朮丸

人參末　人乳粉　等分蜜丸

平補氣血一壯水之源一益氣之主後人兩儀膏從此化出

天王補心丹

生地四兩酒洗人參　玄參炒丹參炒茯苓一用茯神桔梗遠志炒五錢酸棗仁炒柏子仁炒研去油天冬炒麥冬炒當歸酒洗五味子炒一兩蜜丸彈子大硃砂爲衣一方有石菖蒲四錢無五味子一方有甘草

此方原爲心血不足怔忡健忘等症而設故收斂之藥不嫌太重有桔梗載藥上浮遠志開通心氣二味已足減去石菖蒲者爲是否則開洩太猛非虛人所宜也

孔聖枕中丹

敗龜版酥炙龍骨研末入雞腹煮一宿遠志　九節菖蒲各等分爲末每服酒調一錢體壯氣濁痰多者可服若體氣不甚強者當加歸芍丹參柏仁等方可久服

大補陰丸
黃柏鹽酒炒　知母鹽水炒　熟地酒蒸敗龜版酥炙　各四兩　猪脊髓和蜜丸
此治陰火熾盛以致厥逆者則可至內傷虛熱則斷不可用
滋腎丸　又名通關丸
黃柏酒炒　知母酒炒　肉桂一錢　各二兩　蜜丸
坎之爲象一陽居二陰之中故眞陽與安而不妄動腎水大虧不能制火飛龍上亢故喘急而小便秘此方用知柏以象二陰用肉桂以象一陽仍取坎卦之義以通生化之原意義極精非尋常導龍歸海法也
斑龍丸
鹿角膠　鹿角霜　兎絲子　柏子仁　各一兩　熟地黃　等分爲末酒化膠爲丸一方加補骨脂一方加鹿茸肉蓯蓉陽起石附子黃芪

當歸棗仁辰砂
鹿角兎絲澗中之陽也以補腎不偏不倚若加丸烈之品則劫陰耗氣全失立方之旨矣
龜鹿二仙膏
鹿角拾一兩　龜版五兩　枸杞二兩　人參一兩　先將鹿角龜版鋸截刮淨水浸桑火熬鍊成膠再將人參枸杞熬膏和入每晨酒服三錢
峻補氣血不寒不燥又能益髓固精誠補方中之最妙者也
補火丸
石硫黃一兩　猪大腸二尺　將硫黃爲末實猪腸中爛煮三時取出去皮蒸餅爲丸如梧子大每服十九
硫黃一味道家尊之爲金液蓋以硫黃爲火之精其性純陽丹經云陰氣一分不盡不仙

故學仙者欲絶陰以歸純陽必煉絶陰丹服之以破除陰氣此道家燒煉之方非尋常可用之藥嘗見士大夫功成名就妄想長生燒煉硫黃辰砂等物按時服食乃服之日久無不腹脹面青腸胃崩裂而死可不戒哉若寒疫陰厥猝急之時胃崩裂而死可不戒哉若寒疫陰厥猝急之時當病投之功效大而且速又非尋常温通之藥所能及學者宜善用之

唐鄭相國方

破故紙拾兩酒二拾兩去蒸爲末胡桃肉二拾兩去皮爛研蜜調如飴每晨酒服一大匙不能飲者熟水調忌芸薹羊肉　本方加杜仲一觔生薑炒蒜四兩名青娥丸　本方加杜仲胡盧巴小茴香葫蘆破故紙拾兩酒二拾兩去蒸爲末胡桃肉二拾兩去皮爛研蜜調如飴每晨酒服一大匙不能飲者熟水調忌芸薹羊肉　本方加杜仲一觔生薑炒蒜四兩名青娥丸　本方加杜仲胡盧巴小茴香葫蘆

名喝起丸

喘與咳由於痰隨氣升腰脚痛由於氣不納腎方中二味温腎納氣則喘咳自平腰脚自強矣青娥喝起二方亦俱有意義

二至丸

冬青子即女貞實冬至日採不拘多少陳乾酒拌蒸過一宿粗皮擦去晒乾爲末旱蓮草夏至日採不拘多少搗臨臥酒服一方加桑椹乾爲丸或熬膏和丸

二至丸取意甚佳尚嫌力量淺薄加入天冬地黃人參以三才合二至始爲得力

扶桑丸

嫩桑葉去蒂洗淨晒乾一觔爲末巨勝子即黑脂麻淘淨四兩將脂蘇擂碎熬汁和蜜煉至滴水成珠入桑葉末爲丸

此即世所謂桑麻丸也去風明目烏髭黑髮頗爲有功至稱駐顏益壽則譽之太過殊爲失實矣

參苓白朮散

人參　白朮土炒　茯苓　甘草炒　山藥　陳皮炒　扁豆炒　薏仁炒　砂仁　桔梗　蓮肉炒去心

爲末每三錢棗湯或米飲調服
此健脾和胃之正藥也惟扁豆性劣宜減去
嘗見瘧愈之後服扁豆者無不復發此可知
也
妙香散
山藥薑汁炒　人參　黃芪　遠志炒　茯神
茯苓一兩　桔梗二錢　甘草二錢　木香二錢五分
麝香一錢　辰砂二錢　另研　爲末每服二錢酒下

此方頗有作意但參芪之固終不敵麝香之開誠恐耗散心氣神不能藏君火不安相火亦動以之開解驚悸鬱結則有餘以治夢遺失精則不足不如減去加沉香琥珀等爲佳
玉屏風散
黃芪炙　防風一兩　白朮炒二兩　爲末每服三錢
此固表去風藥用以實表則可若云加減即可代桂枝麻黃等湯則表實而邪無出路斷不可此等議論誤人不淺必不可從

四君子湯
人參　白朮土炒　茯苓二錢　甘草一錢　薑三片　棗二枚煎　本方加陳皮名異功散再加半夏名橘半六君子湯　加香附砂仁名香砂六君子湯　本方加木香藿香乾葛名七味白朮散　本方除人參加白芍名三白湯　本方合四物名八珍湯又加黃芪肉桂名十全大補湯
四君子湯中正和平爲補方中之金科玉律至加減有法者如異功散之理氣橘半六君之去痰香砂六君之溫胃加竹瀝薑汁之治半身不遂七味白朮散之去熱治瀉均極妥善三白湯治內傷尙可若謂治外感亦爲奇方則吾不信也至於合四物爲八珍增黃芪肉桂爲十全大補用各有當皆不可磨滅之

良方也

升陽益胃湯

黃芪二兩　人參　甘草炙　半夏一兩潘者用　白芍炒　羌活　獨活　防風五錢　陳皮四錢　白朮土炒　茯苓　澤瀉　柴胡三錢　黃連二錢　薑棗煎

東垣論飢飽勞役陽陷入陰而黃氣弱發熱者當升舉陽氣以甘溫治之此眞卓識確論為治陽虛發熱者開一大法門惟方中輒用升柴恐上實下虛者更加喘滿在東垣必能明辨當病而投後人若執定此法一概施之則誤人不淺矣

補脾胃瀉陰火升陽湯

黃芪　蒼朮泔浸炒　甘草炙　羌活一兩　升麻八錢　柴胡一兩五錢　黃連酒炒五錢　黃芩炒　人參七錢　石膏少許

每服三錢或五錢

東垣十書予最為服膺以其重脾胃為正法

眼藏也如此方中升柴黃連黃芩石膏等皆非可輕投後人但師其意不泥其方可耳

補肺湯

人參　黃芪蜜炙五味子炒　紫菀一錢　桑白皮蜜炙　熟地一錢入蜜少許和服

此方但為肺氣久虛以致咳嗽而設其他咳嗽之症不一而足不可混施方中有補有瀉用意亦隹但桑皮紫菀之薄弱豈能敵參芪熟地之滯膩獨不慮助痰為病乎至謂熟地壯水免得子盜母氣則可謂為化痰之妙品則佐使正末合也

百合固金湯

生地黃一錢　熟地黃三錢　麥冬一錢五分　百合　當歸　貝母　芍藥炒　生甘草一錢　玄參　桔梗八分

此方金水相生又兼養血治肺傷咽痛失血者最宜孝士材謂清金之後急宜顧母識解

尤卓予謂咽痛一定卽當培土生金也

紫菀湯

紫菀洗淨炒　阿膠蛤粉炒　知母　貝母三錢　桔梗
人參　茯苓　甘草五分　五味子十三粒

此方治氣極久咳失血極隹若肺癰便當去五味子以肺氣壅塞成癰不宜收斂也

秦艽扶羸湯

柴胡二錢　秦艽　人參　當歸　鱉甲炙

地骨皮錢半　紫菀　半夏　甘草炙二錢　薑棗煎

所載見症乃陰陽兩虛碎金不鳴之候並無表症且體虛自汗元氣更傷柴胡秦艽半夏生薑辛散之品重傷其陰吾恐危亡隨之矣

黃芪鱉甲散

黃芪蜜炙　鱉甲炙　天冬五錢　秦艽　柴胡
地骨皮　桑白皮　紫菀　半夏　茯苓三錢
芍藥　生地黃　知母　甘草炙三錢　人參

桔梗　肉桂一錢五分　薑煎

此方過於繁雜不足法也

秦艽鱉甲散

鱉甲炙一兩　秦艽　知母　當歸
地骨皮一兩　烏梅一個　青蒿五葉

風爲天之氣中人最速鬱而爲熱固當清散但深入骨裡者千萬中無一二蓋骨蒸乃陰虛非外風在骨也

益氣聰明湯

黃芪　人參五錢　葛根　蔓荊子三錢　白芍
黃柏二錢如有熱煩亂春月漸加炙升麻錢半夏倍之如脾虛去之熱淋少用升麻炙甘草一錢臨卧服

此方重脾胃而兼治肝腎立義最精但升麻似乎過重酌減其半亦可以升清開竅矣

羊肉湯

當歸　白芍　牡蠣煅一兩　龍骨煅一兩　生薑五錢　生薑二

附子炮二枚　桂枝七錢
　　雨　　五分　每服一兩羊肉四兩加
葱白煮服
此方飲陰生陽補虛固脫色色周到洵爲佳
製

麻黃湯

麻黃去節三兩　桂枝二兩　杏仁七十枚
　　去皮尖　甘草一兩
先煮麻黃數沸去沫內諸藥煎熱服覆取微
汗巾病卽止不必盡劑

仲景立方之祖醫中之聖也所著傷寒金匱
諸書言言典要爲後人度盡金針卽如傷寒
太陽一症頭緒最繁有風傷衛者有寒傷營
者有風寒雨傷營衛者不得其解無所措手
今觀其用桂枝湯治風傷衛用麻黃湯治寒
傷營大靑龍湯治風寒雨傷營衛劈分三項
開三大法門後人察脈辨症謹守成規庶不
至於僨事但仲景本爲隨受隨發冬月之正

傷寒而設非可以此法混施於春溫溫疫等
症後人不明此理一概混投誤人實多於是
辨論者紛紛而起遂將溫症寒症糾纏不已
愈辨愈明者固多愈辨愈晦者亦不少予則
以爲春溫歸春溫溫疫歸溫疫傷寒歸傷寒
各分門類劃然了然不必互相引証反使人
多所惶惑也

桂枝湯

桂枝　芍藥　生薑三兩　甘草三兩
　　炙　大棗十二
　　枚
此治風傷衛解表之輕劑也加減之法最多
細看註中之方凡仲景所加減者無不絲絲
入扣至後人之法亦儘有可用但須細心參
酌因症而施始爲得之

大靑龍湯

麻黃六兩　桂枝　甘草二兩　杏仁四十枚
石膏一塊如　炙　去皮尖
雞子大生薑三兩大棗十二枚

此爲風寒兩傷營衛而設。卽麻黃湯加石膏姜棗也。麻黃湯中本用桂枝可見仲景治寒未嘗不兼治風則風寒兩傷營衛者用麻黃湯亦足矣而必加石膏等三味者蓋因風寒兩傷營衛非但傷風傷寒之可比鬱熱必倍加故用石膏體重味輕以瀉鬱熱姜棗甘溫以反佐之仲景之意全重在煩躁二字若無此候雖不可輕投

小青龍湯

麻黃去節　桂枝　芍藥酒炒　細辛　甘草炙
乾薑三兩半夏　五味子　半升

此方全爲外有風寒內蓄水而設所以不用石膏者因水停胃中不得復用石膏以益胃之寒故一變而爲辛散外去風而內行水亦名曰青龍者亦取發汗天氣下爲雨之義也

葛根湯

葛根　四兩　麻黃　生薑三兩　桂枝　芍藥
甘草二兩　大棗十二枚

太陽症無汗宜用麻黃湯矣乃變其法於桂枝湯中加葛根麻黃二味此中奧義全在惡風二字但惡風而不惡寒則不在寒傷營之例乃太陽表症未解將入陽明之象故用麻黃以發汗桂枝以去風參用葛根以阻其入陽明之路若拋荒本經之病而預用引經之藥便爲閉門揖盜仲景斷不爲也

麻黃附子細辛湯

麻黃　細辛　二兩　附子　一枚炮

此症機竅全在反發熱脈沉五字蓋太陽之邪初傳少陰故脈症如此方中用細辛附子溫腎以捍衛本經格外來之邪不使深入用麻黃以散太陽之邪使之仍從原路而出只此三味而治法之妙如此非仲景其孰能之

升麻葛根湯

升麻三錢　葛根一兩　芍藥二錢　甘草一錢　加姜煎

此方用升麻葛根以升散陽明又恐升提太過致人喘滿故用芍藥甘草酸收甘緩以佐之寃竟互相牽制不如獨用葛根爲君加牛旁連翹桔梗薄荷等斑疹時疫則加馬勃青黛等未爲不可也

柴葛解肌湯

柴胡　葛根　羌活　白芷　黃芩　芍藥　桔梗　甘草　加薑棗石膏　錢　煎服

此証無脇痛耳聾之象與少陽無涉乃首用柴胡開門揖盜一忌也大青龍湯用石膏全爲煩躁而設輒用石膏以傷胃氣二忌也此方斷不可用

柴胡升麻湯

柴胡　前胡　黃芩　六錢　升麻　五錢　桑皮　四錢　葛根　四錢　荆芥　七錢　赤芍　石膏　一兩　加姜煎

二十粒煎

升麻之爲物用以治天行癘疫化毒消斑則可尊常陽明症中不可輕用且用石膏爲君意在清肺胃耳獨不慮寒胃太過其變更不可問乎

九味羌活湯

羌活　防風　蒼术　一錢五分　細辛　五分　川芎　白芷　生地　黃芩　甘草　一錢　加生姜葱白煎

此方用以代麻桂等湯實爲穩妥但地黃滋膩太過不如仍用桂枝湯中之芍藥斂陰而不滋膩也至其辛散燥烈陰虛氣弱者忌用則固自言之矣

十神湯

麻黃　葛根　升麻　川芎　白芷　紫蘇　甘草　陳皮　香附　赤芍　加姜葱煎

時邪瘟疫。天行之厲氣也。故此方於升散中多用芳香辟穢之品。辛烈善走。雖有芍藥甘草不能制之。不可作陽經外感之通劑用也。

神术散

蒼术 制 防風 二兩 甘草一兩 加姜葱煎 水 方

除蒼术加白术二兩不用葱名白术湯

神术白术二方乃治寒傷脾胃濕滛於裡之妙法。夾有外感受寒無汗者加葱白。受風有汗者去葱白。動有法度。正不必謂其可代麻黃桂枝二法也。

大無神术散

蒼术 泔浸厚樸 姜汁炒 各一錢 陳皮二錢 甘草 炙 藿香 石菖蒲 各一錢五分

大無神术散。乃正本清源之要義。惟石菖蒲一錢五分。開洩太過。宜酌減之。

葱豉湯

葱白一莖 豉一升

解表通陽最爲妥善。勿以其輕淡而忽之。

人參敗毒散

人參 羌活 獨活 柴胡 前胡 川芎 枳殼 桔梗 茯苓 兩 甘草 五錢

每服一兩加薑三片薄荷少許煎

此不過尋常固本治標法耳。用之於虛人感冒則可。若表裡俱實。則不增劇爲幸。尚望病之輕減乎。傷寒用人參。仲景本有成法。並非以人參助元氣爲驅邪之主也。嵐障則濕毒爲多。亦非感冒可比。至癘疫之氣中人更烈。陽毒則有發熱煩躁斑疹等症。陰毒則有面青腹痛下利等症。若用此方治陽毒既無清火解邪之功。以之治陰毒又無回陽急救之力。均未見其可。予於喻西江先生最爲服膺。豈敢輕議。但謂表藥中有用人參之法則可。

若謂表藥中用人參更爲得力則不敢阿私所好也

川芎茶調散

薄荷八錢　川芎　荆芥四錢　羌活　白芷　甘草各一錢　細辛一錢　每三錢食後茶調服

炙一錢　防風　五分

輕揚解表三陽並治兼用細辛並能散寒惟虛人宜去此一味蓋細辛善走誠恐重門洞開反引三陽之邪內犯少陰此不可以不慮也

再造散

人參　黄芪　桂枝　甘草　附子　炮細辛　羌活　防風　川芎　熯薑　棗

此方但可施於常時之不能作汗者若在冬月而脈見浮緊便是太陽之寒傷營此方斷不可用註中又引東垣丹溪治虛人感冒多用補中益氣加表藥予不以爲然蓋親見喜用升柴者殺人無數故不得不加意慎重非偏執已見不喜升柴實不敢泥紙上之成方悞目前之人命也

大羌活湯

羌活　獨活　防風　細辛　防已　黄芩　黄連　蒼术　白术　甘草炙三錢　生地黄　知母　川芎一兩　每服五錢熱飲

雨感傷寒一日太陽少陰二日陽明太陰三日少陽厥陰古方俱有加減治法但予意更有進者若至二日而前症未解則是四經合病三日而前症未解則是六經俱病矣四經合病者既未有成方而六經俱病者更難於措手仲景以後豈復有補天浴日手段大羌活湯漫無分別亦不過盡人事而已

桂枝羌活湯

桂枝　羌活　防風　甘草等分　每服五錢

瘧發在虛者前宜從時瘧治且內經只分邪
在肌表。在衛在營初無六經之說更不可倣
傷寒之例。

瓜蒂散

甜瓜蒂炒黃赤小豆共爲末熱水或酸鹽水調
下

高者因而越之。經有明訓卽吐法也。後人視
爲畏途。久置不講。殊不知痰涎在胸膈之間。
消之匪易。因其火氣上衝之勢。加以吐法使
傾筐倒篋而出之。則用力少而成功多。瓜蒂
散之類是也。且吐必有汗。故併可治風治黃。
惟註中食填太陰欲吐不出二語。須與申明
蓋飲食必先入胃。食填太陰者。非旣出胃而
入脾也。乃胃氣窒塞使脾氣不通耳。又必新
入之食尙爲完穀。故可用吐。若經宿之後將
爲燥糞滯於胃中。便宜攻下。豈可尙用吐法
乎

參芦散

人參芦研爲末水調下一二錢或加竹瀝和
服

化痰清火。頗爲平穩。但用以涌吐。恐力尙不
逮也

梔子豉湯

梔子十四枚淡豉四合服令微吐

註中治傷寒汗吐下後。虛煩不眠。懊憹身熱
等症。汗吐下後一語。宜善體會。蓋言或汗後。
肌表雖解。而裡熱未除。或吐後。痰氣雖平。而
陽邪未去。或下後。裡滯雖退。而表邪未清。乃
指一節而言。並非謂三法並用之後也。今人
死煞句下。往往誤認三法並施。雖有壯夫。豈
能堪此。且三法並用之後。豈尙有餘邪未清
者乎。不參活句。謬以千里矣。仲景用梔子令

上焦之熱邪。委宛而下用豆豉以開解肌理。眞超凡入聖之方。其各種加減之法。亦俱有精義。不得草草讀過。

稀涎散

皂角四挺去皮弦炙白礬一兩共爲末溫水調下五分或加藜芦

治上焦用湧吐之法。此義本之內經。而方則出於仲景古人體氣壯實。不妨用之。後世機

心日明嗜慾日甚。元氣大傷。稟受甚薄。一經湧吐汗而且喘。百變叢生。後人不敢輕用。蓋亦愼重之道。卽如稀涎散。性最猛烈。用以救猝急痰症。方足以斬關奪門。然尙有醒後緩投藥餌。痰不可盡攻之戒。可知虛人及尋常之症。不可輕用吐法也。

乾霍亂吐方

燒鹽　熟童便　三飲而三吐之

炒症至元而始著。元以前但有霍亂之名。無所爲炒症也。欲吐不得。欲瀉不得。陰陽顚倒。氣閉血凝。症極危險。故不可進藥餌穀食。燒鹽童便以吐之。是也。然必須外用針刺人中少商委中舌尖等處。再用手揉其穴。令血能多出。則毛竅方開。而氣始得漸達。或用香附末廣艾炒溫熨臍之四旁。亦佳。

大承氣湯

大黃四兩先煎芒硝三枚實五厚樸半斤炙先煎樸實將熟內大黃煮二三沸傾硝碗內和芒硝服攻下之法。原因實症俱備。危在旦夕。失此不下。不可復救。故用斬關奪門之法。定難於俄頃之間。仲景所以有急下存陰之訓也。乃後人不明此義。有謂於攻下藥中兼行生津潤導之法。則存陰之力更強。殊不知一用生津滋潤之藥。則互相牽制。而蕩滌之力輕矣。此

譬如寇盜當前。恣其焚掠。所過爲墟。一旦聚而殲之。然後人得安居。而元氣可以漸復。是去實可以保陰。乃相因之理。方得存字眞解。並非謂攻實卽是補陰。併可於攻下中寓養陰法也。仲景製大承氣湯。用枳實開上焦用厚樸通中焦。芒硝理下焦。而以大黃之善走者統率之。以蕩滌三焦之堅實。正聚寇盡殲之大法。而又恐藥力太猛。非可輕投。故又有小承氣之訓。夫以仲景之欲用大承氣。先與小承氣之試。實恐後人審症未確。藉神靈豈尙待於先試。口成法。孟浪輕投。不得不諄諄誥誡。此實愼重民命之婆心也。至於三陰多可下之症。三陽惟正陽明可下。少陽必不可下。而陽明中下焦之濁氣。必隨感而上反致喘逆者有之。矢去枳樸加甘草。使之專入脾胃而又緩芒消酌始爲得之

小承氣湯

大黃四兩　厚樸二兩　枳實三枚　麩炒

此治邪在中上兩焦之正法也。註語潮熱喘滿等症。而無腹脹堅滿。去芒硝。不使伐無病之地。以劫陰。必有精義規矩方圓之至也

調胃承氣湯

大黃酒浸　芒硝一兩　甘草炙五錢　少少溫服

此治邪在中下焦之正法也。註中但有譫腹滿中焦燥實數語。最宜着眼可見病在脾胃全與上焦無涉。若雜入枳樸以犯上焦。則下焦之濁氣。必隨感而上反致喘逆者有之。矢去枳樸加甘草。使之專入脾胃而又緩芒硝始爲得之

大陷胸湯

大黃二兩芒硝一升甘遂一錢爲末先煮大黃去滓內芒硝煮一二沸內甘遂末溫服

傷寒下之早則反爲結胸盖緣邪尚未入陽明若先下之則邪未去而徒傷胃氣邪反得乘虛入胃而爲結胸或熱勝寒勝痰勝濕勝諸瀉心湯泰酌用之最爲妥善此症仲景不用大陷胸湯者因三焦俱實而又有水氣故不得不攻用此方觀註

中日晡潮熱至小腹鞕滿痛不可近只此一症與此方確對盖誤下之後胃氣雖虛而邪入胃中則正經所謂邪往從之虛處轉實故藥雖極峻不犯虛虛之戒至前後兩條有云或重汗而復下之不大便五六日舌上燥渴此則津液大傷近於陽結又云或無大熱但頭微汗出胍沉爲水結胸則近於陰結此二條似不堪此峻劑矣丹溪亦微有不滿之意後人自當以愼重爲宜

小陷胸湯

黃連一兩半夏半升括蔞一枚

小陷胸湯非但治小結胸並可通治夾滯時邪不重不輕最爲適用

大陷胸丸

大黃入兩芒硝　葶藶炒杏仁去皮尖各半升合研取如彈丸一枚別搗甘遂末一錢白蜜二合者

服

變湯爲丸加葶藶杏仁以洩肺氣是專爲上焦喘滿而設

十棗湯

芫花炒甘遂　大戟等分大棗十枚先煮棗去滓內前藥末或棗內爲丸

十棗湯乃逐水之峻劑非大實者不可輕試至河間之三花神佑丸除大棗而加大黃黑

丑巳是一味峻猛不復留脾胃之餘地更加輕粉則元氣搜括殆盡病雖盡去而人亦隨亡可知仲景以十棗命名全賴大棗之甘緩以救脾胃方成節制之師也

三物備急丸

巴豆霜　大黃　乾薑　等分蜜丸

此不過猝急備用力耳姑存之以備一法

礬砂丸

礬砂　巴豆油去三稜　乾薑　白芷五錢　木香　青皮　胡椒二錢　大黃　乾漆炒一兩　梹榔五分

為豆蔻一個為末醋二升煮巴豆五七沸再下三稜大黃未同煎五七沸入礬攸熬成膏和諸藥杵丸菉豆大每五九薑湯下

枳實導滯丸

大黃一兩　枳實炒麩　黃芩炒酒　黃連炒酒　白朮土炒　茯苓二錢　澤瀉三錢蒸餅為丸

治濕熱蘊結腹痛泄瀉煩為得力但黃芩黃連炒神麯炒五錢

通陽理氣為第一義若但用攻劫峻劑吾見其立敗也

木香梹榔丸

木香　梹榔　青皮醋炒　陳皮去白枳殼炒　黃柏酒炒　黃連菜菔湯炒三稜醋煮莪朮醋煮大黃酒浸一兩　香附　黑牽牛二兩芒硝水丸一方加當歸洗酒

此較礬砂丸已從輕減但峻烈之品尚多試問病退之後元氣尚存幾許即有加當歸一味者一潤而十攻豈尚能有濟乎此等方法

連尙在可減之律恐哲寒太過反傷中上二焦也

倒倉法

黃牡牛肉肥嫩者二斤切碎洗淨用長流水桑柴火煮糜爛濾去滓取淨汁再入鍋中文武三十勑納穀道中用手抱住欲大便時去之

陰液虧損魄門燥結故以此潤之

猪胆導法

猪胆一枚取汁入醋少許用竹筒長三四寸以下半納穀導中將胆汁灌入肛中頃當大便

蜂蜜用銅器微火熬頻攪勿令焦候凝如飴捻作挺子頭銳如指糝皂角末少許乘熱

從下出正盛邪消理固然也

蜜煎導法

大柴胡湯

柴胡八兩半夏半升黃芩三兩生姜五兩大棗十二枚枳實四枚大黃二兩酒浸

大柴胡爲發表攻裡之劑可見表症未解雖裡症甚急不宜專於攻下道表症於不問也故在上者迎之仍從上出在下者迫之仍

然究竟攻裡之力倍於解表從此可悟立末之法當相其緩急輕重而投之則不拘成法中自然處處合法矣

柴胡加芒硝湯

小柴胡湯加芒硝六兩

傷寒再傳少陽之症未解胃中又有實熱故用芒硝以蕩其餘波較大柴胡爲輕減矣

桂枝加大黃湯

桂枝湯加大黃一兩芍藥三兩

太陽悞下不專屬胃而入於脾故仍用枝枝以解太陽之邪加大黃以去太陰之實

冰解散

麻黃四兩　桂心　甘草炙　白芍二兩　大黃　黃芩三兩

瘟疫有頭中面無傳經初起便有數經合病者故發表攻裡不嫌太早也

防風通聖散

防風　荊芥　連翹　麻黃　薄荷　川芎當歸　白朮　白芍炒　山梔炒黑　大黃酒浸芒硝錢五　黃芩　石膏　桔梗一兩　甘草二兩滑石三兩　加生姜葱白煎

雖云通治一切內外諸邪然必如註中表裡三焦俱實者方可用否則硝黃之峻烈石膏滑石之沉寒尋常之症豈能堪此雙解散已除去大黃芒硝而石膏滑石二味予意尙以爲過當不如一併除去加木通青皮二味爲妥也至祛風至寶丹則爲治中風之善劑矣

葛根黃連芩湯

葛根觔半　甘草炙　黃芩二兩　黃連二兩

太陽悞下熱入陽明故於解表中清陽明之熱以止利

三黃石膏湯

石膏一兩五錢　黃芩　黃連　黃柏七錢　梔子二十個
麻黃　淡豉二合　每服一兩姜三片棗二枚
細茶一撮煎服
三焦鬱熱毒火熾盛非三黃石膏不足以祛
之尤妙在麻黃豆豉開解肌表使鬱火通行
此正如清風滌煩非發風助火也

五積散
白芷　陳皮　厚樸六分　當歸　川芎　芍藥
茯苓　桔梗　枳殼七分半　夏　麻黃
四分　乾姜　肉桂重表者用桂枝甘草三分　加姜棗煎
仲景治傷寒發表則麻黃桂枝温中則乾姜
附子簡當的確開後學無限法門此方不過
發表温中耳而藥味繁多通治五積豈有一
人之身五積咸備而尚能存活者乎若其人
只有一積或多則二積豈可以五積並治者
治之乎後人於本方再合人參敗毒散名五

積交加散則更不解所謂矣
麻黃白朮湯
青皮　陳皮　黃連酒炒　黃柏酒炒甘草炙
升麻二分　柴胡　桂枝　人參　黃芪　厚樸
蒼朮泡浸白朮炒土指苓三分　茯苓　澤瀉　吳
白寇　炒麴五分　麻黃不去節四　杏仁四粒　分
二服
藥須對症而發見一症治一症合病則合治

之併病則併治之如是而已未聞可以六經
通治也方中藥有二十二味補散温凉一齊
用到即如升柴麻桂等豈不與喘促無力相
妨乎黃連黃柏等豈不與膀有動氣小腹急
痛相庚乎不謂東垣老人亦有此等方何況

參蘇飲
人參　紫蘇　乾葛　前胡　半夏　姜汁炒

茯苓七錢　陳皮去白五分　甘草　枳殼麩炒　桔梗
木香二錢　每五錢加姜棗煎
補散兼行。風痰並解。當病即止不爲過量製
方最佳。

香蘇飲

香附炒　紫蘇二錢　陳皮去白一錢　甘草七分　加姜葱煎
外疎風而內行氣。正以輕鬆流利爲佳不必
動轉峻劑也。

茵陳九

茵陳　梔子　黃芩　芒硝二兩　大黃　常山
杏仁炒三兩去皮炒　巴豆一兩心　豆豉五合　蜜丸
天行厲氣。取效每有不可以常理論者。至痰
瘧及赤白痢。自有正法治之。何必冒險以冀
倖。汪訒菴反以爲佳方。吾不解也。

小柴胡湯

柴胡八兩　半夏半升　人參　甘草　黃芩
生姜三兩　大棗十二枚

少陽爲半表半裡之經。邪在表者可汗。邪在
裡者不可汗也。邪在裡者可吐。邪在裡者不
可吐也。邪在裡者可下。邪在表者不可下也。
須知此之所謂半表半裡者乃在陰陽交界
之所。陽經將盡。駸駸乎欲入太陰。營衛不和。
陰陽交戰。並非謂表裡受邪。若大柴胡可表
可下例也。仲景嘉惠後世。獨開和解一門。俾
後人有所持循。不犯禁忌。蓋和者和其裡也
解者解其表也。和其裡則邪不得內犯陰經。
解其表則邪仍從陽出。故不必用汗吐下之
法。而陰陽不爭。表裡並解矣。小柴胡湯乃變
大柴胡之法而另出心裁。用人參以固本。又

用甘草姜棗以助脾胃。又用黃芩以清裡熱。使內地奠安。無復返顧之慮。我既深溝高壘。有不戰而屈人之勢。而又用柴胡以專散少陽之邪。用半夏消痰行氣以化逆。譬之自守已固。而又時出遊騎以蹂踏之。使之進無所得。退無所據。有不氷消瓦解者乎。此則仲景立方之微意。非通於神明者不能也。註中凡仲景所加減之方。皆精當不磨。有專治而無通治。此其所以可貴也。學者須細細參之。則於和解一門。思過半矣。

黃連湯

黃連 炒　乾姜 炒　桂枝　甘草三兩　人參二兩　半夏半升大棗十二枚　牛

變姜連瀉心之法而為升降陰陽之法寒熱並用。補散兼行。和法之最佳者。

黃芩湯

黃芩三兩　芍藥　甘草二兩　大棗十二枚

古未有治下利之方自仲景立此法以調和腸胃。為主後人踵事而增。藥味太多失之龐雜者不免矣。

芍藥甘草湯

白芍藥　甘草 炙各四兩

不通則痛。腹中不和。氣逆而有濁陰。此但用甘酸化陰之法而逆氣自消。亦高明柔克之義也。

括蔞薤白白酒湯

括蔞一枚　薤白三兩　白酒四勺

薤白通陽。括蔞散團結之氣。再加白酒以行氣。血自能消陰翳而開痺結。故不必用辛散耗血之品。以傷至高之元氣也。

溫胆散

陳皮去白　半夏 姜製　茯苓　甘草　枳實 麩炒　竹茹

加姜煎

胆爲清靜之府又氣血皆少之經痰火擾之則胆熱而諸病叢生矣温胆者非因胆寒而與爲温之也正欲其温而不熱守其清靜之故常方中用二陳竹茹即是此意

逍遙散

柴胡　當歸　酒拌　白芍　酒炒　白朮　土炒　茯苓　一錢
甘草　炙五分　加煨姜薄荷煎

逍遙散於調營扶土之中用條達肝木宣通胆氣之法最爲解鬱之善劑五臟惟肝爲最剛而又於令爲春於行爲木具發生長養之機一有拂鬱則其性怒張不可復制且火旺則尅土木旺則尅土波及他臟理固宜然此於調養中寓疎通條達之法使之得遂其性而諸病自安加丹參香附二味以調經更妙蓋婦人多鬱故也

六和湯

砂仁　藿香　厚樸　杏仁　半夏　扁豆
木瓜　人參　白朮　赤苓　甘草　姜棗
扁豆一味古方多用之以其有清暑利濕健脾之功也予以爲扁荳之性最劣減去扁荳人參二味更妙

藿香正氣散

藿香　紫蘇　白芷　大腹皮　茯苓　三兩

白朮　土炒　陳皮　半夏　麯　厚樸　姜製　桔梗　二兩
甘草　一兩　每服伍錢
辟穢祛邪兼治瘴氣由其芳烈之性足以勝之而又兼用化痰利濕之品以顧脾胃中州一和則客邪自解矣

三解湯

柴胡　麻黃　去節　澤瀉　各一錢
一日一作之瘧邪在衛間日一作之瘧邪在

營。二陰大瘧則邪在腑。皆由先受熱後受寒所致。故陰陽交爭內經之訓昭然如揭日月。後人紛紛聚訟各出己見。反致拋荒經義。即如此方通治瘧究竟有損無益。

清脾飲

青皮　厚樸炒　柴胡　黃芩炒　半夏姜製　茯苓　白朮炒　甘草炙　草菓　加姜煎

痎瘧一症。內經論之甚詳。從無一語及臟。可見瘧邪。斷無入臟之理。巢氏病源。妄爲分配。識者譏之。清脾飲。變小柴胡之製而用黃芩。蓋欲其清營分之熱邪。使之仍從衛出耳。並非病在脾經。清脾以治瘧也。

黃連阿膠丸

黃連一兩　茯苓二兩　阿膠炒一兩　爲末水熬阿膠爲丸

黃連阿膠之法開於仲景但阿膠一味所重者在井水而不在驢皮。因濟水伏流。惟阿井下通於濟。故有平肝滋腎之功。後來射利之徒。更將牛羊猪犬雜皮。一概入膠。敗人脾胃。不如不用爲佳。

姜茶飲

生姜　陳細茶　每未約三錢濃煎服

此亦調和陰陽之法。病輕淺者可用。

蘆根湯

蘆根一勫　竹茹一勫　生姜二兩　粳米一合

此治熱鬱胃中。作嘔作吐。則可若云治寒冷傷胃。則予不敢深信。

陰陽水

沸湯　井水　各半鍾和服

此法甚佳。極平淡。極神奇。屢用屢效之方也。

但稱解藥毒而已非治病之方也

補中益氣湯

黃芪蜜炙一錢　人參　甘草炙一錢　白朮土炒五分　陳皮酒當歸五分　升麻三分　柴胡三分　姜三片棗二枚煎

氣也者。人之所賴以生者也。大氣積於胸中。歸於丹田呼出則由心達肺。吸入則由肝納腎。無一處不到無一息或停。故宗氣爲一身之主。外護肌表則爲衛氣。內統血脈則爲營氣。散布於各臟腑則爲各臟腑之氣。人能順而養之則氣平而血亦和。尙何疾病之有。無如七情擾於中。六淫侵於外。斯百變叢生而鬱氣。逆氣動氣。滯氣。痞氣。燥氣。寒氣。痰氣。濕氣。水氣。種種氣病。指不勝屈矣。醫者當細心剖晰。對症施治。方免貽誤。汪訒庵於理氣門中首選補中益氣湯。誠以東垣辨內傷外感

。切詳明使人於陽虛發熱之症不誤作傷寒。妄汗妄下。保全無限民命。實爲功於千古。即如此方於主治註中治一切清陽下陷中氣不足之症。臨後二語明白了當。本無謬訛。若使東垣遇陰虛發熱及上實下虛之症亦斷不用此方。乃不善學者每有先入之見膠執於中。一遇發熱不論陽虛陰虛。不論上實下實。遂謂甘溫能除大熱。動輒參芪升柴爲害非小。醫貫曰。讀傷寒書而不讀東垣書。則內傷不明而殺人多矣。讀東垣書而不讀丹溪書。則陰虛不明而殺人多矣。此誠持平之論也。夫學醫而知宗仰東垣。不可謂非有志之士。然尙不可預有成心。又況峻烈之品。險怪之法。豈可輕試乎哉。

烏藥順氣散

烏藥　橘紅二錢　麻黃去節川芎　白芷　桔梗

枳殼炒一錢　殭蠶去絲炒　炮姜　甘草炙五分
加姜棗煎

中風之症皆由氣血虛外風乘隙而入便當着意調營使風從衛出又或痰火內蘊外風乘之便當清營化痰息風理氣此方多用升散於養血化痰二義闕然與註中治中風等症未爲合法也

蘇子降氣湯

蘇子　半夏　前胡　厚樸姜炒　橘紅
當歸一錢　甘草炙　肉桂五分　加姜煎

此等方施之於濕痰壅塞中脘不舒者尚嫌其太燥乃註中主治虛陽上攻喘嗽嘔血等症是益火加薪吾見其立敗也

木香順氣湯

木香　草蔻仁　益智　蒼术二分　厚樸四分
青皮　陳皮　半夏　吳茱萸湯泡乾姜二分

佽苓　澤瀉分一升　麻　柴胡一當歸五分
東垣此方升清降濁使中脘開通極有意義但辛燥太過宜酌用之。

四磨湯

檳榔　沉香　烏藥　人參　等分濃磨煎三四沸溫服

四磨湯原爲氣逆喘急而設若用人參不如勿服之爲佳矣除人參加木香枳實者爲宜。

且於氣厥者尤合。

越鞠丸

香附炒醋　蒼术泔浸炒　撫芎
等分麯糊爲丸

凡鬱病必先氣病氣得流通鬱於何有此方註云統治六鬱豈有一時而六鬱並集者乎。須知古人立方不過昭示大法氣鬱者香附爲君濕鬱者蒼术爲君血鬱者川芎爲君食

鬱者神麯爲君火鬱者梔子爲君相其病在何處酌量加減方能得古人之意而不泥古人之方讀一切方書皆當作如是觀

七氣湯

半夏 姜汁炒 厚樸 姜汁炒 茯苓 四錢 紫蘇 二錢 五錢 三錢

加姜棗煎

七情受病兼有痰涎一時舉發則有之理氣化痰開解鬱結七氣湯所以爲佳也

四七湯

人參 官桂 半夏 一錢 甘草 五分 加姜煎

越鞠丸治氣實之鬱四七湯治氣虛之鬱虛則寒生不可謂氣病純無寒症也備此一法庶無偏勝之患

代赭旋覆湯

旋覆花 三兩 代赭石 一兩 人參 二十草 三兩 半夏 半升 生姜 五兩 大棗 十二枚

汗吐下後中虛氣逆不可再攻故用重以鎮之甘以緩之辛以散之之法

丁香柿蒂湯

丁香 柿蒂 二錢 人參 一錢 生姜 五片

呃逆之症非一端若腎氣不收厥逆而上頭汗微喘當用大劑參附以收攝眞陽此治連珠發呃之要法非丁香柿蒂等所能勝任也若因寒犯胃氣鬱而呃者則此方爲宜丹溪乃以相火上衝之呃爲辭豈呃逆之症但有火呃竟無寒呃乎是又過當之談矣

橘皮竹茹湯

橘皮 竹茹 人參 甘草 赤苓 枇杷葉 加姜棗煎 半夏 麥冬

此則治痰火之呃而不可以治胃寒之呃若誤用之則輕者增劇

定喘湯

白芍藥二錢炒黃　麻黃半錢去皮　夏製姜製夏冬花三錢
桑皮蜜炙蘇子二錢杏仁去皮尖一錢　黃芩一錢五分　甘草錢
加姜煎

治痰先理氣氣不爲疏泄則膠固不通此定喘用麻黃之意也

四物湯

當歸酒洗生地三錢芍藥二錢芎藭一錢五分

血之取義一爲榮榮者發榮也非血則無以

妄行血脫以至跌撲之傷血瘡瘍之潰血病既種種不同治病之法或補之或養之或涼之或溫之或散之或破之立方須一一對症理血門以四物湯爲主方藥雖四味而三陰並治當歸甘溫養脾而使血有統白芍酸寒斂肝而使血能藏生地甘寒滋腎而益血川芎辛溫通氣而行血調補血分之法於斯著矣乃或有譽之太過毀之失實者不可以不

辨也譽之過者謂能治一切亡血及婦人經病夫亡血之症各有所由起此方專於補血滋腎而已無他手眼不溯其源而逐其流豈能有濟至婦人經病多有氣鬱伏寒痰塞等正未可以陰寒之品一概混投此譽之太過也毀之失實者謂川芎一味辛散太過恐血未生而氣先耗殊不知亡血之人脾胃必弱若無川芎爲之使則陰寒之品未能滋補而

反以礙脾此殺之失實也至精求之以爲凡治血症當宗長沙法兼用補氣之藥無陽則陰無以生此論最確又恐執定有形之血不能速生無形之氣所當急固遂至補氣之藥多於補血是又矯枉過正反坐拋荒本位之失矣此愈不可不知也

當歸補血湯

黃芪炙一兩　當歸酒洗二錢　空心服

當歸補血湯黃芪多於當歸五倍以之專治氣分尚恐滿中若云養血則輕重尚宜斟酌

歸脾湯

人參　白朮　炒茯神　棗仁　炒龍眼肉二錢
黃芪炙一錢五分　當歸酒洗一錢　木香　甘草炙五分
遠志一錢　姜棗煎

歸脾湯專治心脾陰中之陽藥故不用地黃白芍後人加作黑歸脾殊失立方之旨矣

養心湯

黃芪蜜炙　茯苓　茯神　當歸酒洗半夏麴
川芎一兩　甘草炙一錢　柏子仁去油　酸棗仁炒
遠志去心五味子　人參　肉桂二錢五分　每服五錢

方中心經藥爲多而其餘佐使亦能配合引入心臟故專以養心爲名製方極有意義

人參養營湯

人參　白朮　黃芪蜜炙　甘草炙　陳皮　桂心

當歸酒拌一錢熟地　五味子炒　茯苓七分　遠志五分
白芍一錢五分　加姜棗煎

此實三陰並補氣血交養之劑註中但言治脾肺兩經未免掛漏論者但議其及肺與不及肺抑末也

龍腦鷄蘇丸

鷄蘇葉一兩六錢　生地黃六錢　麥冬四錢　蒲黃炒　木通
阿膠炒　銀柴胡二錢　甘草五分　黃芪　人參

先將木通柴胡浸二日熬汁地黃浸汁熬膏再加蜜三兩煉過和丸

清鬱熱而瀉濕火此方最佳惟近日之阿膠斷不可用柴胡黃芪再爲酌減斯盡善矣

咳血方

青黛水飛括蔞仁去油海石炒黑山梔炒黑訶子肉等分爲末蜜丸噙化嗽甚加杏仁

咳嗽痰血固屬君相之火犯肺此方但清火而不治血去所擾則自安之義然業經失血則肺已大傷豈可置之不論不議去訶子而加清養肺陰之藥始爲得之

獨聖散

白芨爲末每服二錢臨卧糯米湯下

肺壞能補惟有白芨此獨聖之所以得名也

清咽太平丸

薄荷十兩川芎　防風　犀角　怖霜

甘草二兩桔梗三兩蜜丸

於清涼中寓升散之法非特火鬱則發之亦非此不能清解上焦也

還元水

童便　取十一二歲無病童子不茹葷辛清徹如水者去頭尾熱飲冬則用湯温之或加藕汁和服

童便乃眞陰又無嗜慾以之滋腎降火誠治

血之妙品

麻黃人參芍藥湯

桂枝五分麻黃　黃芪　甘草炙白芍各一錢人參三分大棗冬三分五味子五粒當歸五分熱服

麻黃人參湯非教人補中當用散藥正教人散中當用補藥也氣血虧弱之人易受外感風寒深入不得不爲表散若往用麻桂等湯發汗後虛陽欲絶矣東垣立此方以治虛人

之表病天下後世可知固本治標之法矣

犀角地黃湯

生地黃一兩　白芍一兩　丹皮　犀角二錢五分
五錢

每服五錢

犀角化斑解毒涼血清心又能引地黃直達腎經壯水制火故吐衄症中多用之然治心腎則有餘而非肺肝之正藥若治衄血等不如羊角之效至謂升麻可代犀角則其說尤謬既有鬱火再加風藥逼血上升不旋踵而敗矣

桃仁承氣湯

桃仁五十粒去皮尖研　大黃四兩　芒硝　甘草
桂枝一兩

此方準繩以爲當用桂枝子則以爲主治註中有外症不解一語此四字最宜着眼有桃仁大黃芒硝甘草以治裡必當用桂枝以解表仲景立方固無遺漏也

抵當湯

水蛭三十個　猪脂熬黑　蝱虫三十個去頭足翅　桃仁二十去皮尖研
大黃四兩酒浸

此症雖瘀熱結於少腹極陰之處不得以裡症名之蓋膀胱乃太陽本經之病非由太陽傳裡之症但水蛭蝱虫二味人不敢用卽代抵當尤謬既有鬱火再加風藥逼血上升不旋踵而敗矣

槐花散

槐花炒　側柏葉杵　荊芥黑炒　枳殼炒
每三錢米飲下

等分爲末

陳修園云五臟各有守經之血六腑無血試看猪羊腸胃中豈有一絲一點之血世人謂巨口吐紅爲胃血者妄也此說頗有識解惜其但見得一層尚遺漏一層字特申明之夫

五臟主藏故各有守腑之血方其無病之時胃中納水穀大小腸傳糟粕腸胃中本無血也血但流灌於腑外以榮養之經所謂酒陳六腑此一語不得滑口讀過迫至火勢衝激或濕熱薰蒸逼血入於腑中腑不能容隨受亦隨出矣故血淋尿血血之由小腸而出者也瀉血痔血血之由大腸而出者也大小腸既有血症而胃獨無血症有是理乎胃經之血隨火上升宜從食管而出往往盈碗盈盆至內傷之血則中肺經氣管而出自是兩途故胃血易治肺血難治數千年來從未有將無血而有血之故微底發明者子故因論槐花散一方而詳及之○槐花散寒涼太過腸風下血中氣必虛再用陰寒血更凝結方中去柏葉加參朮當歸陳皮甘草庶有瘳乎

秦艽白朮丸

秦艽　白朮　歸尾酒洗　桃仁研　枳實麩炒　皂角子燒存性　澤瀉五錢　地榆三錢　麪糊丸

凡痔漏之疾多起於濕熱下注然又有本體陰虛者一味去風燥濕反致劫陰況照皂角子者令人每發眩暈此方立意雖佳然陰虛者未可輕投也

芍藥湯

芍藥一兩　歸尾　黃芩　黃連五錢　大黃三錢　木香　檳榔　甘草炙二錢　桂一錢五分

此即通因通用之法濕熱鬱蒸氣血瘀壅故下利而後重行血理氣則血止而後重自除矣

葛朮地榆湯

葛朮泔浸炒黑　地榆一兩炒

每一兩煎

一燥濕一凉血亦治下利之正法然止此三

柴尚未足以扶土和榮也。

小薊飲子

小薊　蒲黃炒黑　藕節　滑石　木通　當歸
生地黃　梔子炒　淡竹葉　甘草各五分

清心與小腸之熱。滋腎水而通膀胱自可以治淋而止痛

復元羌活湯

柴胡五錢　當歸　括蔞根　川山甲炮二錢　甘草

紅花二錢　桃仁五十去尖研　大黃一兩酒浸　每服一兩加酒煎

治跌撲損傷之法。破瘀第一。行氣次之。活血生新又次之。此方再加一二味行氣之藥更佳。

小續命湯

防風一錢二分　桂枝　麻黃　杏仁去皮尖炒研　芎藭酒洗　白芍炒酒　人參　甘草炙　黃芩酒炒

防己八分　附子四分　每服三錢加姜棗煎

天地之氣鬱而必宣。風也者乃大塊噫氣鼓盪萬物者也。然有和風有烈風有怪厲之風。有微柔之風和風則不疾不徐人縱感之不爲大害。烈風則咸知畏避。受者反少怪厲之風本不常有。惟微柔之風最易中人。微則難防。柔則善入。虛人腠理不密。外風乘隙而投。由表及裡。病亦由淺入深。前於醫醇賸義中已將中絡中經中腑中臟之症。縷晰條分。茲不復贅。但於各方後竊附管見。小續命湯乃治六經中風之通劑。方中補氣血去風寒清濕熱之藥俱備。非各分門類之專方易老加減法亦不過示人以用藥之大凡。至於八腑八臟之症則固未嘗議及也。

侯氏黑散

菊花四十分　防風　白朮十分　桔梗八分　人參

茯苓　當歸　川芎　乾姜　桂枝　細辛
牡蠣　礬石三分右末用温酒調方寸七服二
十日再冷服四十日共六十日止則藥積腹
中矣
此方隹處全在平肝息風內風不動則不與
外風勾結此便是阻截之法喻西江盛稱其
衛氣以爲城垣當養榮血以堅壁壘若使藥

積腹中以爲堵截吾恐風不得入者氣血亦
由此不通無怪誤解塡塞空竅者之滋議也
大秦艽湯
秦艽　石膏三兩　當歸酒洗　白芍酒炒　川芎
生地酒洗熟地　白朮土炒　茯苓　甘草炙　防風
黃芩炒酒　羌活　獨活　白芷一兩細辛五錢每服
一兩
此方劉宗厚與喻嘉言俱謂其風藥太多不

能養血益筋骨汪訒庵又謂用此方者取效
甚多各執一見予謂方中四物咸備不可謂
無血藥也若中風初起表邪重者用之尙可
取效然石膏細辛二味必須減去
三生飲
生南星一兩生川烏去皮五錢生附子去皮五錢木香二錢
每服一兩加人參一兩煎
邪之所湊其氣必虛是也然邪往從之虛處
轉實又何說耶東垣謂中風非外風乃本氣
自病太屬偏執此等峻猛之藥雖有人參氣
虛者能任受耶如喻嘉言之加減爲宜
地黃飲子
熟地黃　巴戟去心　山茱萸　肉蓯蓉酒浸
附子炮官桂　石斛　茯苓　遠志　麥冬
石菖蒲　五味子　等分每服五錢入薄荷
少許姜棗煎服

清肝氣以益水之源納腎氣以制火之僭水能涵木孤陽不升則心氣通而舌瘖自解矣惟足癈不能行尙當加壯筋利節之藥至其不用風藥正恐以風助火故特爲迸去未可議之也

順風勻氣散

白朮二錢　烏藥一錢　人參　天麻五分　沉香磨三分　白芷　蘇葉　木瓜　青皮　甘草炙　加姜

煎

順風勻氣全是氣分藥並無活血舒筋之藥以之順氣疎風則可若治半身不遂口眼喎斜當加血藥舒筋爲是

稀薟丸

稀薟草　以五月五日七月七日九月九日採者隹不拘多少揀去粗莖留枝花莖實酒拌蒸晒九次蜜丸

稀薟之性一味搜風逐濕若風濕相博腿足痺痛及諸濕瘡皆可用以治中風喎僻徒益之燥耳

牽正散

白附子　殭蚕　全蝎　等分爲末每二錢酒調服

但口眼喎邪而別無他症則經絡臟腑均未受傷乃太陽陽明兩經之風痰蘊熱所致三藥直走內絡祛風化痰極爲得力故不必加血藥也

如聖散

羌活　防風　白芷　柴胡　甘草　黃芩　半夏　川芎　芍藥　當歸　烏藥　加蓋煎入薑汁竹瀝服柔痙加白朮桂枝剛痙加蒼朮麻黃口噤咬牙大便實加大黃活血去風化痰清熱剛柔二痙加減亦有法

此節卷方之佳者。

獨活湯

獨活　蒺活　防風　細辛　桂心　白微　當歸　芎藭　半夏　人參　茯神　遠志　肉　菖蒲五錢　甘草炙二錢　每服一兩加姜棗煎

此以息厥風爲第一義。養心神次之。化痰清熱又次之。方法極有條理。

活絡丹

川芎炮去皮　草烏炮去皮　胆星六兩　地龍洗焙乾　乳香去油　沒藥另研三錢　酒九

藥力頗峻。筋及血不養筋者不可誤投。

消風散

荆芥　陳皮去白　厚朴姜汁炒　甘草炙五錢　防風　羌活　藁香　殭蚕洗炒　蝉蜕　川芎

人參　茯苓二兩　爲末每服三錢茶湯下。

風熱上攻。治當清解。過用辛散。是發風助火矣。殊非正法也。

清空膏

黄芩酒炒　黄連酒炒　防風一兩　柴胡七錢　川芎五錢　甘草炙一兩　爲末每服三錢茶調

如膏白湯送下。如少陰頭痛加細辛。太陰頭痛脈緩有痰去羌活防風川芎甘草加半夏

如偏頭痛服之不愈。減羌活防風川芎一半加柴胡一倍。如自汗發熱惡熱而渴。此陽明頭痛。只與白虎湯加白芷。此則寫清涼於升散中。爲治風熱之大法。若陽明頭痛。少陰厥痛。血虚頭痛。又當別用方法矣。

胃風湯

人參　白朮炒　茯苓　當歸炒酒　芎藭　桂炒

為藥酒炒等分加粟米百餘粒煎

東垣胃風湯　升麻一錢二分麻黃不去節一錢白芷一錢二分葛根一錢柴胡五分羌活五分藁本五分蒼术五分蔓荆五分草蔻五分黃柏五分炙甘草五分加姜棗煎

易老胃風湯　養血柔肝補脾和胃並無一味風藥而治法特妙蓋緣肝木太旺動而生風犯胃剋脾故見殘泄腸風等症但須肝木一和則內風自息若東垣之胃風湯純用風藥且燥亦太過不及遠矣

上中下通用痛風丸

川芎雨一兩黃柏酒炒蒼术泔洗南星姜製二兩桃仁去皮尖搗羌活　威靈仙酒拌三錢

神麯炒　防己　白芷一兩龍胆草一兩柱枝三錢紅花二錢麪糊丸

此於風寒濕之外又兼治痰與血丹溪原自謂通劑不過舉此以示大法病有專在何經者必須對症立方不得用此通共之劑反傷無病之處也

史國公藥酒方

羌活　防風　白术土炒當歸酒洗川牛膝酒浸川萆薢　杜仲炒薑汁炒松節拌虎脛骨酥炙黛甲酥炙晚蠶沙炒二兩秦艽　蒼耳子炮搥碎四兩拘杞五兩　茄根八兩蒸熟爲粗末絹袋盛浸無灰酒三十觔煮熟退火毒服每日數次常令醺醺不斷

此酒祛風利濕頗有力於實症爲宜若氣虛者當加補氣藥血虛者當加補血藥

鷄痺湯

黃芪蜜炙當歸酒洗赤芍酒炒羌活　防風片子薑黃酒炒甘草炙加姜棗煎

營衛不虧風何由入不調營衛而多用風藥

者非升痰卽助火此方營衛兼顧而又能祛風利濕痺症中之善方也

三痺湯

人參　黃芪　茯苓　甘草　當歸　川芎　白朮　生地黃　杜仲姜汁炒　桂心　川牛膝　川續斷　細辛　秦艽　川獨活　防風　等分加姜棗煎

峻補氣血而祛風除寒利濕之法悉寓乎其中本未兼該誠治痺之上策也

獨活寄生湯

獨活　桑寄生　秦艽　防風　細辛　當歸酒洗　川芎酒洗　熟地　杜仲姜汁炒　牛膝　人參　茯苓　甘草　桂心　等分

每服四錢

獨活取其獨立不搖不須依傍寄生取其附木而生大得依傍二者相濟又能利筋節而祛風再兼平補營衛疎通寒濕用意頗爲周到

沉香天麻丸

羌活五錢　獨活四錢　沉香　益智仁　川烏二錢　附子炮　天麻　防風　半夏三錢　當歸　甘草　殭蠶一錢五分　每服五錢　姜三片煎

以之治風寒痰厥則可若因風化火兼有痰涎者斷不可用

通頂散

藜蘆　甘草生用　細辛　人參　川芎一錢　石膏五錢　爲末用一字吹入鼻中有噦者肺氣未絕可治

不過欲其通陽開竅耳然太覺煩瑣不如皂莢散之便捷也

烏梅擦牙關方

烏梅　揩擦牙齦涎出卽開

木旺則剋土、木燥則筋急。泄木緩筋則土
自開矣

理中湯

白朮陳壁土炒 人參 乾薑炮 甘草炙 一兩

每服四錢自利腹痛者加木香不痛利多者倍白朮渴者倍白朮倦卧沉重利不止加附子腹滿去甘草嘔吐去白朮加半夏姜汁膀下動氣去朮加桂悸加茯苓陰黃加茵陳寒結胸加枳實本方等分蜜丸名理中丸

寒有外感有傳經有直中有痼冷外感之寒先病在表後傳入裡必發熱而惡寒此傷寒之寒病也直中之寒手足厥冷並不發熱痼冷在內遇寒而發暴猝厥逆其勢尤重此中寒門之寒病也施治之法傷寒一門在表者宜辛散傳裡者宜辛温中寒一門則每用辛熱回陽急救之法此傷寒中寒治法之分也理中湯治傷寒太陰病腹痛便溏等症亦通

治中院虛寒惟云治結胸吐蚘感寒霍亂此兩條則宜去人參甘草量加厚朴砂仁等味爲妥

四逆湯

附子一枚生用　乾姜一兩　甘草炙二兩

蔥九莖腹痛加芍藥二兩咽痛加桔梗一兩利止脈不出加人參二兩嘔吐加生姜二兩四逆湯爲四肢厥逆而設仲景立此方以治

傷寒之少陰症若太陰之腹痛下利完穀不化厥陰之惡寒不汗四肢厥冷者亦宜之蓋陰慘之氣深入於裡眞陽幾幾欲絕非此純陽之品不足以破陰氣而發陽光又恐姜附之性過於燥烈反傷上焦故倍用甘草以緩之立方之法盡善盡美後人分傳經爲熱厥厥陰爲藏血之經故當歸通草主加桂枝細辛以和榮衛和則厥自解矣

發熱應下之此明明說厥逆在前發熱在後及至發熱則不復厥冷乃傷寒失下之症故滌蕩邪滯則發熱自退本非爲厥而不熱者言也程氏又云下之者下其熱非下其厥也遇發熱則可下遇厥則萬不可下此數語最爲明白了當可見傳經之邪亦自有當下者但不可概謂之熱厥耳四逆者必手冷過肘足冷過膝脈沉細無力腹痛下痢等象咸備

方可用之否則不可輕投

當歸四逆湯

當歸　桂枝　芍藥　細辛三兩　甘草炙通草二兩　大棗二十五枚　仲景又曰其人素有久寒者加吳茱萸二兩生姜半斤勿論四逆加吳茱萸生姜湯厥陰爲藏血之經故當歸四逆湯以和榮主加桂枝細辛以和衛榮衛和則厥自解矣

雖有寒而不加姜附者恐燥烈太過叔陰耗血也

四逆散

柴胡　芍藥炒　枳實麩炒　甘草炙等分爲末水調飲

四逆散乃表裡並治之劑熱結於內陽氣不能外達故裡熱而外寒又不可攻下以礙厥陰陽邪外泄則手足自温矣

真武湯

附子炮一枚　白朮炒三兩　茯苓　白芍炒生姜三兩

北方曰幽都乃陰寒濕濁之地賴真武之神運用水火以鎮攝之濁陰方漸得解散此方取名真武乃專治腎臟之劑坎之爲象一陽居二陰之中水中之火是爲眞火此火一衰則腎水泛濫停於下焦則腹痛自利水氣犯中焦則作噦欲吐不吐水氣犯上焦則咳嗽心悸頭眩方中姜附以助眞陽用苓朮以制水調飲

真武湯乃表裡並治之劑熱結於內陽氣不能外達故裡熱而外寒又不可攻下以礙厥陰陽邪外泄則手足自温矣無脈此爲陰寒過甚陽氣將絕之候加人尿猪胆汁湯

葱白四莖　乾姜一兩　附子炮一枚　人尿五合　猪胆汁一合

少陰病下利脈微服白通湯後利不止厥逆無脈此爲陰寒過甚陽氣將絕之候加人尿猪胆汁者以類相從之義也服後脈暴出則陽氣盡泄孤立無依故隨脫而死脈微續者陽氣漸回以次可復故得生外用葱艾熨灸氣海關元表裡通陽亦爲善策

吳茱萸湯

吳茱萸　泡一升　人參三兩　大棗十二枚　生姜六兩

吳茱萸辛烈善降得姜之温通用以破除陰

氣有餘矣又恐辛燥太過耗氣叔陰故用人參大棗之甘緩以濟之又能補土扶陽使濁陰不得上干清道治法更爲周到

大建中湯

蜀椒二合　乾姜四兩　人參二兩　煎去滓內飴糖一升微煎溫服

非人參不能大補心脾非姜椒不能大祛寒氣故名曰大建中又有飴糖之甘緩以殺姜椒之辛燥非聖於醫者不辨有此

十四味建中湯

黃芪蜜炙　人參　白朮土炒　茯苓　甘草蜜炙　牛夏姜製　當歸酒洗白芍酒炒熟地　川芎　麥冬　肉蓯蓉　附子　肉桂　加姜棗煎

於十全大補中又加四味究竟陽藥太多若以治陰虛之勞瘵非抱薪救火乎至藥令建中湯加柴胡細辛之開透善走欲其建立中氣不亦難乎

小建中湯

桂枝　生姜三兩　芍藥六兩　甘草炙一兩　大棗十二枚　八飴糖一升微火解服

肝木太強則脾土受制脾陽不運虛則寒生陰氣日凝陽氣日削故見腸鳴泄瀉腹痛等症小建中湯之義　全在抑木扶土當從吳氏之說用肉桂而不用桂枝肉桂溫裡桂枝

解表用各有當也且肉桂性能殺木合芍藥以制肝又用姜棗甘草飴糖之甘溫以補脾斯中州之陽氣發舒而陰寒盡退矣

白朮附子湯

白朮二兩　甘草一兩　附子炮一枚　每服五錢　姜五片棗一枚煎

此爲治腎風之藥腎爲水臟得火則平而濁陰退聽矣若肝風頭眩則當用養血之劑悞

用此方則風火相搏而病益劇不可不知

益元湯

附子炮　乾姜　艾葉　黃連　知母　人參
麥冬　五味子　甘草　加姜棗葱白煎入童
便一匙冷服

戴陽者陰不抱陽虛陽上浮幾幾欲絕若悞
作熱症治立見敗壞此方用姜附艾葉以回
陽用生脈散以斂陰使陽回氣復陰能抱陽
同煮爛去姜取棗肉搗丸每服二錢臨臥鹽
湯下

命門爲日用之火所以薰蒸脾胃運化穀食
可無虛脫之虞矣

回陽救急湯

附子炮　乾姜　肉桂　人參　五分白朮
茯苓一錢半　夏　陳皮七分　甘草二五味子九粒
加姜煎入麝三厘調服無加猪胆汁泄瀉加
升麻黃芪嘔吐加姜汁吐涎沫加鹽炒吳茱
萸

此方治中寒之緩症則可若云救急則姜附
中又合六君五味子反令姜附之性多所牽
制不如四逆湯爲能斬關奪門也

四神丸

破故紙　酒浸一宿炒四兩　五味子　炒三兩　肉荳蔻　麪裹煨二兩
吳茱萸　鹽湯泡一兩　用大棗百枚生姜八兩切片
同煮爛去姜取棗肉搗丸每服二錢臨臥鹽
湯下

命門爲日用之火所以薰蒸脾胃運化穀食
若腎瀉者宜二神丸脾瀉者若由木旺尅土
則吳萸能散厥陰之氣用以抑木則可非此
則不如去五味吳萸加茴香木香者之爲佳
也

感應丸

木香　肉荳蔻　丁香一兩　乾姜炮　百草霜
一兩　杏仁一百四十粒去皮尖　巴豆七十粒去心皮膜油
巴豆杏仁另研同前藥末和勻用好黃蠟六

雨浴化重絹濾去渣好酒一升于砂鍋內煮
數沸候酒冷蠟浮用清油一兩銚入熬熱取
蠟四兩同化成汁就銚內和前藥末乘熱拌
勻丸如豆大每服三十丸空心姜湯下

製方之法極有巧思然走者太走而濇者太
濇偏師陷陣終不如堂堂正正之爲得也譬
之者嘆爲雄有巴豆服之不瀉此不過藉蠟
性爲之封痼耳吾不敢以爲神妙也

導氣湯

川楝子四錢　木香三錢　茴香二錢　吳茱萸一錢
水煎　湯泡長流

此爲治疝之通劑有川練子苦寒濟以茴香
木香吳萸之辛溫肝腎並顧寒濕盡祛致爲
妥善

天台烏藥散

烏藥　木香　茴香鹽炒　良姜炒　青皮五錢

楝柳二個　川練子十個　巴豆七十一粒
先以巴豆微打破同川練麩炒黑去麩及巴
豆同餘藥爲末酒下一錢

治疝大法當温腎柔肝兼治寒濕何至用巴
豆之峻攻不及導氣湯遠矣

疝氣方

吳茱萸　枳殼　梔子　山查炒　荔枝核煅
等分爲末空心長流水下二錢

此方亦平易近人雖無近效然較之烏藥散
穩妥多矣

橘核丸

橘核　川練子　海藻　海帶　昆布
桃仁兩二　延胡索　厚朴
桂心　木香五錢　酒糊丸鹽湯或酒下

此乃治癭疝之專劑理氣破血軟堅行水之
法俱備其知痛楚者不可悞用

四味香薷飲

香薷一兩　厚朴姜汁炒　扁豆炒　五錢　黃連姜炒　三錢

冷服

暑濕暗三氣初學不能分別多致錯悞今爲明白言之時當夏令天氣下降地氣上升人處其中暑上侵而濕下襲暑爲天之氣濕乃地之氣其濕之甚者則爲暍此三氣之分也今就暑病門中先論暑症雖有冒暑傷暑中暑伏暑等名不過暑分輕重其爲陽邪則一也其因暑而貪凉受風者便是傷風因暑而食冷受寒者便是傷寒但與冬月之傷風傷寒治法不同因暑傷風當辛凉表散因暑傷寒當於清解中參用温藥此爲正法四味香薷飲乃治感冒暑氣陽邪遏抑之劑卽冬月傷風中用桂枝荆防之例今人誤以香茹爲凉藥不論是何暑病首先用之殊可怪嘆

清暑益氣湯

黃芪　人參　白朮炒　蒼朮　神麯炒　陳皮　青皮炒　楚甘草炙　麥冬　五味子　當歸酒洗　黃柏酒炒　澤瀉　升麻　葛根　姜棗煎

清暑益氣湯藥味龐雜補者補而消者消升者升而瀉者瀉將何所適從乎且主治下有胸滿氣促一條則黃芪升麻在所當禁矣謂此等症但須清心養胃健脾利濕足矣何必如此小題大做東垣先生乎最爲服膺惟此等方不敢阿好

生脈散

人參　麥冬　五分　五味子　七粒

肝主氣心主血生脈散養心肺之陰使氣血得以榮養一身而又有酸斂之品以收耗散之氣止汗定咳虛人無外感者暑月宜之

六一散

滑石 六兩 甘草一兩 爲末冷水或燈心湯調下　本方加辰砂名益元散　加薄荷名鷄蘇散加青黛名碧玉散

六一散施之於體壯熱盛濃厚太過之人則可若體虛氣弱者則寒傷脾而滑傷腎反致飲食減少津虛作渴至益元散鷄蘇散碧玉散亦同此例也不可因夏月一概混投

縮脾飲

砂仁 草果煨去皮 烏梅 甘草炙 四兩 扁豆炒研 乾姜 二兩

方中辛燥太過用以快脾去濕則可若謂清暑除煩止渴吾不謂然

消暑丸

半夏一觔醋五茯苓 甘草 姜汁糊丸勿觔煮乾

見生水熱湯下

消暑丸不治暑而治濕使濕去而暑亦除用意甚佳然必須兼清解之藥一二味爲得

大順散

乾姜 桂 杏仁去皮尖 甘草 等分先將甘草用白砂炒次入姜杏炒過去砂合桂爲末每服二錢

此卽治暑月之傷寒也因暑傷寒故但不事而不治暑

五苓散

猪苓 茯苓 白朮炒十八銖 澤瀉 一兩六銖半 桂五錢

濕爲地之氣其中人也緩其入人也深其爲病也不可以疾而已坐卧卑濕汗漬雨霖此濕之自外冰者也多食濃膩過嗜茶酒此濕之自內生者也治濕必先理脾脾土健運始能滲濕此定法也又須分利使濁陰從下而出亦定法也五苓散仲景本爲脈浮小便不

利微熱消渴表裡有病者而設方中宜用桂枝不可用肉桂後人遂通治諸濕腹滿水飲水腫嘔逆泄瀉水寒射肺或喘或咳中暑煩渴身熱頭痛膀胱熱便秘而渴霍亂吐瀉痰飲濕瘧身痛身重等症總之治寒濕則宜用肉桂不宜用桂枝若里陰生陽積濕化熱便當加清利之藥併桂枝亦不可用矣至加減之附方各有宜稱亦當細細參之

豬苓湯

豬苓　茯苓　滑石　阿膠各一兩

五苓散治濕濁不化故用术桂以通陽而化濁豬苓湯治陽邪入裡故用滑石阿膠以降熱而存津至於統治少陰下利六七日咳而嘔渴心煩不得眠乃借瀉膀胱以清腎臟是活用之法而非正治也

茯苓甘草湯

茯苓　桂枝二兩　甘草一兩　生姜二兩

茯苓宜於獨重以其能滲濕安神也姜桂性溫開解腠理能遂水氣從毛竅而出用甘草以補土和中方法特妙

小半夏加茯苓湯

半夏一斛　茯苓三兩　生姜半斤

古人立方有藥味少而分兩重者專走一門為功甚鉅如半夏等湯是也痰去則眩悸自止濕去則痞滿自消氣順則嘔吐不作矣

加味腎氣丸

熟地四兩　茯苓三兩乳拌　山藥炒　丹皮酒炒　山萸肉酒潤　澤瀉酒浸　川牛膝酒浸　車前子炒　肉桂一兩　附子製五錢　蜜丸

此方之妙全在導龍歸海命腎之火衰微濁陰日漸凝結始則小便不利繼則水氣泛溢腹脹肢腫怛用分利之劑徒然耗正圾陰小

便仍不能利。惟用附桂以直達命門。之火得以薰蒸脾胃腎中之眞陽發越則腎氣通暢而寒水亦行小便通則泛溢之水如衆流赴壑矣人但知水能剋火而不知火亦能制水發陽光以消陰翳此類是也

越婢湯

麻黃六兩　石膏八兩　生姜三兩　甘草二兩　大棗十二枚

風與水在皮膚之間故但腫而不脹變小青龍之制使風水俱從毛竅而出故名越婢越婢者悅脾也

防已黃芪湯

防已　黃芪兩　白朮七錢　甘草五錢　每服五錢加姜棗煎

去風先養血治濕先健脾此一定之法此症乃風與水相乘非血虛生風之比故但用治風逐水健脾之藥而不必加血藥但得水氣去而腠理實則風亦不能獨留矣

腎着湯

乾姜炮　茯苓四兩　甘草炙　白朮炒二兩

方中但燥濕健脾而不用温腎之藥緣此症乃積濕下注於腎非腎虛寒水爲病也若虛寒之體即少加附子杜仲亦可

舟車丸

黑牽牛四兩炒　大黃二兩酒浸甘遂麪裹煨　大戟麪裹煨　芫花醋炒　青皮炒　橘紅一兩　木香五錢　輕粉一錢

水丸

仲景十棗湯已極峻厲此更厲而加厲縱形氣俱實豈能堪此予謂此等症全是陰結非陽不通宜用附桂兼疎肝逐水之劑此等方法萬不可用

疎鑿飲子

羌活　秦艽　槟榔　大腹皮　茯苓皮

椒目　木通　澤瀉　赤小豆　商陸
等分加姜皮煎
疎鑿飲名色甚佳用藥亦較舟車丸已輕一等然吾見服商陸者必然大瀉胸腹驟寬不逾時而復脹萬無生理蓋逐水自前陰而出者得生自後陰而出者必死學者愼之哉

實脾飲
白朮炒　茯苓　甘草炙　厚朴炒　木香　附子
大腹皮　草豆蔻　木瓜片　黑姜
加姜棗煎
主治條下有色悴聲短口不渴二便利數語則此症乃脾腎虛寒當用香砂六君合溫腎滲濕之劑若徒事破氣利濕色悴者不更加燋悴乎

五皮飲
五加皮　地骨皮　茯苓皮　大腹皮
生姜皮
此亦爲水邪客於皮膚而設以其病不在上故不用發汗逐水之法而但利小便也

麥門冬湯
麥門冬五十枚　姜炒　粳米五十粒
麥門冬湯解之者多談玄理予則謂初起便見喘滿則明是清肅之令不能下行故水溢高原也擬以桑白皮瓜蔞皮苡仁米等代之亦未爲不可

羌活勝濕湯
羌活　獨活一錢　川芎　藁本　防風
甘草炙五分　蔓荆子三分
此爲治在表之濕故獨用風藥關節利則濕除矣且屬外來之淺恙本不在健運分消之例

中滿分消丸

厚朴炒一兩枳實炒黃連炒黃芩炒半夏姜製五錢
陳皮　知母炒錢炒四澤瀉三錢茯苓　砂仁二錢
乾姜二錢姜黃　人參　白朮炒甘草炙猪苓
一錢蒸餅丸焙熱服
中滿分消丸解者謂治熱脹。此不過脾胃失
職積濕所化之熱耳。並非實火也。若有實火
則水氣安得橫行濁陰豈得復盛乎惟其寓
補脾胃之法於分消解散之中不傷元氣極
爲正法
中滿分消湯
川烏　乾姜　生姜　黃連　人參　當歸
澤瀉　青皮　麻黃　畢沉茄　柴胡二錢
吳茱萸　草蔻仁　厚朴　黃芪　黃柏五分
益智仁　木香　半夏　茯苓　升麻三分熱服
此方於大隊溫補中用黃連黃柏所謂從權
以寒熱藥下之也於中又升散又分利雖屬

開鬼門潔淨府之法。究竟岐路太多矣。
大橘皮湯
滑石六錢甘草一錢赤茯苓一錢猪苓　曰朮土炒
澤瀉　桂五分陳皮一錢木香　栀卽三分
加姜煎每服五錢
利小便卽所以實大腸。使小腸之水滲入膀
胱而不入大腸則五苓散中肉桂一味尤爲
得力也。

茵陳蒿湯
茵陳六兩大黃二兩酒浸梔子十四枚炒
凡發黃症二便不利者用大黃若二便如常。
當去大黃用黃連至寒濕陰黃則又當於分
利中用熱藥矣。
八正散
車前子　木通　瞿麥　扁蓄　甘草稍
栀子炒黑　滑石　大黃　加燈草煎

此方治實火下注小腸膀胱者則可若陰虛夾濕火之體便當去大黃加天冬丹參丹皮琥珀等味不可再用大黃以傷其元氣

革薤分清飲

川萆薢　石菖蒲　烏藥　益智仁　等分

甘草稍減半　入鹽食前服

凡淋症皆由於濕熱小便頻數其爲腎虛夾熱可知但當於滋腎中加清利之藥若烏藥益智仁不謂此以疎泄爲禁止吾不謂然

琥珀散

滑石　二錢　琥珀　木通　扁蓄　木香

當歸　鬱金炒　一錢　爲末服

上焦之熱下注小腸膀胱精道與溺道混淆故成淋症此於清利中少加氣藥以分清濁極爲有法

防已飲

防已　木通　梹榔　生地酒炒　川芎炒

白朮炒　蒼朮鹽炒　黃柏酒炒　甘草稍　犀角

食前服

濕熱爲病不宜調補亦不可攻下此方於健脾燥濕中寓滋陰凉血之法最爲合度

當歸拈痛方

茵陳酒炒　羌活　防風　升麻　葛根　蒼朮

白朮　甘草炙　黃芩酒炒　苦參酒炒　知母酒炒　當歸

猪苓　澤瀉　空心服

疎風所以勝濕健脾所以滲濕通小便所以利濕上下中三焦之濕盡去則熱亦解散而遍身之痛止矣此不治痛而痛自止之法也

禹功散

黑牽牛　四兩　茴香炒　一兩　爲末每一錢姜汁調下

此方峻猛不可輕用

升陽除濕防風湯
蒼术泔浸四錢方風二錢茯苓　白术　芍藥一錢
芡粟漁
但升陽宜腑而濁陰自化尤妙在不用升麻
最爲的當
瓊玉膏
地黃觔四　茯苓十二兩　人參六兩　白蜜二觔　先將地黃

熬汁去渣入蜜煉稠再將參苓爲末和入磁罐封水煮半日白湯化服
熬者燥烈也不能滋潤也喻嘉言作涼字解
于於醫醇賸義中已詳論之如瓊玉膏之潤燥亦善策也人參地黃氣血並補金水相生又加茯苓以寧心而補土則水升火降而咳嗽自除矣
炙甘草湯
甘草炙四兩　生姜　桂枝三兩　人參　阿膠蛤粉炒二兩

生地黃觔一　麥冬去心麻仁半觔研　大棗十二枚
水酒各半煎內阿膠烊化服
或疑姜桂之辛溫恐不可以潤燥不知此方
仲景原爲傷寒脈結代餘邪未解者而設故
温散與清潤並行使外邪清則正氣醒而血脈復也
麥門冬湯
麥門冬七斤　半夏一升　人參三兩　甘草二兩　大棗十二枚

粳米三合
半夏之性用入温燥藥中則燥用入清潤藥中則下氣而化痰胃氣開通逆火自降與徒用清寒者眞有霄壤之別
活血潤燥生津湯
當歸　白芍　熟地一錢　天冬　麥冬　括蔞八分　桃仁研　紅花五分
牛津養血本潤燥之正法但桃仁紅花雖云

活血恐其破血耳

清燥湯

黃芪一錢五分　蒼朮炒一錢　白朮炒陳皮　澤瀉五分　人參　茯苓　升麻三分　當歸酒洗　生地　麥冬炒一錢五分　甘草炙　神麴炒　黃柏酒炒　猪苓二分　柴胡　黃連　柏　神麴等以此清燥非艳薪救火乎不知此症之要全在肺金受濕熱之邪一語蓋熱爲積濕所化濕不去則熱不清徒用清滋留濕即以留熱故毅然用燥濕之品使濕去而熱亦清此其所以爲清燥乎

滋燥養榮湯

當歸酒洗一錢　生地　芍藥炒　黃芩酒炒　熟地　秦艽一錢　防風　甘草五分

若大便風秘便可用秦艽防風若大便如常便當減去風藥善走與火鑠肺金不宜

搜風散氣丸

大黃九蒸九晒五兩　大麻仁　郁李仁去皮　山藥酒蒸　山茱肉　車前子　牛膝酒洗二兩　兎絲子酒洗獨活　防風　槐枳殼麩炒一兩　蜜丸

此不過因大腸秘結以之潤腸通氣耳乃本方自註久服則可百病皆除安有大黃槐枳之峻下而可以常服者乎

潤腸丸

大黃歸尾　羌活五錢　桃仁研　大麻仁去殼一兩　蜜丸

此以通爲潤非專於清潤也伏火燥結得滌蕩而始清不待潤而燥自除矣

通幽湯

當歸身　升麻　桃仁研　紅花　甘草炙錢　生地黃　熟地五分

雖云病在幽門亦無專治幽門之藥不外調和氣血開通胃府清升濁降而上下自安惟不用香燥攻下最爲有識

韭汁牛乳飲

韭菜汁　牛乳　等分時時呷之

燥兼通大腸不用辛熱刻陰傷津洵爲良法

黃蒼湯

黃蒼　熟地　芍藥　五味子　麥冬三兩

天冬　人參　甘草三錢　茯苓一兩　每服三錢加烏梅姜棗煎

氣血並補飲陰生津極爲有力惟方既有五味不必再加烏梅

消渴方

黃連　天花粉　生地汁　藕汁　牛乳　蜜炙甘草　生地　熟地　天冬　麥冬　枇杷葉蜜炙　石斛　澤瀉　枳殼炒麩　茯苓　黃連花粉爲調服

治胃熱消渴天花粉宜重用黃連當用胡連蓋川連但能瀉心火生津止渴不如胡連之爲佳也

地黃飲子

人參　黃芪蜜炙甘草炙生地　熟地　天冬　麥冬　枇杷葉蜜炙石斛　澤瀉　枳殼炒麩　茯苓　等分每服三錢

此方妙處在清金潤肺以益水之源又有澤瀉泄腎濁而煩躁亦除矣

白茯苓丸

茯苓　黃連　花粉　菖蒲　人參　熟地　覆盆子　玄參一兩　石斛　蛇床子七錢五分　鵝胜胵三具　蜜丸磁石湯送下

金水俱傷方成下消蛇床子燥烈如火萬不可用卽鵝胜胵之消導磁石之鎮墜皆非此症所宜

桑白皮等汁十味煎

桑白皮一勹 地骨皮三勹 生地汁五升 麥冬汁二升
生葛根汁 竹瀝三升 生姜汁 白蜜一升
棗膏一升 牛酥三合

頗有清肺化痰除熱止咳之力但久虛者恐其滑腸或再加茯苓懷藥苡仁等培土正以生金也

治久嗽方

白蜜二勹 生姜二勹 先秤銅銚知勹兩訖納蜜姜汁微火熬令姜汁盡惟有蜜勹兩在則止每合如棗大一丸日三服

肺有伏寒久咳不止者可用若陰虛者不宜

猪膏酒

猪脂 姜汁 各二升熬取三升再入酒酒五合 分三服不過有此一法耳若欲以此取效吾恐其不能也

麻仁蘇子粥

大麻仁 紫蘇子 等分洗淨合研再用水研取汁煮粥啜

氣血虧虛不可通利惟此潤導之法最宜

醫方論卷四

黃連解毒湯

黃連　黃芩　黃柏　梔子　等分

此治實邪實火表裡俱盛之劑故用黃芩瀉肺火黃連瀉心火又用梔子令下又不能仍從毛竅而出惟有苦寒瀉熱之法方能消痞解邪而又恐陽邪既去濁陰上干故於清瀉中參入辛溫以預截後患此所以爲醫中之聖也

白虎湯

石膏一觔　知母六兩　甘草二兩　粳米六合

附子瀉心湯

大黃一兩　黃連　黃芩一兩　附子一枚去皮

傷寒痞滿在心胸而不在胃故用三黃以瀉痞而去熱然惡寒汗出陽氣亦虛故用附子温腎固陽寒熱並用各有精義非仲景其孰能之

半夏瀉心湯

半夏升半　黃連一兩　黃芩　甘草炙八參　乾姜三兩大棗十二枚

此爲誤下胸痞而設陽邪鬱於上焦既不能下又不能仍從毛竅而出惟有苦寒瀉熱之法方能消痞解邪而又恐陽邪既去濁陰上肺火黃連瀉心火又用梔子令干故於清瀉中參入辛温以預截後患此所以爲醫中之聖也

白虎湯

石膏一觔　知母六兩　甘草二兩　粳米六合

先煮石膏數十沸再投藥米米熟湯成温服同一石膏也合麻黃用之則爲青龍合知母用之則爲白虎一則欲其興雲致雨以解外邪一則欲其清肺胃滌蕩內熱義各有當也然用此方者必須審而又審自汗而渴脈大有力數者咸備方可與之若一誤投禍不旋踵蓋緣此症爲濕熱鬱蒸故有汗而煩熱不解既有汗故不可表表則陽脫亦不可下

下則耗陰惟有大清肺胃之熱爲正法也

竹葉石膏湯

竹葉二把　石膏一斤　人參三兩　甘草炙二兩　麥冬一斛　半夏半升　粳米半升　加姜煎

治肺胃虛熱故加人參麥冬加竹葉者恐虛陽內犯胞絡也

升陽散火湯

柴胡八錢　防風二錢五分　葛根　升麻　羌活　獨活　人參　白芍五錢　炙甘草三錢

生甘草三錢每服五錢加姜棗煎

鬱結之火逆而折之則其勢愈激而上升此則全用風藥解散盡火得風力而升亦因風力而滅故絕不用清寒之品深達火鬱則發之之義也

涼膈散

連翹四兩　大黃酒浸　芒硝　甘草二兩　梔子炒黑

黃芩酒炒　薄荷一兩　爲末每服三錢加竹葉生蜜煎

解此方者但云此上中二焦瀉火之藥既下焦無病豈得輕用苦硝觀仲景三承氣湯邪在上者不用苦硝可知也殊不知主治條下有大小便秘一語則下焦安得不並治乎

當歸龍薈丸

當歸酒洗　龍膽草酒洗　梔子炒黑　黃連炒　黃柏炒

黃芩炒　大黃酒浸　青黛水飛　蘆薈五錢　木香二錢　麝香五分　蜜丸姜湯下

苦寒之至無以復加此等峻劑豈可輕試予意去三黃二香庶幾可用耳

龍膽瀉肝湯

龍膽草酒炒　黃芩炒　梔子酒炒　澤瀉　當歸酒炒　車前子　木通　生地酒炒　柴胡　生甘草

肝膽火盛濕熱鬱蒸者此方爲宜下部發瘍

者尤妙
左金丸
黃連六兩炙茱萸一兩鹽水炒 水丸
此方之妙全在苦降辛開不但治脇痛肝脹吞酸痞氣等症即以之治時邪霍亂轉筋吐瀉無不神效
瀉青丸
龍胆草 山梔炒 大黃酒蒸 川芎 當歸酒洗
羌活 防風 等分蜜丸竹葉湯下
肝性至剛宜柔而不宜伐此方但瀉肝經之鬱火則可若以之治驚恐筋痿等症吾未見其有濟也若去大黃加芍藥丹皮等類爲庶幾耳
瀉黃散
防風四兩藿香七錢 山梔炒黑一兩 石膏五錢 甘草二錢
石末微炒香酒調服

有風藥以散伏火有清藥以瀉積熱而又用甘緩以和中使不傷正氣此法頗佳
清胃散
生地 丹皮 黃連 當歸 升麻
涼血解熱升陽散火胃氣清則諸病自除矣
甘露飲
生地 熟地 天冬 麥冬 石斛 茵陳
黃芩 枳殼 枇杷葉 甘草 等分每服五錢
治胃虛發熱兼有血症者則可若積濕化熱又無血症者當去地黃加花粉茯苓等爲佳
瀉白散
桑白皮 地骨皮 一錢 甘草五分 粳米百粒
易老加黃連
肺金有火則清肅之令不能下行故洒淅寒熱而咳嗽喘急瀉肺火而補脾胃則又頧毋

法也若加黃連反失立方之旨

導赤散

生地　木通　甘草梢　淡竹葉　等分煎

心經之火每移於小腸該裡相傳也故治小腸之火必兼清心此爲定法

連子清心飲

石蓮肉　人參　黃芪　茯苓　柴胡三錢

黃芩炒　地骨皮　麥冬　車前子　甘草炙二錢

空心服

柴胡散肝胆之陽邪木不助火則心氣亦安又有參芪足以制之故雖發熱煩渴而不相妨也

導赤各半湯

黃連　黃芩　犀角　知母　山梔　滑石

甘草　茯神　麥冬　人參　加燈心棗煎

越經症乃心經之熱邪上而通肺本與小腸

無關其必兼瀉小腸者欲令上焦之邪俱從小腸出也

普濟消毒飲

黃芩酒炒　黃連酒炒　甘草生　去皮甘草炙　牛蒡子　薄荷二錢

連翹　板藍根　馬勃　鼠粘子　陳皮　白去甘草生　去皮甘草炙　牛蒡子　薄荷二錢

殭蠶　升麻七分　柴胡　桔梗二錢　爲末湯

調時時服之

天行厲氣最爲酷烈病在上焦者天氣中人

必於上也此方清熱解毒祛厲疫之氣最爲精當

清震湯

升麻　葛木　五錢　荷葉一枚

雷頭風頭本風陽上擾之症故宜升散而不宜清寒

紫雪

黃金百兩　寒水石　石膏　滑石　磁石水煮三觔

搗煎去渣入後藥升麻玄參甘草炙牛蒡屑羚羊角沈香木香五分丁香一兩並搗剉煎去渣朴硝入後藥朴硝各一斤提清入前藥汁中微火煎不住手將柳木攪候汁欲凝再入後藥辰砂三兩研細麝香一兩二錢研細入前藥拌勻合成退火氣冷水調服每一二錢清火解毒清神辟穢色色俱備治温疫熱毒障氣極佳

人參清肌散

人參　白朮　茯苓　甘草炙當歸　赤芍　柴胡　乾葛　牛夏麴　加姜棗煎四君以補氣歸芍以養血營衛調則虛煩自退加柴葛者因潮熱無汗欲使陽明之邪從肌表出也

白朮除濕湯

人參　赤茯苓　甘草炙柴胡五錢白朮一兩生地黃　地骨皮　知母　澤瀉七錢每服五錢水二鍾煎一鍾去渣入後藥升麻羚羊角沈香木香丁香一兩並搗剉煎去渣入後藥朴硝各一斤提清入前藥汁中微火煎不住手將柳木攪候汁欲凝再入後藥辰砂三兩研細麝香一兩二錢研細入前藥拌勻合成退火氣冷水調服每一二錢清火解毒清神辟穢色色俱備治温疫熱毒障氣極佳

人參清肌散

人參　白朮　茯苓　甘草炙當歸　赤芍　柴胡　乾葛　牛夏麴　加姜棗煎四君以補氣歸芍以養血營衛調則虛煩自退加柴葛者因潮熱無汗欲使陽明之邪從肌表出也

白朮除濕湯

人參　赤茯苓　甘草炙柴胡五錢白朮一兩生地黃　地骨皮　知母　澤瀉七錢每服五錢水二鍾煎一鍾去渣入後藥升麻羚羊角沈香木香丁香一兩並搗剉煎去渣入後藥朴硝各一斤提清入前藥汁中微火煎不住手將柳木攪候汁欲凝再入後藥辰砂三兩研細麝香一兩二錢研細入前藥拌勻合成退火氣冷水調服每一二錢清火解毒清神辟穢色色俱備治温疫熱毒障氣極佳

人參清肌散

人參　白朮　茯苓　甘草炙當歸　赤芍　柴胡　乾葛　牛夏麴　加姜棗煎四君以補氣歸芍以養血營衛調則虛煩自退加柴葛者因潮熱無汗欲使陽明之邪從肌表出也

白朮除濕湯

人參　赤茯苓　甘草炙柴胡五錢白朮一兩生地黃　地骨皮　知母　澤瀉七錢每服五錢水二鍾煎一鍾去渣入後藥升麻羚羊角沈香木香丁香一兩並搗剉煎去渣入後藥朴硝各一斤提清入前藥汁中微火煎不住手將柳木攪候汁欲凝再入後藥辰砂三兩研細麝香一兩二錢研細入前藥拌勻合成退火氣冷水調服每一二錢清火解毒清神辟穢色色俱備治温疫熱毒障氣極佳

人參清肌散

人參　白朮　茯苓　甘草炙當歸　赤芍　柴胡　乾葛　牛夏麴　加姜棗煎四君以補氣歸芍以養血營衛調則虛煩自退加柴葛者因潮熱無汗欲使陽明之邪從肌表出也

白朮除濕湯

人參　赤茯苓　甘草炙柴胡五錢白朮一兩生地黃　地骨皮　知母　澤瀉七錢每服五錢水二鍾煎一鍾去渣

一兩加巴霜十粒姜三片臨卧白湯嚥服
但用二母力亦淺薄古方加巴霜十粒尤爲
不倫
利膈湯
薄荷　荆芥　防風　桔梗　甘草　人參
牛旁子　炒等分爲末每服二錢或加姜蚕
痰火閉塞故咸咽痛寒凉過抑益之病耳此
用輕清解散之法全不用寒凉最爲妙法

甘桔湯
甘草二兩　桔梗一兩或等分
甘桔二味爲咽喉必用之藥至於加味之法
則當隨症而施
玄參升麻湯
玄參　升麻　甘草　等分
元參清上焦浮游之火升麻升陽而解毒甘
草清熱而解毒藥只三味簡而能到

消斑青黛飲
青黛　黄連　犀角　石膏　知母　玄參
梔子　生地　柴胡　人參　甘草
加姜棗煎
消毒化斑頗爲有力若實火熾盛則地黄人
參尚宜酌減
玉屑無憂散
玄參　黄連　荆芥　貫衆　茯苓　甘草
山豆根　砂仁　消石五錢研砂　寒水石三錢
爲末每一錢先挑入口徐以清水咽下
此治實火實痰之重劑若虛火聚於咽喉閉
結不通者萬不可用
香連丸
黄連二十兩吳茱萸十兩同炒去茱萸用木香四兩
飲下　八錢醋糊丸米
裡急後重者氣不通也此亦苦降辛開之法

白頭翁湯

白頭翁二兩　秦皮　黃連　黃柏三兩

香連丸治氣分不通之後重此則治熱傷營血之後重故但清降而不用氣分藥

腎熱湯

磁石煅紅　牡蠣鹽水煮　白朮炒五兩　麥冬　芍藥四兩　甘草一兩　生地汁　蔥白　大棗十五枚

分三服

清寒重鎮所以欵陰退火加以健脾和胃故為有制之師

辛夷散

辛夷　白芷　升麻　藁本　防風　川芎　細辛　木通　甘草　等分為末每服三錢茶調下

辛散太過峻風散寒則宜之非瀉火門中之法

蒼耳散

白芷一兩薄荷　辛夷五兩　蒼耳子炒二錢五分　為末食前葱茶湯調下二錢

鼻淵一症有為火燥有為風乘有為寒侵種種不同此但可施於風乘者耳亦非瀉火門中之法也

二陳湯

半夏姜製二錢　陳皮去白　茯苓一錢　甘草五分

加姜煎

痰之為病最烈痰之為病亦最多積濕與鬱火二者為生痰之大源其餘或因風或因寒或因氣或因食變怪百出隨感而生難可枚舉治痰大法濕則宜燥火則宜清風則宜散寒則宜温氣則宜順食則宜消二陳湯為治痰之主藥以其有化痰理氣運脾和胃之功也學者隨症加減因病而施則用之不窮矣

潤下丸

廣陳皮去白八兩　鹽水浸洗甘草二兩　蜜炙　蒸餅糊丸

此治痰而兼停飲者。

桂苓甘朮湯

茯苓四兩　桂枝　白朮二兩　甘草一兩

此治痰而兼有風者。

清氣化痰丸

半夏薑製　胆星一兩　橘紅　枳實麪炒

杏仁去皮尖　括蔞仁去油　黃芩酒炒　茯苓各一兩

薑汁糊丸淡薑湯下

此治痰而兼有火者。

順氣消食化痰丸

半夏薑製　胆星一兩　青皮　陳皮去白　萊菔子生用

蘇子炒　山查炒　麥芽炒　神麯炒　杏仁去皮尖研　各一兩　姜汁糊蒸餅爲丸

此治痰而兼有食者。

清肺飲

杏仁去皮尖　貝母　茯苓一錢　桔梗　甘草　橘紅五分　加姜煎

此治痰而兼有濕火者

金沸草散

旋覆花　前胡　細辛一錢　荆芥一錢五分　半夏五分　茯苓六分　甘草炙三分　加姜棗煎

此治痰而兼疎風者。

百花膏

百合　款冬花　等分蜜丸

此治痰而兼清熱者。

三仙丹

南星麯　半夏麯四兩　香附二兩

此治痰而兼理氣者。

半夏天麻白朮湯

半夏薑製　麥芽一錢五分　神麯炒　白朮炒一錢　茯苓　陳酒浸

人參　黃芪蜜製　陳皮　茯苓　澤瀉
天麻五分　乾薑三分　黃柏二分酒洗　每服五錢
此治痰而兼息風者

茯苓丸

半夏麴一兩　茯苓一兩　乳拌　枳殼五錢麩炒　風化硝二錢五分
薑汁糊丸

此治痼結之頑痰非大實者不可輕投

控涎丹

甘遂去心大戟去皮白芥子　等分爲末糊丸臨臥姜湯服

此治痰而兼遂水者亦不可輕用

三子養親湯

紫蘇子　白芥子　萊菔子　各微炒研煎服

此治痰而兼息風清心者

滌痰湯

礬石滾痰丸

青礬石一兩沉香五錢大黃酒蒸黃芩各八兩右將礬石打碎用朴硝二兩同入瓦礶鹽泥固濟晒乾火煅研末和諸藥水丸

此治實痰實火者

半黃丸

胆星　全蝎去足焙　蟬蛻二錢五分　牛黃　白附子
殭蠶洗焙　防風　天麻一錢五分　麝香五分　煮棗肉和水銀五分細研入藥末爲丸荆芥姜湯下

此治痰而兼息風清心者

辰砂散

辰砂一兩　乳香　眞仁五錢　温酒調下

此治痰而兼定驚者

白金丸

白礬三兩鬱金七兩　薄荷糊丸

此治痰而兼鬱解鬱者

青州白丸子

白附子生用南星生用半夏水浸生姜生用二兩　川烏去皮臍生用五錢

生爲末絹袋盛之水擺出粉末盡再搖再擺以盡爲度貯磁盆日晒夜露春五日夏三日秋七日冬十日晒乾糯米糊丸

如菜豆大每服二十九姜湯下

此治痰而兼祛風者

星香散

膽星八錢木香二錢爲末服

此治痰而兼行氣者

常山飲

常山燒酒炒二錢　草菓煨栝樓　知母　貝母一錢

烏梅二個姜三片棗一枚牛酒牛水煎露一宿

日未出時面東空心温服

此治痰而兼分陰陽者瘧不可截用此方者則痰濕俱生於是爲積聚爲脹滿爲瀉痢種種諸病從此而起

每貽後患大率邪伏於內脾氣受傷致成脹滿者多矣

截瘧七寶飲

常山酒炒　草菓煨栝樓　青皮　厚朴　陳皮　甘草等分用酒水各一鍾煎熟絲綿蓋之露一宿于當發之早面東温服

較前方之用知母烏梅者稍可然亦非正法也

平胃散

蒼朮酒浸二錢厚朴姜炒二錢陳皮去白甘草炙一錢　加姜棗煎

人非脾胃無以養生飲食不節病即隨之多食辛辣則火生多食生冷則寒生多食濃厚則痰濕俱生於是爲積聚爲脹滿爲瀉痢種

種俱見平胃散乃治脾胃之聖劑利濕化痞消脹和中兼治時疫瘴氣燥而不烈故爲消導之首方

枳朮丸

白朮三兩土炒　枳實麩炒一兩　爲末荷葉包陳米飯煨乾爲丸

一補脾一去實簡當有法勿以其平易而忽之

保和丸

山查三兩神麴炒　茯苓　半夏一兩　陳皮　萊菔子微炒　連翹五錢　麴糊丸　麥芽湯下

此亦和中消導之平劑惟連翹一味可以減去

健脾丸

人參　白朮土炒二兩　陳皮　山查一兩五錢　神麴麴糊丸　米飲下　麥芽炒一兩　枳實三兩

此乃補中用消之法正其善於用補也否則滯濁之氣不清縱有補劑必且格而不入矣

枳實消痞丸

枳實麩炒　黃連姜汁炒五錢　厚朴姜炒四錢　半夏麴　麥芽炒　人參　白朮土炒甘草炙　茯苓三錢　乾姜二錢　蒸餅糊丸

此方隹處全在姜連苦辛便能平木否則全不關照肝經主治條下右關脇弦一語其謂之何

痞氣丸

黃連八錢　厚朴五錢　吳茱萸二錢　白朮土炒　黃芩二錢　茵陳酒炒　乾姜炮　砂仁一錢五分　人參　茯苓一錢　澤瀉一錢　川烏炮　川椒炒五分　桂　巴豆霜四分　蜜丸　燈草湯下

攻補兼行而又苦辛開降頗有意義惟川烏巴霜則斷不可用

葛花解醒湯

葛花　豆蔻　砂仁一錢　木香一分　青皮　陳皮　人參　白朮炒　茯苓四分　神麯炒　乾姜　豬苓　澤瀉三分

補脾利濕又兼快胃故能治吐瀉痞滿等症用葛花者所以解酒毒

鱉甲飲

鱉甲醋炙　白朮土炒　黃芪　芍藥　白芍酒炒　柾柳草菓麵煨　厚朴　陳皮　甘草　等分姜三片棗一枚烏梅少許煎

此亦攻補並行之劑但欲去瘧母故以鱉甲爲君耳

赤石脂禹餘糧湯

赤石脂　禹餘糧　等分杵碎煎

利在下焦者小腸之水不從膀胱化出也故仲景有服此湯復利不止當利其小便之訓此亦滿中寓溫之法加入補氣補血之藥於

訶子飲

御米去帶蜜炒五分　訶子去核七分　乾姜炮六分　橘紅五分

右末空心服

眞人養藏湯

罌粟殼去帶炙三兩六錢　訶子麵裹煨一兩三錢　木香二兩四錢　肉豆蔻麵裹煨一兩五錢　肉桂八錢　人參　白朮炒　當歸六錢　白芍炒一兩六錢　生甘草一兩八錢　每服四錢

此亦滿中寓溫之法加入補氣補血之藥於久病正虛者尤宜

當歸六黃湯
當歸　生地　熟地　黃芩　黃柏　黃連等分黃芪加倍
此氣血平補而兼瀉火之劑並無澀藥不宜收入濇門
牡蠣散
牡蠣煅研去黃蓍　麻黃根一錢浮小麥百粒　煎服固表清煩即以止汗此法是也

柏子仁丸
柏子仁炒研去油二兩　人參　白朮　半夏　五味子　牡蠣　麻黃根一兩麥麩五錢
棗肉丸米飲下五十丸日三服
養心陰而實肌表故能補虛止汗
茯菟丹
菟絲子十兩五味子八兩石蓮肉　白茯苓三兩將菟絲用酒浸浸過餘酒煮山藥山藥六兩

糊爲丸
亦補腎澁精之平劑腎氣虛寒者可用若有火者則菟絲尙宜酌易
治濁固本丸
蓮鬚　黃連二兩黃柏　益智仁　砂仁　半夏薑製茯苓一兩猪苓二兩甘草炙三兩
寓澁於利用意甚佳濕熱不去則濁無止時徒用澁藥反致敗精塞竅矣

水陸二仙丹
金櫻膏蒸膏一觔蒸熟爲粉芡實一觔蒸熟爲粉和丸
亦能澁精固氣但力量甚薄尙須加味
金鎖固精丸
沙苑蒺藜炒　芡實蒸　蓮鬚二兩龍骨酥炙　牡蠣鹽水煮一日一夜煅粉一兩　蓮子粉爲糊丸
潛陽納氣火不動則精宮自固矣
人參楮皮散

人參　樗根白皮東引者去粗皮醋炒　等分爲末米飲或酒調下日久血虛濕退者方可。若濕熱尙重則留邪爲害。

桑螵蛸散

人參　茯苓　遠志　石菖蒲鹽炒　桑螵蛸鹽炒　龍骨煅　龜板酥炙　當歸　等分爲末臨卧服二錢人參湯下

交通心腎。去虛熱而固精。此方最佳。

烏梅丸

烏梅三百個細辛　桂枝　人參　附子　炮黃柏　六兩黃連一兩乾薑十兩川椒　當歸四兩

苦酒浸烏梅一宿去核蒸熟和藥蜜丸

無濕不生觀腐草爲螢可知也殺虫之中。兼燥濕利濕之法非深達本源者能之乎。

集效丸

大黃炒一兩五錢　鶴虱炒　檳榔　雄黃　檳榔　白礬　枯礬　乾薑炒　附子　七錢五分　湯下婦人醋湯下　醋苦殺虫。亦屬正法。

雄槨丸

雄黃　檳榔　白礬　等分飯丸每五分食遠服

藥性稍烈。虛人忌之。

化虫丸

鶴虱　胡粉　苦楝根東引者去皮　檳榔　使君子　五錢　枯礬　二錢五分　爲末酒煮麵糊作丸量人大小服之亦是殺虫之法。但不如前二方之爲佳。

使君子丸

使君子去殼二兩　陳皮　檳榔一兩　生米用麥芽一勺炒　食茶葉用茶葉炒　右藥合妙如食

土川炭土炒取藥爲末蜜丸每晨沙糖水送下
於殺虫之中從其類而餌之治法殊妙
獺肝丸
獺肝一具陰乾爲末水服二錢日三次
以幽通幽而又能隨月盈縮故獨爲靈異
消渴殺虫方
苦楝根　取新白皮一握切焙入麝香少許

煎空心服
虫病消渴症不常有麝香丸屬非宜

滋陰地黃丸
熟地一兩　生地一兩　山藥一兩　丹皮一兩五錢　茯苓一兩七錢五分　柴胡八錢　黃芩酒炒
當歸酒洗五錢　天冬　地骨皮　五味子　人參
黃連酒炒三錢　枳殼麩炒三錢　甘草炙　蜜丸
養陰補血兼清風火用五味子所以收耗散之氣而使瞳神復舊也

加減駐景丸
枸杞子　五味子　車前子炒二兩　川椒炒一兩　熟地　當歸五兩　兎絲子　入兩酒浸　蜜丸酒下
方法甚佳惟川椒一味辛辣耗氣必須減去。
定志丸
遠志　菖蒲二兩　人參　茯苓一兩　蜜丸硃砂爲衣張子和方無菖蒲加茯神柏子仁棗仁亦

名定志丸酒糊丸
定志丸以張子和之所加者爲佳。
地芝丸
生地焙　天冬、四兩　枳殼炒　甘菊花去帶二兩　蜜丸茶清或酒下
枳殼一味並非欲其寬腸去滯欲其合甘菊使藥力上行也
人參益胃湯

黃芪　人參一兩　甘草炙　入錢　白芍炒　黃柏酒炒　三錢　蔓荊子二錢每四錢日二服

此方極妥善但於內障一層尚少着意加穀精石決斯爲得耳

消風養血湯

荊芥　蔓荊子　菊花　白芷　麻黃　防風　桃仁去尖　紅花酒炒　川芎五分　當歸酒洗　白芍酒炒　甘草炙五錢　石決明

日赤腫痛自宜疎風清火川芎一味辛散太過宜減去加蟬衣桑葉芎皮

洗肝散

薄荷　羌活　防風　當歸　川芎　梔子　大黃　甘草炙　等分爲末每服二錢

有六黃之寒下則川芎在所不忌

補肝散

夏枯草五錢　香附一錢每服五錢臘茶下

肝無補法養血便是補肝此方但行氣而不養血名此名矣

撥雲退翳丸

當歸一兩　川芎五錢　地骨皮　蜜蒙花　甘菊花　羌活　一錢五分　天花粉　蔓荊子　枳實五錢　黃連　蛇蛻　蟬蛻三錢　蜜丸

去川椒蛇蛻加薏仁石決爲宜

石膏羌活散

羌活　荊芥　白芷　藁本　細辛　川芎　蒼朮　甘菊　蜜蒙花　薄荷　木賊一兩　川椒　木賊　黃芩　石膏　甘草炙五錢　等分爲末每服一二錢

但有辛散並無滋養非法也

防風飲子

黃連炒　甘草炙人參一錢　當歸一錢五分　蔦根

防風五分細辛 蔓荆子二分食後服
此較前方爲勝以其有人參一味也
羊肝丸
夜明砂淘淨蟬蛻 木賊去酌當歸一兩酒洗羊肝四兩
搗爛爲丸
以目入目且能散瘀去障故爲有法
兎矢湯
兎矢二錢 茶清調服

兎矢一味甚有意但須加養血藥

表實六台湯
四物湯四兩每兩麻黃 細辛五錢
胎前有病若至危急方顧母而不顧子否則雖有外邪必不可傷損胎氣如此症表實無汗雖從太陽發表例而必用四物乃正法也
膠艾湯
阿膠 芎藭 甘草二兩艾葉 當歸三兩
芍藥四兩乾地黃 水五升酒三升煮取三升內阿膠烊化
有四物以補血而又加膠艾以和陰陽故爲止崩漏腹痛之良法
鉤籐湯
鉤籐勾 當歸 茯神 人參 桔梗一錢桑寄生五分
息風清火兼通筋節妙在安養心神所以能

保胎氣
羚羊角散
羚羊角屑二錢 獨活 防風 芎藭 當歸
棗仁炒 茯神 杏仁 苡仁各五分 木香 甘草二分加姜煎
息風清火致爲有法若去苡仁加貝母亦可
紫蘇飲
蘇葉一錢 當歸七分 芎藭 芍藥 人參

陳皮　大腹皮五分　甘草二分　加姜煎　腹痛加木香延胡索
胎氣上逆自覺中下氣加木香者猶可加
元胡索則不可以其破血礙胎也
天仙藤散
天仙藤卵生木香香附炒烏藥　陳皮
甘草炙等分加紫蘇三葉木瓜生姜各三片
空心煎服
疎通血氣兼以去風不加利濕藥者恐傷胎
也

白朮散
白朮一錢　陳皮　茯苓皮　大腹皮五分
薑皮
爲末米飲下
健脾和胃使水氣從皮膚而出故消腫而不
礙裡
竹葉湯
麥冬一錢五分　茯苓　黃芩一錢　人參五分　淡竹葉十片
清心解煩養正補虛節節入解
紫菀湯
紫菀　天冬一錢　桔梗五分　甘草炙　桑白皮
杏仁三分　竹茹二分　人蜜溫服
清潤肺氣亦爲平妥
參朮飲
當歸　熟地　苓藥　人參　白朮
甘草炙　陳皮　牛夏　加姜煎空心服

調養榮衛化痰理氣清升濁降則胎與胞自
安矣
黑神散
熟地　歸尾　赤芍　蒲黃炒　桂心
乾姜炒　甘草四分　黑豆炒去皮　牛膝升
便各牛煎
此方當去熟地加桃仁方爲得力
失笑散

蒲黃　五靈脂　等分爲末
産後以去瘀爲最要此方得之
清魂散
澤蘭葉　人參　三分　川芎　五分　荆芥　錢　甘草　炙　三分
爲末温酒調下
荆芥乃治血暈之聖藥調氣血而去外風則
神自清矣
返魂丹

五月五日六月六日或小暑日益母草花正
開時連根採收陰乾用花葉及子石臼搗末
蜜丸或搗汁于砂鍋内文武火熬成膏服忌
鐵
去瘀生新則有之畢竟去瘀之力倍於生新
産後用以去惡露則可若謂其有種種功效
未免譽之太過
當歸羊肉湯
黄芪一兩　人參　當歸三錢　生姜五錢　用羊肉一
勛煮汁去肉入前藥煎服
肉血有情補形補氣故元氣斂而汗自收
當歸散
當歸　芎藭　芍藥　黄芩一勛　白术半勛
爲末酒調服
養榮血清血熱健脾胃而安胎懷孕者最宜
啟宮丸

芎藭　白术　半夏麴　香附　一兩
神麴五錢　橘紅　甘草一錢　粥丸
痰塞子宫不能孕育故以化痰行氣之法以
通其塞
達生散
當歸酒洗　芍藥炒酒　人參　白术土炒
紫蘇一錢　甘草炙二錢　大腹皮三錢　陳皮
入青葱五葉黄楊腦子七個煎

於以補氣血中。疎通流利使氣血不壅滯自無留難之患

猪蹄湯

猪蹄一隻　通草一兩　卽木通　煮食

潤而兼通較用王不留行及甲片者爲妥。

人參荆芥散

人參　白朮　熟地　酸棗仁　黨田　童便炙　羚羊角　枳殼　柴胡　荆芥　五分　防風

甘草　乾葛　當歸　桂心　三分　加姜煎於滋補之中用升散之法故風去而血不傷。良劑也。

柏子仁丸

柏子仁　去油　牛膝　酒浸　卷柏　五錢　澤蘭　續斷　二兩　熟地　一兩　蜜丸　米飲下

去卷柏加當歸丹參芫蔚子等爲佳

芎歸六君子湯

當歸　芎藭　人參　白朮　茯苓　甘草　橘紅　半夏　加姜煎

行血補氣而兼消痰則經水自無阻滯矣。

連附四物湯

四物湯　加香附黃連

黃連以清血熱香附以通厥陰不涼不燥最爲合法

固經丸

龜版　炙　四兩　芍藥　酒炒　黃柏　酒炒　黃芩　炒　二兩　香附　童便炒　一兩　梔子皮　炒　五錢　酒炒　棕皮　炒　一兩

龜版黃柏黃芩多服令人絕產此等方斷不可用。

升陽舉經湯

補中益氣湯加白芍黑栀子　姜三片棗三枚煎

升陽退熱調和氣血故亦能止崩漏。

如聖散
　櫻棚燒烏梅一兩　黑姜一兩五錢爲末每服二錢烏梅湯下
　氣不攝血當以補氣爲先截止太過猶不虛積瘀爲患乎
牡丹皮散
　丹皮　桂心　歸尾　延胡索三分　牛膝　赤芍　莪朮六分　三稜四分　水酒各半煎

去瘀破結本治瘕之正法惟體弱者宜配以正氣天香散
　香附八錢　烏藥二錢　陳皮　蘇葉一錢　乾姜五分
每五六錢煎
解鬱散氣血自流行再加當歸一味亦可
和氣散
　香附四兩　陳皮二兩　茯神　甘草炙一兩　爲末每服二錢

輕淺小方服之亦無害
固下丸
　楝皮一兩五錢　白芍五錢　艮姜煅黑　黃柏煅黑三錢　粥丸米飲下
　但可施於濕熱下注者耳若榮衛虧損者不可服
當歸煎丸
　當歸　熟地　白芍炒赤　芍炒　阿膠　續斷　牡蠣煅一兩　地榆炒黑三錢　醋糊丸米飲下

此治虛人之帶下尚當加氣分藥一二味
白芷散
　白芷一兩　海螵蛸二個煅　胎髮一錢煅　爲末酒調下二錢
胎髮一味極有意義用先天之血餘以治赤帶也

醫方論卷四終

潛齋簡效方序

古名臣大儒往往喜錄單方以關生民疾苦而世之醫者每爲舉鄙不足道何識量之不廣哉王君孟英謂一藥治病卽古之奇方葢一病原有一藥主治識之旣眞何須多品第病有可以常理測者夫婦與知其不可常理測者雖聖亦有所不能盡是以病機隱幻固非良手不爲功而病情奇怪有非單方不能治在昔歐公暴痢幾絕乞藥於牛醫李防禦治嘔拜官得方於下走誅醫理之難窮而藥之不可以貴賤爲優劣也卽今道光間吾杭皇甫心安家有狐能治病

以仙目之樂懷谷女方禡禖忽啼不止拍之則愈啼解衣視背見繡鍼微露其緒而鍼已全沒多醫治之雜以藥敷肉潰而鍼終不出狐令以慈石吸瘡口理極是也而亦罔效延至百日忽賣酒家聞之曰易耳第以銀杏仁去衣心杵爛菜油浸良久取油滴瘡孔中卽出移時果鍼透瘡口而鍼則已彎葢强拍入之也夫以狐而仙者豈智有不逮哉乃不爲慈石引而爲銀杏透眞理之不可測矣由此推之一病必有一藥主治洵非虛語而單方之不可忽也益信因出願體醫話一冊願體集爲康熙時史搢臣先生著其醫

方之後惟　四方博雅咸以利濟爲懷傳播秘方諒不吝教如荷匡余未逮隨時皆可續登跋予望之虛左以俟

癸丑長至日自記

潛齋簡效方目次附醫話
頭風
面皺
肺癰
痰哮
喉疹
口鼻病
耳目病
牙病
瘰癧
乳病
婦女諸病
小兒諸病
拘攣
鬼箭
魅惑
二陰諸病
臁瘡
腳氣附纏足方
癬
癜
瘤
大衄
痣
禿瘡
腋癰
多骨疽
惡瘡
移毒法
退毒法
消管法
殺蟲法
腋氣
杖丹
閃肭
瞽目
肝胃腹痛
截瘧膏
藥酒方
灸火論

勞病說附方
愼疾法
治疫方
解鴉片
勸醫說三則
穩婆說
救荒法
救火策
救火策續
寡欲說
交梨火棗湯
成方弊
辨指南十六條
論續名醫類案
溫熱經緯論暑略
忌暑證治附方三則
夏月傷寒略
瘰癧乳巖疔瘡祕方
治流注方
圍藥二方
刺瘧法

潛齋簡效方　杭州王士雄孟英輯

定州楊照藜素園鑒定　張性陶養之　同郡蔣寅敬堂參校　連自華書樵

治頭風，蓖麻仁乳香，研塗患處立愈。

天南星一個，艾五錢，煎湯熏之。

痛久欲失明者，川烏去皮細辛防風蝎稍等分，研細。薑汁調貼患處，若眉目牽引不正，貼太陽穴。

面上皺路，大猪蹄四枚洗淨，煮如膠，臥時用塗面上。

次早以漿水洗去，半月後，面皮細潔如童子。

肺癰，冬月醃芥菜滷貯壜，封埋土中，年久則清淡如水，略無鹹味，飲之甚效，或和淡腐漿服。

蕺草，俗名魚腥草，水煮不住口食之甚效。

金絲荷葉草擣汁，同生白酒數飲立效。

橘葉搗汁服，吐出膿血即愈。

經霜黃菊葉，絞汁冷服，亦治腸癰。

立秋後擇粗大絲瓜藤，或南瓜藤，掘起根三四寸，剪斷插餅中，其汁滴貯餅內，封埋土中，年久愈佳，兼治喉蛾哮喘。

柘黃，即柘樹上蕈，厚大而色黃者，用井水磨服，以愈爲度，或用鯉魚重四兩者一尾，去腸勿見水，入貝母末二錢縫好，童溺半椀浸之，重湯煮至晴出去鱗骨食之甚效。

痰瘧，浸溼海帶四兩，煎湯調飴餹服。

淡豆腐漿每晨飲之，兼治黃瘅。

漂淡陳海蛇煎湯，生蘆菔擣汁和服，兼治諸痰證。

燗喉時疹，錫類散，象牙屑，焙，廉珠各三分，飛青黛六分，梅花冰片三釐，壁錢，俗名喜子窠，二十個，角泥壁上板上者，勿用木者，西牛黃，人手指甲，男病用女，女病用男，各五釐，共研極細，粉吹患處，雖瀕死者可救，兼治乳蛾牙疳舌腐等證甚效。

蘆菔菜于初冬攤于屋瓦上，或挂樹枝上，任其風吹日曬雨洗霜凌，直至立春前一日收下，懸挂簷下有風無日處，陳久愈佳，煎濃湯服，冬春二季每晚食生蘆菔數片，可以免患喉證，或以橄欖蘆菔常煮湯代茶飲亦妙。

口舌糜爛，大紅薔薇葉焙燥，研末揉之，冬月用根，重舌用不蛀牙皂四五挺，去核炙焦，荊芥穗二錢，共爲細末，米醋調塗即消。

舌脹滿口。生蒲黃末搽上卽愈。舌卽以黑蒲黃末糝之。或以辰砂一錢。伏龍肝二錢。鴨子清調服。

舌脹出口。冰片一錢。研末敷之。或暗擲椀後于地。聞聲卽能舌出不收。辰砂末敷之。

驚入。

脣齶不止。栗子一個。連殼燒灰。硫黃等分研末和敷。

烟管戳傷咽喉。以龍眼核去黑皮焙擣極細。用筆管吹患處卽定。疼止血居家者。此藥須預備。凡小兒頭面磕撲。銅鐵戳傷諸患。亦以此敷之。愈後無瘢。仍生毛髮。

風寒鼻淵。蒼耳子辛夷花各三錢煎服。

風熱鼻淵。絲瓜藤近根二三五寸數株。曬燥燒存性爲末。每一錢陳酒下。

久吸蘭香烟成鼻淵者。白鴟脊骨燒烟薰洗之。

年久鼻淵煩勞則發者。名曰腦漏。宜瓊玉膏固本丸六味丸三才封髓丹之類久服自效。

諸物塞入鼻中而不能出者。緊掩兩耳。緊閉其口。不使通氣。以筆管吹其無物鼻孔。則所入之物自出。

諸物吸入肺管而不能出者。無藥可治。喘急而死。大概小兒或有此患。然不必驚慌。但捉兒兩足使倒懸。則所入之物一咳卽出。

肺風瘡。酒磨鹿角尖濃塗。久之自愈。

雀斑。鹿角燒灰。猪油調搽。

白附子生研。卧時以豆腐擦洗後。鷄子清調塗。

鼻齆不止。以本人鼻血紙撚蘸之。左齆者點右眼角。左右並齆者。點兩眼角內立效。

或以梔子炭研末。吹入鼻中立愈。

耳暴聾。木香研末。酒浸一宿。以酒滴耳中。少頃倒出。三次卽愈。

白蒺藜炒去刺爲末。蜜丸服。

靈磁石如豆大者一塊。同穿山甲煅研末。棉裹塞耳中。口含生鐵一塊。覺耳中如風雨聲卽通。

耳齆。龍骨末吹之。又炒黑蒲黃研末吹之。

耳聾。血餘一錢。冰片七釐。研勻吹之。

耳爛。燈心陳皮各一錢。燒灰。加冰片一分研吹。

頭風損目。以大川貝母一粒。白胡椒七粒。共研末。葱白汁丸如柏子大。以膏藥蓋貼太陽穴。目可重明。

赤眼。黃丹白蜜調貼太陽穴。止痛如神。

田中潔淨柔泥。搓丸拳扁。貼兩眼皮。一夜兩丸立效。如睡熟候醒方換。

芙蓉葉末。水和貼太陽穴。

芒硝荊芥穗泡湯溫洗。

黃連爲末。鷄子清調勻。左眼貼左足心。右眼貼右足心。

目翳。胡桃肉烏賊柿餅等分擣燔。開水調服。

目星。樟腦東丹等分研細。瓷器封貯。左目吹右鼻。棉塞之。隔宿卽退。右目仿此。

白蒺藜三錢。水煎。日洗三次效。

目障。鵝兒不食草川芎青黛各等分爲末。搐鼻取嚏。

遠年者亦效。

望江青。一名天脂麻一兩。羊肝一具。同豆腐煮食。

小兒疳氣攻目。鷄肝一具不落水。竹刀切片。用牡蠣粉入分。飛辰砂少許拌勻。糝入。飯鍋上蒸熟食之。

如此十次。翳障退淨。當時忌食茶湯油膩。

烟油入目。如將他物洗之。愈洗愈疼。甚至損瞎。須用亂髮緩緩揉之。自愈。不可嚥下。

天絲入目。頭垢點入眼內。卽出。又方雄鷄冠血滴入眼內。少頃看有紅絲。將燈心捲去。或用好墨磨濃。亦用燈心捲去。

塵芒入目。生藕洗擣。棉裹滴汁入目中。卽出也。

石灰擦眼。山扈子煎濃汁。不住手洗一二時辰。痛卽止。或用活五穀蟲淘淨。搗攤油紙上。用布紮好。七日不可動。藥自落。目無恙。

眼角出血。槐花炒焦煎服。

損目破睛。牛口涎每日點兩次。須要避風。黑睛破者亦瘳。

青盲。用二鹽砂三斗晒燥。每晨服三四錢。淡鹽湯下。

眼堂成漏。凡眼下生瘡。出膿流水不乾。日久成漏。諸藥不效。以柿餅去皮。取肉杵爛。塗匊旬日愈。

眼癬。用銀杏葉泡湯。少加枯礬末。溫洗漸愈。奇效。

牙疼。經霜西瓜皮燒灰。敷患處。牙縫內立效。

黑山扈葉泡濃湯熱漱。不痛乃止。

兒茶貼患處。流出風涎自愈。不可嚥下。

石膏火煨熟。入兩。白蒺藜去刺四兩。爲極細末。頻擦之。立愈。每日用之。可免此患。

葶藶一錢。川椒五分。石膏三錢。青鹽四分。共研細點患處。立愈。

青鹽蓬砂火硝樟腦各一錢。研末擦之。

馬蘭頭葉水溝或水缸內青苔共杵爛以棉卷之左痛塞左耳右亦然。

牙齒絲瓜藤炙灰擦之立止或用絲瓜絡亦可酒調下兼治腸紅。

草決明煎湯含之即止。

馬蘭頭杵爛塞患處立止。

槐花炒爲末搽之。

瘰癧俗名癆痺用天明精五六枝同鯖魚煮熟但飲其汁數次自愈。

羚羊角燒灰研細鷄卵清和塗兼治癍毒。

豬膽汁以臙脂邊一方滲透懸風處吹乾剪貼患處。

豆腐泔水一桶慢煮成膏頻頻塗之。

三桑葉曬乾爲末赤沙糖調服數兩自愈。

南星半夏等分爲末米醋或鷄子清調敷黃柏爲末豬油調塗。

活鮪魚一尾生山藥如魚長一段白糖三錢杵爛塗之。

土貝母研末陳米醋調搽。

牛皮膠一兩水熬化入土貝末五錢攤油紙貼之。

佛前舊羊角燈底焙存性研末麻油調搽。

田中螞蝗杵爛圍之即散。

活蝘一隻麻油一瓶浸三日取起曬乾爲末以鵝毛蘸油搽上初起者爲癌毋每日多搽幾次三五日即愈。

已潰者用牛皮油鞋底燒灰麻油調敷。

麵糊作餅貼于先潰之處再用小砂壺二把俱盛燒酒煎滾去酒以熱壺口覆于餅上熏之一壺冷又易一壺如此數次將毒拔盡則愈熏後用豬膽汁熬成膏貼之。

破爛多年不愈延及胸脇臭穢難聞雖十數載之頑證可用新石灰一塊滴水化開成粉以生桐油調勻乾溼得中先用葱椒湯洗淨瘡口塗數日即愈。

牛皮膠四兩牡蠣粉拌炒成珠去粉土貝母八兩共研末水法丸如綠豆大早晚用昆布海藻各一錢五分煎湯吞下三錢不論已破未破者加胡桃膈乳巖土貝母五錢煎服數日可消已破未破均效。

銀花連翹各三錢酒水煎服。

濱爛已久者用雄鼠糞經霜土楝子不用川楝露蜂房各三錢俱煅存性各取淨末和勻每服三錢酒下間二日一服即止痛收口

乳癖白芷雄鼠糞等分曝乾爲末好酒調服必多飲取一醺睡而愈

活鰑魚一尾鮮山藥如魚長者一段共搗爛敷患處以紙蓋之立愈

陳皮炒爲末黑糖調和開水送三錢七日而愈

蒲公英一兩銀花二兩酒水各一椀煎半椀加酒一小杯服之一醺可愈

乳吹砂仁去殼五分冬葵子八分共研末以蒲公英五錢梔蔞仁三錢煎湯調服數日即愈

穿山甲三片炒橘紅二錢水煎和酒服立愈

甘菊花根葉杵爛酒釀衝服渣敷患處立效

乳頭破爛龜板炙研末加冰片研勻麻油調搽

陰癢鷄肝或猪肝煮熟切一長條插入陰戶內過一宵取出數次乃愈

寶珠茶花焙研末麻油調敷內服治諸血證

夜次早取出數次乃愈

陰腫羌活防風煎湯薰洗

葱白研膏入乳香末拌勻敷患處

陰寬肥皂子浸去黑皮用其白肉加白茂五倍子蛇牀子石榴皮甘松山奈龍骨煎濃湯日日熏洗寬而冷者加石硫黃煎

陰挺飛礬六兩桃仁一兩五味子雄黃各五錢銅綠四錢末之煉蜜丸每重四錢卽以方內雄黃爲衣坐入玉門卽愈甚者不過二次

陰瘡陳蚌殼煅兒茶輕粉飛滑石入中白煅各三錢枯礬龍骨煅各一錢冰片三分共研麻油調搽

陰爛煅牡蠣飛滑石各三錢陳蚌殼煅二錢入中白煅一錢龍骨煅錢半冰片二分共研末糝之

房後陰痛地榆煮酒服

陰傷出血五倍子研末糝之或加血餘黃連白礬灰亦妙或以青布燒灰血餘等分研敷之

蛇牀子研末綿裹納陰中立效

小便不通生白礬末五釐入臍以一指甲水滴之

皂角煎湯洗陰戶

淋帶搖濁屬于濕熱者淡豆腐漿調六一散服亦治男子淋濁屬于陰虛火動者以生鷄子打散淡醋漿衝服亦治勞嗽欬血帶脈虛而不攝者海螵蛸粉魚鰾煮爛擣丸梧子大吞服自愈

血崩不止。淡腐漿一椀。韭菜汁半椀。和勻空心服。

棉花子。童便浸一宿。爲末。每一錢。側柏葉湯下。極效。兼治勞嗽吐血。

調經種子保胎丸。白茯苓二兩。白术土炒。條芩酒炒。香附童便炒。延胡醋炒。紅花隔紙焙乾。益母淨葉各一兩。眞沒藥三錢。瓦上焙乾去油。其研細蜜丸梧子大。每日七丸。白湯下。汎慾者服之。自調。不孕者服之。即安。胎動者服之。即固。若胎動者。每日可服三五次。胎滑者。有孕即宜配合。每日服之。勿斷。自然無事。亦且易生。但每次七丸爲則。不可多服一丸至囑。

慣於三月小產。諸藥不效者。日以梅梗三五條。綠萼梅樹上者尤良。煎濃湯飲。復飲龍眼湯甚驗。

南瓜蒂頻煎湯服。催生用荷辦一張。上書一箇入字。嚼而吞之立產。

車前子四錢。冬葵子三錢。炒枳殼二錢。白芷一錢。多日不下者。可煎兩服之。

六一散催生最妙。兼下死胎。並治熱產惡露不行。胎澀不下。用鮮猪肉三觔。煎清湯。吹去浮油。恣飲即產。

生牛膝一兩。酒浸杵爛。以龍眼肉六兩。煎濃汁。衝牛膝酒內。服之即產。

過月難產。用舊絹飾羅底一箇。捲筒燒椀內。白湯下即產。

盤腸生。以生半夏搐鼻中。腸自收。橫生。以益母草一兩。酒煎濃汁。和童便一大盞服。諸般難產。用陳麥稈。露天者尤妙。一兩洗淨。剪寸段。煎湯服。極效。

產下子腸帶出。切勿剪斷。致傷母命。以枳殼煎湯熏洗。即收。

胞衣不下。生鷄子清一枚吞之即下。

鮮荷葉濃煎服。良。或用伏龍肝末。醋調納臍中。

死胎不下。蓖麻仁三粒。巴豆仁四粒。麝香二分。同研成餅。貼產門上。交骨。其胎立下。即好胎至足月臨盆。久而不下之難產。亦可貼而即產。但勿用之稍早。恐有墮苗之害也。

伏龍肝一兩。研細。甘草湯調服。冷飲。能解諸般中毒。

產後小便不通。陳皮一兩。爲末。溫酒下二錢。

產後暈絕。生半夏末。冷水和。如豆大。納鼻中。灌以

熱童溺。薰以炭醋立甦。

產後虛弱。豆腐漿一椀。衝入打散生鷄子一枚。再加豆腐皮一張龍眼肉十四枚。白沙糖一兩同滾透。五更空心服。蓋產後失調。往往延成勞損。而貧戶醫藥無資。富家每爲藥誤。特采此方甘平和緩。補血滋陰。貧富皆宜。允爲妙劑。

小兒初生。以猪膽汁一枚入湯浴。永不生瘡。

初生無虎泥地上臥一宿。卽生。冬月以白米粉燥撲之。候皮生乃止。

小兒開口。不宜太早。須生下一周時。以大黄黄連生甘草等分泡汁飲數匙。然後喫乳。

初生小兒。兩目紅腫赤爛不開。以蚯蚓泥杵塗顖門。乾則易之。三次必愈。

生南星生大黄等分爲末。醋調塗兒兩足心。雖月內亦可用。

初生驚風欲死。米砂磨新汲水塗手足心。

初生小兒便秘。一味生大黄泡濃汁飲之。小便不通者。用清明插簷朝南楊柳枝煎湯服。亦治大人溺閉。

遊風伏龍肝爲末。鷄子清和塗。乾則易之。如治浸淫瘡以猪脂和傅。

胎毒胎瘡。臙脂膽礬黄柏東丹等分研末。菜油調搽。水邊柏樹根白皮晒研。入雄黄末少許。生油調搽。

醫藥無資。富家每爲藥誤。特采此方甘平和緩。補稀痘法。生黄豆生綠豆生白扁豆或亦可黑豆生甘草銀花等分。常煮湯代茶飲。

橄欖核七箇。打碎去仁。晒乾研極細末。不可見火。勿沾生水。再用玉蝶梅花二十一朵去蒂。加淨白蜜二茶匙。共擣濃。夾春分時與兒食之。永不出痘。

即出亦不過三粒。

蒸菜俗作甜菜卽菱菜一名滑菜一名蓬一名女菜性滑可浣油膩。煮而供蔬食妙。

小兒能食。卽以乾柿飯上蒸透嚼飯飼之。能稀痘。併免疳瀉諸疾。

免痘法。淨銀花一觔。生晒研末。淨白蜜丸如龍眼大。日日與兒服之。可不出痘甚驗。

蓖麻仁三十六粒。辰砂一錢研爛。再入麝香當門子五釐研勻。于端午日午時。塗小兒百會穴暨心窩處。余在宜黄見

越人王望沂少府云。其家用此法。已數世不出痘矣。

凡居窮鄉僻壤。值嬰兒發痘。不能迎醫者。須于微發熱時。用手蘸眞麻油摩其背脊。下至尻骨。如此數次。其熱自退。

痘疹不出。以及悶痘不發毒脹滿者。此係急證。用青蔗漿頻服。則痘立起。其寒散解毒之功。勝白鴿蚯蚓多矣。

疹發不出。頭面腫脹。氣喘垂危者。用大葱頭杵爛。放在大銅盆內。上用木架架之。再以大被單罩蓋停當。人抱定小兒睡在上面。然後將沸湯衝入葱盆內。熱氣熏蒸。俟稍溫。卽抱出。切不可露一絲之風。直待汗乾。卽差。

悶疹。分開頂門。有紅筋紅瘰。挑破卽出。

疹疹咽喉腫痛。不拘初起囲後。用苦參三錢。白僵蠶二錢。研細吹入。

痘出眼內。新象牙磨水。滴眼內卽退。

兒生母中指上刺血一點。滴入眼內卽退。

痘瘡潰爛。用青茶葉滾水略泡。攤于草紙上。以絹蓋之。臥兒于上。任其展轉卽痂。

痘爛生蛆。以柳葉鋪而臥之。蛆盡出。

痘毒泡過茶葉晒乾爲末。五倍子等分。鷄子清調敷。極效。

痘疔。青蔗渣晒乾。眞香油點燈燒成灰。以津液調勻。銀簪挑破。點之立效。

諸瘡。南天竹煎湯頻服。

蟑螂去頭足翅。焙乾與食。瘡愈則不要食此矣。

使君子肉二錢。雷丸檳榔各一錢。黑丑頭末五分。俱生曬研末。每服三分。以鷄卵一枚打破空頭。內藥紙封。飯上蒸熟食之。藥完病疼。

積滯。海蛇皀莊。常煮食之。兼治大人痰嗽及肝乘胃痛。浸燒酒飲。能消大人胸中痞塊。又紹興青腐乳作下飯。能消瘡積。治腹脹身黃。

臍風。釣藤鉤甘草各五分。水煎服。

驚風。八手指甲長寸外者。煎湯服。

開通元寶錢。以水磨服少許。神效。俗讀開元通寶者非

按俗謂驚風者。卽火動風生之癇癡也。金能制木。可息內風。國朝康熙通寶錢。照字作正楷。從臣不仿帖體。從臣作照者。乃乎西蔵時銘藏中佛相

所鑄故世謂之羅漢錢銅色如金俗又呼爲金錢
愚民往往私毀改爲首飾酷似眞金蓋其鑄佛之
時多雜金寶于銅內也入藥更勝遠僞開通元寶
之上。

小兒瘧疾不能服藥以黃丹五錢生礬三錢胡椒二
錢五分麝香五釐共末好醋調敷男左女右手心
絹包手掌藥熱汁出而愈一方可效三人未曾食
穀之兒欠瘧不已濃煎米糖湯服神效。

小兒久瀉身熱最危以炒黑松花一錢炒紅麴二錢
共研分二服白糖湯調下。

暑風取淨黃土鋪地上以芭蕉葉爲薦臥兒於上飲
以益元散鮮竹葉湯調立效小兒體弱夏月最多
此證切勿誤認爲驚妄投峻藥。

痾證俗呼羊癲風用經霜老茶葉一兩明礬五錢爲
細末水法左辰砂爲衣每三錢開水下三服全愈。

又方用二陳湯加青皮丹皮石菖蒲辰砂爲劑甚
效。

手足拘攣用草本水楊柳酒煎服。

鬼箭風用野苧蘇天南星同搗敷。

狐魅以珠蘭花根搗爛塗陰上但此花根有毒勿入
藥服狐沾之卽死也。

邪氣蠱惑以黨甲蒼朮燒之卽安。麝香一二兩佩
之良。

便毒以棉地榆四兩穿山甲二片土炒白酒三椀煎
一椀空心服雖有膿者亦愈。

全蠍貫衆生礬等分爲末空心調服一錢。

棉地榆四兩生甘草銀花各一兩白芷三錢皂角
刺二錢五分水二椀煎減半空心服。

胡桃二箇連殼杵碎澤蘭白芨松蘿茶各三錢井
水河水各一椀煎取四分和酒服一劑知二三劑
愈將附治驗

陰囊腫痛蔥白乳香搗爛塗之。

硼砂一分水研塗之。

棉子仁煎湯洗之。

葛年青根搗汁熱酒衝服。

腎囊風鷄子黃炒出油搽之。

陰囊濕腫紫蘇柴背浮萍各一兩水煎熏洗。

囊瘡作爛六一散四錢赤石脂二錢紫蘇一錢五分
兒茶一錢共爲末糝之。

腎囊皮爛龜板炙存性研入冰片少許麻油調塗卽

愈。

囊癰初起以獨核肥皂數箇用乳香四兩裝入外將經草紙包煅火須先文後武以烟盡爲度出火氣研末每服一錢五分三服卽愈。

疝氣乾荷葉帶二十一箇炒焦海金砂三分好酒一碗煎一滾乘熱服以醉爲度卽愈。

鷄子殼燒灰爲末空心溫酒下二服卽愈。

牛蒡子根葉搗爛絞汁和好酒服之覆被出汗永不再發。

精滑善遺牽轉白牛法最妙其法不拘布帛敝一小兜將外腎兜起拴在腰後褲帶之上此病自免道家謂之張果老倒騎驢或以刺蝟皮焙研黃酒調早服。

又靈雪丹甘草薄荷甘遂朝腦蘇葉陽起石各三錢共研末碗盛紙糊口細錐紙上密刺小孔另用楪復碗上碗邊寬餘半指黑豆麪同濟砂鍋底鋪粗砂加水坐碗砂上出水一寸炭火煮五炷香水耗常添熱水香完俟水冷取出入研細麝香少許人乳浸化蟾酥少許蔥湯和丸如麥餅封收用時以唾津在掌上研半丸塗玉塵頭上一時塵頂酥麻便是藥力透徹凡遺泄不止夢在危急者先燥此丹保固腎精子日落時研塗卽能秘精一夜不泄再用湯丸調治。

老年夜多遺溺晚食稜米糍卽效若溺時玉莖痛而仍頻數不赤者生黃耆一兩甘草二錢煎服甚者二日二服卽愈。

下疳先以大小薊地骨皮煎湯洗淨再用黃栢黃芩官粉珍珠冰片研細敷之立效。

楸櫬燒存性白螺螄殼右泥墻上者浸去泥醋煆各一錢研末加冰片一分研勻麻油調搽塗者糝之須先用甘草花椒湯洗。

鮮小薊鮮地骨皮各五兩煎濃汁浸之極痛者不數口而愈。

鮮豨薟草葉貼之。

黃花薔薇葉焙研糝之。

楸櫬燒灰研細末糝之。

二便不通皂角末齒白連鬚加麝香二分蜜少許杵貼臍下至毛際再以韭地蚯蚓泥搗和水澄清飲之尤妙。

坐板瘡松香五錢雄黃一錢五分研細和勻以棉紙

包裹煻成條臘月猪脂浸透點火燒著取滴下油搽之立效。

藤黃搗碎糝在雄猪網油之上以青布一長條捲緊線紮浸菜油內一夜取出火燃取滴下油以杯承之埋土中一宿去火氣塗上卽愈。

甘蕉皮燒存性研麻油調搽。

臀癬芙蓉葉晒研胡椒焙研各二錢野苧根一兩蔥頭七個酒糟兩許共杵爛加米醋和敷卽消。

脫肛萬年青連根煎湯洗川五棓子末敷之或先以麻油潤之再用風菱殼煎湯洗之

鼈頭煆存性研加冰片糝之立收。

腸風痔血棉花子炒黃黑色去殼爲末陳米濃汁加黑沙糖丸如梧子大每晨開水送三錢服三勫斷根。

生豆腐渣鍋內炒燥爲末每服三錢白沙糖湯下日三次遠年垂危者亦效。

瓜子殼一味煎濃湯服立愈兼治吐血。

鴉膽子取圌圇仁每七粒以龍眼肉包之每服三包白湯下重者日三服忌葷酒戒鴨肉兼治休息久痢極效。

柿餅煆存性研再以煮爛柿餅杵和丸如梧子大仍以柿餅湯下久服神效王道法也。

久瀉不痊生慈杵爛入黃丹爲丸如豆大填臍中外以膏藥封之。

陳火腿煆存性研鍋心飯焦各三錢炒松花一錢米糊丸參湯下。

痢疾肛門腫脹如痔狀冰片研細乳調搽或以木鱉子五棓子共研調敷。

臁瘡白蘞蔴打爛貼患處瘡口上一日一換三日毒血去盡再用松香一兩杏仁三十粒去皮細黃丹八錢輕粉五錢舊羊角燈底刮末二錢共研極細麻油調搽一日一換數日卽痊。

慈鹽湯洗淨拭乾馬勃粉傅之良。

黃蠟白蠟輕粉韶粉乳香等分爲末臘月猪板油麻油各半化勻調前藥攤薄油紙貼之兼治血風瘡之久不結痂者。

先以鹽湯淋洗用帛拭乾后以白糖霜津唾塗數生豆腐渣揑成餅如瘡之大小先用清茶洗淨絹帛拭乾然後貼上以帛束之一日一換痂漸小肉漸平而愈亦可貼脚蛙但勿落生水。

龜板炙爐甘石煅各三錢輕粉二錢冰片一二分共研細末麻油半杯銅銚內熬滾入白蠟黃蠟各二錢溶化離火將凝入前藥末攪勻攤油紙貼患處以葱椒甘草湯洗一日一換

鹿角灰乳香末研勻清油調敷用清涼藥不效者宜之

柿葉燒存性仝川椒研末搽之

生豆腐渣柿餅同搗爛貼患處以帛束之立效

黃牛矢曬燥煅黑四兩烟膠末一兩共研少加冰片香油調搽蔣附治驗

腳氣俗呼流火以大張海蛇皮包之乾則易

生煤炭研極細醋調塗之

樸硝大黃寒水石牙皂爲末鷄子清調敷

人中黃研細芭蕉根汁調塗

蘆菔煎湯洗之仍以蘆菔晒乾爲末鋪患內

馬前子一個以粗碗底磨水用鷄毛掃遍日掃五七次立效兼治痔瘡

不論男女濯足宜頻濯時水中宜加入鹽滷一瑽生足疾且無踹蹶之患皆閨閫中秘方也

纏足生瘡用甘草湯洗淨以荆芥燒灰研細蒸白汁調搽

諸癬龍眼核醋磨塗之

大黃藤黃雄黃硫黃薑黃等分爲細末蒸油調塗

于李後主乃于續齊諧中云其矯揉造作壽流天下後世是以永墮泥犁之獄誠深惡而痛恨之也然余見北齊刁玉奴雲峯山四疏內有規奴雙趾持之而生憐之句則南北朝已有纏足之風袁又云俗有火化其父母之骸以爲孝者遂有裹小其女子之足以爲慈者敗俗傷風事同一例無如相沿成俗雖我 朝之仁政不能革其陋習良可歎也不得已采李瀕湖本草綱目內閨閣事宜一方于此帙聊紓玉趾之疼易效蓮鉤之式不致呼號慘切免其戕賊成勞惟願仁人廣爲傳播用經屢效洵是神方桑根白皮四錢肥皂子浸去黑皮二錢杏仁一錢水五椀薪餅煎至三椀入樸硝五錢乳香一錢封口煎烊置足于上先熏後洗三日一作十餘次後輭若束棉也束時以羅細生白礬末少加白洋糖糝之每于洗足湯中入鹽滷一杯不生足疾且無踹蹶之患皆閨閫中秘方也

調搽

大黃藤黃雄黃硫黃薑黃等分爲細末蒸油調塗

患處。兼治腳上鷄眼。

喫髮癬。煨石膏末。糖調塗之。蘆薈龍膽草浸油搽髮。

或加秋葵花尤妙。

鵝掌癬。豆腐泔水。日日頻洗。

牛皮癬。桃樹根白皮。同膽礬杵爛敷。

紫白癜風。蘆薈汁調生礬末三錢。先以布擦損。塗之。

瘤贅。用甘草煎膏。筆塗瘤之四圍。塗三次。另用芫花草。次日卽縮小。又以甘草膏塗其外暈三次。再搽三末于其中。自然漸漸焦矣。

血瘤初起。以薄棉花剪如瘤大一塊。在鷄子清內浸。溼貼之。略乾。仍以筆蘸鷄子清潤之。勿斷。四五日卽消盡。

血痣潰血。消消不絕。諸藥不能止。用五靈脂爲末。糝上卽愈。

九竅及髮根出血。不因服毒者。名大衄血。乃極虛欲脫之證。急取泉水一桶。燒酒一觔。扶病人坐定。裸其腿。以燒酒淋之。俾酒從踝下。卽滴入水桶內。淋乳哺之。再用遼東紅旗海參他處者亦可用力較小耳一觔。切片焙爲末。每三錢。調服。日三次。蓋海參能生百脉之血。諸補藥之所不能及也。

禿瘡。紫蘇皮煆存性。研末。香油調搽。

舊羊角燈底。瓦上煆存性。研。麻油調搽。

鮮蠶豆擣如泥。塗之。乾卽易。三五次自愈。無鮮豆。以乾者水泡搗之亦可。

海螵蛸二兩。輕粉一兩。樟香三兩。共研細。油調搽腋癤腰疽。用糯米飯乘熱入鹽塊慈菇少許。杵極爛如膏。貼患處卽消。

多骨疽。白花芙蓉葉晒乾大黃五倍子各一兩。篩黃生礬各三錢。麝香冰片各三分。其爲末。米醋調如厚糊。塗其四圍。留中一頭如豆大。以醋用鵝翎埽之。若不塌。則無效。一日夜卽內消。并治一切癰癤。敷之並效。

一切惡瘡無名腫毒。用生豆腐渣于砂鍋內焙熱。看紅腫處大小量作餅子貼之。冷卽易。以愈爲度。

獨核肥皂生芋艿各一個。慈白七個。同搗爛敷之。乾卽易。過一周時。未成者卽散。已成者咯出膿卽愈。

烟管中油。塗之立散。兼治蠱脹。用油紙攤貼。

野苧根擣汁。醇酒和服。渣敷患處。露頭蓋被出汗。
卽出膿水而愈。雖發背對口亦可治。
大芋頭生杵爛。敷之。
龍眼核爲末。水調塗之。
大黃五錢。朮鼈土炒三錢。共研細末。醋調圍之。
老菱殼燒存性。油調塗。
白礬末。熱水調塗。
腦月煉淨豬板油一觔。入白蠟半觔化勻。再下好
樟腦四兩攪勻。瓷器收藏。勿令出氣。患處先以蔥
白花椒甘草猪蹄湯洗淨。用無灰棉紙攤膏貼之。

立治湯火傷及臙瘡濕毒久不愈者。神效無比。
泡過茶葉。杵如泥敷之。乾則以茶汁潤濕抹去。再
換五六次。卽愈。兼治蛇咬及火燒成瘡。
癰發背初起。甘草鹽滴煎湯洗卽消。
諸瘡潰爛不愈。朮耳焙乾研末。白砂糖等分。用溫
水調敷縛之。神效。
核毒法。以藤黃銀硃等分。醋和敷毒之半圍。卽移他
處出毒。
弩肉不退。硫黃研細末。敷上卽退。再用泡過茶葉五
錢。烏梅三個燒存性。共研敷之。卽收口。

龜筮腋氣也。俗名狐臭。又曰肋腥臭。一作體氣。用大
田螺一箇。巴豆仁一粒。膽礬一豆許。麝香少許。先
將螺以水養三日。吐去泥土。搗起靨入藥于內。用
綫拴住放瓷椀內。次日化成水。凡用須五更時。將
藥水以手自抹其兩腋下。不住手抹藥。直待腹中
欲瀉卻住手。要揀深遠無人到處空地內出大便。
黑糞極臭。是其驗也。以厚土蓋之。勿令人知。如不
盡。再抹之。又去大便。次用枯礬一錢。研細擦之。以去病根。
精豬肉兩大片。以甘遂末一兩拌之。五更時挾腋

下。至天明以生甘草一兩煎湯飲之。良久瀉出穢物。須棄野地中。恐氣傳人也。五次即愈。虛弱者閒日爲之。

預備夾棍方。用肥皂子水浸透去外黑皮。用裏白肉併仁杵如泥。如明日用事。今晚以此敷之。上至腳膕挺一節。下至腳底板心。併指甲內處處敷勻。不可有一毫空隙處。用油紙包之。外用裏腳纏足。其藥與皮肉一樣顏色不變。雖遭寃抑。畧無妨礙。出水時以黃豆漿溫溫洗之。其豆漿須預先一日將豆泡爛磨漿候著用。神哉方也。

夾棍傷一出衙門。即用熱童便一盆。將足浸之。如便冷。預燒紅甎二塊。淬之。即熱。直浸至童便面上浮起白油。其傷盡出矣。不痛不瘡。再用肥皂搗如泥。鷄卵清和塗傷處。以草紙包裹腳綁紮。一夜不可動。即差。

又方。猪油四兩。胡椒照人一歲一粒。擣爛敷上。蒸好。勿洗去。併勿解動。一夜亦差。

夾傷骨未碎者。土牛膝搗敷。骨碎者。土鼈蟲同活。蝌擣敷。

夾棍傷。死血鬱結。疼痛壞爛。命在頃刻。用麝香一分。冰片三分。乳香沒藥各一錢五分。樟腦二錢。輕粉血竭各三錢。共研極細。後將黃蠟一兩。猪板油一兩二錢同化。調藥成膏。貼患處。晝夜流出惡杖丹。生豆腐。鳳仙花連根葉同杵爛。打出敷上。乾則再易。三日全愈。

桑葚二三斗。又餅內。麻布絞日。放陰處臭爛。過霜後取出。搾去渣。以小餅收貯清汁。搽上即止痛。二次立差。

綠豆粉炒研。以鷄蛋清和塗止痛。

玉簪花手排熟。貼杖破處即差。嫩荷葉貼亦妙。

鳳仙花葉杵如泥。塗腫破處。乾則易。一夜血散而愈。冬春須預收之者。研末。水和塗之。

大黃滑石赤石脂等分。研細。茶湯洗淨。糝之。

如受杖後以葱頭煮湯揩洗。再將松香四兩溶化。又將葱一握擣爛入松香內攪勻。攤一膏藥貼患處。外以棉帛掩上紮定。五六日愈。

杖傷出蛆。眞麻油澆之。

杖丹長肉臘月猪油一斛。黃連四兩。熬至黃連轉焦色。去渣。入白蠟黃蠟各二兩收之。敷患上。帛紮緊

自愈。

血竭白蠟各一錢。硃砂輕粉各二錢。研粉糝之。二日即平。

杖瘴。細茶二錢。輕粉乳香象牙末各一錢。水銀木香各五分。麝香少許。爲細粉。雞子黃蠟羊油調搽。諸閃肭。或打傷不出血。但有青紫內傷者。先以葱白杵爛炒熟。將痛處擦徧。隨用生大黃研末。薑汁調塗。盡量飲以好酒。雖三月半年者悉效。

閃腰。木香一錢。麝香三分。共研細。右痛吹入左鼻。左痛吹入右鼻。令病手上下之。

閃頸肭腰。硼砂研粉。以骨簪蘸唾沾粉點兩目。淚出即愈。三點全愈。

擊閃傷筋。結核腫痛。若使成毒。最難治療。初覺急用火酒頓溫手蘸輕拍患處數百下。隨以韭菜杵爛罨一周時。次日再拍再罨。以差爲度。極效。初拍覺疼宜忍之。拍久則不疼矣。

臂膊脫骱。生地黃搗如泥。攤紙上。糝以木香末一層。貼患處。

再舖地黃泥一層。硝六錢。鮮桑根白皮二兩。以新砂盆一層。

瞽目重明法。淨皮硝六錢。鮮桑根白皮二兩。以新砂盆一層。貼患處。

再舖地黃泥一層。硝六錢。鮮桑根白皮二兩。以新砂盆一層。貼患處

翁幕於姑蘇時。患心腹久痛。諸藥罔瘳。得此而愈。遂照方配合施送。服者多效。今高芝檢先生家壓其事。求藥者日益廣。但用藥甚奇。其分兩之多寡。亦難測識。謹附錄之以質博雅。

腹痛。紅棗二枚。巴豆三粒同杵爛。裹縛臍上立止。

截瘧膏。硃砂胡椒各一兩。研極細無聲。餈餅密貯。瘧久者用煖臍膏一張。挑藥末一茶匙于膏藥中央。勿令四眼見。對臍紮貼。瘧止勿揭。聽其自落神效。

愈風酒

孕婦忌之。

陳海蛇十二兩　馬料豆　嫩桑枝　松鍼杵爛各四兩

醇酒七觔封浸煮三炷香

喇蘇酒治半身不遂風瘅麻木。

胡桃肉　龍眼肉各四兩　杞子　首烏　熟地各一兩　白朮　當歸　川芎　牛膝　杜仲　白芍　稀薟草　茯苓　丹皮各五錢　砂仁　烏藥各二錢五分以上用絹袋盛之。入瓷瓶內浸醇酒五觔。隔水燉濃。候冷。加滴花燒酒十五觔。封貯七日可飲矣。

宮方定風酒補血息風。甚有奇效。余于辛丑年視伊

協揆之證得此方。凡患虛風病者。飲之輒愈。且藥味平和。衰年者頻服。極有裨益而無流弊。眞妙方也。但飲貴微醺。不可過恣耳。

天冬　麥冬　生地　熟地　川芎　五加皮　牛膝　秦艽各五錢　川桂枝三錢　絹袋盛之。汾酒二十觔。淨白蜜赤沙糖陳米醋各一觔攪勻。浸以瓷壜。豆腐皮封口。壓以巨甎。安水鍋內蒸三炷香取起。埋土中七日可飲矣。

清和酒。不能斷飲之人。可用此法。庶幾飲而無弊焉。

直生地八兩　天冬四兩　銀花八兩　生猪脂一觔

生綠豆一升　耿柿餅一觔切碎　汾酒二十觔密封浸之。一月後可飲。久藏不壞。

按酒性熱而火酒尤烈。故浸酒方忌用辛竄之品以助其虐。而世人往往犯之。殊不合制。惟此四方用藥深有精義。洵爲可法。他如神仙百益百歲之類。徒有美名而功不補患。幸勿爲其所愚也。

灸火先當辨證論。汪省之曰。素難諸書。皆言陽氣陷下者。脈沉遲也。脈證俱見寒在外者。冬月陰寒大旺。陽明陷入陰水之中者。並宜灸之。設鮓浮者。陽氣散于肌表者。皆不宜灸。丹溪亦曰。夏月陽氣盡

浮于表。今醫灼艾多在夏月。寧不犯火逆之戒乎。或者因火而生熱脹發黃腰痺咽燥唾血者。往往有之。尚不知爲火逆所致。甯甘心於命遭所遭悲夫。經曰春夏養陽。以火養陽。安有是理。論而至是雖愚亦當有知者焉。又曷堅志趙三翁云。世人但知灼艾而不知點穴。又不審虛實。徒受楚痛。耗損營液。有冷疾者。使其仰臥。揉艾徧鋪腹上。若五六七月間。就屋上開穴。取日光照射。自然氣透臍腹。如冬春可用熨斗盛灰火慢熨之。皆以患者鼻聞濃艾氣爲度。宿疴自去。按此名天灸。功勝灼熾。藥勞病之因非一。總緣情志不舒。所謂七情不損。五勞不成者。眞至言也。然有藥治病。無藥移情。故素問云。二陽之病發心脾。有不得隱曲。女子不月。其傳爲風消其傳爲息奔者死不治。蓋二陽者。陽明也。陽明爲多氣多血之經。衝脈隸於此。苟心之隱曲不伸。脾爲思慮所困。則鬱火內熾。營液暗爍。陽明不能滋養。漸漏。衝脈乃衰。血耗風生。汛愆肌削。勢必君相二火升騰。氣逆奔迫而死也。俗謂之乾血勞。惟室女尼姑婢女。最多患此。孟子曰。女子生而願爲之有家。誠以飲食男女。人之大欲存焉。奈何爲人父母與主人者之不曲體人情也。若能稱家有無。不攀宮貴。遂其所願。嫁不失時。何至玉折蘭摧。噬臍莫及。而富貴之家。逸居無俚。輒以小說演義諸書爲解悶消閒之事。佳人才子。誘掖成勢。尤易易也。婢女雖非我生。尤當曲加憐憫。恣心久錮。洪裂堪虞。更有鄉愚爲人所誑。每將幼女送入空門。拂性違情。慘同桎梏。良可悼也。世人不察。但疑今人元氣日薄。故多勞損。不知古今元氣不甚相殊。七十古來稀。匪由今日始。而人多勞病。實係乎茲。惟望有覺世牖民之責者。嚴禁傳奇小說。毋許鄉民幼年出家。庶可內白骨於香閨。濟紅顏于壽域。洵造無涯之陰德。豈徒有關於風化而已哉。

虛勞慾火。甘梨汁胡桃肉研各一斤。芽茶五兩。懷生地當歸末各六錢。熬至滴水成珠。入鷄子清一枚。貯瓷器內封口。勿令出氣。冷水浸去火毒。每晨服一匙。

飢飽勞逸。皆能致疾。而飽煖二字。尤爲釀病之原。故神農氏播穀之餘。即收藥味。有能氏垂裳之際。聿著力書。周公贊易于頤卦。以愼言語節飲食二者。

爲養身之切務古樂府云晚飯少喫日消到九十九放翁詩云多壽祇緣餐飯少釋氏有過午不食之戒寓意草亦極言少食爲養脾之妙法諺有之曰禍從口出病從口入蓋肥甘過度每發癰疽酒肉充腸必滋穢濁熏蒸爲火凝聚成痰汨沒性靈變生疾病凡遇時疫流行之際更爲召疾之媒苟臟腑清虛素甘澹泊氣機不爲濁壅邪氣不能逗留雖感六淫易于解散惟內濁既甚疫氣易招同類相求如膠入漆治之費力死者恒多慎疾之人毋貪口腹至於勞逸之論莫詳於魯敬姜勞力者知有逸欲之病矣噫此温補之門所以日開而炎黃之道所以日晦歟抑何陋哉

恒享大年逸惰者常多疾疢後人無識改爲饑飽勞役不但文理不通亦且僅知有勞傷之病而不知有逸欲之病矣噫此温補之門所以日開而炎黃之道所以日晦歟抑何陋哉

辟疫方以枇杷葉拭去毛淨鍋炒香錫瓶收貯泡湯常飲取其芳香不燥不爲穢濁所侵能免夏秋一切時病若別藥恐滋流弊方名雖美概弗輕試而薄滋味遠酒色尤爲先務外以諸葛行軍散搐鼻可辟屍穢惡氣食井中宜入白礬雄黃水缸內以菖蒲根浸之室內頻用大黃焚之此外皆屬異端不必惑也

普濟解疫丹治濕溫時疫之主方也六元正紀五運分步春分後交二運火旺天乃漸熱芒種後交三運土旺地乃漸濕濕熱之氣上騰烈日之暑下燥人在氣交之中受其蒸淫邪由口鼻皮毛而入留而不去乃成溫熱暑疫之病則爲發熱倦怠胸悶腹脹肢痠咽腫斑疹身黃頤腫口渴溺赤便秘吐瀉瘧痢淋濁瘡瘍等證但看病人舌苔淡白或厚膩或乾黃者是暑濕熱疫之邪尚在氣分悉以此丹治之立效醫家臨證亦當準此化裁自可十全

爲上方用飛滑石十五兩茵陳十一兩淡黃芩十兩石菖蒲六兩貫母木通各五兩霍香連翹射干薄荷葉白豆蔻各四兩共十一味不可加減生曬研細末每服三錢開水調下日二次或以神麴糊丸如彈子大開水化服亦可

神犀丹專治溫熱暑疫諸病邪不即解耗液傷營逆傳內陷痙厥昏狂譫語發斑等證但看病人舌色乾光或紫絳或圓鞕或黑苔皆以此丹救之若初病即覺神情躁亂而舌赤口乾者是溫暑直入營分酷熱之時陰虛之體及新產婦人最易患此急

須用此多可挽回切勿拘泥日數誤投別藥以賃
事也兼治痘麻毒重夾帶紫斑及麻痘後餘毒內
熾口糜咽腐目赤神煩痰瘀等證但溫暑直入之
證皆危甚速竟有延醫不及之憾況方中犀角鎊
而煎之味極難出磨則需時緩不及待亦且價昂
非貧苦人所能猝辦惟望濟世爲懷者預將此丹
配合施送則患者易于得藥救活必多貧人亦可
重生豈非陰德更望存心之藥舖誠合出售儻取
工本獨於此丹不取利亦不費錢之功德也方用
烏犀火磨汁石菖蒲黃芩各六兩直生地冷水洗淨
汁銀花如有鮮者搗汁用尤良各一觔糞清連翹各十兩板

藍根九兩淡豆豉八兩元參七兩紫草花粉各四
兩共十二味不可加減生曬研細以犀角地黃汁
糞清和搗爲丸切勿加蜜銀花如有鮮者亦絞汁
和入如汁少難丸可將淡豆豉煮爛如無糞清可
用人中黃四兩研入如無板藍根以飛淨青黛代
之每丸重三錢用涼開水調服小兒用半丸

玉樞丹一名解毒萬病丹俗名紫金錠治諸中毒諸
癰疽五絕時疫喉風障氣水土不服蛇犬蟲傷尸
疰鬼胎顛狂驚悸百般惡證山慈姑去皮洗淨焙

川文蛤即五棓子搥破洗刮內桿千金子淨霜各
二兩紅芽大戟洗焙一兩麝香三錢各研細和勻
稷米粥爲劑每料分四十粒於辰日淨室中木臼
中杵數百下再加硃砂雄黃各五錢名紫金片尤
良

鴉片者云用噶喇吧鴉土所造故又謂之土或作阿
片亞片者音之轉也產自外洋倭國故曰洋煙又
曰倭煙彼處名爲合甫融而有烏土白皮紅皮三
種烏土爲上彼處稱爲公班故有烏煙之名丙有
嬰粟花之脂漿芙蓉葵花云亦可造台州福建亦

有所產故有阿芙蓉葵漿台漿建漿等號京師稱
曰大烟所以別于尋常烟草也溫台人稱曰烟酒
言其能如酒之醉人也俗謂之捶騙烟不僅諸聲
也蓋彼外國法禁甚嚴無一人敢吸此烟者專捶
賣于中國而騙銀易土蠱惑愚人緣此烟吸入頭
刻能遍一身諸藥無其迅速氣主宣升精神隨以
上涌升提日久根蒂日虛烟癮日深銀錢日少必
至傾家廢業絕嗣喪身而後已五十年來天下之
蒙其害者人所共聞王子壽所謂挾無形之酖毒
燦九州之膏血開尾閭之大壑蕩四民之筐篋者

是也故余目之爲妖烟云。其性甚熱。最燥陰津。妄人誤以爲寒。余於回春錄中曾詳辨之。其生土與未經火煉之烟膏。毒性尤烈。服之昏躁氣絕甚至殺人。惟濃煎甘草汁或金汁可以解之。生南瓜搗汁服亦良。同酒服者難救。同醋服者尤不易救。火上煉過者毒較緩。尙不吸此者誤服亦能殺人。粳米和水搗絞濃汁可救。吸烟醉者。陳豆醬泡湯解之。醬油泡湯亦可吸烟成癮者。用甘草一味熬膏。調入烟中。吸食二三日。卽漸不欲吸矣。方簡價廉。又不損人。且無後患。極深之癮。一月可斷。但必痛

悔堅心無不神效。併望廣爲傳播。俾海內烟癮全除。豈非大幸。又凡烟癮戒斷。一二年內多食南瓜。永無後患。

勸醫說黃退菴曰。每見有名醫家。不數年間必獲厚貲。其閒實緣得當而愈人者固多。僥倖而得者亦復不少。宜修合良藥以施貧苦。疎財帛以行利人之事。則天亦原其情而錫其福也。莫謂我道勝人。分應坐享。求田問舍以傳子孫。墓木未拱。已有貲產廢棄者比比也。何如早行善事。以爲綿遠之計耶。

曲禮云。醫不三世。不服其藥。俗以世業相承爲解。實不然也。橘旁雜著言。醫必父而子。子而孫。如是則其業精。始服其藥。若傳至曾元。更爲名醫矣。其閒賢者不待言。其不肖者奈何。因其世業而安心服其藥。詖爲所誤。生死攸關。雖愚者不爲也。況醫道通乎仙道。選數十百年偶出一豪傑之士。聰明好學。質微徹幽。然其上世。竝非醫者。舍是人而必求所謂三世者。有是理乎。漢儒謂神農本草。黃帝素問。元女脈訣。爲三世醫書。醫之讀之方爲有本之學也。梁芷林中丞云。右之醫師。必通於三世之書。三者不可以言醫。注疏甚明。若必云三世相承。然一日神農本草。二日靈樞鍼灸。三日素問脈訣。脈訣可以察證鍼灸所以去疾。本草所以辨藥。非是後可服其藥。將祖父二世行醫。終無服其藥者矣。又沈歸愚葉香巖傳云。先生臨沒。誡其子曰。醫可爲而不可爲。必天資敏悟。又讀萬卷書而後可借術以濟世。不然。尠有不殺人者。是以藥餌爲刀刃也。吾死。子孫愼毋輕言醫。嗚呼。可謂達且仁矣。噫。今之藉祖父聲名而不學無術者。可爲醫者非博極羣書不可。第有學無識。雖博而不知反約。則書不爲我用。我反爲書所縛矣。泥古者可不鑒哉。

愚。其與不學無術者相去幾何哉。故柯氏有讀書無眼遂致病人無命之歎。夫人非書不通。猶人非飯不活也。然食而化。雖少喫亦長精神。食而不化。雖多喫徒增疾病。所以讀書要識力。始能有用。喫飯要健運。始能有益。奈毫無識力之人。狃於如菜作蜜之語。涉獵一書。卽爾懸壺應世。且自夸曰儒理。喻氏所謂業醫者愈衆。而醫學愈荒。醫品愈陋。不求道之明。但求道之行。此猶勉强喫飯。縱不停食而卽死。亦爲善食而形消。黃玉楸比諸酷吏蝗嬪。良不誣也。更有文理全無。止記幾箇成方。遂傳

衣鉢而世其家業。草菅人命。恬不爲羞。尤可鄙矣。

語云用藥如用兵。善用兵者。岳忠武以八百人破楊么十萬。不善用兵者。趙括以二十萬人受坑於長平。噫。是非才學識三長兼具之豪傑。斷不可以爲醫也。父兄之爲子弟擇術者。尚其察諸。

穩婆說按難產自古有之。莊公寤生。載於左傳。故先生如達。不坼不副。詩人以爲異徵。然先生難而後生易。理之常也。晚嫁者尤可必焉。第亦有雖晚嫁而初產雖易繼產反難者。或頓產皆易。閉有一次爲難者。有一生所產皆難者。此或由稟賦之不齊。或由人事之所召。未可以一例論也。診云。十箇孩兒十樣生。洵至言也。但得兒身順下。縱稽時日。不必驚惶。安心靜俟可耳。會稽施圃生茂才誕時。其母產十三日而始下。母子皆無恙。世俗不知此理。稍覺不易。先自慌張。近有兇惡穩婆。隨身攜帶凶器。故爲恫嚇。使人不得不從其策。要取重酬。操刃斃生。索謝去後。產母旋以告殞者有之。從此成病者有之。奈貿貿者不知。墮其術中。翻艷稱其手法。忍心害理。慘莫慘於此矣。設果胎不能下。自有因證圖治。諸

方。卽胎死腹中。亦有可下之藥。自古方書未聞有斃割之刑。加諸投生之嬰兒者。惟贏形之女。交骨如環。不能開坼者。俗名鎖子骨。能受孕而不能娩。如懷妊。必以產厄亡。此乃異稟。千萬人中不得其一二者。如尋常可開之交骨。斷無不能娩之理也。方書五種不孕之所謂螺者。卽贏字之譌也。蓋驢馬交而生騾。純牝無牡。騾交而生贏。純牡無牝。其交骨如環無端。不交不孕。稟乎純陰。性極馴良而善走。勝於驢馬。然亦馬之屬也。故易曰坤爲馬。行地無疆。利牝馬之貞。皆取象於此。之謂也。人賦此形而不能安其貞。則厄

於娩矣施秋濤室兩次難產一女一子竝遭癆劄
問余說方疑其室之鳳形也而適有孕臨月產一
男竟無恙始悟前此受穩婆之愚而噬臍莫及也
救荒法按邱文莊公曰荒歲之民桂薪玉粒吸水餐
餓牂羊羶首水靜星光業藝者技無所施營運者
貨無所售典質則富室無財舉貨則上戶乏力魚
鰕螺蚌索取已竭草根木子掘取又空面皆飢色
身似鬼形棄男鬻女忍割心腸乞之不足又顧而
他輾轉號呼曳衰輸翁氣息奄奄須臾不保或垂
亡於茅舍或積屍於道途當此之時非用方術難
以度過此厄然救飢辟穀之方貴乎簡易而荒誕
不經之藥流弊反多茲以平淡而有效驗者錄之
幸勿哂其諺陋也

馬料豆淘蒸極透曝乾如是三次尤次更妙爲粉
柿餅煮爛去蒂核與豆等分擣丸如鷄子大每服
一丸不用湯水細嚼以津液嚥下既能耐飢且又
滋補脾腎更可任喫粥飯遠行攜帶亦可代糧
黃豆七斗脂麻三斗水淘淨即蒸不可久浸恐減
其力蒸過即曬曬乾去殼再蒸再曬共三次擣極
熟尤如胡桃大每服一丸可三日不飢此方所費
不多一料可濟萬人
糯米一斗淘淨百蒸百曬爲末每食以開水調之
服至一月可以一年不飢
脂麻糯米各三升紅棗肉三觔焙燥磨末蜜丸彈
子大每一丸白湯下可耐一日飢久服不餓
守山糧若心有力者宜預爲制造以備荒歉用堅
實蘆菔不拘紅白洗淨蒸熟俟半乾擣爛再以糯米舂
白浸透蒸飯搗如糊一物等分合杵勻泥竹壁上
待其自乾愈久愈堅不蛀不爛如遇荒年鑿下掌
大一塊可煮成稀粥一大鍋食之耐飢或做成土

浪費之擾其稍能自存者又恥來隨衆就食較之聽民糴買滋弊萬端大相懸絕夫貧民得食則反側潛銷而富家豪族皆可藉手安枕矣按道光己酉年浙省大水奇荒吾杭紳富捐貲開設粥廠數十所僅取半值貧民賴以存活閭閻得以安堵今年春粵匪滋事江南失守吾杭貧民失業洶洶欲逞亦賴粥廠以安此等善舉洵堪垂法於後世也臺公又曰兵荒交警貧富百姓自宜有無相通然而不肯捐助分文者無非欲保其貲財而與妻子共享富貴也不知飢寒百姓死亡切身甘心應賊導爲摽掠則洞房曲室非己所有賊得焚之朱提白鏹非己所有賊得捲之粉白黛綠嬌妻美妾非己所有賊得淫之牽衣執袂桂子蘭孫非己所有賊得戮之肢體髮膚併非己有刀俎惟賊截解惟賊祖宗邱墓併非己有發掘惟賊剖戮惟賊皆由不能散財之故耳余所以苦口勸輸者正爲富貴之家保全性命豈區區勸有餘補不足已哉按富貴二字不易享受須以學問識見駕馭之用所不當用則爲敗家子用其所當用不作守財虜苟不知此徒積金錢爲子孫計則多藏厚亡悔何及耶

臺公藥石之言的是富貴家保全性命之簡效良方也

救火要策凡人烟稠密之地最慮火患專恃取水近便庶易灌救然亢旱之時河井乾涸苟非預籌貯水之法將何以杜劍廬之災乾隆閒揚州余君觀德創設水倉法美意良洵善策也其法凡人烟稠密距河稍遠之區買屋基一所前設門楹榜曰水倉中爲大院置大缸百十隻滿貯以水。（嚴冬慮缸凍裂每缸內入以粗松柴一根另用稍稈結爲缸蓋冒之）復置水桶百十隻水龍數具外鑰以鎖設有火患開取救滅極爲簡易附錄

此帙冀各處仿而行之吾杭素多火患雖有官水缸之設不但缸少而貯水不多且無扃閉居民傾潑土其久則缸碎而水無存矣亟宜效法是所望也至泰西水法所論水庫及作井造器諸法無不精妙茲不備載

續

寡慾說沈芊綠云男女居室雖生人之大倫爲聖王所不能禁然必行之有節則陰陽和而孕育易若淫慾無度則精傷氣餒神散血枯由是而潮熱而骨蒸而枯槁而羸瘦而厄怯變生種種年壽日促

矣。若夫艷治當前。姣嬈在側。情投意洽。頓起淫心。因而雲雨綢繆。眞精施泄。雖此身殆難有所勿顧。即不然或逢婁相對。村醜相臨。未免有情。因諧魚水。甚至三妻四妾。居室纏綿。衾枕言歡。匪朝伊夕。更有捐茲閨閣。戀彼龍陽。有美孌童。心如膠漆。要皆實有其事。確有其人。興之所到。情之所鍾。所謂一旦相依。誰能遣此者。獨可異者。既無彼美。終鮮狂且。形不必其相遇。目不必其相接。忽然而心動。忽然而火熾。獨居無偶。宛如有女同衾。握手爲歡。不啻伊人在御。直身頓足。筋脈都搖。而且火則屏

而上炎。精則磬而就下。其爲傷損。較之實有其事。確有其人者。尤甚焉矣。則其精氣神有不歸於竭者哉。所以昏嫁及時也。俞惺齋云。周愼齋謂酒是邪陽。色亦邪陽。邪陽勝。則正陽衰。誠至言也。凡人遏慾藉酒爲助。自覺陽强可喜。不知仍靠命門眞陽作主。慾既遂而邪陽息。眞陽始寧。欲火頻起。頻息眞陽。陽必漸用漸衰。或欲起而勿遂其欲。似與眞陽無損。然如燈火本明。而於燈下另添一火以逼之。此火漸旺。則燈火漸滅。理更可悟。凡服壯陽熱藥。皆同此理。尊生者。總以泊然不起欲火爲妙也。

杜勞方專治骨蒸勞熱。羸弱神疲。腰脊痠疼。四肢攣軟。遺精吐血。咳逆嗽痰。一切陰虛火動之證。輕者二三料全愈。重者四五料除根。若先天不足之人。不論男女。未病先服。漸可强壯。常服更妙。以其性味中和。久任亦無偏勝之弊。屢收奇效。勿以平淡而忽之。方用

枇杷葉五十六片刷去毛。鮮者尤良。咳甚者加多。不咳勿用。

紅蓮子四兩。不去心皮。

梨二枚。大而味甘者。良去心皮。切片

大棗八兩。同煮熟後去皮。

煉白蜜一兩。便燥多加。溏瀉勿用。

先將枇杷葉放砂鍋內。甜水煎極透。去渣以絹澱取清汁。後將果蜜同拌。入鍋鋪平。以枇杷葉汁淹之。不咳者。但以甜水淹之。蓋好煮半炷香收盞。罐內。每日隨意溫熱連汁食之。冬月可多製。夏須逐日製小料也。

咳嗽多痰。加眞川貝母一兩。研極細。起鍋時加入。滾一二沸即收。

吐血。加藕節。薤汁同煮。

成方弊。執一定之成方。治萬人之活病。厥弊大矣。昔東坡先生誤信聖散子。而作序流傳。後人被其害者不可勝紀。續醫說載宏治癸丑。吳中大疫。邑侯孫磐修合聖散子遍施街衢。服者十無一生。原孫侯之意。本欲活人。殊不知方中有附子麻黃艮薑茛菪霍香等藥。皆性味燥熱。反助火邪。殺人利於刀劍也。奈今人偏信乩士之言。請鸞定方。合藥施送。徃徃亦蹈此弊。孔子曰好仁不好學。其此之謂乎。故是編於解疫神犀二方外。不多錄者。固由疎陋。亦敬愼之意也。蓋外治單方。凡效驗者。亟當傳布。若內證則病異其因。人殊其體。投劑極宜詳審。設非王道之方平和之藥。斷勿輕信妄傳。誤人性命。苟廣此說以告人。亦仁者之一端也。若夫世俗相沿。如外感之五虎湯。瘧疾之柴胡薑棗湯。臨盆之催生丹。產後之生化湯。麻疹之西河柳（此物性同麻黃）故繆氏每與石膏並用。有奇功。若獨用則大誤也。櫻桃核痘科外科之桑蟲蜈蚣之類。皆人受其害而習焉未察者。更有飽煖之家。無病服藥。如六味丸八味丸全鹿丸歸脾十全及壯陽種子等方。滋弊尤深。不勝縷述。聊引其概。智者愼之。

布。若內證則病異其因。人殊其體。投劑極宜詳審。設非王道之方平和之藥。斷勿輕信妄傳。誤人性命。苟廣此說以告人。亦仁者之一端也。若夫世俗相沿。如外感之五虎湯。瘧疾之柴胡薑棗湯。臨盆之催生丹。產後之生化湯。麻疹之西河柳（此物性同麻黃）故繆氏每與石膏並用。有奇功。若獨用則大誤也。櫻桃核痘科外科之桑蟲蜈蚣之類。皆人受其害而習焉未察者。更有飽煖之家。無病服藥。如六味丸八味丸全鹿丸歸脾十全及壯陽種子等方。滋弊尤深。不勝縷述。聊引其概。智者愼之。

徐洄溪所批葉案。頗有可議處。如云肝爲剛臟。未知何出。余謂肺稟堅金之性而體反虛浮。肝稟柔木之性而體反沉實。故肺養其嬌。易遭侵剋。肝憑其悍。每肆欺凌。是以肺稱嬌臟。肝爲剛臟。

批青果汁法丸爲杜撰。余按古方丸劑多用蜜爲其味同甘草。有協和諸藥之功。不拘何證。似可通融。且質粘易於凝合。遂相習成風。千篇一律。而不知蜜之爲言密也。密者秘也。固也。故蜂王出入。滾成球圓。釀之所。不容人窺。何秘如之。蓄奇香者。以密。之而其氣不泄。鼎俎家蒸玉面狸與黃雀。必先塗以蜜。雖沸爛而其膏不走。固之道也。且味純甘而性極緩。故惟峻藥欲其緩。脾藥欲其守者。始爲合法。否則欲補下者有戀中之弊。欲運中者有鈍膩之偏。欲宣經隧者嫌秘。自當各因其用而隨時制宜也。青果即橄欖。色青而味酸微甘。用於此證。則清膽息風。豁痰充液。莫云杜撰。深有巧思。觸類而通。愼毋泥古。

批陰傷及陽爲古無此語。余曰。即下損及中之謂耳。

批肝陽吸其腎陰爲無此病證。余謂肝陽熾而暗吸腎陰。猶之乎鐙灶大則膏易竭。子盜母氣。理所必

然患此者多。可云無此病證耶。

批海參淡菜爲開後人亂道之弊。余謂海參肖男陽。功竝蓯蓉。淡菜類女陰。性同烏劍。古方雖未采用。而鮑魚雀卵。素問已作濫觴。但氣味腥穢。非胃所喜。況究爲食品。宜充虛人之饌。入藥力甚緩。而海參更有釀痰滑利之弊。中虛少運者勿食也。

批下損過中難治爲非越人語。余按此卽難經論至脈從下上之謂也。雖語不如是而義則同。

批王先生卽晉三。余謂殊無的據。又按晉三著古方選注於雍正九年。葉氏暨其高弟陸禹川吳正功稱合諸書觀之。則晉三於葉氏爲前輩耳。非師生也。

爲之校讐而香嚴沒於乾隆十年。或謂葉氏曾從晉三學。則洄溪何以不言。而選注中亦無門人之稱。各諸書觀之。則晉三於葉氏爲前輩耳。非師生也。

批噫卽呃逆病者最忌噯。爲飽食氣。非病也。何可併爲一證。余按噫於其切音醫。痛傷之聲。又於介切。飽食息也。莊子大塊噫氣。俗作噯。編書者以噫噯不化。故雖數飲而水不得出。水不出則本末俱病。故與中氣喘爭。蓋其清濁不分。故時發飧泄。然則腸痺者。乃小溲不通而大便滑泄。上兼喘渴之病也。編書者以腸痺與大便閉同類。殊乖經旨。

為噦。謂卽呃逆。蓋此湯原可推廣而用。凡嘔吐呃逆之屬中虛寒飲爲病者皆可治也。余嘗以治噫氣頻年者數人。投之輒愈。益見徐氏之僅泥爲飽食氣者爲未當也。

批肺痺門所列喘欬諸病。謂非經義。余按內經以秋邪內舍於肺。所過此者爲皮痺。皮痺不已。復感於邪。內舍於肺。卽難經論至謂痺者。各以其時重感於風寒濕之氣也。又云肺痺者。煩滿喘而嘔。蓋痺音秘。閉塞不通之謂也。外感之邪。初著於皮毛。漸舍於肺。則治節不行而爲煩滿喘嘔也。雖經言風寒濕三氣雜至。合而爲痺。而暑燥二氣亦何嘗不侵肺而爲痺乎。所以病機之諸氣臌鬱。諸痿喘嘔。喻氏謂卽生氣通天論秋傷於燥之注腳。則喘咳氣逆之隸於肺痺。亦不爲謬。惟前列腸痺門。乃便閉之治。從開上者。考之經文。腸痺者。數飲而出不得。中氣喘爭。時發飧泄。注謂腸痺者。兼大小腸而言。腸閉病痺。則下焦之氣不化。故雖數飲而水不得出。水不出則本末俱病。故與中氣喘爭。蓋其清濁不分。故時發飧泄。然則腸痺者。乃小溲不通而大便滑泄。上兼喘渴之病也。編書者以腸痺與大便閉同類。殊乖經旨。

批呃門謂仲景治此以旋覆代赭湯爲主方。余按病深者。其聲噦。說文噦氣悟也。玉篇。逆氣也。卽俗云呃忒也。洄溪誤以爲噫。智者之一失也。又謂病者所最忌是但知下虛衝逆吸氣不入之呃矣。然實證亦有之。痰阻清陽者宜開胃火上衝者宜清肝氣佛鬱者宜疏府氣祕塞者宜通。卽平人亦有偶患者。但啜熱飲或取嚏卽愈。豈可專借重一旋覆代赭湯哉。

批此編獨闕傷寒一門。余按香巖有評點陶氏全生集一書。嘗引其大父紫帆先生暨乃翁陽生先生所考。寇宗奭朱丹溪皆以爲山蘭李東壁引衆說以譏之。而據方虛谷之說。謂是省頭草。後此修本草者。服其淹博。無不遵之。雖劉氏述盧氏乘雅倪氏棄言。皆稱善本。亦無異議。惟汪訒菴頗疑町畦賤品。不副雅名。洄溪之論。諒亦本此。豈可謂爲香巖之臆見乎。道光閒武進鄒潤安本經續疏。始辨定爲山蘭葉。余謂山蘭葉以清逸勝。功並竹筍。省頭草以猛烈勝。各有所宜也。

批瘧門不以小柴胡爲主方。是背仲聖。余謂瘧不離乎少陽。小柴胡湯是專方。今古相傳。誰不知之。然此但論風寒之正瘧也。若溫熱者。濕之邪。雖已化瘧。總當以感證之法治之。卻新而言之。詳矣。設拘守其迹。不知變通。而執死法以限生人。惡足以言

醫耶。

批熱入血室不用柴胡湯爲視之如仇云云余謂温熱病熱入血室不與傷寒同例女科輯要內堯封治驗可證徐氏之論虛勞也方辨建中湯不可輕試蓋誠知古今病證之有同異矣豈亦視之如仇專與相背抑皆誤用抱疚而畏之如虎乎。

友漁齋醫話云香巖論温暑雖宗河間而用方工細可謂青出於藍但欲讀其書者須先將仲景以下諸家之說用過功夫然後探究葉氏方意所從來庶不爲無根之萍也古今醫案云指南全部亦僅數年之醫案豈足概葉氏之一生自刊行以來沾溉後學被其惠者良多而枵腹之輩又藉此書易於勦襲每遇一證即鈔其詞句之精華及藥方之纖巧而平穩者錄以應酬竟可懸壺無論大部醫書長如堂洋即小部醫書亦來之高閣惟奉指南爲其簡便而不知學之日益淺陋也嗟乎豈指南誤人耶抑人誤指南耶。

魏氏續類案提要病其蕪雜潦草如腳門載張文定患腳疾道人與綠豆兩粒而愈一條訂斷非常食之綠豆余按此特綠豆下脫一大字耳孟言得藥

爲時事所阻爰附其畧於此以俟大雅教我。

余纂温熱經緯一書詳辨温熱暑溼之異于正傷寒也余悉點出併爲補目楊素園大令意欲付梓而因古人但以寒爲肅殺之氣而于暑熱甚略也然嚴寒易禦酷暑難消熱地如爐傷人最速按徐后山柳崖外編云乾隆甲子五六月閒都城大暑冰至五百文一斤熱死者無算九門出櫬日至千餘又余師愚疫疹一得云乾隆戊子丙午壬子癸丑等年暑疫流行率用大劑石膏救全不少紀文達公云乾隆癸丑京師大疫以景岳法治者多死以又可法治者亦不驗馮星實姬人呼吸將絶桐城

醫士投大劑石膏藥應手而痊踵其法者活人無算蓋卽師愚也道光閒毘陵莊製亭重刻其書余已采入經緯而卷帙稍鉅未能授梓且辨證處方非精于醫者不可今附暑疫大略于通俗方書庶世人咸知暑患之烈而醫家治疫亦勿徒守又可之法爲至當也若王子中太史白田集內謂承氣白虎孰非爲卽病之傷寒設豈可以治溫暑噫太史雖深究于理學殆未深究于醫學乎至石膏辨云日擊受石膏之害者甚多深以繆仲淳袁體菴爲不可法是亦書生之見也夫停食不消因而致死者多矣豈可歸罪于五穀以爲神農后稷作俑而令天下之人辟穀耶況物性中和莫如穀矣而霍亂痧脹一口米湯下嚥卽難救治故一病有一病之宜忌不可舍病而但以藥之純駁爲良毒也補偏救弊隨時而中貴于醫者之識病耳先議病後議藥中病卽是良藥況石膏無毒甘淡而寒善解暑火燥熱無形之氣凡大熱大渴大汗之證不能舍此以圖功若兼胸悶腹脹者須加辛通開泄之品以佐之第讀書以明理明理以致用苟食而不化則粗庸偏謬貽害無窮非獨石膏爲然矣撰

紳先生博覽之餘往往涉獵岐黃家言或筆之于書或參贊戚友之病世人因信其知儒遂併信其知醫孰知紙上談兵誤人不淺呂晚村是其尤者也安得如徐洄溪者一一而砭之哉

又按內經云在天爲熱在地爲火其性爲暑又云歲火太過炎暑流行蓋暑爲日氣其字從日曰酷暑皆指烈日之氣而言也夏至後有小暑大暑冬至後有小寒大寒是暑卽熱也寒卽冷也故寒字從冫爲水氣陰陽對待乃天地閒顯明易知之事並無深微難測之理而從來歧說偏多誤人不淺更有調停其說者强以動靜分之夫動靜惟人豈能使天上之暑氣隨人而判別乎又有妄合溼熱二氣爲暑者則亢旱之年河井皆涸禾苗枯槁溼氣全無可以謂之非暑耶況溼無定位分旺四季暑與溼固易兼感而風溼寒溼無不可兼若云溼與熱合始名爲暑然則合于風合于寒又將何名乎且二氣兼感者多矣如風與寒最易合而仲聖嚴分桂枝麻黃之異治豈暑與溼而可不爲分別哉故治暑者須知暑爲火熱之邪然必審其有無兼溼而隨證用藥庶不誤人

惡暑證。中暑昏迷病名暑厥多在亢旱酷熱之時。因吸受暑毒。直入心包營分耳。蓋暑爲火邪心爲火臟同氣相求。不比別邪必由他經傳入也。故告危極速往往不及延醫診治。世人但知爲痧。夫痧者。卽客邪驟入阻塞其氣血流行之道也。阻塞經氣脈氣者爲淺。阻塞臟氣者爲深。惟暑爲陽邪直犯神明之臟。殺人最烈。而諸般治痧丹丸。類多燥烈之藥。暑治貪涼飲冷過度。而病者之方也。設誤服之。如火益熱以致死。後渾身青紫。或發斑或口鼻流血。凡小兒產婦患此者。俗皆誤作驚風治之。無不杜死。聞之慘然。今將救治方法。備錄于此。惟藥品珍貴。購覓匪易。若好善之家依方預爲修合。則病者易于得藥。貧人亦可重生。功莫大焉。外則用銀鍼刺病人曲池臂灣委中膝灣擠去毒血再將其口撐開。看舌底有黑筋三股。男左女右。以竹箸嵌瓷鋒刺出惡血一點。更將其髮解散細看再看其背上。如有長毛數莖。必盡拔去之。如有赤髮急拔去之。臥清涼之地。忌飲薑湯米湯及一切熱湯。若其舌苔或黃或白者。急以行軍散或紅靈丹灌之。立蘇如舌色紫絳或苔黑者。暑毒更重也。急以紫雪灌之。灌後不甚爽慧者。營分暑熱未清也。再灌之或以神犀丹繼之亦可　口渴用生藕汁及清童便飲之或以竹葉綠豆等湯涼飲

潛齋醫話　三十四

行軍散　治暑熱直中。頭目眩暈。昏不知人。心腹痞滿。絞腸痧脹。及山嵐瘴厲。道途穢惡。一切不正之氣。涼水調服三五分。兼治口瘡喉痛。併點治眼目風熱翳障。揣眞能辟疫癘之邪。

西牛黃　麝香當門子　眞珠　梅花冰片

蓬砂各一錢　明雄黃入水飛火硝三分飛眞金二十頁各

藥另碾俱令極細如粉。再合研和勻。瓷餅密貯以蠟封之。

絳雪一名八寶治證如前　紅靈丹

辰砂水飛馬牙硝各一兩　明雄黃水飛蓬砂各六錢　煆礞石四錢　梅花冰片　麝香當門子各三錢　飛眞金五十頁

右藥擇吉日。于淨室中各研極細末。瓷餅收貯。熔蠟封口。勿使泄氣。每服一分。涼開水灌下。小兒減半。

紫雪　治暑火溫熱瘴疫毒厲諸邪直犯心經猝死及溫瘧煩熱發斑狂易叫走五尸五疰痧脹穢毒心腹疠痛。急黃蠱毒。鬼魅驚癇。麻疽火閉口舌生瘡。一切邪火毒火穿經入臟。蘊伏深沉。無藥可治之證。

黃金百兩　寒水石　慈石　石膏　滑石各三斤　以

上並擣碎。用水一斛煮至四斗。去滓。入下藥。
羚羊角屑　犀角屑　青木香　沉香各五斤　丁香一兩　洞溪云可用二兩　元參　升麻各一斤　炙甘草八兩　以上三方藥甚珍貴。初不敢選入簡效。然暑邪上入前藥汁中再煮。取一斗五升。去渣。入下藥。
朴硝十四斤　洞溪云二硝二味入前藥汁中。徹火上煎。柳木篦攪。不住手。候有七升。投硝石宜用十分之一
在木盆中半日。欲凝。入下藥。麝香當門子一兩　二錢五分　硃砂三兩　二味入前藥中。攪調令勻。瓷器收藏。藥成霜雪紫色。須密貯。勿令泄氣。每服一錢。
小兒減半。新汲水調灌。徐洞溪云方中黃金如用飛金萬百研入尤妙


夏月傷寒者。因畏熱而浴冷。卧風。或冰瓜過啜所致也。乃暑月之陰證。非病暑也。輕者香薷正氣平胃五苓等藥。重者大順冷香等方。譬如避火而溺于水。拯者但可云出之于水。不可云出之于陰火也。晉羅謙甫治商參政與完顏小將軍二案俱用挑藥俱不名曰暑病。又吳球治暑月遣行人案直日中寒二案皆載名醫類案。蓋恐後世誤以熱藥治暑。故特舉病因以稱之。可謂名正言順矣。昧者猶不深究妄立陰暑之名。眩惑後人。若謂夏月傷寒。爲陰暑則冬月之紅爐煖閣。羔酒狐裘。而患火證者。將謂之陽寒矣。夫寒暑者。乃天地一定之陰陽。不容淆混。惟司命之士。須知隆冬有熱病。盛夏有寒病。用藥皆當諦審其脈證。庶無倒行逆施之害也。
楊素園大令云。瘰癧乳巖二證。最稱難治。余購得一秘方。屢經試驗。付潛齋刊以傳世。方用丹雄鷄全生甘草各一錢　槐樹枝三十寸　右六味。以鷄骨入麻油鍋內。微火煎枯。入後藥。亦用微火煎枯。去渣。二油一丹。收成膏。浸冷水中。拔去火氣。不論已破未破。量大小貼之。以愈爲度。又一治面疔方甚簡效。以活鯽魚一尾。杵爛。入研細辰砂拌勻。圍之。火即漸散。漸圍漸小。其疔自拔。百試百中。
徐洄溪云。流注乃寒疫爲風邪所引。竄入經絡爲毒也。余治多人。悉以大活絡丹愈之。舍此別無對證之方矣。按大活絡丹即俗稱再造丸者是也。其但用二烏乳沒膽星地龍六味者名小活絡丹毒烈異常。慎勿誤用切記切記

呂愼菴云。洞溪以外科獨擅。凡毒初起。欲其不大。故首重圍藥。而方秘不傳。余訪求既久。得其最珍重者二方。一曰東毒圍。用玉精尿（即童便煅存性）生大黃（各四兩）五倍子　白芨（各二兩）生半夏　白斂（各二兩）百草霜　礬紅　生南星　陳小粉（炒各一兩）熊膽（一錢）共研末。以廣膠（化鮮芙蓉葉汁）醋量和搗。成錠治熱毒瘡瘍。發於陽分。盤硬外疼。色紅。蔓腫者。醋磨濃塗四圍空頭。

一曰疔圍。專治疔瘡初起。根腳不收。堅硬發麻。用生南星　生半夏　五倍子　磁石（煅）陳小粉（炒各一兩）明礬　生軍（各二兩）東丹（六錢）鐵銹　瓷粉（各五錢）雄黃　蟾酥（焙各一錢）熊膽（二錢）白梅肉（一兩四錢）共爲末。猪膽汁打錠

吾鄉管榮。業縫藥。善人也。好施藥。嘗曰。痧邪深入血分。必用刺法。以泄其熱。而通其絡。曩遇桐鄉八十老人張德祥者。善治痧。數十年來。生死決其鍼下。百不失一。凡鍼入而肌肉凝閉者。必不得生。然其所刺部位。不僅玉衡書所言之十處。惜世罕知囑。余錄入醫話。以便鄉僻壤。皆得按證而施救療也。

凡痧證頭暈者。刺素髎（穴在鼻柱上端準頭。鍼入一寸。）頭痛者。刺風府（穴在項後入髮際一寸大筋內宛宛中。鍼入一寸。）偏痛者。刺風池（穴在耳後顳顬後腦空下髮際陷中。鍼入一寸。）腹痛而吐者。刺上脘（穴在臍上五寸。鍼入一寸。）腹痛而瀉者。刺下脘（穴在臍上二寸。鍼入一寸。）腹痛而吐不吐。欲瀉不瀉者。刺中脘（穴在臍上四寸。鍼入一寸。）用手極力提起其皮而刺。以上諸穴。並不出血。手癇者。刺商陽（穴在手次指內側去爪甲如韭葉。）出血立已。足弔者。刺厲兌（穴在足次指之端去爪甲如韭葉。）出血立已。刺承筋（穴在腿肚下七寸。）出血立已。刺承山（穴在腿肚下分肉間。）出血立已。然此穴非精明者不易取。宜愼刺。牙關緊閉者。刺人迎（穴在結喉兩旁一寸五分大脈動應手處。）刺之立開



自序

余賦性羸弱、幼嬰多病、迄于弱冠、嘗思內傷諸藥罔效、於是悉取內經、難經、甲乙經、東垣十書、傷寒六書、及論、及薛氏等書、主於殊國異壤、奇方怪證、皆沿波溯源、推詳考索、循古人之餘而爲之不知其已廖已人情莫不欲言其所自、知交親承是謬推、稱多奏效、妄意遂謂凡病不出傷寒內傷之範圍也、壬寅秋、天時熱甚、人多仍不寒、四方疫癘大作、其證似瘧、而寒熱不門鬬、似傷寒而三陽經少陰太陰經證悉似內傷、而氣口脈不大於人迎、向所妄意以自信者、皆失之矣、彼以傷寒治者、七日逝、以內傷治者、先後亦逝、間有染輕本固元、稍淹淡、終歸不起、至一發不能言者、其死尤速、惟輕而不服藥者、百起一二、即老醫宿匠、計與術兩

窮矣、然天地之大德曰生、塞極必有以通之者、有宋李待制之書在也、書名瘴瘧衛生方、專是一證、始以風濕論、越一涉獵而盡之、而後乃知其書也、論證則辨晰周詳、用藥則簡易平順、此真妙於治也、且諸書瘧部、亦嘗及瘴瘧矣、本末未甚悉、豈身而履其地、寧不蔑智乎、待制造端王張、討閫、皆因宦彼地得其真詮、是書賴以全、寧始以一二及十百、因沿鄉曲、面流涎、隨手應心刻期色起矣、予秩之是以人命爲私也、告之同業、惺不能偏謀梓以廣之區區之公而已、客有告之者曰、夫瘴何有於瘴哉、閩廣之間、山深雨淫、嵐氣爲瘴、黃霧障天、中人作苦、吾信畏在中土、土不同方、風亦殊俗、曠絶千里、嵐瘴何從、迸乃巧於署名以炫技乎、予曰否否、諸疾之作、由天時也、四時之變、由氣數也、人身肖天地、與氣順逆也、

易曰觀乎天文以察時變其徵在國國實以人天氣流轉山澤通之以時驗變以人驗時矣氣不藏時之變也物直槎天人直疾病山川不必同而氣至則行之矣故吾信不必問廣而氣類之此瘴瘧之所由作也且如癸卯之冬四山花木蓋然如春甲辰夏仲菊華如秋六月反擁絮春秋隔霜不殺註謂四時失其序則其施必悖月令仲夏行秋令民殃於疫在昔識之蓋天失其序整氣旁行於是乎在邇年以來冬復大煖草木禽虫不含不蟄殆物得氣之先與韓昌黎雪擁藍關句李唐嶺南尚雪今絶無之馴至洛陽杜鵑天氣自南而北不尤信乎客因領之予又謂瘴癘於文爲瘴言疾彰於外內無實也爲瘧如虎反爪向人也以瘧施無實之人故多瀕於死李待制之調劑思深哉不揣愚陋次其源委附以鄙見別傷寒內傷諸症之形似詳藥餌之宜用宜禁驗病色之可治弗治編曰瘴瘧指南車僭妄之罪固無所逃然於活人或有小補庸有未盡以俟後之君子

萬歷三十七年歲次己酉十月朔信州鄭全望撰

是書論症精詳方法備設但分門別類不易檢閱今改編目錄於前以便檢查

瘴瘧指南目錄
卷上
辨證
瘴瘧形狀
受病之源
瘴病內傷辨
傷寒瘴瘧分南北辨
冷瘴
瘧瘴
脈
婦人
小兒
日期
熱瘴
不治證
人身肖天地瘴瘧類天時
瘴瘧傷寒辨
諸瘧瘴瘧辨
瘴瘧五臟俱病
發瘴時調理却病法
瘴病中將息法
多法
痢
痰
辨藥
腫脹
瘴後變證
升藥
降藥
平胃
麻黃
柴胡
檳榔
附子
常山
黃芪白朮肉桂
酒
卷下

正氣方
陳皮半夏湯一
藿香正氣散二
二陳湯五
和解方
和解散七
温中方
附子理中湯八
真武湯十
平胃散十二
感應丸十四
不換金正氣散二
大無神朮散四
人參養胃湯六
治中湯九
嘉禾散十一
紅丸子十三

温中固下方
藎附湯十五
沉附湯十七
乾薑附子湯十八
冷湯十八
冷香湯二十
既濟湯十九
三建湯二十一
鎮下方
養正丹二十二
來復丹二十四
黑錫丹二十三
靈砂丹二十五
斷瘴方
七棗湯二十八
截瘴丸二十八
四獸飲二十七
七寶飲二十九
治瘧瘴方
麥門冬湯三十
青州白丸子三二
三生飲三四
附諸方
柴胡散三六
濟命散三八
烏沉散四十
黃芪建中湯四二
六君子湯四四
温瘧湯四六
六和湯四八
柴平湯五十
星香湯五二
藕感丸五四
藕子降氣湯五六
沉香降氣湯五八
四七湯六十
香蘇飲六二
變亂丸六四
真人養臟湯六六
四神丸六八
黑神散三一
星附湯三三
正舌散三五
草果飲三七
五苓散三九
加減五積散四一
異功散四三
大養脾丸四五
如聖餅子四七
參蘇飲四九
樂令黃芪湯五一
附香飲五三
蘇合丸五五
殊傳降氣湯五七
四物湯五九
木香檳榔丸六一
香連丸六三
斷下湯六五
保和丸六七
七味白朮散六九

補中益氣湯七十　四柱散七一
參苓白朮散七二　震靈丹七三
敗毒散七四　進食丹七五
補脾丹七六　五皮飲七七
實脾散七八　五苓五皮散七九
胃苓湯八十　木香流氣飲八一
金匱腎氣丸八二　導痰湯一二
通關散八三　蜜導法一五

新田平從屋廖氏歸醫如誤治今告以瘴瘧已祛
州城四圍必在山澤水草之處應禮初試出五味
五第四姑婿素弟病極代治不百日皆愈推
黃瑞卿才初起失治旋亡不得其代
瘴瘧年深病雖治不得其代
永福力鈞定

瘴瘧指南卷上

信州鄭全望靈渚先生原著

連江陳晉治
同人孫　謀
曾孫泰紱扇重刊

辨證

瘴瘧形狀

或問曰發熱頭痛人俱稱爲傷寒二以傷寒藥治之可乎予曰當有所辨諸賦發熱種種不一而最毒者在內傷有瘴瘧或曰古人傷寒論辨別詳晰甚爲有理若醫瘴瘧則不能無疑矣將以予爲妄吾見子治斯病活人甚多但未聞見書未聆是語當明以告我予曰傷寒內傷所病處廣況立法指乃仲景東垣二人聖醫也名重寰宇而擴充是法者陶節庵時立齋二君故其書傳之廣而心於活人者未有不讀也若女瘴瘧惟炎方有之（過）（此）（二）（過）（此）（瘴）（瘧）（發）（熱）（頭）（痛）（與）（傷）（寒）（同）（看）（無）（的）（證）（可）（說）（有）（三）（者）書所傳不廣（而）（形）（狀）（不）（外）於頭痛發熱腰（世）（頭）（痛）（發）（熱）（得）（閒）（數）（日）其病有三而形狀不外於頭痛發熱腰重腳軟或冷或嘔或泄或大便秘或小便赤面赤目紅口渴心煩胸中大熱舌或黑狂言譫語欲飲水欲坐水中或吐血或衄血或腹痛或有汗或無汗諸證以有寒有熱者爲寒瘴或間日或不間日爲易治以單熱不寒者爲熱瘴爲難治得間日猶可以不言語惟噫噫作聲者爲瘴瘴瘴之形狀大都如是矣

人身肖天地瘴瘧類天時

天[illegible]氣覆[illegible]地[illegible]人居[illegible]載中[illegible]何[illegible]與[illegible]
[illegible]載我[illegible]君[illegible]也[illegible]古聖[illegible]等天地人爲三才[illegible]無[illegible]
[illegible]蓋謂天以輕清之氣上浮而下轉地居其中而乾健之
運無一毫少息若一毫不續則穹壞判一息不運則機緘窮人
身肖之其氣亦無息天以日月循環人以榮衛循環地有九州
人有九竅經日天氣通於肺地氣通於嗌風氣通於肝雷氣通
於心穀氣通於脾雨氣通於腎六經爲川腸胃爲海九竅爲水
注之氣陽之汗以雨名陽之氣以風名人之一身身以上其氣
象天身以下其氣象地故天不足西北而人之耳目右不如左
之聰明也故西北之人頭常冷地不滿東南而人之手足左不

如右之利便也故東南之人腰足常冷天有陰陽以生風暑濕
燥寒地有陰陽以生木火土金水人有陰陽以生肝心脾肺腎
天氣以四時溫熱涼寒運於上地氣以生長收藏應於下而人
之陽氣以升浮降沉應之爲生生不息之妙何也天令春其氣
温[illegible]氣[illegible]温故地中之陽氣鼓動而升於外以生萬物人之陽
氣亦應之以升天令夏其氣熱[illegible]氣熱地中之陽氣盡出於
外以長萬物所以地之下極寒人之陽氣亦應之盡出於外脾
坤土也象地斯時脾土亦寒天令秋[illegible]寒其氣涼[illegible]氣涼所以陽
氣能降於地而行收成之令人之陽氣亦應之而降於內天令
冬其氣寒[illegible]氣寒陽氣盡沉於地而成閉藏之令所以地之
下煖人之陽氣亦應之沉藏於內斯時脾土亦煖此天地得其

常而人之灾害亦不生發瘴之地則不然春夏多寒秋冬多熱
盛夏久雨則可挾纊隆冬久晴寧不搖扇一日之間日未升則
寒日中則熱日入又寒一日一夜寒暑迭變無論四時久晴則
熱蒸蒸極則雨雨下則濕蒸雨久則淒涼人生其間飲食起居
[illegible]又[illegible]證[illegible]稍失調養便感此乖戾之氣而
瘴然瘴之發多在秋冬以其天氣熱地中之陽氣不能收藏而
外泄故草木不花而花不葉而葉人之陽氣亦應之不能收固
而恒泄之於外惟其外泄[illegible]脾土所以[illegible]虛寒身以上象天則
極熱身以下象地則不熱而寒或熱蒸極而汗汗出則[illegible]涼其
人身之寒熱濕蒸一與天時相似故曰人身肖天地瘴瘧類天

時知斯道者則治瘴之法過半矣

受病之源

南方[illegible]寒暑不時春夏淫雨則多寒晨夕霧昏地下濕蒸故
陰濕之氣常盛秋冬久晴則多熱草木不凋而放花故陽燠之
氣恒泄晝燠夜寒晴霽熱陰雨寒人居其中因寒濕之氣盛故
下體重濕生痰又多痰因秋冬熱故熱多上薰膚多出汗致腠
理不密陽外而陰內陽浮而陰閉[illegible]斯時[illegible]時[illegible]及食生冷[illegible]炙煿則痰與食相併積於胃而寒熱之病作
矣或不避暑奔走於日中或避暑而坐卧當風閉其汗孔使汗
不出此病亦因之而作或因其晨多霧而寒飲酒以禦之少焉
日出而熱則酒與痰相併滯於膈上此病亦因之而作或晨寒
而少衣或夜冷而薄衾則寒與痰相併亦作寒熱或因晨寒多

衣行至日中未解則暑與瘧相併亦作寒熱證以瘧治之此病之本於天氣熱元陽恒泄在人之陽氣自不降而內又多痰再不能調攝感於不正之氣宜其病有上熱下寒之證所謂無痰不成瘧者是也養生者能遠房室省勞役毋食生冷毋食炙煿毋醉早酒毋飽晚飯毋乘暑行走毋當風坐卧一日之中順其寒暑而加減衣裳則瘴雖毒厲可免矣

瘴瘧傷寒辨

外傷寒邪之證與瘴瘧俱有寒熱但傷寒有不熱處以手捫之額上極熱而微熱鼻尖涼心胸及腹極熱背微熱腰以下不甚熱重者常冷或厥且譫語以手捫心胸踡卧狂起則脚重無力何也瘴病是上熱下寒故腰以下不熱而沉重上身之證雖陽而陰證隱具於其中鼻尖為年壽宮年壽屬脾脾寒所以鼻

尖涼此病是外熱內寒熱證雖見於外而內寒之證驗於鼻涼

踡卧又手胃胸隱然見矣或謂是傷寒陰證似陽不可汗者陰

證似陽渴欲飲冷與之冷則不飲瘴病與之則能飲宜用藥得宜則熱退或得間日熱退時則脉微弱非復前之洪弦數矣大抵瘴與傷寒大不相同傷寒因於寒瘴病因於暑傷寒有傳經無變證有傳染而瘴病不傳經無變證不傳染若醫者誤認惡寒發熱為表證用傷寒汗藥以狂言譫語大便秘舌黑為裏證用傷寒下藥則不旋踵而告殞矣

瘴瘧內傷辨

內傷飲食勞役過度之病其發熱惡寒與瘴瘧相似若以瘴瘧而用內傷勞役之藥治之則神識昏亂譫語加狂其熱愈劇脈

多亦至不起由不細察其證候耳今細辨之內傷勞役之病其惡寒也見風見寒居陰處無日處則惡之若避風寒居温煖處或添衣被則不惡也雖發寒一煖便已其發熱也蒸蒸然上徹頭頂傍徹皮毛下至腰足渾身燥熱若袒衣被近寒涼處則已或熱極而汗出亦解若涼片時則惡寒添衣被則不惡寒又發熱直至甘温之劑進多則病已其頭痛身重手心熱口渴心煩舌黑妄語妄有見聞大便秘或滯小便赤澁或嘔口不知味其脉氣口洪大或兼谷臚形證內傷之病如此瘴瘧之作其寒也先起於毫毛伸欠乃作寒慄皆頭腰脊俱痛雖重衣厚被漸湯熱火不能温寒去則內外皆熱渴欲飲冷雖袒去衣被重氷泉水不能寒或先寒後熱或先熱後寒或一日一發或間一日發此是冷瘴其脉洪数数冷瘴與內傷其寒熱不同又如此惟熱瘴瘧末間斷時又當細辨之內傷之熱足煩厥而多躁亦有足熱者雖熱亦不甚內傷之熱袒去衣被即解片時熱瘴之熱即卧於冷地亦不解內傷之脉氣口獨洪大而六至熱瘴之脉六脉俱弦洪而七八至或陽證而見陰脉要之兼證雖多惟以寒熱及脉潛心分別則瘴瘧內傷若氷炭矣苟誤認瘴瘧爲內傷而用補中益氣湯則熱愈劇而神愈昏益瘴因陽氣不降而然升麻柴胡乃輕清升藥使不降之陽氣愈飛越矣瘴乃天氣鬱蒸得雨方解瘴之熱悶欲俟下元温固自然出汗方舒黄芪白朮欽膝理藥也使腠理閉塞

汗不得出愈加熱悶神昏矣若是內傷此藥一進病勢即漸減縱不減亦不加病之疑難如此醫者不明望聞問切之理不分別其內傷瘴瘧傷寒而妄爲施治者屠劊之流也

諸瘧瘴瘧辨

或曰傷寒內傷瘴瘧之不同已知之矣敢問瘴與瘧何以辨之曰有三陽經瘧三陰經瘧五臟瘧又有以寒多熱少者及單寒者名寒瘧寒熱相半者名温瘧單熱不寒者名痟瘧胸膈痰痞心下脹滿氣逆煩嘔爲疟瘧噫氣吞酸胸腹脹吐酸惡酸惡食爲食瘧惡風自汗筋骨痛拍搐爲風瘧面垢日渴心煩多汗爲暑瘧三日一發久而不愈爲疫瘧表裏俱虛客邪未散真氣不復間一日連二日發或疫雖間遇勞即發久而不瘥爲勞瘧不外於一日一發二日一發三日一發有間一日連二日發有一日兩發有日與夜各發有上半日發有下半日發有有汗有無汗此一定之規若瘴瘧只是三證以有寒者爲寒瘴單熱者爲熱瘴不語者爲啞瘴其始發也多不間斷重者七日方間斷其間斷也一日十二時只間一二時即發亦有間斷半日者退而時復起動則又發終屬難退即退去胸腹之熱尚在或間一日一發者其發時去死一間其退去之時渾身上下筋骨若無其難過也不可以言語形容非若諸瘧退去之時即如平人又或先輕後重或先重後輕或先間斷而後反不

間斷或先不間斷而後間斷變怪不常非若諸瘧作息自有定期○○○○○○○○其治諸瘧用藥錯者尙可救療瘴瘧用藥一錯禍如反掌瘴最忌者汗吐下及小柴胡湯柴苓湯解肌湯○○○何也蓋瘧因陽氣外泄而然發汗之藥多驅內陽外泄是重虛其內所以多死瘴因陽氣不降於下焦吐則陽氣愈上升下元無陽氣是無根也故死瘴疾是下真寒而上假熱下藥太寒一下咽則中寒大作陽氣隨之即脫所以死極速瘴病外雖熱而內實寒故人謂瘧疾爲脾寒正謂瘴也故小柴胡柴苓解肌之類其性俱大寒服之則外熱不降而內寒更甚故至外熱微時裏外俱無陽氣所以難救欲治斯病○○○自首至尾不

○○○藥只遵大法温中鎮下正氣相解且攻且守主病者無責速效病者能深疾則治自愈醫不失一矣若夫瘧瘴當歸之天命千百中可救一二非人力之所能爲也

傷寒瘴瘧分南北辨

或○○○○○傷寒因於寒瘴瘧因於熱則北地多寒傷寒乃北方之病南地多熱瘴瘧乃南方之病歟○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○古○人亦有異法方宜之論然不可執一○○通第曰北方傷寒病多南方瘴瘧病多則可若曰北方無瘴瘧南方無傷寒則不可蓋天道無常假令北方暑熱過多秋時暴熱數日北人感此氣亦多病瘴廣之東南設有冬時大寒數日南方素無寒若感此氣亦多病傷寒故醫者當上察天時四時温凉寒熱上明五運六氣司天在泉之理中察四方風土之宜中辨病人平日之性宜涼宜熱平日是何脉再審今病或外傷風寒暑濕或內傷飲食勞役七情男女或感乖戾之氣而爲瘴灼見其病之在何經何藏宜補宜瀉宜吐宜汗宜温宜和解萬舉萬全庶不愧爲醫矣

瘴瘧五臟俱病

夫人身自胸膈至頭爲上焦其氣象天自胸膈至腹爲中焦其氣象人自腹至足爲下焦其氣象地以五行論之上焦屬丙丁火中焦屬戊己土下焦屬壬癸水在五藏心肺陽也居上脾陰也居中腎肝陰也居下必也陰能升陽能降以成水火之既濟天地之交泰則爲平人若夫發瘴之地秋冬多熱則人身陰陽之氣上者自上下者自下而成水火之未濟天地不交之

否故一觸外邪五臟俱病其病多上熱下寒外熱內寒何也天氣通於肺天氣熱故肺熱極所以大渴引飲小便頻數或遺尿氣逆胸中痞悶或衄血心在上焦火位天氣熱故心熱極所以心煩悶亂狂言譫語神識昏沉聲不知人或吐血飲冷舌黑面紅口唇生瘡脾爲中州坤土天氣熱則地中陽氣恒浮而不降地下無陽則寒故脾土虛所以鼻尖涼多發肌肉削不能食面黃四肢無力或嘔或泄中焦虛痞氣倦怠肝腎居下焦地之分天氣熱陽氣不降地下無陽故肝腎虛寒所以腰重脚軟筋骨痛病一作五藏之證俱見非若傷寒之證也知此則知傷寒汗吐下之法不當施於瘴瘧矣而治瘴之法當知升降浮沉則順之寒熱

溫涼則逆之之理必使心肺之陽降於下焦俾下元溫煖下元者人身之根本也溫煖則根本固根本固則邪熱退諸病息矣

冷瘴

其證惡寒發慶發熱頭或痛或不痛或嘔吐或不嘔吐胸膈痞悶身重腰痛脚軟或先寒後熱或先熱後寒寒時雖厚衣被不能溫熱時雖卧冷地不能涼或大渴飲水或一日一發發時多退時少或間日三日一發兼證極多不能盡述惟以其有寒謂之冷瘴有陰有陽四證云冷瘴必不死此瘴之輕者也其脉或寒時微遲熱時弦數或來六七至或陽證見陰脉治法先用感應丸十四粒薑湯送下次用陳皮半夏湯三四服或不拘錢正氣散三四服重者七八服方用和解湯三四服或

七八服加厚朴更好得寒熱間斷多時後用截瘧九酒下截之或發嘔湯不已亦斷飲此常法也

如往來寒熱痰逆嘔吐頭痛及身腰痛加被杖汁多煨燥引飲自利小便赤或如中風者薑附湯主之如寒熱往來煩渴手足厥冷寒熱交作冷重火涼身重舌黑渴欲飲水自利嘔逆汗出惡風者乾薑附子湯主之如上半身熱極下半身冷腿足寒厥者沉附湯主之或送截正丹黑錫丹靈砂丹

如發熱手足厥冷煩渴悶亂上吐下瀉者附子理中湯主之如發熱咽喉乾燥焦煩大渴飲水不止者冷湯主之或既瀉湯理之渴甚者乾霍散加附子主之如大便不利可與正氣散或和解散加柱大便行

嘔或咳者真武湯主之

如發熱惡寒嘔不止者藿香正氣散主之食傷脾而得又受方之病氣多上逆瘧與氣併而上故多嘔如因食生冷不過嘔而惡食頭目昏沉肢體拘急瘧多腹痛者藿香湯加附子沉香主之嘔甚送來復丹或治中湯主之

如嘔吐膨脹者二陳湯送感應丸

如嘔而胸膈不快脇筋脹滿心腹刺痛食少多痰吞酸噎氣及見證不一者以嘉禾散主之

如寒熱往來惡心嘔吐吞酸噫腐腹痛瘧痞不能食紅花子主之

如大便秘者先服和解湯自然通利或秘甚者用嘉禾散加蜜主之又有多日不通者看病勢何如得大便利而後病方得愈方可用藥法若不甚急只以治瘴爲主得熱漸不來大便自然通利矣

如寒熱臍腹刺痛脇痛煩亂引飲霍亂手足厥冷者冷香湯主之

如寒多熱少或但寒不熱者其人平日虛弱七寶湯主之如神思昏亂狂言譫語不知人事者輕則養胃湯加附子沉香重者二陳湯加沉附若甚者沉附湯主之

如發熱手足厥冷煩渴悶亂上吐下瀉者附子理中湯主之加脉代者此病甚不宜代脉看大便何如如大便照常養胃湯加附子主之如大便不利可與正氣散或和解散加柱大便行則代脉去矣

如發熱頭痛、小便不利、煩燥飲水、水入即吐者、五苓散主之、若引飲自汗、小便赤澁者、不得服五苓散、汗出更利小便、必亡陽也、況滲泄之劑、下虛者光忌之、加倒四肢厥冷、頭額虛汗、欬逆脉促、其證甚危、三建湯主之、

如證候不一、多所變怪者、和解湯主之、

如瘴止後腰痛腳軟者、加減五積散主之、

如瘴止後汗多者、黃芪建中湯主之、

如瘴止後食少體倦者、異功散主之、

如瘴止後虛煩不得眠、心膽虛怯、夙事易驚者、溫膽湯主之、

熱瘴

其病身發大熱、神氣沉昏、晝夜如卧炭火中、腰痛脚弱、大渴欲飲冷水、上脘痞悶、神昏妄語、頭痛或不痛、或嘔逆或不嘔逆、小便赤澁、或頻數、或遺尿、大便或秘、或自利、舌黑而赤、目紅、或吐血衄血兼見之證、不能盡述、惟以其單熱不寒、謂之熱瘴、其熱勢稍緩、服養胃湯吞截瘴丸、迤逦日服六七次、如未止服四劑、又未止、服至二日一發、尤妙、不來之日、服和解湯七八服、和解後、若果蘊熱、但冷服無害、益覺來散、治下虛中滿、能升降陰陽、正與秋冬作熱之地爲宜、服二三日、則裏熱之證、隨證調治、自無不效、

如嘔逆以養胃湯來復、再治中湯二陳湯選而用之、

橫縫中青脉刺之、出血如汪、乃以青高水與服、應手而愈、若冷瘴與雜病、決不可刺、熱瘴亦不可刺、刺而得愈者、即太陽傷寒證也、況滲泄之劑、下虛者光忌之、加倒四肢厥冷、頭額虛汗、欬逆脉促、其證甚危、三建湯主之、

邪氣在表、當汗之法也、刺出黑血、即是得汗、而其效速於得汗、益以身之上下唇、陽明胃脉之所經、足後腕、太陽膀胱脉之所經、太陽受病三日、而陽明受病、南人之針、可謂暗合、若愚所經、九鍼從南方來、刺熱論曰、病未見赤色而刺之、是謂治未病、然則南方桃草子之法、不可廢也、但南人未知辨赤色之道、而將死刺病入陰壅而愈、豈不危哉、按黃帝內經、

熱瘴初起、刺病人兩足腕出血、又刺舌下出血、頭痛兩額角脉張者、與兩額角脉上刺之出血、其病甚衰大半、次服和解湯七八服、後換金正氣散、又服和解湯七八服、得間斷一日一發、然後截之、若一日一發、尤妙、不來之日、服和解湯七八服、後熱勢稍緩、服養胃湯吞截瘴丸、迤逦日服六七次、如未止服四劑、又未止、服至二日一發、尤妙、不來之日、服和解湯七八服、後若果蘊熱、但冷服無害、益覺來散、治下虛中滿、能升降陰陽、正與秋冬作熱之地爲宜、服二三日、則裏熱之證、隨證調治、自無不效、

如嘔逆以養胃湯來復、再治中湯二陳湯選而用之、

如兀兀欲吐而不吐者一陳湯主之
嘔而熱不退者藿香正氣散主之
嘔而膨脹二陳湯下感應丸
嘔而頭痛衆御丹兼如聖飲子
嘔而胸膈不快下虛中滿嘉禾散主之
嘔而大便秘嘉禾散加蜜主之
嘔而腹痛紹九子及烏沉散
嘔而痰逆頭痛身痛腳痛腳弱熱大汗多煩燥引飲大便自利
小便赤澁者薑附湯主之吞青娥丹或靈砂散
如發熱煩燥手足冷鼻尖涼一證病人因熱大煩燥多不自知
醫者須以手捫其手足與鼻尖方知之身重腳腰痛舌生黑胎
全不具陰證其脈弦而六七至有力六和湯主之

大渴引飲自利嘔逆自汗惡風者乾薑附子湯主之
如大熱咽嗌乾渴煩燥不解者冷香湯主之
如熱大煩渴大作飲水無度者既濟湯主之甚者合奪命散
如熱大神昏不知人事妄語遺尿吐血衄血舌黑而紅目赤煩
渴脈弦而七八至以手捫之額上極熱胸膜熱腰以下不熱而
冷雖狂言妄語病人必蹉卧火手捫心或引衣自蓋陰證具於
隱微之中況脈只以五六至爲數爲實熱若七至八至是內陽
盡出於外之脈腹內則空虛矣若誤用寒涼攻外熱其斃也可
立而待急用沉附湯主之吞黑錫丹稍緩者一陳湯合沉附主
之輕者養胃湯合沉附湯主之
如熱大煩渴悶亂嘔逆泄瀉手足稍微冷者附子理中湯主之

如嘔逆泄瀉臍腹刺痛脇肋脹痛引飲無度胸膈不利者冷香
湯主之
如發熱腹痛頭目昏沉四肢疼痛大便自利小便或利或澁或
嘔或欬自汗多者真武湯主之
如因悞攻外熱以致四肢厥冷兩足如無頭顱虛汗不止或時
發噦脈數而促其危尤甚急宜收心液壯真陽庶可更生宜服
三建湯
如大便秘其脈六至兼弦而有力者和解湯主之其者用蜜導
法
如夏月胃暑伏熱即發熱瘴煩燥日渴上吐下泄心脾不調飧
全不具陰證其脈弦而六七至有力六和湯主之

如熱大便堅硬其人平素脾胃壯實而脈弦數有力者和解湯
加藕葉地骨皮主之
如發熱頭疼或眼睛疼大便實其脈舉按皆弦數全無陰證其
人平素宜涼劑者參藕飲主之只可一二服稍和即止不可過
用須要詳審可忽
如已分爲間日脾胃已和濕冷已去病退時脈亦弦數者養胃
湯加柴胡主之
如已服正氣和解溫中回下後熱已問斷截瘧九不在者十四
日外可少與柴平湯或柴胡散九穩不可多服參藕飲柴平湯
柴胡散三方須細察病人平素宜涼劑胃氣壯實及脈實而無
陰證是也隨證用之中者方可用之如稍緩不若和解湯加減守

之免致失手
如已經七日發熱煩燥引飲喜冷水大便不通小便赤澁狂言內熱神昏不省者鄉令蔔芪湯主之若因上熱未降者尤宜況附湯主之
如無汗發熱頭痛小便澁煩渴飲水水入即吐五苓散主之不可多服
如瘴止後猶狂言神昏者因心經之陽尚未降於下焦故也宜陳湯加沉附主之或養胃湯亦加沉附
如瘴止後腹痛腸鳴大便溏而煩平胃散主之
如瘴止後虛煩不眠心膽虛怯觸事易驚或夢不祥或異象眩惑夜不安寢者溫膽湯主之無多服

瘧瘴
如瘴止後精神倦不喜飲食者異功散主之
如瘴止後腰痛脚痛加減五積散
如瘴止後自汗多者黃芪建中湯主之多痰體倦六君子湯
如瘴止後易饑易飽者香砂六君湯吞以蔥脚丸

瘂瘴
瘴病初起發熱頭痛或嘔逆或不嘔逆兼證雖多惟以其神昏不能言但噫噫作聲或全不作聲謂之瘂瘴此熱瘴之甚者故真瘂瘴不治
如瘴病已經二三日不泄不識但不犯不可服之藥治得其道千百人亦可起一二人其脉初起一二日七八至而弦熱大至三四日熱微神清脉反和平
如瘴精神清目開如常能飲食能大小便熱微脉平常只是全不作聲者此真瘂瘴不治

散及金蟬脫殼南星柴苓之類
如瘴初起或是寒瘴或是熱瘴能言語因誤者悞用發汗及升藥降藥而變瘂者為不治之證雖神氣清爽脉息和平二三日決死不可用藥

不治證
一瘴病初起熱大不語至二三日熱微神清脉和惟不作聲此瘂瘴不治
一瘴病上吐下泄精神昏亂脉微遲無力二三日決死勿治
一瘴病因食生冷過多至四五日作泄手足冷者決死勿治
一瘴病熱退時脉亦七八至無神者決死勿治
一瘴病脉大而散無胃氣者不治

一瘴病陽證見陰脈無胃氣者不治有胃氣者生
一瘴病惡服麻黃發汗藥及柴胡黃芩苦寒藥而變痙者決死不治
一因惡服麻黃而筋惕肉瞤者死
一因惡服麻黃而目赤喘急者死
一因惡服麻黃汗出不止發寒而噦者死
一因惡服寒涼自利而手足厥冷漸及肘膝者死
一因惡服寒涼而發噦者不治
一因惡服寒涼狂起亂搏人者不治
一因胎前染瘴胎落而變痙者不治
一產後染瘴脈洪大如竹管皷指七至者不治

脉

瘴病之脉不可不細察如真脉沉細而遲此元氣虛寒之脉外證雖見純陽當急用沉附等藥苟惑投以寒劑其逝卽在頃刻所謂乘氣入胃陰盛乃亡也傷寒陽證見陰脉爲真病脉之證瘴瘧爲上熱下寒外熱內寒之病陽證見陰脉爲必死見有胃氣者反爲易治萬不失一

如真脉洪大無倫七八至按之皷指或無力者此元陽氣盡泄於外如真脉不可謂之陽脉蓋脉只以六七至爲數爲熱若七八至爲元氣已越而邪氣獨盛正不勝邪故見是脉以浮而無力爲洪若洪大過筋似指則爲元氣不固於內反泄於外故見是脉正內經所謂脉大爲虛是也皷指者更虛於無力二脉兼見似內傷火不歸經之證方書謂龍雷之火其外證決見大熱之病細察之必有陰證具於陽微之中急宜用薑附等大熱之藥冷飲之其效可必倘惑投涼藥禍如反掌在他證脉至七八至爲七極八脫決死之脉在瘴瘧如治以法有永保無慶如脉代而不散者當問大便如溏小便調爲元氣不足宜參附歸脾之類補之元氣實代脉去矣若數日未更衣更宜和解正氣使大便利黑屎去則代脉去矣若代而兼散則爲不治之脉

如脉瘴作時七八至温中固下正氣和解後熱退四時一呼一吸只來二至在他證爲二敗必死之脉在瘴瘧爲邪氣盡退正氣將復之脉其外證如見渾身氷冷困倦之外惟口中所出之氣暑温或大汗如雨惡寒之極斯時惟宜調養如服補脾之藥一日則前證俱退二三日脉復四五至矣

日期

瘴病無傳經治得其道則自滅而增劇如瘴初起輕則自間斷正類瘧病治之當一日一發者十四日愈或二十一日愈二日一發者七日愈其故何也夫瘴是元氣不勝邪一日一發元氣難復其愈遲二日一發元氣

易復、其愈速、若三日一發、則與痎瘧無異、當以治瘴治痎之方、斟酌合用、必半年一年方可愈也、其次初發不間斷、正氣和解後、三日即間斷、七日可愈、或十日愈、又有重者、直至七日方間斷、十四日可愈、如不愈、二十一日、猶色有二十一日猶未已者、雖未愈、謹慎用藥、再無變證、若不知治瘴之法、妄用藥餌、則閒輕重、如重犯發汗涼藥、則三日變證、七日死、有十日變證者、有十四日變證者、有二十一日變證者、若犯石膏大黃、則變證只在頃刻、總之治失其道、七日內變證極多、十四日變證次之、二十一日內變證又次之

南方陽浮陰閉、陽恒泄陰恒固、男子以陽爲主、故瘴病者多、女子以陰爲主、故瘴病者十中一二、治法與男子同、更加以諸瘀仲續、跡安胎或兼四物、若見陰證亦照瘧附溫中鎮下方法、胎前產後與男子異、在胎前以正氣和解方加大腹皮砂仁杜亦不落即經所謂有故無殞是也、或不幸而瘴毒深重熱極、及胎多難保、胎下不變瘂、不作瘂脈不洪大無倫、皷指數七八至、調氣隆氣爲主、用四七湯烏沉散、佐以沉香、間服或加四物、惟者、猶可治、設變瘂或脈七八至、雖參附亦無如之何矣、在產後寒後熱、先熱後寒、或間一日發者、或日一發者、此是冷瘴、治當以前審病之法用藥、庶幾可稱爲幼科之國手、

小兒

小兒瘴病、多因乳母不知避寒暑、啖生冷、飧多煎致兒聚痰爲患、況小兒不能言病情、故難辨別、醫者當審諦聞其聲、望其色、察其舉止、看其虎口、參以三證治法、斟酌其輕重而後藥之可也、如熱大不寒、振不作聲、以手重拿合谷不作聲、惟手撐動、熱微時亦不作聲者、此是瘂瘴、必不可治、如熱大而赤、舌黑、目赤、唇紅、欲扯甌碗、頻含乳、唇紅是肺熱、欲扯甌碗、頻含乳、是口大渴、上吐下泄踡臥、或俯臥手足指稍冷、是虛欲就實、手足指冷、是胃中寒、睡露睛是脾虛、時時狂叫、或曲腰而啼、是腹痛、虎口脈過三關、當用附子理中湯治之、服至病減方止、如熱大而赤舌黑目赤唇紅、頻含乳不吐大便秘小便赤手足指稍不冷、睡不露睛、仰卧時時狂叫、虎口脈過三關、此無虛寒之證、當用正氣和解、參以熱瘧方法治之、如先寒後熱、先熱後寒、或間一日發者、或日一發者、此是冷瘴、治當以前審病之法用藥、庶幾可稱爲幼科之國手、

發瘴時調理却病法

發瘴時、必須加意保養、晨興盥漱後、先服平胃散、或不換鈔正氣散過一刻、啖粥、巳時早食、申時晚食、夜間服理脾消食丸、藥酒少飲、如不宜太醉、天氣若不常、寒煖、加減衣裳、不食生冷、則脾胃自壯、省食油膩、則胸膈自快、無怒怒以傷天和、節色慾以固眞氣、如此調攝、決保無恙、如秋冬大熱服以降氣鎮墜藥養正丹黑錫丹蕪子降氣湯秘

傷寒氣湯沉香降氣湯選而用之

瘴病中將息法

凡纔病瘴時、切須息口、非惟生冷油膩不可食、尤忌酒肉魚麵之類、即日日但、只可食粥、仍戒葷食、但日日吃白粥、雖發過稍久、仍食、如不發日、從便吃白粥、發時、亦不可食、不可大飽、不忌口則、日日食、物、助邪、重致困服藥不效、若食葷腥、與服藥、即發所謂服藥不如忌口是也、每日只宜漱口面、不可洗手面、梳頭、但妄心坐卧數日莫動、如此將息、無所不瘥、

瘴病後將息法

凡瘴病纔住、可記初發幾日、依前日數十分畏謹大率瘴不發後三日、方可洗手、七日後方可洗面、半月後可畧梳頭一二次、三月內戒房事、能戒百日尤妙、瘴不發時仍素粥三日、經五日後、以猪脾熟煮羹薄吃軟飯、十日後畧飲些酒、少吃肉羹、但不可食諸般骨汁、犯之即再發、如牛羊雞肉須忌一月、如如不能將息、或致再發、又須依前法服藥前法將息而已、如饑飽勞役喜怒不時、再發雖依前法服藥調理、多致延綿半年方得平復、終不若小心謹慎調理、不再發爲妙

灸法　多代仿此

凡冷瘴初起、腰足寒厥、其脉沉細、因失饑寒、傷飲食、致病者內服薑附等藥、外灸中脘、從建里上行在臍上四寸中脘穴也、氣海在臍下一寸五分宛宛中氣海穴也、三里、從上廉穴上行一寸鍼肉之堵按之肉起手三里穴也、三穴、使中氣温下元煖、則病無不愈、若無前證、其人平日不甚虛弱、及病始發者、未可便灸、如瘴病既久、氣血已虛、服藥不效者、宜灸膏肓、從臍之下行第四椎下五椎上此穴居中去脊中各三寸半正坐曲脊取之膏肓穴也、或大椎、一椎之上大椎穴也、及第五椎、五椎下神道穴也、二穴隨年壯尤妙、及足三里、則久瘴自瘥、熱瘴忌灸、

瘴後變證

瘴後調攝、較、他病、難百倍、善養元氣、著及飲食、起居、若稍有不謹、百日內、元氣復、方、免變證、

瘴後元氣虛弱、及病始發者、未可便灸、如瘴病既久、氣血已虛、服藥不效者、宜灸膏肓、從臍之下行第四椎下五椎上此穴居中去脊中各三寸半正坐曲脊取之膏肓穴也、或大椎、一椎之上大椎穴也、及第五椎、五椎下神道穴也、二穴隨年壯尤妙、及足三里、則久瘴自瘥、熱瘴忌灸、

瘴後調攝、較、他病、難百倍、善養元氣、著及飲食、起居、若稍有不謹、百日內、元氣復、方、免變證、

瘴後元氣虛弱、飲食、與、我治病、無異、若飲食起居、不時、恣意飲食、與、我治病、無異、元氣未復、不能消化、積而作痢、緊而作瘧、浮而作腫、皆難以立方施治、蓋謂瘴後元氣常虛、是無根本將何以當病邪、今擇數方治之、後、以備審用、當、其時、權、

痢

下痢、皆由、氣脾胃衰弱、飲食不節、積而不化、遂致溫熱傷於氣分則白、傷於血分則赤、氣血俱傷則赤白相雜、其青黃黑色者、由濕熱兼傷各藏、故見各經之色也、脉沉小流連有胃氣者生、洪大而數者死、身涼脉靜者生、身熱脉大者死、

治法初起腹痛、裡急後重、如、元氣未虛者、先服神感丸、下之、去其積滯、兼有實熱者、量用木香檳榔下之、蓋謂無積不成痢、故先宜蕩滌以去其積、若兼伏暑、以

香茹飲送下小便不利五苓散送之次用消導和氣行血藥後服香連丸或變酏丸久不止斷下湯真人養臟飲斟酌選用若元氣虛弱又不可更行瀉滌先用六君子湯隨所傷物加藥送保和丸如傷米食加穀芽神麯麵食傷加麥芽神麯肉食傷加益氣湯如因脾胃元氣虛損又不能調攝飲食起居失時復乃下痢不納飲食宜用參苓白朮散送之加元氣下陷用補中研致之如因故復傷者先元氣而後攻其邪若邪氣甚者先攻其邪而後元氣若兼脾胃虛寒用理中湯又有噤口者（俱出丹溪）

苓散加肉荳蔻木香或噦震靈丹等藥何乃王德膚知其一未知其二即蓋古方有清心蓮子飲及歷壽藥者有用生胃進食藥豈可執一物以治之耶如診視而知其脾胃脉不弱開知其心煩頭痛手足温熱未嘗多服凉藥此乃毒氣上沖心肺所以嘔而不食宜用敗毒散每服四錢陳倉米百粒薑棗煎服又一方石蓮子搥碎去壳留心研爲細末用陳倉米飲調下若其脉微弱或心腹虛脹或手足厥冷初病不嘔因服栗壳烏梅及諸苦濇凉劑或飲草藥過多早晨未食先嘔不思飲食此乃脾胃虛弱却可信簡易方之言又有一方猶爲簡易用山藥一味剉小豆大一半銀石器内炒熟一半生用同爲末米飲調下甚有奇效又觀前賢治嘔逆不食者亦有一說毒氣攻心首以乳香豉末作丸托散服之脾氣虛弱者嘉水散山藥丸治之胸中當存活法裁其方法爲噤口劑用何患不收功於危篤

耶大都瘴後劑疾極難施治如前數藥雖是良劑特準繩耳至於臨時變通在醫者盡望聞問切之功極精巧以別其虛實寒熱然後施治庶可爲人之司命

腫脹

腫脹之因有脾胃元氣虛損又不能調攝飲食起居失時復傷脾肺腎三經俱能作腫傷脾而腫者即經所謂諸濕腫滿皆屬脾土是也傷肺而腫者即經言飲食入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱使小便不利洏溢作腫是也傷腎而腫者腎主水令腎氣虛寒不能攝水以致洏溢反以浸漬乎上於是三焦停滯經絡壅塞滲於皮膚注於肌肉而爲腫也

脉浮大者生沉細者死臍突缺盆平手足心腫起無紋滿肚青筋腰腫陰腫無縫者俱不治

治法傷於脾者宜實脾利水快氣嘉禾散烏沉散五加散實脾散五苓散五皮散平胃散胃苓散流氣飲斟酌詳用切不可用樟柳花黑牽牛戟甘遂下水之劑傷於肺者補中益氣湯加減用之腎水虛寒者附子理中湯香砂六君湯加薑附煎送金匱腎氣丸已上諸方治腫荃蹄變通之妙尤在醫者隨時取用

痰

瘴瘧之作多由痰滯而成故每發後稍不調攝痰證即作然痰之變證非止一端爲喘爲嗽爲嘔逆爲麻木爲痞膈及爲異病之最重者又爲卒暴痰厥眩暈等證

若痰厥僵仆不知人事脉浮而遲者生數而惡疾者死目開眼合手撒遺尿吐沫喉如鼾睡髮直搖頭汗綴如珠皆不治之證治法痰厥者三生飲合蘇合香丸或用其他痰證以二陳湯爲主隨證施附湯星香散及導痰湯選用其他痰證以二陳湯爲主隨證施治不可執一也

辨藥

升藥

南方之地其氣之常盛春夏多寒陽恒泄秋冬多熱陽外而陰內陽浮而陰閉故人得病多內寒外熱下寒上熱醫者不察概用升陽發表等藥致病者痰滯神昏而不知人服多者氣逆噦而汗出即逝蓋瘴病之作秋冬爲多人之陽氣春升夏浮秋降冬藏秋冬其氣行夏令而秋冬之令亦行陽氣之不降明矣陽氣不降則中下二焦空虛而寒大法升降浮沉則順之寒熱温凉則逆之知此者慾使陽氣下降及温中之不暇而況敢用升浮凉藥以犯逆時之戒乎凡升陽之藥味辛性凉味辛便能散真氣性凉非脾胃虛寒所宜因其升故心肺之陽不降反因而益盛陰血不能上承而反因以耗竭若瘴瘧之初感日重陰必陽重陽必陰瘴病之作天氣熱而人身亦熱上多燥渴心煩煩熱是重陽也而鼻尖凉腰足冷痛是陰寓於其中也又寒極生熱熱極生寒故瘴之始作也必大熱及其病退也身反大汗如冰冷舌黑面紅目赤脉弦數便以爲大熱之證用苦寒降藥如黄芩黄連梔子黄柏知母之屬愈投愈劇連服數劑則上熱未降中寒大作或變痙或痰滯或發喊或手足稍冷厥而泄諸證一起百無一生甚者見其煩燥引飲而用白虎湯石膏湯見其舌黑

大便秘小便赤可用大柴胡湯承氣湯此藥下咽或即發狂而或即痰滿即頃刻危亡是知瘴病未必遽危醫危之也若寒降藥如天花粉木通滑石車前子芍參連翹玄明粉生地黃之類亦不可輕用醫者審之

平胃

或曰瘴病因於脾胃虛寒外感乘戾之氣而成治法必先正氣利解所用正氣散養胃湯不過芳香解散諸方俱有平胃散在內蓋平胃散古人用以治脾胃敦阜有削平之義故曰平胃非補脾胃藥何又用之況瘴病脈弦而服平胃散又犯東垣虛虛之戒何也曰發瘴之地多山其土卑薄方其晴明天氣熱蒸地下生水及其陰雨地下多濕人生其間常履於

濕土之上經曰穀氣通於脾濕傷脾內故脾胃之虛多由陽氣浮於上陰濕之氣傷於下而然非若內傷之主於飲食勞倦也用平胃以去脾濕胡爲不可中有蒼朮之燥濕不閉腠理使汗易出陳皮之消痰下氣厚朴溫中下氣理痰消食甘草之調中氣益脾胃故李待制選以爲治瘴要藥也若謂脈弦在內傷謂肝木尅脾土宜補脾抑肝不宜祛濕故犯虛虛之戒不知瘴瘧脈弦是瘧脈自弦之弦爲邪在半表半裏因濕生痰而作故不禁平胃正欲其溫中去濕也

麻黃

衛生方云麻黃生於中牟有麻黃之地冬雪不積蓋麻黃能泄內陽也今南方無霜雪皆如麻黃之地陽氣恒泄

人居其間不勞脈黃而自汗有病則不宜輕發汗輕用麻黃即明前輩詩云四時恒是夏一雨便成秋讀此一聯不惟知南方天氣亦可觸類而知夫人之病也假如病者多熱繞經一汗便翻然爲冷是豈宜輕發汗耶如五積散溫關熱金沸草散九寶飲小續命湯十神湯香蘇散俱有麻黃雖有手對亦不可服若麻黃湯青龍湯南方尤不可遽用也今人例以麻黃爲發散藥殊不知其力祇能驅我之內陽以却外寒也古方書用治肺經咳嗽以麻黃之惡寒肺爲嬌臟易於感寒仲景治足太陽傷寒以太陽在表非汗不解及治少陰經傷寒發熱脈沉蓋少陰當無熱惡寒反發熱者邪在表也故以溫劑佐之發中有補皆所當用也除此三經方書已自少用況南方不

寒之地瘴氣交重瘴病尤盛感寒不即不因感寒不用麻黃又何不可南史記范雲欲赴梁武帝九錫之命忽爾傷寒召醫徐文伯治之恐不得與慶事實告之曰欲即愈當先期取汗但不免妄泄元陽恐二年後不復起矣雲曰朝聞夕可況二年乎文伯燒地布蓆置雲於上得汗而解雲大喜文伯曰不足喜也後二年果應夫發汗先期尚促壽限況不當汗而汗乎又嘗見有染瘴者上熱下寒腰足寒痛自謂五積散證也遂倍加麻黃多衣覆汗竟成重證雖服真武湯亦莫能救仲景於此有安用藥

者大凡瘴病誤用麻黃服後啞者七日內死或筋惕肉瞤者十四日內死或目赤上氣喘促者十四日內死若汗出不止脈細如無按動寒戰發譫者即時死當自警可不慎哉

柴胡

衛生方云、夫人身本地水火風四大假合陰陽和會、上焦屬火爲陽、下焦屬水爲陰、過有寒熱、見上熱下寒之疾、不能升降旣濟之、而反用藥實實虛虛、則水火解散、而人身壞矣、嘗見檳榔司教彭亮一日染瘴、身熱心煩、自以爲實熱、乘渴以冷水吞黃連黃芩丸、又取冷水以漬胸膈、至日晡小便漸多、更服黃芩湯小柴胡湯、是夜連進數服、小便愈數次、日晡熱漸退而卽逝、良哉夫下元爲人身根本、根本旣虛、身乎何有、小柴胡湯、今但知爲可用、而不知仲景方意、用之以治足少陽膽經傷寒、蓋膽無出入道路、柴胡乃本經藥耶、在半表半裏、非柴胡黃芩之苦、能發傳經之熱、則不可佐以半夏之辛以潰其心胸、蓋炙方受病、氣專炙上、必心肺焦熬、華蓋乾涸、所以多渴、若其脈浮而虛、按之無力、又或病潮時、脈洪數、病不潮時、脈微弱、其證則心煩燥、額上極熱、面色多赤、舌多黑、頭或痛或不痛、小便或頻或赤、大便或泄、腰腿沉重、兩足不熱、甚者寒厥、或寒誤服涼藥、則渴轉甚、燥轉急、治此者當引上焦熱氣降於下焦、正宜用大附子、及炙甘田氣海足三里等穴、使下元煖陰陽交泰、而病自和解矣、或曰、若然柴胡斷不可用與、曰、非不可用也、但必須其證一定不可已、又胡能治邪氣在半表非不可用之亦不可遽用其性極寒、必須先温中固下、而熱復後、又可用之、或有病退時、脈亦弦數、外證的係實熱、方可用之、亦當與正氣平、胃養胃兼用、可也、或李待制柴胡散尤爲穩當

檳榔

嶺表之俗、多食檳榔、蓋謂瘴癘之作、率由飲食過度、氣壅痰結、而檳榔最能下氣消食去痰、故土人狃於近利、而暗於遠害、此說北人之飲酥酪、塞北地寒、食酥酪膚理緻密、一旦病疫、當汗、而寒塞而汗不得出、南方地熱、食檳榔不知檳榔味辛、能下泄元氣、大泄胸中至高之氣、久食檳榔、臟氣疎泄、一旦病瘴、元氣已虛、故不能堪、又南方多體瘠色黃、是氣虛所致、亦檳榔爲患、不但嶺表耳、

附子

衛生方云、重陽必陰、重陰必陽、寒熱之變、物極則反、今瘴病或始寒戰而終大熱、或連日極熱而後作寒、正謂此也、第傷寒以不飲水爲內寒、瘴則內寒而外熱也、亦飲水、甚則欲坐水中、取水以漬其心胸、蓋炙方受病、氣專炙上、心肺焦熬、華蓋乾涸、所以多渴、若其脈浮而虛、按之無力、又或病潮時、脈洪數、病不潮時、脈微弱、其證則心煩燥、額上極熱、面色多赤、舌多黑、頭或痛或不痛、小便或頻或赤、大便或泄、腰腿沉重、兩足不熱、甚者寒厥、或寒誤服涼藥、則渴轉甚、燥轉急、治此者當引上焦熱氣降於下焦、正宜用大附子、及炙甘田氣海足三里等穴、使下元煖陰陽交泰、而病自和解矣、或曰、若然柴胡斷不可用與、曰、非不可用也、但必須其證一定不可已、又胡能治邪氣在半表非不可用之亦不可遽用其性極寒、必須先温中固下、而熱復後、又可用之、或有病退時、脈亦弦數、外證的係實熱、方可用之、亦當與正氣平、胃養胃兼用、可也、或李待制柴胡散尤爲穩當

檳榔

嶺表之俗、多食檳榔、蓋謂瘴癘之作、率由飲食過度、氣壅痰結、而檳榔最能下氣消食去痰、故土人狃於近利、而暗於遠害、此說北人之飲酥酪、塞北地寒、食酥酪膚理緻密、一旦病疫、當汗、而寒塞而汗不得出、南方地熱、食檳榔不知檳榔味辛、能下泄元氣、大泄胸中至高之氣、久食檳榔、臟氣疎泄、一旦病瘴、元氣已虛、故不能堪、又南方多體瘠色黃、是氣虛所致、亦檳榔爲患、不但嶺表耳、

勿理今人染瘴或啞而不能言或熱而精神昏亂如卧炭火之中半死一間不謂之火病可乎所以立從治之方有薑附湯乾薑附子湯沉附湯附子冷湯附子理中湯真武湯冷香湯七棗湯極重三建湯雖各有主對俱係温劑合冷服之或佐以涼藥乃寒因熱用也或曰熱治之法既聞命矣而三建湯用川烏附子天雄乃一物也何以別之余曰以春月採小者爲川烏主除寒濕去痰冬月採大而有小子附於旁者爲附子主回陽反本補下焦之陽虛大而旁無小子者爲天雄取其雄不孕子之意其力全無分散補上焦之陽虛以三物用一本出於建平故名曰三建瘴瘧因醫者誤用涼藥以致四肢厥冷頭額虛汗發噦脉數而促證甚急用之能收心液能止真陽多有得生者

常山

瘴與瘧似同而實異瘧之輕者全類瘧瘧醫者不知治瘧例用常山白礬及草果湯吐其痰致元氣實者茍苐難安元氣弱者卽加腫脹多致不起殊不知瘧益瘴因陽氣不降又吐之則不降之陽氣愈升中氣愈虛其不危者幾希故白礬草果不可用若常山猶有用處其力能去皮膚毛孔中瘴氣寒熱所感邪氣多在榮衛之間欲除根本非常山不可然常山多能吐人須製之使不吐方可用七寶飲冷服之不吐截瘧尤日服六七次酒送之亦不吐屢驗之藥也當知此藥之有始發必先正氣和解温中鎮下因其人見瘴熱不復來矣此時惟當保護真氣之法卽謂避真氣之法也及瘴熱之間斷也明見其

作息有時一日一作只有五六時卽退或間一日一作

脾胃已和下焦濕冷已去元氣漸而平復邪熱漸微漸短卽用七寶飲截瘧尤應手而愈若瘴熱正盛而用常山非徒無益而正氣愈損矣

黄芪白朮肉桂

瘴疾卒由暑熱所以勝理不密多自汗暨者因其自汗以治瘧之法治之用參芪歸朮之劑補之服後愈覺煩悶難安神識昏迷不知天熱氣蒸得雨方解瘴病熱蒸得汗方除白朮止汗黄芪止汗常勝理汗不得出熱蒸無由得解更作煩悶神昏故白朮黄芪亦不宜遽用或曰白朮黄芪固止汗矣肉桂何又用之余曰肉桂固能止汗本草有曰主

蒸得汗方除今病者自汗宜其瘴之愈也何又不除余曰此自汗畀得舒片時之熱悶耳若欲其愈必使温中固下正氣和解使陰升陽降榮衛和調邪無容地自然大汗如雨自頭至足大汗後渾身氷冷惟口中所出之氣暑温此等證候一見瘴熱不復來矣此時惟當保護真氣調攝百日元氣可復常耳

酒

本草載三人晨同行觸霧空腹者死食粥者病惟飲酒者獨不病南方天氣清晨多霧而寒故人相勉以飲酒謂其可以禦寒辟瘴不知乃發瘴之源也蓋南方暑濕飲酒則多中暑濕毒

連江陳晉治洵泉敬刊

信州鄭全望靈渚先生原著　同人孫　謀亭新校字

曾孫泰維康重刊

正氣方

陳皮半夏湯

治瘴瘧不問先寒後熱先熱後寒多熱少寒多寒少熱皆因夏月傷暑汗出不透或秋傷風或過食生冷先傷脾胃沐浴感冒多作此疾因有痰涎停於胸膈所謂無痰不生瘧初起宜先下感應尤温中去積滯方服此以正氣去痰

陳皮去白　半夏湯泡七次各等分爲粗散每服四錢薑七片水煎不拘時服壯實人日三四服虛弱人日二服

瘴瘧指南　卷下　正氣方

瘴瘧本於痰痰主於濕半夏能勝脾胃之濕脾胃既健痰無所生

皮同用其味辛能散滯氣利水穀下氣氣行則痰行所以治瘴先用之以正氣理痰也

不換金正氣散

治四時感冒五種膈氣和脾胃温中下痰止霍亂吐瀉心腹疼痛脹滿吞酸噫痞噎塞乾嘔惡心中受寒濕生冷外感風邪及山瘴之氣發而爲瘴身體沉重骨節酸疼頭昏鼻塞未分陰陽之間並宜服之則氣自正而病自退及能止汗治諸瘧疾遍身浮腫或風氣所攻手足腫痛全不思飲食腸腑時鳴婦人胎前產後皆可服之小兒脾胃不和時氣諸疾又治四方不服水土

凡寓嶺南此藥不可缺也
厚朴去皮生薑汁浸一夜
陳皮去白　藿香去梗洗淨　甘草　半夏湯泡七次薑汁浸晒干
蒼术去皮米泔水浸一宿炒　草果去皮
入蒼术炒令紫色又會半夏炒香熟再入甘草炒黃又入陳
皮炒方將衆藥安藿香在中心用藥遍蓋罨定少時許藿香
乾方可取出同草果爲散每服薑棗水煎一方無草果

拔發瘴之地地土卑薄陰濕之氣恒盛四時多熱陽烜之氣
恒泄濕氣盛則脾胃傷陽氣泄則脾胃冷是方用厚朴之温
中去濕滿陳皮之消痰下氣蒼术之燥濕健胃安脾甘草之
調中同用以去敦阜之氣半夏之利痰以除瘴本藿香之芳
芬助脾開胃止嘔草果之辛以消食化滯共爲温中正氣之
劑方名正氣者謂其能正不正之氣故治瘴爲先用之劑

藿香正氣散

治證仝前嘔吐不止者用此
藿香葉晒干　陳皮去白　半夏湯泡薑汁浸炒
甘草　厚朴去皮薑汁炒　右各等分薑棗水煎

此即前方去蒼术草果治瘴之嘔甚者聞藥氣則嘔蒼术草
果其氣太辛竄故去之

大無神术散

治證仝前若兼耳閉心痛者用此
蒼术　厚朴　陳皮　藿香

甘草　石菖蒲　薑水煎服
此方即不換金去半夏加石菖蒲此太無治瘴之方若瘴初起
兼耳閉心氣痛者可擇用之以菖蒲味辛能散邪開竅治冷
氣也

二陳湯

治瘴病元欲吐不吐及嘔而膨脹又治證候未分用之服之
待其明見證方用對證藥
陳皮五兩　半夏五兩湯泡七次　茯苓一兩去皮
甘草一兩　右剉散每服五錢薑七片烏梅一箇水煎温服不拘
時候

諺云無痰不成瘧故瘴病當以治痰爲主痰生於濕由脾土
不能制濕而痰自生用半夏辛温能燥濕茯苓甘淡能滲濕
濕去則痰不生陳皮辛温能利氣甘草甘平能益脾則土足
以制濕和氣則痰不能留滯名曰二陳者以半夏陳皮二藥
宜陳用之爲君故名之此方治瘴首尾俱可用温中固下之
藥恐其太峻加入此方合用則少緩

養胃湯

治外感風寒內傷生冷增寒壯熱頭目昏痛肢體拘急乃辟山
嵐瘴氣脾寒痰瘧四時疫病治冷瘴及寒痰加附子
人參　茯苓　甘草　半夏
蒼术　厚朴　藿香　草果
陳皮　各等分每服二錢烏梅一箇薑七片煎熟服不拘時

是方乃不換金合二陳加人參烏梅瘴初起於濕痰內積邪氣外感而成故平胃以除濕二陳以去痰正氣以正不正之氣人參之甘温補脾益元氣而利痰烏梅之酸以止渴收肺氣可爲治瘴良方予每用温中固下之藥合於此方甚獲奇效

和解方

和解散

治瘴瘧四兩之後事由此方一日五六服南人常自汗不可汗不可下不可吐多是脾胃感冷成病此方和脾胃逐風邪妙如神感寒輕者更不再發重者亦自減輕

蒼术半斛製　陳皮二兩去白　藁本四兩洗　桔梗四兩

卷下　和解方　四

瘴瘧指南

甘草四兩　厚朴二兩去皮薑汁炒

共爲粗散每服三錢水一鍾生薑三片棗一枚同煎至七分去渣熱服一日夜五六服不拘時若用此藥不發更服亦效一日亦服別藥發稍輕亦有效後再發次日更服一日亦五六服若第三次不發更服此藥一日亦服別藥如三次再發却服後藥亦效不治瘴神效就是傷風傷寒作瘧證候未分之時並服此藥一二日皆有效驗如不效即自依各證用藥若無醫藥之地病初發至未後皆服有效

瘴病起於地濕濕則生痰天氣熱外泄脾胃多寒是方用蒼术爲君能去濕不閉腠理使汗易出汗出則病從汗減與厚朴甘草陳皮同爲平胃之劑能去濕温脾胃去冷氣調中氣

治中湯

治瘴疾嘔吐心腹滿痛

人參　白术　青皮　各等分水煎熱服不拘時

陳皮　青皮　乾薑　甘草

瘴疾多嘔者脾土虛寒痰氣上逆亦令嘔也故以乾薑之辛熱治寒人參白术甘草之甘温以補脾同爲理中之劑加陳

皮青皮各一錢辛以散氣氣降則痰下而嘔止矣

真武湯

治瘴病數日後發熱腹痛頭目昏沉四肢疼痛大便自利小便或利或澁或嘔或咳

大附子一枚炮　白茯苓去皮　白朮炒　白芍炒黃色

右藥薑五片水煎食前温服小便利者去茯苓大便利者去白芍加乾薑嘔者加生薑五片易簡方云不下利而嘔者去附子但存三味似太平易以當臨時消息之治病之法也活人書云太陽病發其汗出不解仍發熱心悸頭眩身瞤筋惕振振欲擗地真武湯主之意謂太陽經傷風醫者借用麻黃既然不解復成重虛故宜术附芍藥之類又云少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自利或嘔或咳或小便利此為有水氣真武湯主之併贅於此以備用藥者易曉庶不局於一偏也

瘴病頭目昏沉四肢沉重疼痛者寒濕傷脾之外證也腹痛自利小便不利者寒濕傷脾之內證也脾惡濕濕勝則濡泄茯苓白朮甘以補脾去濕寒淫所勝治以辛熱附子生薑補脾益陽氣而去寒白芍收脾氣除腹痛又能停諸濕而益津液使小便自行然必須酒炒黃色以去寒性名曰真武者真武乃北方之神能鎮北方之寒水氣使不為禍也

嘉禾散一名穀神散

治中滿下虛五噎五膈脾胃不和胸膈痞悶脇肋脹滿心腹刺痛不進飲食或多痰或吞酸胸滿短氣肢體倦怠面色萎黃如中焦虛寒不任攻擊臟腑虛寒不受峻補或因病中氣衰食不復常禀受怯弱不能多食及瘴疾陰陽表裏未分之際尤宜服之

枇杷葉去毛薑汁炙一兩　石斛酒拌微炒三錢

杜仲酒薑汁炒三錢　青皮五錢　甘草一兩五錢

藿香葉三錢　穀芽炒五錢　陳皮去白三錢　白朮炒二兩

砂仁一兩　薏苡仁炒一兩　隨風子一錢如無小訶子代之

半夏薑汁製三錢　丁香五錢不見火

木香三錢　桑白皮炒五錢　檳榔炒五錢　五味子炒五錢

神麯炒一兩　人參去蘆一兩　白殼去皮炒五錢

茯苓一兩去皮　大腹皮炒三錢　沉香三錢　右為末每服薑三片棗三枚水煎温服不拘時

此方療四時感冒能調陰陽使無變動刻日得安如療五噎加乾柿一枚全煎如療膈氣吐逆羸困入慈白三寸棗五枚全煎婦人亦可服瘴病發熱候冷服老人虛人大便閉加蜜少許煎冷服

瘴病多因脾胃感冷而成是方用參朮苓草陳半六君以補脾利痰丁香木香砂仁白殼藿香以開胃除積冷以温中青皮以理氣穀芽神麯以消積瘴病上熱肺最受邪枇杷葉遺苡仁桑白皮以養肺散肺熱五味隨風子之酸以補肺欲肺

氣瘴病陽氣不降檳榔大腹皮沉香以降氣氣不降則下寒下寒則腎無陽石斛杜仲合沉香引陽氣入腎而煖腰膝故李待制謂其宜於瘴病能升降陰陽雖證候未分亦可服之

平胃散

治脾胃不和膈噎痰氣嘔吐酸水氣刺氣悶脇筋虛脹腹痛腸鳴胸膈痞滿飲食不美常服則温養脾元及辟嵐瘴冷濕病後進食惡有神效

厚朴三兩去皮薑汁炒　陳皮留白三兩　甘草二兩炙

蒼术五兩米泔水浸炒　生薑四兩和皮薄切

小棗二百粒去核　右用水五升漫火煎乾搗作餅子先晒後焙碾爲末入鹽少許調服如泄瀉加生薑烏梅空心服脾寒瘧疾

可加草果烏梅各一個如胃寒嘔吐加丁香茯苓生薑氣不舒快不思飲食加砂仁香附各三兩生薑湯調服

瘴地陰濕之氣常盛脾惡濕蒼术以扶脾燥濕厚朴以温中下氣理痰消食去濕陳皮以消痰利氣甘草能健脾和中薑以利痰温胃小棗之甘可以補脾氣

紅丸子

治食瘧惡心腹滿寒熱右手寸鬲脈弦實或沉滑要之瘴瘧多因食積氣痞痰結此藥消食下氣化痰雖爲下氣消瘴之妙藥却不可常服而又不宜於孕婦虛老之人所以易簡方云礬紅阿魏不宜常服用以治瘧黃丹爲衣最好若食積癥瘕痞脹得真阿魏却甚良然亦在修合之際用好米醋煎陳米糊爲丸自洗米至作糊不着水純用醋爲妙

蓬莪术五兩煨青皮五兩去穰陳皮五兩去白京三稜五兩煨胡椒三兩　乾薑三兩　阿魏二兩酒化　礬紅爲衣用細末醋糊丸礬紅爲衣每服六十九不拘時治瘧疾生薑桔皮湯下大病後飲食難化及中脘停酸薑湯下心腹脹滿紫蘇湯下　酒疸食疸遍身皆黃大麥煎湯下酒傷面黃腹脹或時乾嘔煨薑湯下　脾氣刺痛菖蒲湯下兩脇引乳作痛沉香湯下

瘴瘧外因四時之氣乖戾內因積食生冷而成留者攻之故用阿魏棱术以去積冷積爲患氣快則消氣滯則聚得熱則行得寒愈結青陳皮辛温以快氣椒薑辛熱以散冷結用礬紅爲衣者假其土性以培脾胃耳治瘧用之以温中消積甚得其宜

感應丸

治瘧初起先服此去冷積及治飲食生冷傷物停積不化心下堅滿胸膈痞悶兩脇脹痛心腹大痛霍亂吐瀉大便頻後重遲滯下痢赤白膿血相兼米穀不消飲食不進而復發嘔吐痰逆惡心喜睡大便或秘或泄不拘新久積冷併治之

南木香一兩五錢去蘆　丁香一兩五錢　乾薑一兩炮

肉豆蔻去皮搥碎去油二十粒　百草霜二兩研細末

巴豆去心去油淨七十粒　杏仁去皮尖四十粒研爛如膏

右將前四味為末同草霜杏仁研勻又將好黃蠟六兩溶化作汁以重棉濾去渣更以好酒一升於銀石器內煮蠟數滾傾出候酒冷其蠟自浮取蠟聽用春夏修合用清油一兩五錢先於銚內熬令不散香熟次下煮過蠟四兩化作汁就銚內拌和前藥末作錠以油單紙裹之旋丸每服十丸棗豆大薑湯送下或用陳皮半夏湯送下亦可

溫中固下方

薑附湯

治瘴病內弱發熱或寒熱往來痰逆嘔吐頭痛身疼或汗多煩燥引飲或白利小便赤兼主卒中風

黑附子大者要一兩以上者一個炮去皮臍分作四服每服加

薑十片煎溫服如欲令汗依此方作服之才拘時

瘴疾痰逆嘔吐自利者脾土無陽虛寒也汗多者陽氣外泄也煩燥引飲小便赤者陽氣上浮心肺焦熬而然也頭痛心疼者虛寒外甚也是方用附子乾辛熱以溫脾收外泄之陽氣佐以生薑又能發散外寒冷服乃能導心肺之熱下行焦腎經陽氣盡浮於上腎經空虛之極是方用附子乃腎經本藥加以沉香能引上焦陽氣入腎腎中有陽氣則下元煖根本固而邪氣自息矣

冷服之

瘴病煩渴引飲舌黑陽氣上浮心肺極熱也手足冷鼻尖涼吐利脾土無陽虛寒也身體重寒氣外盛也汗出惡風陽氣外泄不能衛皮毛也薑附乾辛熱能溫中祛外寒而收外泄之陽氣冷飲之以導心肺之熱下行而煖下焦上焦之熱下行中下二焦溫煖則寒熱退諸病息矣

沉附湯

治瘴病上熱下寒腿足寒厥

大附子五錢　沉香磨濃汁右薑七片煎八分乘熱入沉香汁勿令十分熱方冷服之

此藥既主上熱下寒須真正沉香方佳

此香自有數種如用腿足須當以泡水試之沉者入水即沉性平辛辣者性熱用者須要擂以附子率用小者及漏蘆側子之類謂難得大者然陰毒及冷瘴但欲一時壯陽氣可也若虛而藉以降氣斂陽恐非地道大附子辛熱以溫脾收外泄之陽益元加減方治瘴病本上熱下寒加之腿足寒厥乃下焦腎經陽氣盡浮於上腎經空虛之極是方用附子乃腎經本藥加以沉香能引上焦陽氣入腎腎中有陽氣則下元煖根本固而邪氣自息矣

冷湯

治瘴病內寒外熱咽嗌乾燥煩渴不止

人參五錢　甘草三寸炙　淡竹葉十四片大棗五枚

大附子一錢去皮右水煎服
瘴病內真寒外假熱咽嗌乾燥煩渴不止者心肺熱也人參能補肺甘生津又利痰甘草甘能和二味合用能緩心肺之火淡竹葉能解煩渴大棗能補元氣大附子能引心肺之火下行則煩渴止矣

既濟湯

治瘴病熱大煩渴飲水無度
甘草一錢　淡竹葉二十片
大附子三錢　人參三錢
麥門冬二錢去心水煎服
半夏一錢　粳米二錢
瘴病煩渴飲水無度者華蓋蕉葵之極也故用人參以補肺生津甘草甘以緩火麥冬竹葉寒以潤肺佐以半夏引火下行不令華蓋蕉葵焦燥也

冷香湯

治瘴病胃脘刺痛胸膈不利或吐或瀉引飲無度及治夏秋暑濕恣食生冷遂成霍亂陰陽相干臍腹刺痛脇肋脹滿煩亂口渴等證
良薑一兩　檀香二兩
甘草二兩　川薑一兩
丁香五錢　附子一兩
錢水一鍾半煎數滾貯瓶內沉井底待冷服之

瘴因食生冷而得胃脘痛吐瀉胸膈不利皆脾胃之寒也寒甚於內治以辛熱川薑良薑檀香草豆蔻丁香附子皆辛熱之

按温中固下二法治瘴之重者必用之第瘴病顯然明見者皆極熱之證而陰寒之證反微難見故以熱治熱之法非玄機之士未免皆以爲怪也然必冷飲者乃內經寒因熱用熱因寒用之義已見附子論

鎮下方

養正丹

治瘴病上盛下虛升降陰陽補接真氣及治虛風頭眩吐涎不已
黑錫　水銀　硫磺
草豆蔻一兩　右爲細末每用三
另研先將淨鐵銚入鉛先鎔去滓二兩淨再入銚內用鐵匙炒攪將硫磺末三錢漸投入或焰起無妨只憑手攪炒令鉛熟

無性其硫磺皆燒去但得鉛熟遂傾地下紙上令硬即研細以紗篩出鉛粉其餘成硃者再炒再研再篩次將銚頭漫火上又鎔鉛粉入硫磺一兩頻頻攪炒至黃烟上即惡持起放冷處少頃又頓火上再炒鉛與硫磺皆成黑色極調和了却放冷處候其微冷又頓在微火上少頃入水銀以匙攪炒切勿令青烟上又次入硃砂末頻炒至十分調和即傾在地中紙上候硬別研爲末粘米糊爲丸綠豆大每服三十丸鹽湯送下

瘴病之證多上熱下寒是方用硫磺大熱之藥能補真陽兼真火佐以硃砂黑鉛水銀三味皆至陰之物其性寒所以去巨格之寒兼有伏陽不得不爾硫磺亦號將軍功能破邪歸陽氣使不上浮外泄下元常温煖已病瘴者得愈未病者可以免矣

黑錫丹

治瘴病上熱下寒升降陰陽及治痰氣壅塞上盛下虛心火炎熾腎水枯竭及婦人血海久冷無子赤白帶下屬虛寒者並治之

黑錫二兩　硫磺二兩　肉桂五錢　沉香　附子炮去皮劑故紙炒　小茴炒　木香　胡盧巴酒浸炒肉豆蔻煨　陽起石研細水飛

金鈴子蒸去皮核各一兩　右用新鐵銚如常法結黑硫砂於地上出火毒候冷研極細末餘藥併末同研自朝至暮以黑光爲度酒麵糊丸梧桐子大陰乾入布袋內擦令光瑩每服三五十丸鹽湯下或棗湯婦人艾葉湯下

瘴病土熱下寒是方硫磺之大熱能助真火佐以黑鉛之至陰能治陰盛格陽之病木香能理諸氣肉豆蔻能下諸氣沉香能降諸氣加以故紙小茴胡盧巴引陽氣入腎肉桂能保腎附子導熱氣下行入腎若陽起石能補腎添精直高嶺之上引陽氣下達腎經共爲温補下元鎮固陽氣與瘴病爲宜也

來復丹

治瘴病上盛下虛升降陰陽及治伏暑泄瀉如水嘔吐不止

硝石三兩　青皮二兩去瓤　五靈脂二兩去沙石　陳皮二兩去白　玄精石二兩研飛　硫磺二兩爲末同靈脂入鍋內微火炒用柳條攪勿可火大再研極細末右末醋糊爲丸綠豆大每服三十丸米飲下

瘴病因傷生冷外感暑氣氣不升降是方硝石性寒佐以青陳皮性疏快硫磺大熱能助真陽佐以硝石玄精石之至陰則伏陽格陰皆退五靈脂能理氣共爲通利三焦升降陰陽之劑瘴疾揮霍變亂者尤宜用之

靈砂丹

治瘴病上盛下虛痰涎壅塞此藥最能升降陰陽鎮墜陽氣安和五臟扶助元氣

水銀八兩　硫磺二兩　右用新鐵銚炒成砂有烟即以醋酒
候研細入水火罐內醋調赤石脂封口鐵線札縛煅鹽塩土
固濟晒乾用炭二十觔煅煉如罐裂筆蘸赤石脂類抹水盡
爲度經宿取出研爲細末糯米糊爲丸麻子大每服二十丸
衆湯下米飲人參任下

七衆湯

斷瘴方

治外感風寒內傷生冷或五藏氣虛陰陽相勝作瘧寒多
熱少或但寒不熱
大附子一個炮火煨以塩浸再煨再浸七次去皮臍切片用
生薑七片棗七枚水煎當發早晨空心温服仍吃棗三五枚
忌口爲要

冷瘴因寒疾而作是方用大附子去寒疾且能引上焦之陽
氣下入至陰以成地天之交泰正王太僕所謂益火之元以
消陰翳加以大棗甘以温脾則寒疾息而瘴瘧止矣

四獸飲

治喜怒不節飲食過度勞役兼併致陰陽相勝結聚厥飲與衛
氣相搏發爲瘴瘧

截瘴九

治瘴病不問冷熱或一日一發二日一發三日一發
常山五兩醋炒七次　烏梅四十粒去核
檳榔四十枚　甘草三兩同炒爲細末薑汁打米糊爲丸
梧子大未發時好酒吞二十一九一日服七八次尤妙正發
時莫服瘴止後忌雞魚羊肉及鮓麵葱韮蒜生冷瓜果一切
毋犯避風寒戒房事毋忽怒

瘴與瘧同病異名瘧有定時瘴多變證治瘴之法不問
斷者使之間斷已間斷者使之輕減然後用
是方無痰不瘧故用常山以去痰寒熱所感邪氣多在榮衛
之間常山能去皮膚毛孔中之邪氣佐以檳榔能下滯
氣消積利痰甘草甘以和中氣借烏梅酸以斂外泄陽

氣生薑辛以開胃利痰痰去則瘴本去矣截瘴之方惟此爲妙

七寶飲

治瘴瘧一日一發或間日一發明白作息有時此以截之

常山　檳榔　草果去皮　厚朴　青皮　陳皮　甘草　等分用酒水各一鍾煎好以棉罩之放星月下露一宿當日早冷服服後莫熱飲食

無痰不成瘧是方用常山逐痰檳榔墜痰氣草果温中去寒痰厚朴青陳皮辛以行氣氣行則痰不能留甘草調胃和中共爲行氣消痰之劑痰消則瘧本消宜乎瘴已

不再作也

按瘴病治法最難於始發熱不間斷時及其温中固下正氣和解後明白作息有時正氣漸和下焦濕冷已去諸凡截藥不犯寒凉不吐不利者俱可用

麥門冬湯

治痙瘴神清目開大小便如常惟不能出聲身熱

麥冬去心　人參　白朮　陳皮　當歸　肉桂　川芎　半夏　烏梅　大附子　甘草　茯苓去皮

右加薑三片水煎温調黑神散服

痙瘴若神昏直視不知人事痰響者屬痰神昏不知人事不痰響能飲食惟不能出聲此邪熱湧沸其血上塞心肺之竅故不能言也是方用六君子緩火邪以補脾救元氣門冬解心肺之熱烏梅生津以收外泄陽氣歸芎以行散上竅之血血得熱則行故用桂附之熱以行之且能引上焦之陽下入陰分再調黑神散以驅逐其血血散則心肺之竅開而聲音出矣

黑神散

治痙瘴

黑豆二合半炒去皮　當歸二兩　乾薑二兩　熟地二兩　肉桂去粗皮二兩　白芍酒炒五錢　甘草五錢

右爲末每服二錢調麥門冬湯下

瘴病之熱專熬心肺熱甚則湧沸其血出於上竅則爲吐衄不能上出口鼻惟塞於心肺之竅則爲痙瘴是方蒲黃能逐敗血芍歸能去舊血生新血薑能使血行甘草以和氣益血乃陰類熟地黑豆乃北方之物合諸藥以導血歸源也

青州白丸子

治痙瘴目上視口噤痰涎閉塞昏不知人遺尿遺屎及治中風痰甚等證

生半夏七兩　南星二兩　生白附子二兩　生川烏五錢

右爲細末以生絹袋盛入井水內擺出未出者再以手搓合出渣再研再入絹袋擺盡爲度於磁盆中日晒夜露每日一換新水攪澄清春五夏三秋七冬十日去水晒乾研細以

糯米粉煎服清爲丸菉豆大每服二十丸生薑湯下

瘧瘴口噤目上視痰涎閉塞昏不知人遺尿遺屎因脾胃感冷中氣不能運痰以致痰氣上迷心竅故神昏不能言也痰生於濕半夏南星能燥濕痰滯於寒白附之温川烏之辛熱能祛寒送以薑湯最能治痰滯之瘴也

星附湯

治瘧瘴痰涎上壅昏不知人聲如牽鋸口噤直視遺尿遺屎

生南星一兩　生附子一兩　木香五錢　㊀劑散每服四錢薑

九片水煎温服

瘧瘴有痰涎上塞聲如扯鋸之狀㊀再兼異證皆痰所爲由脾胃感冷中氣虛寒㊀㊁㊂㊃㊄㊅用南星㊆燥以去痰

附子㊇辛熱以温中佐以木香㊈辛以行氣氣行則痰行也

予治痰證多以此方爲主重者單用或加二陳湯內虛㊉再倍加人參㊋佐以沉香㊌屢㊍效

三生飲

治瘧瘴如前證之甚者及治瘴後痰厥

生南星一兩　生附子五錢　生川烏五錢　木香二錢五分

㊎劑散每服五錢生薑十片水煎温服元氣虛者加人參五錢㊏劑煎

見㊐即前方加川烏因脾胃虛寒㊑㊒故加之若元氣虛者寒不能爲柄㊓㊔㊕㊖㊗㊘㊙㊚㊛㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢㊣㊤㊥㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)(46)(47)(48)(49)(50)(51)(52)(53)(54)(55)(56)(57)(58)(59)(60)(61)(62)(63)(64)(65)(66)(67)(68)(69)(70)(71)(72)(73)(74)(75)(76)(77)(78)(79)(80)(81)(82)(83)(84)(85)(86)(87)(88)(89)(90)(91)(92)(93)(94)(95)(96)(97)(98)(99)(100)(101)(102)(103)(104)(105)(106)(107)(108)(109)(110)(111)(112)(113)(114)(115)(116)(117)(118)(119)(120)(121)(122)(123)(124)(125)(126)(127)(128)(129)(130)(131)(132)(133)(134)(135)(136)(137)(138)(139)(140)(141)(142)(143)(144)(145)(146)(147)(148)(149)(150)(151)(152)(153)(154)(155)(156)(157)(158)(159)(160)(161)(162)(163)(164)(165)(166)(167)(168)(169)(170)(171)(172)(173)(174)(175)(176)(177)(178)(179)(180)(181)(182)(183)(184)(185)(186)(187)(188)(189)(190)(191)(192)(193)(194)(195)(196)(197)(198)(199)(200)(201)(202)(203)(204)(205)(206)(207)(208)(209)(210)(211)(212)(213)(214)(215)(216)(217)(218)(219)(220)(221)(222)(223)(224)(225)(226)(227)(228)(229)(230)(231)(232)(233)(234)(235)(236)(237)(238)(239)(240)(241)(242)(243)(244)(245)(246)(247)(248)(249)(250)(251)(252)(253)(254)(255)(256)(257)(258)(259)(260)(261)(262)(263)(264)(265)(266)(267)(268)(269)(270)(271)(272)(273)(274)(275)(276)(277)(278)(279)(280)(281)(282)(283)(284)(285)(286)(287)(288)(289)(290)(291)(292)(293)(294)(295)(296)(297)(298)(299)(300)(301)(302)(303)(304)(305)(306)(307)(308)(309)(310)(311)(312)(313)(314)(315)(316)(317)(318)(319)(320)(321)(322)(323)(324)(325)(326)(327)(328)(329)(330)(331)(332)(333)(334)(335)(336)(337)(338)(339)(340)(341)(342)(343)(344)(345)(346)(347)(348)(349)(350)(351)(352)(353)(354)(355)(356)(357)(358)(359)(360)(361)(362)(363)(364)(365)(366)(367)(368)(369)(370)(371)(372)(373)(374)(375)(376)(377)(378)(379)(380)(381)(382)(383)(384)(385)(386)(387)(388)(389)(390)(391)(392)(393)(394)(395)(396)(397)(398)(399)(400)(401)(402)(403)(404)(405)(406)(407)(408)(409)(410)(411)(412)(413)(414)(415)(416)(417)(418)(419)(420)(421)(422)(423)(424)(425)(426)(427)(428)(429)(430)(431)(432)(433)(434)(435)(436)(437)(438)(439)(440)(441)(442)(443)(444)(445)(446)(447)(448)(449)(450)(451)(452)(453)(454)(455)(456)(457)(458)(459)(460)(461)(462)(463)(464)(465)(466)(467)(468)(469)(470)(471)(472)(473)(474)(475)(476)(477)(478)(479)(480)(481)(482)(483)(484)(485)(486)(487)(488)(489)(490)(491)(492)(493)(494)(495)(496)(497)(498)(499)(500)(501)(502)(503)(504)(505)(506)(507)(508)(509)(510)(511)(512)(513)(514)(515)(516)(517)(518)(519)(520)(521)(522)(523)(524)(525)(526)(527)(528)(529)(530)(531)(532)(533)(534)(535)(536)(537)(538)(539)(540)(541)(542)(543)(544)(545)(546)(547)(548)(549)(550)(551)(552)(553)(554)(555)(556)(557)(558)(559)(560)(561)(562)(563)(564)(565)(566)(567)(568)(569)(570)(571)(572)(573)(574)(575)(576)(577)(578)(579)(580)(581)(582)(583)(584)(585)(586)(587)(588)(589)(590)(591)(592)(593)(594)(595)(596)(597)(598)(599)(600)(601)(602)(603)(604)(605)(606)(607)(608)(609)(610)(611)(612)(613)(614)(615)(616)(617)(618)(619)(620)(621)(622)(623)(624)(625)(626)(627)(628)(629)(630)(631)(632)(633)(634)(635)(636)(637)(638)(639)(640)(641)(642)(643)(644)(645)(646)(647)(648)(649)(650)(651)(652)(653)(654)(655)(656)(657)(658)(659)(660)(661)(662)(663)(664)(665)(666)(667)(668)(669)(670)(671)(672)(673)(674)(675)(676)(677)(678)(679)(680)(681)(682)(683)(684)(685)(686)(687)(688)(689)(690)(691)(692)(693)(694)(695)(696)(697)(698)(699)(700)(701)(702)(703)(704)(705)(706)(707)(708)(709)(710)(711)(712)(713)(714)(715)(716)(717)(718)(719)(720)(721)(722)(723)(724)(725)(726)(727)(728)(729)(730)(731)(732)(733)(734)(735)(736)(737)(738)(739)(740)(741)(742)(743)(744)(745)(746)(747)(748)(749)(750)(751)(752)(753)(754)(755)(756)(757)(758)(759)(760)(761)(762)(763)(764)(765)(766)(767)(768)(769)(770)(771)(772)(773)(774)(775)(776)(777)(778)(779)(780)(781)(782)(783)(784)(785)(786)(787)(788)(789)(790)(791)(792)(793)(794)(795)(796)(797)(798)(799)(800)(801)(802)(803)(804)(805)(806)(807)(808)(809)(810)(811)(812)(813)(814)(815)(816)(817)(818)(819)(820)(821)(822)(823)(824)(825)(826)(827)(828)(829)(830)(831)(832)(833)(834)(835)(836)(837)(838)(839)(840)(841)(842)(843)(844)(845)(846)(847)(848)(849)(850)(851)(852)(853)(854)(855)(856)(857)(858)(859)(860)(861)(862)(863)(864)(865)(866)(867)(868)(869)(870)(871)(872)(873)(874)(875)(876)(877)(878)(879)(880)(881)(882)(883)(884)(885)(886)(887)(888)(889)(890)(891)(892)(893)(894)(895)(896)(897)(898)(899)(900)(901)(902)(903)(904)(905)(906)(907)(908)(909)(910)(911)(912)(913)(914)(915)(916)(917)(918)(919)(920)(921)(922)(923)(924)(925)(926)(927)(928)(929)(930)(931)(932)(933)(934)(935)(936)(937)(938)(939)(940)(941)(942)(943)(944)(945)(946)(947)(948)(949)(950)(951)(952)(953)(954)(955)(956)(957)(958)(959)(960)(961)(962)(963)(964)(965)(966)(967)(968)(969)(970)(971)(972)(973)(974)(975)(976)(977)(978)(979)(980)(981)(982)(983)(984)(985)(986)(987)(988)(989)(990)(991)(992)(993)(994)(995)(996)(997)(998)(999)(1000)(1001)(1002)(1003)(1004)(1005)(1006)(1007)(1008)(1009)(1010)(1011)(1012)(1013)(1014)(1015)(1016)(1017)(1018)(1019)(1020)(1021)(1022)(1023)(1024)(1025)(1026)(1027)(1028)(1029)(1030)(1031)(1032)(1033)(1034)(1035)(1036)(1037)(1038)(1039)(1040)(1041)(1042)(1043)(1044)(1045)(1046)(1047)(1048)(1049)(1050)(1051)(1052)(1053)(1054)(1055)(1056)(1057)(1058)(1059)(1060)(1061)(1062)(1063)(1064)(1065)(1066)(1067)(1068)(1069)(1070)(1071)(1072)(1073)(1074)(1075)(1076)(1077)(1078)(1079)(1080)(1081)(1082)(1083)(1084)(1085)(1086)(1087)(1088)(1089)(1090)(1091)(1092)(1093)(1094)(1095)(1096)(1097)(1098)(1099)(1100)(1101)(1102)(1103)(1104)(1105)(1106)(1107)(1108)(1109)(1110)(1111)(1112)(1113)(1114)(1115)(1116)(1117)(1118)(1119)(1120)(1121)(1122)(1123)(1124)(1125)(1126)(1127)(1128)(1129)(1130)(1131)(1132)(1133)(1134)(1135)(1136)(1137)(1138)(1139)(1140)(1141)(1142)(1143)(1144)(1145)(1146)(1147)(1148)(1149)(1150)(1151)(1152)(1153)(1154)(1155)(1156)(1157)(1158)(1159)(1160)(1161)(1162)(1163)(1164)(1165)(1166)(1167)(1168)(1169)(1170)(1171)(1172)(1173)(1174)(1175)(1176)(1177)(1178)(1179)(1180)(1181)(1182)(1183)(1184)(1185)(1186)(1187)(1188)(1189)(1190)(1191)(1192)(1193)(1194)(1195)(1196)(1197)(1198)(1199)(1200)(1201)(1202)(1203)(1204)(1205)(1206)(1207)(1208)(1209)(1210)(1211)(1212)(1213)(1214)(1215)(1216)(1217)(1218)(1219)(1220)(1221)(1222)(1223)(1224)(1225)(1226)(1227)(1228)(1229)(1230)(1231)(1232)(1233)(1234)(1235)(1236)(1237)(1238)(1239)(1240)(1241)(1242)(1243)(1244)(1245)(1246)(1247)(1248)(1249)(1250)(1251)(1252)(1253)(1254)(1255)(1256)(1257)(1258)(1259)(1260)(1261)(1262)(1263)(1264)(1265)(1266)(1267)(1268)(1269)(1270)(1271)(1272)(1273)(1274)(1275)(1276)(1277)(1278)(1279)(1280)(1281)(1282)(1283)(1284)(1285)(1286)(1287)(1288)(1289)(1290)(1291)(1292)(1293)(1294)(1295)(1296)(1297)(1298)(1299)(1300)(1301)(1302)(1303)(1304)(1305)(1306)(1307)(1308)(1309)(1310)(1311)(1312)(1313)(1314)(1315)(1316)(1317)(1318)(1319)(1320)(1321)(1322)(1323)(1324)(1325)(1326)(1327)(1328)(1329)(1330)(1331)(1332)(1333)(1334)(1335)(1336)(1337)(1338)(1339)(1340)(1341)(1342)(1343)(1344)(1345)(1346)(1347)(1348)(1349)(1350)(1351)(1352)(1353)(1354)(1355)(1356)(1357)(1358)(1359)(1360)(1361)(1362)(1363)(1364)(1365)(1366)(1367)(1368)(1369)(1370)(1371)(1372)(1373)(1374)(1375)(1376)(1377)(1378)(1379)(1380)(1381)(1382)(1383)(1384)(1385)(1386)(1387)(1388)(1389)(1390)(1391)(1392)(1393)(1394)(1395)(1396)(1397)(1398)(1399)(1400)(1401)(1402)(1403)(1404)(1405)(1406)(1407)(1408)(1409)(1410)(1411)(1412)(1413)(1414)(1415)(1416)(1417)(1418)(1419)(1420)(1421)(1422)(1423)(1424)(1425)(1426)(1427)(1428)(1429)(1430)(1431)(1432)(1433)(1434)(1435)(1436)(1437)(1438)(1439)(1440)(1441)(1442)(1443)(1444)(1445)(1446)(1447)(1448)(1449)(1450)(1451)(1452)(1453)(1454)(1455)(1456)(1457)(1458)(1459)(1460)(1461)(1462)(1463)(1464)(1465)(1466)(1467)(1468)(1469)(1470)(1471)(1472)(1473)(1474)(1475)(1476)(1477)(1478)(1479)(1480)(1481)(1482)(1483)(1484)(1485)(1486)(1487)(1488)(1489)(1490)(1491)(1492)(1493)(1494)(1495)(1496)(1497)(1498)(1499)(1500)(1501)(1502)(1503)(1504)(1505)(1506)(1507)(1508)(1509)(1510)(1511)(1512)(1513)(1514)(1515)(1516)(1517)(1518)(1519)(1520)(1521)(1522)(1523)(1524)(1525)(1526)(1527)(1528)(1529)(1530)(1531)(1532)(1533)(1534)(1535)(1536)(1537)(1538)(1539)(1540)(1541)(1542)(1543)(1544)(1545)(1546)(1547)(1548)(1549)(1550)(1551)(1552)(1553)(1554)(1555)(1556)(1557)(1558)(1559)(1560)(1561)(1562)(1563)(1564)(1565)(1566)(1567)(1568)(1569)(1570)(1571)(1572)(1573)(1574)(1575)(1576)(1577)(1578)(1579)(1580)(1581)(1582)(1583)(1584)(1585)(1586)(1587)(1588)(1589)(1590)(1591)(1592)(1593)(1594)(1595)(1596)(1597)(1598)(1599)(1600)(1601)(1602)(1603)(1604)(1605)(1606)(1607)(1608)(1609)(1610)(1611)(1612)(1613)(1614)(1615)(1616)(1617)(1618)(1619)(1620)(1621)(1622)(1623)(1624)(1625)(1626)(1627)(1628)(1629)(1630)(1631)(1632)(1633)(1634)(1635)(1636)(1637)(1638)(1639)(1640)(1641)(1642)(1643)(1644)(1645)(1646)(1647)(1648)(1649)(1650)(1651)(1652)(1653)(1654)(1655)(1656)(1657)(1658)(1659)(1660)(1661)(1662)(1663)(1664)(1665)(1666)(1667)(1668)(1669)(1670)(1671)(1672)(1673)(1674)(1675)(1676)(1677)(1678)(1679)(1680)(1681)(1682)(1683)(1684)(1685)(1686)(1687)(1688)(1689)(1690)(1691)(1692)(1693)(1694)(1695)(1696)(1697)(1698)(1699)(1700)(1701)(1702)(1703)(1704)(1705)(1706)(1707)(1708)(1709)(1710)(1711)(1712)(1713)(1714)(1715)(1716)(1717)(1718)(1719)(1720)(1721)(1722)(1723)(1724)(1725)(1726)(1727)(1728)(1729)(1730)(1731)(1732)(1733)(1734)(1735)(1736)(1737)(1738)(1739)(1740)(1741)(1742)(1743)(1744)(1745)(1746)(1747)(1748)(1749)(1750)(1751)(1752)(1753)(1754)(1755)(1756)(1757)(1758)(1759)(1760)(1761)(1762)(1763)(1764)(1765)(1766)(1767)(1768)(1769)(1770)(1771)(1772)(1773)(1774)(1775)(1776)(1777)(1778)(1779)(1780)(1781)(1782)(1783)(1784)(1785)(1786)(1787)(1788)(1789)(1790)(1791)(1792)(1793)(1794)(1795)(1796)(1797)(1798)(1799)(1800)(1801)(1802)(1803)(1804)(1805)(1806)(1807)(1808)(1809)(1810)(1811)(1812)(1813)(1814)(1815)(1816)(1817)(1818)(1819)(1820)(1821)(1822)(1823)(1824)(1825)(1826)(1827)(1828)(1829)(1830)(1831)(1832)(1833)(1834)(1835)(1836)(1837)(1838)(1839)(1840)(1841)(1842)(1843)(1844)(1845)(1846)(1847)(1848)(1849)(1850)(1851)(1852)(1853)(1854)(1855)(1856)(1857)(1858)(1859)(1860)(1861)(1862)(1863)(1864)(1865)(1866)(1867)(1868)(1869)(1870)(1871)(1872)(1873)(1874)(1875)(1876)(1877)(1878)(1879)(1880)(1881)(1882)(1883)(1884)(1885)(1886)(1887)(1888)(1889)(1890)(1891)(1892)(1893)(1894)(1895)(1896)(1897)(1898)(1899)(1900)(1901)(1902)(1903)(1904)(1905)(1906)(1907)(1908)(1909)(1910)(1911)(1912)(1913)(1914)(1915)(1916)(1917)(1918)(1919)(1920)(1921)(1922)(1923)(1924)(1925)(1926)(1927)(1928)(1929)(1930)(1931)(1932)(1933)(1934)(1935)(1936)(1937)(1938)(1939)(1940)(1941)(1942)(1943)(1944)(1945)(1946)(1947)(1948)(1949)(1950)(1951)(1952)(1953)(1954)(1955)(1956)(1957)(1958)(1959)(1960)(1961)(1962)(1963)(1964)(1965)(1966)(1967)(1968)(1969)(1970)(1971)(1972)(1973)(1974)(1975)(1976)(1977)(1978)(1979)(1980)(1981)(1982)(1983)(1984)(1985)(1986)(1987)(1988)(1989)(1990)(1991)(1992)(1993)(1994)(1995)(1996)(1997)(1998)(1999)(2000)(2001)(2002)(2003)(2004)(2005)(2006)(2007)(2008)(2009)(2010)(2011)(2012)(2013)(2014)(2015)(2016)(2017)(2018)(2019)(2020)(2021)(2022)(2023)(2024)(2025)(2026)(2027)(2028)(2029)(2030)(2031)(2032)(2033)(2034)(2035)(2036)(2037)(2038)(2039)(2040)(2041)(2042)(2043)(2044)(2045)(2046)(2047)(2048)(2049)(2050)(2051)(2052)(2053)(2054)(2055)(2056)(2057)(2058)(2059)(2060)(2061)(2062)(2063)(2064)(2065)(2066)(2067)(2068)(2069)(2070)(2071)(2072)(2073)(2074)(2075)(2076)(2077)(2078)(2079)(2080)(2081)(2082)(2083)(2084)(2085)(2086)(2087)(2088)(2089)(2090)(2091)(2092)(2093)(2094)(2095)(2096)(2097)(2098)(2099)(2100)(2101)(2102)(2103)(2104)(2105)(2106)(2107)(2108)(2109)(2110)(2111)(2112)(2113)(2114)(2115)(2116)(2117)(2118)(2119)(2120)(2121)(2122)(2123)(2124)(2125)(2126)(2127)(2128)(2129)(2130)(2131)(2132)(2133)(2134)(2135)(2136)(2137)(2138)(2139)(2140)(2141)(2142)(2143)(2144)(2145)(2146)(2147)(2148)(2149)(2150)(2151)(2152)(2153)(2154)(2155)(2156)(2157)(2158)(2159)(2160)(2161)(2162)(2163)(2164)(2165)(2166)(2167)(2168)(2169)(2170)(2171)(2172)(2173)(2174)(2175)(2176)(2177)(2178)(2179)(2180)(2181)(2182)(2183)(2184)(2185)(2186)(2187)(2188)(2189)(2190)(2191)(2192)(2193)(2194)(2195)(2196)(2197)(2198)(2199)(2200)(2201)(2202)(2203)(2204)(2205)(2206)(2207)(2208)(2209)(2210)(2211)(2212)(2213)(2214)(2215)(2216)(2217)(2218)(2219)(2220)(2221)(2222)(2223)(2224)(2225)(2226)(2227)(2228)(2229)(2230)(2231)(2232)(2233)(2234)(2235)(2236)(2237)(2238)(2239)(2240)(2241)(2242)(2243)(2244)(2245)(2246)(2247)(2248)(2249)(2250)(2251)(2252)(2253)(2254)(2255)(2256)(2257)(2258)(2259)(2260)(2261)(2262)(2263)(2264)(2265)(2266)(2267)(2268)(2269)(2270)(2271)(2272)(2273)(2274)(2275)(2276)(2277)(2278)(2279)(2280)(2281)(2282)(2283)(2284)(2285)(2286)(2287)(2288)(2289)(2290)(2291)(2292)(2293)(2294)(2295)(2296)(2297)(2298)(2299)(2300)(2301)(2302)(2303)(2304)(2305)(2306)(2307)(2308)(2309)(2310)(2311)(2312)(2313)(2314)(2315)(2316)(2317)(2318)(2319)(2320)(2321)(2322)(2323)(2324)(2325)(2326)(2327)(2328)(2329)(2330)(2331)(2332)(2333)(2334)(2335)(2336)(2337)(2338)(2339)(2340)(2341)(2342)(2343)(2344)(2345)(2346)(2347)(2348)(2349)(2350)(2351)(2352)(2353)(2354)(2355)(2356)(2357)(2358)(2359)(2360)(2361)(2362)(2363)(2364)(2365)(2366)(2367)(2368)(2369)(2370)(2371)(2372)(2373)(2374)(2375)(2376)(2377)(2378)(2379)(2380)(2381)(2382)(2383)(2384)(2385)(2386)(2387)(2388)(2389)(2390)(2391)(2392)(2393)(2394)(2395)(2396)(2397)(2398)(2399)(2400)(2401)(2402)(2403)(2404)(2405)(2406)(2407)(2408)(2409)(2410)(2411)(2412)(2413)(2414)(2415)(2416)(2417)(2418)(2419)(2420)(2421)(2422)(2423)(2424)(2425)(2426)(2427)(2428)(2429)(2430)(2431)(2432)(2433)(2434)(2435)(2436)(2437)(2438)(2439)(2440)(2441)(2442)(2443)(2444)(2445)(2446)(2447)(2448)(2449)(2450)(2451)(2452)(2453)(2454)(2455)(2456)(2457)(2458)(2459)(2460)(2461)(2462)(2463)(2464)(2465)(2466)(2467)(2468)(2469)(2470)(2471)(2472)(2473)(2474)(2475)(2476)(2477)(2478)(2479)(2480)(2481)(2482)(2483)(2484)(2485)(2486)(2487)(2488)(2489)(2490)(2491)(2492)(2493)(2494)(2495)(2496)(2497)(2498)(2499)(2500)(2501)(2502)(2503)(2504)(2505)(2506)(2507)(2508)(2509)(2510)(2511)(2512)(2513)(2514)(2515)(2516)(2517)(2518)(2519)(2520)(2521)(2522)(2523)(2524)(2525)(2526)(2527)(2528)(2529)(2530)(2531)(2532)(2533)(2534)(2535)(2536)(2537)(2538)(2539)(2540)(2541)(2542)(2543)(2544)(2545)(2546)(2547)(2548)(2549)(2550)(2551)(2552)(2553)(2554)(2555)(2556)(2557)(2558)(2559)(2560)(2561)(2562)(2563)(2564)(2565)(2566)(2567)(2568)(2569)(2570)(2571)(2572)(2573)(2574)(2575)(2576)(2577)(2578)(2579)(2580)(2581)(2582)(2583)(2584)(2585)(2586)(2587)(2588)(2589)(2590)(2591)(2592)(2593)(2594)(2595)(2596)(2597)(2598)(2599)(2600)(2601)(2602)(2603)(2604)(2605)(2606)(2607)(2608)(2609)(2610)(2611)(2612)(2613)(2614)(2615)(2616)(2617)(2618)(2619)(2620)(2621)(2622)(2623)(2624)(2625)(2626)(2627)(2628)(2629)(2630)(2631)(2632)(2633)(2634)(2635)(2636)(2637)(2638)(2639)(2640)(2641)(2642)(2643)(2644)(2645)(2646)(2647)(2648)(2649)(2650)(2651)(2652)(2653)(2654)(2655)(2656)(2657)(2658)(2659)(2660)(2661)(2662)(2663)(2664)(2665)(2666)(2667)(2668)(2669)(2670)(2671)(2672)(2673)(2674)(2675)(2676)(2677)(2678)(2679)(2680)(2681)(2682)(2683)(2684)(2685)(2686)(2687)(2688)(2689)(2690)(2691)(2692)(2693)(2694)(2695)(2696)(2697)(2698)(2699)(2700)(2701)(2702)(2703)(2704)(2705)(2706)(2707)(2708)(2709)(2710)(2711)(2712)(2713)(2714)(2715)(2716)(2717)(2718)(2719)(2720)(2721)(2722)(2723)(2724)(2725)(2726)(2727)(2728)(2729)(2730)(2731)(2732)(2733)(2734)(2735)(2736)(2737)(2738)(2739)(2740)(2741)(2742)(2743)(2744)(2745)(2746)(2747)(2748)(2749)(2750)(2751)(2752)(2753)(2754)(2755)(2756)(2757)(2758)(2759)(2760)(2761)(2762)(2763)(2764)(2765)(2766)(2767)(2768)(2769)(2770)(2771)(2772)(2773)(2774)(2775)(2776)(2777)(2778)(2779)(2780)(2781)(2782)(2783)(2784)(2785)(2786)(2787)(2788)(2789)(2790)(2791)(2792)(2793)(2794)(2795)(2796)(2797)(2798)(2799)(2800)(2801)(2802)(2803)(2804)(2805)(2806)(2807)(2808)(2809)(2810)(2811)(2812)(2813)(2814)(2815)(2816)(2817)(2818)(2819)(2820)(2821)(2822)(2823)(2824)(2825)(2826)(2827)(2828)(2829)(2830)(2831)(2832)(2833)(2834)(2835)(2836)(2837)(2838)(2839)(2840)(2841)(2842)(2843)(2844)(2845)(2846)(2847)(2848)(2849)(2850)(2851)(2852)(2853)(2854)(2855)(2856)(2857)(2858)(2859)(2860)(2861)(2862)(2863)(2864)(2865)(2866)(2867)(2868)(2869)(2870)(2871)(2872)(2873)(2874)(2875)(2876)(2877)(2878)(2879)(2880)(2881)(2882)(2883)(2884)(2885)(2886)(2887)(2888)(2889)(2890)(2891)(2892)(2893)(2894)(2895)(2896)(2897)(2898)(2899)(2900)(2901)(2902)(2903)(2904)(2905)(2906)(2907)(2908)(2909)(2910)(2911)(2912)(2913)(2914)(2915)(2916)(2917)(2918)(2919)(2920)(2921)(2922)(2923)(2924)(2925)(2926)(2927)(2928)(2929)(2930)(2931)(2932)(2933)(2934)(2935)(2936)(2937)(2938)(2939)(2940)(2941)(2942)(2943)(2944)(2945)(2946)(2947)(2948)(2949)(2950)(2951)(2952)(2953)(2954)(2955)(2956)(2957)(2958)(2959)(2960)(2961)(2962)(2963)(2964)(2965)(2966)(2967)(2968)(2969)(2970)(2971)(2972)(2973)(2974)(2975)(2976)(2977)(2978)(2979)(2980)(2981)(2982)(2983)(2984)(2985)(2986)(2987)(2988)(2989)(2990)(2991)(2992)(2993)(2994)(2995)(2996)(2997)(2998)(2999)(3000)(3001)(3002)(3003)(3004)(3005)(3006)(3007)(3008)(3009)(3010)(3011)(3012)(3013)(3014)(3015)(3016)(3017)(3018)(3019)(3020)(3021)(3022)(3023)(3024)(3025)(3026)(3027)(3028)(3029)(3030)(3031)(3032)(3033)(3034)(3035)(3036)(3037)(3038)(3039)(3040)(3041)(3042)(3043)(3044)(3045)(3046)(3047)(3048)(3049)(3050)(3051)(3052)(3053)(3054)(3055)(3056)(3057)(3058)(3059)(3060)(3061)(3062)(3063)(3064)(3065)(3066)(3067)(3068)(3069)(3070)(3071)(3072)(3073)(3074)(3075)(3076)(3077)(3078)(3079)(3080)(3081)(3082)(3083)(3084)(3085)(3086)(3087)(3088)(3089)(3090)(3091)(3092)(3093)(3094)(3095)(3096)(3097)(3098)(3099)(3100)(3101)(3102)(3103)(3104)(3105)(3106)(3107)(3108)(3109)(3110)(3111)(3112)(3113)(3114)(3115)(3116)(3117)(3118)(3119)(3120)(3121)(3122)(3123)(3124)(3125)(3126)(3127)(3128)(3129)(3130)(3131)(3132)(3133)(3134)(3135)(3136)(3137)(3138)(3139)(3140)(3141)(3142)(3143)(3144)(3145)(3146)(3147)(3148)(3149)(3150)(3151)(3152)(3153)(3154)(3155)(3156)(3157)(3158)(3159)(3160)(3161)(3162)(3163)(3164)(3165)(3166)(3167)(3168)(3169)(3170)(3171)(3172)(3173)(3174)(3175)(3176)(3177)(3178)(3179)(3180)(3181)(3182)(3183)(3184)(3185)(3186)(3187)(3188)(3189)(3190)(3191)(3192)(3193)(3194)(3195)(3196)(3197)(3198)(3199)(3200)(3201)(3202)(3203)(3204)(3205)(3206)(3207)(3208)(3209)(3210)(3211)(3212)(3213)(3214)(3215)(3216)(3217)(3218)(3219)(3220)(3221)(3222)(3223)(3224)(3225)(3226)(3227)(3228)(3229)(3230)(3231)(3232)(3233)(3234)(3235)(3236)(3237)(3238)(3239)(3240)(3241)(3242)(3243)(3244)(3245)(3246)(3247)(3248)(3249)(3250)(3251)(3252)(3253)(3254)(3255)(3256)(3257)(3258)(3259)(3260)(3261)(3262)(3263)(3264)(3265)(3266)(3267)(3268)(3269)(3270)(3271)(3272)(3273)(3274)(3275)(3276)(3277)(3278)(3279)(3280)(3281)(3282)(3283)(3284)(3285)(3286)(3287)(3288)(3289)(3290)(3291)(3292)(3293)(3294)(3295)(3296)(3297)(3298)(3299)(3300)(3301)(3302)(3303)(3304)(3305)(3306)(3307)(3308)(3309)(3310)(3311)(3312)(3313)(3314)(3315)(3316)(3317)(3318)(3319)(3320)(3321)(3322)(3323)(3324)(3325)(3326)(3327)(3328)(3329)(3330)(3331)(3332)(3333)(3334)(3335)(3336)(3337)(3338)(3339)(3340)(3341)(3342)(3343)(3344)(3345)(3346)(3347)(3348)(3349)(3350)(3351)(3352)(3353)(3354)(3355)(3356)(3357)(3358)(3359)(3360)(3361)(3362)(3363)(3364)(3365)(3366)(3367)(3368)(3369)(3370)(3371)(3372)(3373)(3374)(3375)(3376)(3377)(3378)(3379)(3380)(3381)(3382)(3383)(3384)(3385)(3386)(3387)(3388)(3389)(3390)(3391)(3392)(3393)(3394)(3395)(3396)(3397)(3398)(3399)(3400)(3401)(3402)(3403)(3404)(3405)(3406)(3407)(3408)(3409)(3410)(3411)(3412)(3413)(3414)(3415)(3416)(3417)(3418)(3419)(3420)(3421)(3422)(3423)(3424)(3425)(3426)(3427)(3428)(3429)(3430)(3431)(3432)(3433)(3434)(3435)(3436)(3437)(3438)(3439)(3440)(3441)(3442)(3443)(3444)(3445)(3446)(3447)(3448)(3449)(3450)(3451)(3452)(3453)(3454)(3455)(3456)(3457)(3458)(3459)(3460)(3461)(3462)(3463)(3464)(3465)(3466)(3467)(3468)(3469)(3470)(3471)(3472)(3473)(3474)(3475)(3476)(3477)(3478)(3479)(3480)(3481)(3482)(3483)(3484)(3485)(3486)(3487)(3488)(3489)(3490)(3491)(3492)(3493)(3494)(3495)(3496)(3497)(3498)(3499)(3500)(3501)(3502)(3503)(3504)(3505)(3506)(3507)(3508)(3509)(3510)(3511)(3512)(3513)(3514)(3515)(3516)(3517)(3518)(3519)(3520)(3521)(3522)(3523)(3524)(3525)(3526)(3527)(3528)(3529)(3530)(3531)(3532)(3533)(3534)(3535)(3536)(3537)(3538)(3539)(3540)(3541)(3542)(3543)(3544)(3545)(3546)(3547)(3548)(3549)(3550)(3551)(3552)(3553)(3554)(3555)(3556)(3557)(3558)(3559)(3560)(3561)(3562)(3563)(3564)(3565)(3566)(3567)(3568)(3569)(3570)(3571)(3572)(3573)(3574)(3575)(3576)(3577)(3578)(3579)(3580)(3581)(3582)(3583)(3584)(3585)(3586)(3587)(3588)(3589)(3590)(3591)(3592)(3593)(3594)(3595)(3596)(3597)(3598)(3599)(3600)(3601)(3602)(3603)(3604)(3605)(3606)(3607)(3608)(3609)(3610)(3611)(3612)(3613)(3614)(3615)(3616)(3617)(3618)(3619)(3620)(3621)(3622)(3623)(3624)(3625)(3626)(3627)(3628)(3629)(3630)(3631)(3632)(3633)(3634)(3635)(3636)(3637)(3638)(3639)(3640)(3641)(3642)(3643)(3644)(3645)(3646)(3647)(3648)(3649)(3650)(3651)(3652)(3653)(3654)(3655)(3656)(3657)(3658)(3659)(3660)(3661)(3662)(3663)(3664)(3665)(3666)(3667)(3668)(3669)(3670)(3671)(3672)(3673)(3674)(3675)(3676)(3677)(3678)(3679)(3680)(3681)(3682)(3683)(3684)(3685)(3686)(3687)(3688)(3689)(3690)(3691)(3692)(3693)(3694)(3695)(3696)(3697)(3698)(3699)(3700)(3701)(3702)(3703)(3704)(3705)(3706)(3707)(3708)(3709)(3710)(3711)(3712)(3713)(3714)(3715)(3716)(3717)(3718)(3719)(3720)(3721)(3722)(3723)(3724)(3725)(3726)(3727)(3728)(3729)(3730)(3731)(3732)(3733)(3734)(3735)(3736)(3737)(3738)(3739)(3740)(3741)(3742)(3743)(3744)(3745)(3746)(3747)(3748)(3749)(3750)(3751)(3752)(3753)(3754)(3755)(3756)(3757)(3758)(3759)(3760)(3761)(3762)(3763)(3764)(3765)(3766)(3767)(3768)(3769)(3770)(3771)(3772)(3773)(3774)(3775)(3776)(3777)(3778)(3779)(3780)(3781)(3782)(3783)(3784)(3785)(3786)(3787)(3788)(3789)(3790)(3791)(3792)(3793)(3794)(3795)(3796)(3797)(3798)(3799)(3800)(3801)(3802)(3803)(3804)(3805)(3806)(3807)(3808)(3809)(3810)(3811)(3812)(3813)(3814)(3815)(3816)(3817)(3818)(3819)(3820)(3821)(3822)(3823)(3824)(3825)(3826)(3827)(3828)(3829)(3830)(3831)(3832)(3833)(3834)(3835)(3836)(3837)(3838)(3839)(3840)(3841)(3842)(3843)(3844)(3845)(3846)(3847)(3848)(3849)(3850)(3851)(3852)(3853)(3854)(3855)(3856)(3857)(3858)(3859)(3860)(3861)(3862)(3863)(3864)(3865)(3866)(3867)(3868)(3869)(3870)(3871)(3872)(3873)(3874)(3875)(3876)(3877)(3878)(3879)(3880)(3881)(3882)(3883)(3884)(3885)(3886)(3887)(3888)(3889)(3890)(3891)(3892)(3893)(3894)(3895)(3896)(3897)(3898)(3899)(3900)(3901)(3902)(3903)(3904)(3905)(3906)(3907)(3908)(3909)(3910)(3911)(3912)(3913)(3914)(3915)(3916)(3917)(3918)(3919)(3920)(3921)(3922)(3923)(3924)(3925)(3926)(3927)(3928)(3929)(3930)(3931)(3932)(3933)(3934)(3935)(3936)(3937)(3938)(3939)(3940)(3941)(3942)(3943)(3944)(3945)(3946)(3947)(3948)(3949)(3950)(3951)(3952)(3953)(3954)(3955)(3956)(3957)(3958)(3959)(3960)(3961)(3962)(3963)(3964)(3965)(3966)(3967)(3968)(3969)(3970)(3971)(3972)(3973)(3974)(3975)(3976)(3977)(3978)(3979)(3980)(3981)(3982)(3983)(3984)(3985)(3986)(3987)(3988)(3989)(3990)(3991)(3992)(3993)(3994)(3995)(3996)(3997)(3998)(3999)(4000)(4001)(4002)(4003)(4004)(4005)(4006)(4007)(4008)(4009)(4010)(4011)(4012)(4013)(4014)(4015)(4016)(4017)(4018)(4019)(4020)(4021)(4022)(4023)(4024)(4025)(4026)(4027)(4028)(4029)(4030)(4031)(4032)(4033)(4034)(4035)(4036)(4037)(4038)(4039)(4040)(4041)(4042)(4043)(4044)(4045)(4046)(4047)(4048)(4049)(4050)(4051)(4052)(

草果去殼　良薑　青皮去穰　川芎
白芷　藁葉　甘草　各等分剉散水煎熱
服當發日前連進三服不拘時候
四時治要方云風瘧食瘧瘧即瘴也多生於東南謂東南乃
魚鹽之地及多暴風風瘧宜草果飲此方用川芎青皮白芷
發散風邪良薑藁葉發散寒熱今瘴疾脉浮緊頭痛身疼惡
風寒乃感乎凜冽暴風也正宜草果飲因食生冷肥膩中院
生痰嘔逆遂成食瘧宜服二陳湯三因方治食瘧用紅丸子
亦爲捷妙

尊命散

治傷寒瘴瘧陰陽證候不明誤投藥致病垂困煩燥發渴及婦

人產後胎前受熱瘴等證
人參一兩去蘆切片用水二鍾於銀石器內煎至一鍾以冷水
沉取冷一服而盡若鼻有汗滴尤妙

五苓散

治傷寒瘴疾感暑中濕小便不利頭疼身熱煩燥發渴等證暑
月主治尤多能伐腎氣下虛者不可過服
澤瀉三兩　豬苓去皮一兩　茯苓去皮一兩　肉桂一兩
白朮去蘆一兩　右爲細末每服三錢夏月背寒頭疼發熱無汗
小便秘濇煎葱白湯調熱服令額上有汗爲妙或只用百滾
湯調熱服仍續啜熱湯衝令汗出冒暑極熱新汲水調亦可
熱瘴痢疾小便不利者並用熱水調大便泄小便不利者重

前子湯調不宜多服瘧熱在裏發黃疸茵陳湯調或加辰砂
尤治蘊熱心煩
毛崇甫因母病孝感天地夢授此方可謂神方也但五苓散
用桂正如小柴胡用人參備忌九用乾薑之類欲其剛柔相
濟亦存戰守之意也故方書謂五苓散無桂及隔年陳者俱
不可用如去桂而加人參却謂之春澤湯治煩燥效

烏沉散

治瘴疾心腹刺痛調中快氣
烏藥一兩　香附三兩焙乾甘草一兩炒
少許滾湯調服

加減五積散

治瘴後腰疼腳痛渾身疼
蒼朮陳皮厚朴
茯苓當歸川芎大
乾薑桔梗甘草
右薑三片煎服

黃芪建中湯

治瘴後自汗
黃芪白芍肉桂
右薑三片棗一枚水煎服

異功散

治瘴後精神少不喜飲食此藥能調胃進食順氣化痰不冷不

燥功效尤多
人參　白朮　陳皮　茯苓
甘草　各等分薑三片棗一枚水煎服
六君子湯
治瘴後體倦食少多痰
人參　白朮　茯苓　甘草
陳皮　半夏　各等分薑水煎服如易餓食不多飢
飽悶者加藿香砂仁名香砂六君湯
大養脾丸　治同六君湯
人參一兩　白朮五錢　茯苓一兩　乾薑二兩炮
砂仁三兩　麥芽二兩炒　甘草一兩五錢　右煉蜜爲丸每
諸方　服

兩八丸每服一丸食前細嚼薑湯下
溫瘧湯
治瘴後虛煩不眠心膽虛祛氣鬱生痰痰與氣搏變生諸證或
四肢浮腫心虛煩悶觸事易驚或夢不祥或異象眩惑遂致心
驚膽怯
半夏一兩五錢枳實一兩　陳皮一兩五錢甘草四錢
茯苓三兩　竹茹　石薑七片棗一枚水煎食前熱服
如聖餅子
治瘴疾嘔逆頭疼及氣厥痰飲
防風　天麻　半夏各五錢生用
南星　乾薑　川烏各一兩　川芎

甘草　右共爲末水丸作餅子每服五餅薑湯下
六和湯
治夏月昌暑伏熱發瘴煩燥口渴及心脾不調霍亂吐瀉或瘧
或痢或咳嗽
人參　砂仁　甘草
半夏　扁豆　藿香
木瓜　香薷　厚朴
片棗一枚煎服
參蘇飲
治瘴痢壯熱脈弦數按之不絕頭痛目睛疼
人參　蘇葉　前胡
半夏各三　茯苓　陳皮
甘草　枳殼各五錢　薑七片棗一枚水煎服不拘時
多內寒正經所謂言熱未已寒病復始王叔和云有熱不
可太攻之熱去則寒起是也所以瘴疾熱多單熱者攝生方
衛生方皆以病深難治參蘇有不當服者且如脉虛內弱
煩燥而熱衛生方治以冷凝生薑附子湯甚效余於湟川得
周醫云近日三五證熱甚大用附子乾薑入麝香少許汲水
調下心間頓涼即愈未嘗再服
柴平湯
治瘴疾十四日外熱尚未除其脉弦數有力

柴胡、　黃芩炒黑、　人參、
陳皮、　甘草、　當歸、　半夏、
右薑三片、棗一枚、水煎服
樂令黃芪湯
治瘴疾發熱、煩燥引飲、大便不通、小便赤澁、狂言內熱、神昏不省、
黃芪、　人參、　陳皮、　當歸、
桂心、　細辛、　前胡、　炒芍、
茯苓、　麥冬、　半夏、　甘草、
右薑三片、棗一枚、煎溫服、
星香湯
治瘴痰、手足搐搦、及痰厥等證、氣盛者用之、
南星、八錢、　木香、一錢、
右薑四錢、薑十片、水煎服、
附香飲
治瘴氣逆、及痰厥氣虛者用之、
大附子、八錢炮、　木香、一錢、
右每服四錢、薑十片、水煎服、以天雄
易附子尤妙、
痰涎壅盛者、加全蝎五個、仍服黑錫丹鎮墜、如六脉俱虛者、
用三建各一兩、木香五錢、薑棗煎、更磨沉香仝服、
藏感丸
治因食生冷、致寒痰上壅、作瘧瘴、及瘴後痰厥、或咽初起用蕪

荑等分和勻、如丸如黍米大、每服五六十丸、淡薑湯下、
蕪合丸
沉香、三兩、　青木香、三兩、　丁香、三兩、　麝香、三兩、
犀角、三兩、　安息香、三兩、　檀香、三兩、　白朮、三兩、
香附、三兩、　薤白、三兩、　硃砂、三兩、　訶子、三兩、
薰陸香、一兩、　冰片、一兩、　蕪合油、一兩、　石將安息香用好
酒熬膏、入蕪合油、和勻餘藥爲細末、入膏油內、再加煉蜜爲
丸、
蕪子降氣湯
治男子虛陽上攻、氣不升降、上盛下虛、壅隔痰響、咽喉不利、咳
嗽虛煩、引飲頭昏、腳疼腰痛、肢痛倦怠、肚腹刺痛、冷熱氣泄、大
便風秘、澁滯不通、
真蕪子、五兩炒、　當歸、三兩、　前胡、三兩、　厚朴、三兩、
甘草、三兩、　肉桂、三兩、　陳皮、三兩、　半夏、三兩、
右薑三片、棗一枚、煎服不拘時、
名劉散、每服薑三片、棗一枚、煎服不拘時、
秘傳降氣湯
治男女上熱下寒之病、凡飲食過度、致傷脾胃、色慾過節、耗損
真元、脾胃不和、遂致氣不升降、上熱則頭痛目眩、或痰涎嘔逆、
胸膈不快、咽喉乾燥、飲食無味、下虛則腰膝無力、大便泄瀉、裏
急後重、臍肚冷痛、治以涼則脾氣怯弱、腸鳴下利、治以溫則上
焦壅熱、口舌生瘡、及腳氣上攻、與浮腫心煩、宜先服此藥、然後
以所主之藥治之、無不效者、

五加皮、五錢、酒炒、　枳殼、一兩炒、　甘草、一兩炒、
草果、五錢、　柴胡、一兩、　陳皮、五錢、　地骨皮、一兩炒、
訶子、五錢、去核、半夏、五錢、　桑白皮、二兩炒、桔梗、五錢、
骨碎補、五錢、去毛、炒、

咳嗽倍半夏、上膈熱甚加黃芩、下部虛弱甚加熟附子、如用劉散、加藕葉生薑水煎、食後服、

附子更加生薑、女人血虛加當歸、

瘴疾多上熱、下寒、此正張給事所謂陽浮而陰閉也、愚嘗謂寓廣者、平居無疾、亦須服降氣鎮墜之藥、及養正丹、黑錫丹、然養正丹四藥皆有利性、南方陽氣恒泄、稍失制度、寧免慢人、服不若黑錫丹降氣藥及蘇子降氣湯、秘傳降氣湯、若胃寒氣虛者、亦不可用、

湯、二藥均治上盛下虛、然秘傳降氣湯、若胃寒氣虛者、亦不

此法最良、病退而餘熱在上者、正宜服之、

沉香降氣湯

治陰陽壅滯、氣不升降、胸膈痞塞、喘促短氣、

沉香、一兩、　砂仁、一兩、　香附、四兩、　甘草、二兩、

右爲末、每服二錢、入鹽少許、滾湯點服、

四物湯

治婦人瘴病宜調血者、此方合瘴瘧諸方用之、

大川芎、　當歸、　熟地、　白芍、

右各等分水煎服、

四七湯

治婦人瘴疾中脘痞滿、氣不舒快、痰涎壅盛、及七情氣結成痰、或如破絮、或如梅核、在咽喉之間、咯不出、嚥不下、

半夏、五兩、　茯苓、四兩、　厚朴、三兩、　紫蘇、三兩、

右每服四錢、薑七片、棗一枚、水煎熱服、

木香檳榔丸

治瘴後痢疾、元氣實者、腸胃有積、裏急後重、腹痛頻頻至圊、

木香、一兩、　檳榔、一兩、　青皮、一兩、　陳皮、去白、一兩、

枳殼、一兩、　黃柏、一兩、　三稜、醋煨、一兩、　莪朮、醋炒、一兩、

當歸、一兩、　黃連、一兩、　香附、三兩、

大黃、三兩、　黑丑、半生半熟、取末四兩、　黃芩、二兩、

右爲末、滴水爲丸、梧

子大、每服六七十九、滾湯下、

香薷飲

治暑伏暑作痢、此出易簡方、

香薷、　黃連、　厚朴、

甘草、　**右**藥劉散、薑三片、水煎服、

香連丸

治諸痢、

川連、二十兩、用吳黃淨一兩、同好酒浸一夕、同炒乾、去吳黃不用、以川連爲末、南木香、不見火、另研爲末、每連末五兩、入木香一兩、**右**共和勻、用米醋打老倉米糊爲丸、梧子大、每服五十九、米泔下、

變亂九
治赤白痢
川連去鬚蘆　吳茱萸去梗㊀各等分㊁㊂爲㊃以好酒浸一宿
取出揀開晒乾㊄爲㊅細末各麪糊爲丸梧子大赤痢用川連
九三十九甘草湯下白痢用茱萸九三十九乾薑湯下赤白
相兼各三十九相合用甘草乾薑湯下
斷下方
治赤白痢及休息痢瘧病後患痢俱宜此藥
草果連殼一個白朮麪炒　栗殼十個去肌膜及蒂醋拌
炒透　茯苓　右爲粗末㊆㊇㊈加薑三片棗三枚
烏梅三個赤痢加烏豆七粒白痢加乾薑五分水煎分作二
服之
真人養臟湯

治小兒大人腸胃虛弱患赤白痢或下膿血或如魚腦髓膏腹
疙痛日夜無度大便脫肛
人參二錢　肉桂五錢　訶子一兩去核　粟殼三錢六分
白朮炒　當歸二錢　白芍一兩六錢　甘草五錢炙
肉蔻五錢麪煨木香二兩四錢不見火　㊉㊊劉散每服四錢水煎
食前温服滑瀉及白痢並加熟附子五六片生薑三片冷甚
㊋加乾薑
保和丸
治內傷飲食致成痢疾元氣祛弱不堪下者

山查二兩去核神麯二兩　半夏二兩　茯苓二兩
陳皮五錢　連翹五錢　蘿蔔子五錢　㊌爲末糊爲丸梧
子大每服五六十丸滾湯下或原物燒灰調湯下
四神丸
治瘧後元氣虛弱患痢赤白及脾胃虛清晨溏泄
故紙四兩炒　五味二兩去核　肉蔻二兩麪煨　吳萸一兩去梗
㊍爲末用紅棗六十粒生薑六兩切碎同煮熟去薑將棗肉
搗爲丸梧桐子大每服五十丸米飲下
七味白朮散
治下痢虛渴
白朮　茯苓　人參　甘草

藿香　木香　乾葛　㊎㊏劉散水煎温服
補中益氣湯
治瘧後痢疾元氣下陷者
黃芪二錢　人參一錢　白朮八分　當歸五分
陳皮三分　甘草一錢　升麻三分　柴胡三分
右薑三片棗一枚水煎温服
四柱散
治元氣虛寒陽耗臍瘟痢不止
人參　附子　茯苓
右各等分每服四錢薑五片水煎温服
參苓白朮散
人參　白朮　茯苓　當歸　木香

治瘧後脾胃虛弱、飲食不進、致嘔吐瀉痢、兩後共為細末、每服二錢、棗湯調下

人參、茯苓、白朮、山藥、
甘草、蓮肉、苡仁、桔梗、
扁豆、砂仁、右共為末、每服二錢、棗湯調下

震靈丹

治病後虛羸少氣、泄痢不止、

禹餘糧二兩、代赭石二兩、赤石脂二兩、五靈脂二兩、
乳香二兩、沒藥二兩、硃砂一兩、紫石英四兩三味、俱拌碎、入砂鍋、以苧蓋口、鹽泥固濟、候乾用硬炭十觔煅通紅、火盡為度、入地坑埋出火毒、二日夜研末、醋為丸、小芡實大、風乾、每服三丸、用炒故紙棗湯調鍾乳粉糊丸、小芡實大、風乾、每服三丸、用炒故紙棗湯調鍾乳粉少許、空心送下、

敗毒散 一名蒼鄂湯

治下痢赤白、噤口不食、頭疼心煩、手足溫、脉不虛弱、

人參、桔梗、甘草、茯苓、
川芎、薑活、獨活、柴胡、
前胡、枳殼、右各等分、剉散、每服四錢、陳倉米百粒、
薑三片、棗二枚、水煎溫服、

進食丹

治痢毒熱上衝心肺、嘔逆噤口、

石蓮子去殼、右為細末、陳倉米煎湯調下、

補脾丹 此丹為治瘧人久病後脾胃虛弱、不能進食、及治諸般虛症、

治痢後脾胃虛弱、聞食則嘔、不思飲食、

山藥、切碎半生半炒熟、右為細末、陳倉米煎湯調下、

五皮飲 此飲名雲西安中公究之所用

治瘧後飲水過多、或食毒物、或飲食不節、致傷脾氣、頭面四肢、臍腹腫滿、

生薑皮、茯苓皮、大腹皮、桑白皮、
桔紅皮、各等分、剉散、水煎服、病在上食後服、病在下食前服、忌生冷毒物、臭糟油膩、

實脾散

治瘧後脾虛腫滿、

大附子一兩、草果仁一兩、大茯苓一兩、即檳榔、

乾薑一兩、宣木瓜一兩、甘草一兩、水四盅煎乾一半、
手劈開附子心不白為度、勿令水全乾、恐近底焦、取出割四片、焙為末、每服三錢、空心日午淡湯調服、

五苓五皮散

治瘧後脾氣凝滯、面目虛浮、四肢腫滿、心腹膨脹、上氣惡促、小便不利、

茯苓皮、白朮、猪苓、
五加皮、肉桂、澤瀉、
大腹皮、陳皮、生薑皮、

胃苓湯

冷油膩、葷腥等物、肉桂去皮、各等分、每服四錢、水煎熱服、忌生

治瘴後濕勝腫滿
蒼术　陳皮　厚朴　甘草
肉桂　白术　茯苓　猪苓
澤瀉　㊐各等分用薑一撮水煎熟服

木香流氣飲
治諸氣痞塞胸膈膨脹走注刺痛氣促痰嗽面目虛浮四肢腫滿大便秘結小便不利
青皮四兩　陳皮四兩　甘草四兩　厚朴四兩
紫蘇四兩　香附四兩　木通二兩　腹皮一兩五錢
丁香一兩五錢　木香一兩五錢　藿香一兩五錢　檳榔一兩五錢
草果一兩五錢　肉桂一兩五錢　人參一兩

麥冬一兩　白术一兩　茯苓一兩　枳壳一兩
蒼蒲一兩　木瓜一兩　白芷一兩　半夏一兩
㊐剉散每服五錢薑三片水煎服

金匱腎氣丸
治脾腎虛寒腰重腳腫濕飲留積小便不利或吐腹腫脹四肢浮腫氣喘痰盛其效如神
茯苓三兩　附子五錢　牛膝一兩　肉桂一兩
澤瀉一兩　車前一兩　石斛一兩　山藥一兩
丹皮一兩　熟地四兩　㊐爲末和地黃膏煉蜜爲丸梧子大每服六七十丸空心米飲下

導痰湯
治一切痰涎壅盛胸膈留飲痞塞不通
南星一兩　枳壳一兩　陳皮一兩　茯苓一兩
甘草五錢　半夏四兩　㊐剉散每服四錢薑十片水煎溫服

通關散
治瘴後痰厥昏不知人痰涎上壅牙關緊閉急要諸藥不得下咽喉
細辛一兩　牙皂一兩　半夏一兩　㊐共爲細末吹入鼻中候噴嚏得少甦却急進藥

蜜導法
治瘴後自汗過多津液內竭大便不通不妄用下藥惟宜此法
蜂蜜四兩　㊐於銚內漫火煉攪之勿令焦候稍冷如糖狀以水

濕手捏作錠如拇指大約長二三寸令一頭銳乘其稍熱納穀道中以手抱住如未效更用一枚火上畧炙使溫　嚴氏方云蜜三合入猪膽汁二匙在內同煎無膽只如前亦可
又一方入皂角五錢在內皆可隨病淺深取用

夫醫九流一技也而回天扎與安樂躋壽域而補造物之不逮厥功博已頎五行在手則夭可延陰陽未分則延者促已審之者均天地之厲氣傷寒越可畏哉寒暑均天地之厲氣能生殺人者、傷暑二病均厲氣之說昭、為萬世的、

悶因寒因暑之說昭、為萬世的、傷寒書創自張長沙詳於朱南陽而反覆精析於陶節庵其全書若眉列然學者類能據籍按方而施治故往往取效若傷暑一症醫書止勒小款中世皆忽遇是症率目為傷寒以發散等劑投之間加衣被取汗甚或以加味香薷飲數劑而愈遂著傷寒傷暑辯二篇列於暑月卬布兼施藥餌其旨勁若谷響乃發頼搜羅羣書著為全帙以濟世懼閱歷未久不中窾期五十以後方就筆研戊申自訃部以目恙請告杜門的摭得畢志於性命黃卷

家昕夕乾乾無逸豁暇即焚香几
堂間入園尚視百日不佞及目愈後
至天啟壬戌感
仙師教就筆研狹古諸名家參攷編
集而成帙藉據十餘載約二萬餘千
言分為上下兩卷議論皆常語不敢
鈎深以便醫家覽解方多遵古無宻

奇宜症則靈莽栗豈珍錯而食其時
百歛理宜也要在狥燕毓岐路處着
力耳平高貢除姤忌澄心察理審症
救咀醫之上計乎寧獨醫人一心耳
虛與實相反猶與國相仇古今成敗
之大關也兼國成者典籍國許者身
係

社稷安危操萬姓命脉虛心圓智蓋
可忽乎哉予因醫而廣其說
天啓三年歲次癸亥孟夏朔旦
賜進士出身奉政大夫戶部陝西司
郎中潁郡張鶴騰撰

治暑全書題辭

江陵朱司空來總河政既奉
旨予休澣期生屬承南河乏徂暑始
受事赴謁公於邳未至而公單舸
放流下矣舟次接言論所拳拳河
漕利病膝理而著之鍼砭殆挽萬
斛洪濤運諸指掌蓋公孜孜慈公

去不輟念若此已發行篋手治暑
一編屬爲廣其流布其書雖一家
言乎而原二氣之搏捖辯五行之
生旺審八方之燥濕劑六府之虛
盈集諸家以衷其成不啻視越垣
仁人之心也嘗槩而論之宇宙垂
沴薄蝕之氣其恫然中於人之肌
膚往往不在秋冬斂藏之候而在
春夏暢發之時斯時生人精神血
脉方怒生憤盈旁礴不可圉制且
俛仰間駘蕩恢名之景物無不極
人志氣與之爲飛揚九爽孰知燥

冲煩外之餘倘乃得伏長乃得消
猶之乎家計温腴竊耗因是以萌
生世運熙洽戎菽因是以潛伏先
幾君子爲持滿爲謹微制壯以損
尋亳末於斧柯故可保性命而高
蹻和扁非是者失之未然而晦冥
風雨之震凌既中訌外脅又不幸

授手庸憒者流冥冥焉費人以試術寒熱辛温之雜嘗而標本虚實之億揣此豈復有養生主哉嘗觀厲氣流行孤子而獨父鰥夫而寡妻家誅巷號害乃毒於水火鋒鏑得是編爲中流一壺庶起軒皇岐伯於當年以常回太和之宇也噫

世道之有平陂猶人身之有休旺藥石供養而粱肉療疾幾微不察病或中於膏肓今蚩蚩氓庶囂然不有生全之樂其爲害豈特鄉所砦醫師之以昌陽引年耶維其平而制其陂俾漢廷跋鰲無勤痛哭於賈生而熙嗥之儀張不規瑱於

獻可之諷諫功寧直壽民已也是在知幾君子矣剖劂告竟爰廣其肯而引之簡端云

天啓乙丑小春既望南河治水使者武原彭期生題於署之調鶴下

目錄次第說

病生有原治法順其原故辯冬春夏秋寒溫暑涼症冠其首焉暑陽氣也寒陰氣也氣之運有遲速有順逆有次舍故次天時天運於上地載於下南北異疆寒燠殊氣令不能督之使齊故地氣次焉天地交而陰陽有序鑑則寒暑病作症候各異故剖其異若黑白其獨詳於暑者明專科也忽者使之驚闇窮者所投投則釀然若嚮神喜而病畏之不投則恚然若警病喜而神惡之是在取者藥方列左古人立方良有深意其議見良有慧識卓越不可磨滅者固多中亦有泥古任臆不可爲訓者予採各名家論暑原文後各附愚見品評以俟覽者取裁焉然無徵不信有攷斯傳醫學綱目所載古今名醫類案非後學之鑑衡乎彼俟百世而不惑吾考先正而不謬庶幾哉與古作者默契乎至若治於未病防其外邪順時頤養保命度生是在智者之自謂何耳

傷暑全書目錄卷一
卷之一
辯春夏秋冬溫暑涼寒四症病原
天時　地氣
辯寒暑症各異　暑症
暑厥　暑風
暑瘧　暑瘵
紋腸沙　時疫
寒疫　脉理
傷暑全書　目錄卷一　十一
五運六氣　六氣爲司天之歲
五運配十干之年　十二支年運氣
南政北政
卷之二
治暑主方　六和湯
香薷飲　十味香薷飲
五苓散　益元散
二香散　人參敗毒散
又主方　香朴飲
縮脾飲　人參白虎湯
竹葉石膏湯　桂苓甘露飲合敗毒散
九散方類　加味胃苓九
消暑九　黃龍九
御暑散　三黃石膏湯
備用方類　白虎加蒼朮湯
大順散　枇杷葉散
加味桂苓甘露飲　黃連解毒湯
調中湯　清暑益氣湯見東垣脾氣論
附霍亂瘧痢發斑
乾霍亂吐法　二陳湯
痢疾方　芍藥湯

香連丸
瘧疾方
胃苓湯
發斑方
消斑青黛飲
服藥總法
附經驗方
心痛神效
痢疾
古今名醫論彙
張仲景
瘟濕暍第四論 二款
辯太陽病脉五論 三款
傷寒例論
中暑
李東垣
暑傷胃氣論 清暑益氣湯附
朱丹溪
治痢神驗
清脾飲
治瘧通用
胃氣疼
痔瘡
牙痛
大麻風屢驗
傷寒第三論
孫真人
劉河間
李文淸
虞花溪
李士材
王宇泰
方古菴附瘳暑論
王節齋附餘暑論
陶節菴
治傷寒用藥大略
傷寒變温熱病
辯温暑涼寒諸症
辯風温
辯惡寒
温病辯
辯張仲景傷寒論
醫學正傳論暑
救厥壅法
救途中熱倒法
證治準繩論暑 五款
加減清暑益氣湯
名醫類案

重刻張鳳逵傷暑全書卷之一
總督河道工部尚書江陵朱光祚閱
提督南河員外郎海鹽彭期生輯
監督府第員外郎江津周長應較
山西道監察御史仁壽黃　昌發刻
新安眉吾戴　任閎捽

辯春夏秋冬溫暑涼寒四症病原

生氣通天論曰夫自古通天者生之本本於陰陽天地之間六合之內其氣九州九竅五藏十

二節皆通乎天氣其生五其氣三數犯此者則邪氣傷人此壽命之本也由此論之人身元氣與天相通顧養有道病何從生然則病生有因其發有原乎從其原而治之則易療陰陽應象大論曰天有四時五行以長生收藏以生寒暑燥濕風人有五藏化五氣以生喜怒悲憂恐又曰因於露風乃生寒熱是以春傷於風邪氣留連乃爲洞泄夏傷於暑秋爲痎瘧秋傷於濕上逆而欬發爲痿厥冬傷於寒春必溫病四時之

醫家有四時傷寒之說甚至通以麻黃桂枝湯兼治溫熱症愼人良多陶節菴諸名家亦剖三病若列眉而根始於寒不免沿而未能脫又何怪乎碌碌者愚謂道以一烝生天地以二氣生五行五氣各司其用而水火爲宄要水火能生物亦能殺物若仲景之說是水專擅其權而火爲虛而無用矣愚謂冬之寒病當屬寒威此固然不易者至春時陽氣漸舒孔竅開張服御單夾乃天氣變幻倏暖倏寒又多蕩風人感寒適

入腸腑故爲溫病猶可名曰春寒已與冬寒不相涉矣況夏至後炎火時流蒸鬱爍人得病似傷寒者皆時暑火所感而成與冬之寒氣毫不相涉而亦以爲冬寒之積久所發者悞已即生氣通天論曰是故陽因而上衛外者也因於寒欲如運樞起居如驚神氣乃浮因於暑汗烦則喘喝靜則多言體若燔炭汗出而散是寒暑分因水火別症明列斷案萬世醫學之祖也又何惑乎然內經之溫根於寒者何故按山海經桂

名招搖葉長二尺桑名帝女大圍五十尺桂竹葉大二尺餘高數丈其草樹奇怪類若此據經想太古時洪荒橫流懷山襄陵草木閉塞天地濛昧陰霧拂鬱陽明未舒以故塞氣盛行元和令少即當大夏亦無爍金之患後世文明漸開五行分布水火之氣各司其權若斯爭烈者即今春值淫雨餘寒爲厲甚者如隆冬挾纊不能去試觀舍中暑症寥寥絕無痎瘧皆陰勝之左券也何況古洪荒世予此內經溫根於寒所由發也何仲景遂申演其說幷暑而一類乎是疫

足也且古之人茹毛衣草簡緣澹泊無助火之具後世炙煿之味適口醲鬱之酒克腹嗜欲灼精塵勞食氣皆足以噓煽而煩熾宜暑火之乘類而善入也謂古之寒病多而暑病少今之寒暑並重而暑爲尤劇則可愚故特列論曰傷寒者感於冬之嚴寒溫病者感於春之輕寒若暑病則專感夏之炎熱若氷炭霄泉之不相及一水一火各燥其令治法一熱劑一凉劑各中其

竅而槩以爲寒因不幾於執一遺二哉予俯仰躊躇萬不得已敢於翻千古之案以開百世之覺破迷而扳若遂自甘於僭竊云爾

天時

眞源曰天地之間覩乎上者爲陽自上而下四萬二千里乃曰陽位覩乎下者爲陰自下而上四萬二千里乃曰陰位既有形名難逃度數且一歲者四時八節二十四氣七十二候三百六十日四千三百二十辰十二辰爲一日五日爲

一候三候爲一氣三氣爲一節二節爲一時四時爲一歲一歲以冬至節爲始是時也地中陽生升凡一氣十五日上升七千里三氣爲一節四十五日陽升共二萬一千里二節爲一時一時九十日陽升共四萬二千里正到天地之中而陽合陰位是時陰中陽半其氣爲溫而時當春分之節也過此陽升而入陽位方曰得氣而升亦如前四十五日立夏立夏之後四十五日夏至夏至之節陽升通前計八萬四千里以到

天乃陽中有陽其氣熱積陽生陰一陰生於二陽之中自夏至之節爲始是時天中陰降凡一氣十五日下降七千里三氣爲一節一節四十五日陰降共二萬一千里二節爲一時一時九十日陰降共四萬二千里正到天地之中而陰交陽位是時陽中陰半其氣爲凉而時當秋分之節也過此陰降而入陰位方曰得氣而降亦如前四十五日立冬立冬之後四十五日冬至冬至之節陰降通前計八萬四千里以到地乃

陰中有陰其氣冷積陰生陽二陽生於二陰之中自冬至之後一陽升如前運行不已周而復始即陽升陰降之八節而知天地即溫凉寒熱之四氣而識陰陽夫陰陽判分若黑白然故春夏秋冬四時隨令各別溫熱凉寒四時隨節候變易冬至已後至春分屬傷寒自春分至夏至屬溫病自夏至至白露屬傷暑自白露至立冬屬凉病自立冬以後至春俱屬傷寒蓋春秋之氣當不足冬夏之氣當有餘即四月八月間亦有暑病蓋八月間曉暮夜氣雖凉而午未之時秋陽燥烈日炎灼人反毒於伏蓋伏時氣發汗出陽氣在表此時陽氣漸斂真火內燃而又以烈日薰之故毒易中人熱症更劇當細察之雖其外症相類而受氣不同治法迥異稍有不中節害人不淺而藥用以寒症劑其害可勝言哉治者先數時令後審時氣隨令加減斟酌之未有不立取效者故爲天時說

天地之形其狀如卵六合於中其圜如毬日月出沒運行於天之上地之下上下東西周行如飛輪春夏日行北陸秋冬日行南陸太陽所臨其氣燠故四方風氣各有偏勝秦晉地氣寒遂寒病多而暑病少吳越滇黔及兩粵地氣煖故寒病常而暑病獨劇至八九月猶如伏時彼中盲醫不知寧以治寒熱劑投之以火助火又且禁人飲水食瓜至不可救　予萬曆丙午典試西粵棘闈中簾官厮役多病此呻吟聲相聞醫皆以爲寒　予詰之曰曾風雨爾曾服桑否皆如法用凉劑而痊撫臺楊公異而索方　予冗中姑抽胸臆數款并方楊公遂付之梓題曰張司農活人說今其板貯西粵藩司中楊公仁者乎急於濟人如此地氣不同治法亦異猶越人見劉而駭毳燕人見布而疑廣氣旬之識固之耳安可一槩施藥哉寒而但見其寒限於今也熱而不知其熱狥於古也　予慮大迷不解特辯而表之

辯寒暑症各異

傷寒傷暑二症流毒天地沿襲古今人率習而不察據其外症頭痛身痛發熱惡寒等症相同皆混於象而不審其內景不觀乎時因一名之曰寒而不知其疎多端甚至不可一律論者寒之傷人也一二日在膚宜汗三四日在胸宜吐五六日在臟宜下確有定期可據者若暑則變幻無常入發難測不可尋想彼暴中之激烈扁雀不及俯指而投咀久服之深毒長桑不能隔膚覺知非若傷寒之有定期定症可據可療者不拘表裏不以漸次不論臟腑胃暑蒸毒從口鼻入者直中心胞絡經先煩悶後身熱行坐近日薰燥皮膚肢體者即時潮熱煩渴入肝則眩暈頑麻入脾則昏睡不覺入肺則喘咳痿躄入腎則消渴非專心主而別臟無傳入也中暑歸心神昏卒倒傷暑皆肉分周身煩燥或如針刺或有赤腫蓋天氣浮於地表故人氣亦浮於肌表也

胃暑入腸胃腹痛惡心嘔瀉伏暑即胃暑久而
藏伏三焦腸胃之間熱傷氣而不傷形旬日莫
覺變出寒熱不定霍亂吐瀉膨脹中滿瘧痢煩
渴腹痛下血等自入所至此採醫學入門并主
治法皆以清內火爲主而解表兼之寒之中人
乘其虛暑則虛實并中而實更劇蓋氣血強盛
之人內已有伏火加之外火炎炎相合故焦灼
爲甚經虛處寒棲之經實處暑棲之寒凌其弱
而暑親其類也又藜藿常被寒惟膏粱獨能禦
熱燒灼不已氣耗而血枯故燥渴痞塞腹痛諸

惡症作焉此其變化或乍或久人莫自覺醫家
亦不能辯至病深而後施治故難速愈宜早辨
而早治之則易愈而取効速

暑症

立夏以後暑熱盛行時人有頭疼惡心身熱惡
寒手足厥冷肢節沉痛不思飲食或氣高而喘
或氣短而促甚者用手捫之如火撩皮膚或腹
脇絞痛或口鼻流血病候與傷寒相似不知者
誤認傷寒用風熱發汗蒸或加衣出汗則元氣

蓋虛終不知悟蓋此症乃夏屬陰虛元氣不足濕熱蒸人暴傷元氣人初感之即骨乏腿軟精神倦怠昏睡懶語其形如醉夢間或無汗或微汗不斷或大汗不止煩渴飲水胃膈痞悶小便黃而少大便溏而頻或嘔或瀉或結或霍亂不止此等症與傷寒大異按時而施治據症而急療無不應手者語曰勿伐天和正因時之道也亦有不頭痛身痛惡寒者治法皆同治法輕者宜五苓散以利小水導火下瀉而暑自解或香薷飲辛散以驅暑毒木瓜制者之要藥也或藿香正氣散十味香蘇飲之頭重者人參敗毒散桂苓甘露飲竹葉石膏湯白虎湯之類弱者用生脈散清暑益氣湯補中益氣湯等若不分內外不論輕重強弱一槩以和解百發百中隨試隨應則無如六和湯氣良矣方書名家古今甚衆其中多所發揮則切精密者惟朱丹溪爲宜詳且要近世著作王宇泰先生有證治準繩證治類方諸帙獨得其解扎竅中竅轉丸游刃之技力追古名流已工醫者所當時披誦而潛玩者也治方見後

暑厥

夏月有卒然暈倒不省人事手足逆冷者爲暑厥此陰風也不可驟用寒凉藥先以辛溫藥散解之俟醒然後用辛凉以清火除根誤用熱藥及艾灸立死童便和薑汁灌亦易甦

暑風

忽然手足搐攣鴈聲呻吟角弓反張如中惡狀爲暑風亦有先病熱後甚漸成風者譫語狂呼浪走氣力百倍此傷風也治法以寒凉攻劫之與陰風不同皆宜解散化痰不宜汗下有日久而脾胃弱者宜溫補

暑瘍

凡癰疽毒瘡發熱有時晡甚旦止若夏月間有頭面外項赤腫或咽喉腫痛或腿足掀腫長至數寸不能動履人皆疑爲瘡但其頭痛內燥晝夜發熱不止自與瘡症不同但以敗毒散加石

胃黃連等藥熱症一解赤腫自消全無濃血此名暑瘍毫釐而千里者也

暑瘵

盛暑之月火能燥金若不禁辛酒脾火暴甚有勞熱燥慢而火動於心肺者令人咳嗽氣喘驟吐血衄血頭目不清胃膈煩瞞不寧即童稚老夫問亦病此昧者以爲勞瘵不知火載血上非真陰虧損而虛勞者等也宜四物湯黃連解毒二陳湯三藥內去川芎白芍黃柏以其易牛

夏加桔梗以抑之薄荷以散之麥門五味以斂之自愈或加童便藕汁或黃連香薷飲一二劑方可靜攝數日忌酒煎炒自安是名暑瘵宜酌而善用焉或用東垣參苓調中亦妙

絞腸沙

夏間有不頭痛發熱但覺小腹疼痛或心腹俱痛鼓脹痞滿不能屈伸者人或疑爲陰症或執爲食生冷過多不知皆暑火流注臟腑不能解故先小腹痛後及徧心腹法宜六和湯清解之或五苓散加香薷木瓜紫蘇半夏之類利散之自愈若以爲陰病生冷而用熱藥熱物助之不可拯已或用炒鹽和滾水服探吐痰涎亦妙亦有發熱身痛等症內兼心腹痛大槩吐法爲上用藿香正氣散或二陳湯加厚朴炒梔佳

時疫兒

宋丹溪

春應煖反寒夏應熱反涼秋應涼反熱冬應寒反溫此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者爲時行溫疫病也治法用人參

敗毒散九味羌活湯夏加滑石石羔冬加麻黃桂枝春秋止依原方或藿香正氣散五積散防風通聖散亦可甚者黃連解毒湯竹瀝石膏湯

寒疫

一夏月亦有病涼者偶遇暴風怒雨不及加衣或夜失覆或路行冒犯皆能爲涼症此非其時而有其氣謂之寒疫治法與暑症異亦以九味羌活湯敗毒散以辛散和解爲主不可專用汗藥此論乃李東垣先生發自十書中從來醫者

平及然僅百之一二耳以一律百以或然爲固然左矣

脈理

脈訣舉要曰暑傷於氣所以脈虛弦細芤遲體狀無餘

劉復眞曰暑脈虛而微弱按之無力又脈來隱伏弦細芤遲皆暑脈也脈虛身熱得之傷暑中暍脈虛而微者是也寒病傳經故脈日變溫熱不傳經故脈不變寒病浮洪有力者易治芤細無力者難治無脈者不治若溫熱則不然溫有一二部無脈者暑熱有三四部無脈者被火所遏勒而藏伏耳非絕無也於病無妨攻之亦易

醫人一切覺走不知照經用辛寒藥火散而肺起脈起而病愈徒駭何益乎要在辨之詳耳蓋溫熱病有中一二經始終止在此一二經更不傳遍別經者其一二經或洪數則別經弱且伏依經絡調之則洪者平伏者起乃愈徵也昔在萬曆丁未三月間予寓京師備員太倉庫差忽一日吏部同鄉劉蒲亭聽報曰病劇求拯予就其寓吏部同僚諸公環守之已備後事譫語抹衣不寐者七八日已

御醫院吳思泉名醫也偕醫數人治之予胗脈止關脈洪大其餘皆伏乃書方竹葉石膏湯諸公皆驚曰吳等已莫附子理中湯何氷炭如是

予詰之吳曰陽症陰脈故用附子予曰兩關洪大此陽脈也其餘經爲火所伏非陰脈也吳厲聲相爭予亦動色自任諸公從之一劑甫時即止譫語抹衣就寐片時予視其脈已洪者平而伏者起諸公相視曰此眞張仲景也又用辛凉藥調理全愈脈症有相合者易知有相左者難知脈明而後可以辨症症眞而後可以施藥要在虛心細察不可執已見而以百藥嘗試令命在反掌間也愼之愼之

五運六氣

運氣症治者所以參天地陰陽之理明五行衰旺之機考氣候之寒溫察民病之凶吉推加臨

位温之法施寒熱温涼之劑古人云治時病不
知運氣如涉海問津誠哉言也今遵先賢圖訣
撮其要領使人一覽而知其悉也矣

五運配十干之年

甲己得合爲土運　乙庚得合爲金運
丁壬得合爲木運　丙辛得合爲水運
戊癸得合爲火運

六氣爲司天之歲

子午少陰君火　丑未太陰濕土　寅申少
陽相火　卯酉陽明燥金　辰戌太陽寒水
巳亥厥陰風木

南政北政

甲巳土運爲南政蓋土居中央君尊南面行
餘四運以臣事之而北而受令所以有別也

十二支年分運氣

子午年少陰君火司天歲氣熱化之候也

司天者天之氣候

君火者手少陰心經也心者君主之官神

明出焉君火乃主宰陽氣之本餘象生土
乃發生萬物之源
陽明燥金在泉

在泉者地之氣候也

初之氣厥陰風木用事子上父下益辛瀉苦
自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終
止

天時　寒風切洌霜雪水氷蟄蟲伏藏
民病　關節禁固腰腿疼痛中外瘡瘍

二之氣少陰君火用事火盛金衰補肺瀉心
自二月春分節起至四月立夏終止

天時　風雨時寒雨生羽蟲
民病　淋氣鬱於上而熱令人目赤

三之氣少陽相火用事君相二火瀉苦益辛
自四月小滿節起至六月小暑終止

天時　大火行熱氣生羽蟲不鳴燕百舌
杜宇之類
民病　厥熱心痛寒更作咳喘目赤

四之氣太陰濕土用事子母相順瀉肺補腎
自六月大暑節起至八月白露終止
天時　大雨時行寒熱互作
民病　黃瘟鈲血咽乾嘔吐痰飲
五之氣陽明燥金用事心盛肺衰火怕水復
自八月秋分節起至十月立冬終止
天時　溫氣乃至初冬尤煖萬物向榮
民病　寒熱伏邪於春爲瘧
六之氣太陽寒水用事火衰心病瀉鹹益苦
自十月小雪節起至十二月小寒終止
天時　暴寒勁切火邪恣毒寒氣暴止
民病　生腫咳喘甚則血溢下連小腹而
作寒中
丑未年太陰濕土司天歲氣濕化之候
太陰濕土者足太陰脾經也脾屬中央戊
已土每季寄旺一十八日合爲七十二日
以應一歲六六三百六十日之成數也
太陽寒水在泉

初之氣厥陰風木用事主旺客哀瀉酸補甘
自年前十二月大寒節起至閏二月驚蟄
終止
天時　大風發榮雨生毛蟲
民病　血溢經絡拘強關節不利身重筋
痛
二之氣少陰君火用事以下生上瀉甘補鹹
自二月春分節起至四月立夏終止
天時　大火至疫癘君命宜行濕蒸相搏
暴雨時降
民病　瘟疫盛行遠近咸若
三之氣少陽相火用事土旺刻水補腎瀉脾
自四月小滿節起至六月小暑終止
天時　雷雨電雹地氣騰濕氣降
民病　身重跗腫胸膕滿感胃濕氣
四之氣太陰濕土用事甘旺鹹衰補腎益肺
自六月大暑節起至八月白露終止
脫

天時　炎熱沸騰地氣升濕化不流
民病　膜理熱血暴溢寒瘧心腹脹浮腫
五之氣陽明燥金用事土能生金益肝瀉脾
自八月秋分節起至十月立冬終止
天時　天涼霧露降
民病　脾胃寒瘧痢甚行
六之氣太陽寒水用事以上剋下瀉脾補腎
自十月小雪節起至十一月小寒終止
天時　大寒凝冽

民病　關節禁固腰腿拘痛
寅申年少陽相火司天歲氣火化之候少陽相
火者三焦浮流之火火邪則炎上上剋肺
金金受剋腎水失母則上盛下虛虛陽上
攻變生諸疾致傷元氣
厥陰風木在泉
初之氣厥陰風木用事子父相逢瀉苦益辛
自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終止

天時　熱氣傷人時氣流行
民病　寒熱交作咳逆頭痛血氣不調心腹不快
二之氣少陰君火用事肺衰心盛制苦益辛
自二月春分節起至四月立夏終止
天時　暴風疾雨溫濕相蒸
民病　上熱咳逆胸膈不利頭痛寒熱
三之氣少陽相火用事夏旺火熾補益大腸
自四月小滿節起至六月小暑終止

天時　炎暑亢旱草萎河輸
民病　頒熱目赤喉閉失血熱渴風邪人
多暴死
四之氣太陰濕土用事火能生土瀉甘補鹹
自六月大暑節起至八月白露終止
天時　風雨時降炎暑未去
民病　瘧痢交作寒熱頭疼
五之氣陽明燥金用事肺金受邪瀉苦補辛
自八月秋分節起至十月立冬終止

天時　暴熱風雨草木黃落
民病　寒邪風熱君子周密
六之氣太陽寒水用事心火受剋瀉鹹補苦
自十月小雪節起至十二月小寒終止
天時　寒溫無時地氣正寒霜露乃降
民病　寒熱頭疼心煩作渴
四之氣太陰濕土用事以下生上瀉辛益酸
自六月大暑節起至八月白露終止
天時　早秋寒雨有傷苗稼
民病　卒暴寒熱風邪傷人心疼浮腫瘡
初之氣厥陰風木用事金木相剋補酸瀉辛
自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終止
天時　陰始凝風始肅水乃冰寒雨多花開遲
民病　寒熱浮腫失血嘔吐小便赤淋
二之氣少陰君火用事火盛金衰瀉辛益酸
自二月春分節起至四月立夏終止
天時　臣居君位大熱早行

瘍失血
五之氣陽明燥金用事金盛木衰瀉肺補肝
自八月秋分節起至十月立冬終止
天時　冬行春令草木生青風雨生蟲
民病　寒熱作痢氣血不和
六之氣太陽寒水用事客來助主益苦瀉鹹
自十月小雪節起至十二月小寒終止
天時　氣候反溫蟄蟲出現反行春令
民病　疫癘濕毒寒熱伏邪

辰戌年太陽寒水司天歲氣寒化之候
太陽寒水者足膀胱經也與足少陽腎經合爲表裏屬北方壬癸水
太陰濕土在泉
初之氣厥陰風木用事脾胃受邪瀉鹹助甘自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終止
天時　氣早煖草早榮溫風至
民病　寒熱頭痛嘔吐瘡瘍
二之氣少陰君火用事心火受邪瀉酸補辛自二月春分節起至四月立夏終止
天時　春寒多雨寒濕無時
民病　氣鬱中病浮腫寒熱
三之氣少陽相火用事以上剋下瀉鹹助苦自四月小滿節起至六月小暑終止
天時　暴熱乍涼疾風暴雨
民病　寒熱吐痢心煩悶亂癰疽瘡瘍
四之氣太陰濕土用事本胜土裏瀉甘補酸自六月大暑節起至八月白露終止
天時　風濕交爭雨生羽蟲暴風疾雨
民病　大熱短氣赤白痢瀉
五之氣陽明燥金用事金生水旺制鹹益苦自入月秋分節起至十月立冬終止
天時　濕熱而行客主令
民病　氣虛容熱血熱妄行肺氣壅盛
六之氣太陽寒水用事水盛火衰瀉酸助苦自十月小雪節起至十二月小寒終止
天時　凝寒雨雪地氣正濕令行
民病　病乃悽慘孕婦多災脾受濕肺旺肝衰
己亥年厥陰風木司天歲氣風化之候
厥陰風木者足厥陰肝經也肝屬東方甲乙木春旺七十二日也
少陽相火在泉
初之氣厥陰風木用事脾胃受邪瀉酸補甘自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終

止

天時　寒始肅客行主令殺氣方至

民病　寒居右脇氣滯脾胃虛壅

二之氣少陰君火用事火旺金衰瀉心補肺

自二月春分節起至四月立夏終止

天時　寒不去霜雪永殺氣施木草焦寒

雨至

民病　熱中氣血不升降

三之氣少陽相火用事肺經受邪瀉苦益辛

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時　風熱大作雨生羽蟲

民病　淚出耳鳴掉眩

四之氣太陰濕土用事木土相刑瀉酸益甘

自六月大暑節起至八月白露終止

天時　熱氣返用山澤浮雲暴雨潺濕

民病　心受邪黃疸面爲浮腫

五之氣陽明燥金用事以金刑木瀉肺益肝

自入川秋分節起至十月立冬終止

天時　燥濕更朕沉陰乃布風雨乃行

民病　寒氣及體肺受風脾受濕發爲瘧

六之氣太陽寒水用事主助客勝瀉酸補甘

自十月小雪節起至十二月小寒終止

天時　長火司令陽乃火化蟄蟲出現流

水不冰地氣大發草乃生

民病　瘟疫心腎相制

按天上地下而人居其中一氣分布三才並

立人與天地呼吸相通升降相符故陰陽寒

暑之氣內外合一若魚與水然故運氣所感

即人之疾病應之善攝生者能調和臟腑使

血氣順軌天時不能侵不則逐氣而化疫癘

札瘥不可勝療至於因症而施治癘不能干

人可以勝天是在乎司命者留意焉

傷暑全書卷之一終

治暑主方

六和湯　治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔吐泄瀉寒熱交作痰喘咳嗽胸膈痞滿頭目昏痛肢體浮腫嗜臥倦怠小便赤澁并傷寒陰陽不分冒暑伏熱煩悶或成痢痎疾中酒煩渴畏食婦人胎中亦可服

縮砂仁 研 半夏 湯泡七次 杏仁 去皮尖 人參 去蘆 甘草 炙各一兩 赤茯苓 去皮 藿香葉 去土 白扁豆 姜汁炒 木瓜 各二兩 香薷 厚朴 姜汁製各四兩

右㕮咀每服一兩水二鍾生姜三片棗一枚煎至一鍾溫服

此清火調中和解之劑治暑要藥也

香薷飲　治伏暑引飲口燥咽乾或吐或瀉並皆治之一方加黃連四兩用姜汁同炒令老黃色名黃連香薷飲如有痛搦加羌活煎服

厚朴 去皮 姜汁炙熟半斤 香薷 去土 一斤 白扁豆 微炒 半斤

右㕮咀每服三錢水一鍾入酒少許煎七分

沉苓不拘時服熱則作瀉香薷須陳者佳

十味香薷飲　消暑氣和脾胃

香薷 一兩 人參 去蘆 陳皮 去白 炒 白扁豆 炒 去殼 甘草 炙 厚朴 去皮 姜汁炒黑色 乾木瓜 白茯苓 去皮 各五錢

右爲末每服二錢熱湯冷水任調下

以上辛散驅暑之劑蓋香薷氣厚能散暑木瓜善勝暑厚朴寬中故爲要藥

五苓散　治中暑煩渴身熱頭痛霍亂吐瀉小便赤少如心神恍惚加辰砂又名辰砂五苓散

白术 二錢 白茯苓 去皮 二錢 豬苓 去皮 一錢五分 澤瀉 去毛 一錢 肉桂 一錢 五分

右㕮咀作一貼水一鍾半煎入分溫服或作散用亦可

桂苓甘露飲　治伏暑引飲過度肚腹膨脹霍亂

白茯苓 去皮 白术 土炒 豬苓 去皮 滑石 研 各二兩 寒水石

研甘草炙澤瀉各一兩　肉桂去皮五錢

右爲末拌勻每服二錢熱湯冷水仟下入蜜少許更妙

益元散　治中暑身熱小便不利此藥性涼除胃脘積熱又淡滲濕故利小便而散濕熱也

又名天水散六一散加硃砂良

滑石白脂者去黃水飛六兩　甘草去皮一兩

右爲末每服二錢新汲水調服

以上清利消暑之劑但孕婦禁用

霍香正氣散　治人感四時不正之氣頭痛增寒作熱上喘咳嗽反胃嘔吐惡心瀉泄霍亂腸腑虛鳴冒嵐瘴氣

大腹皮黑豆水煮洗七次　白朮炒　白芷　白茯苓去皮各一兩　甘草炙　紫蘇各二兩　霍香土炒厚朴姜炒　桔梗　陳皮去白各半兩　半夏湯泡洗七次二兩

右㕮咀每服一兩水二鍾姜三片紅棗一枚

煎一鍾溫服

二香散　治暑濕相搏霍亂轉筋煩渴嘔

霍香一兩　半夏製陳皮黑豆水煮洗七次　白朮炒　白茯苓各一兩　甘草炙　黃連去鬚二兩　香薷一斤　白扁豆炒一兩

右㕮咀每服一兩水二鍾生姜三片蔥白二根煎一鍾食後溫服

九味羌活湯　治發熱惡寒無汗或自汗頭痛項強或傷風見寒脈傷寒見風脈並宜服之此藥不犯三陽禁忌爲四時發散之通劑也

羌活　防風　蒼朮各五分　白芷　生地　黃芩　細辛各一錢　甘草　川芎各一錢細辛用五分亦可

溫症如神暑亦可解

羌活去蘆苗　人參去蘆　柴胡去苗　甘葛炙　桔梗　白朮上大腹川厚朴姜汁炒　紫蘇

咳嗽鼻塞聲重如心經蘊熱口舌乾燥者加黃芩溫暑通用皆臻神妙

茯苓去皮枳殼去瓤各一錢炒　前胡去苗　獨活去蘆各等分

右㕮咀每服三錢水一鍾姜三片煎服如止

同煎七分去滓溫服

以上正氣驅邪之劑但暑不可汗微發解之散毒散尤爲調和之宗也

又主方香朴伏　沿伏熱吐瀉虛煩作亂

人參去蘆茯苓甘草炙各一錢三分　紫蘇葉七分　木瓜七分

七分　澤瀉六分　香薷一半夏湯泡七次　白扁豆炒七分

陳皮七分厚朴七分　烏梅肉七分

右㕮咀水二鍾生姜三片棗一枚煎一鍾食前熱服

一發一斂一驅一補巧力并中長技也當與六和湯并善

枇杷葉散　治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩

枇杷葉去毛炙二兩　香薷七錢五分　白茅根　麥門冬去心　甘草炙乾木瓜各一兩　丁香　陳皮去白厚朴去皮姜汁炙

右爲末每服二錢水一鍾姜三片煎服如止渴燥去丁香加知母冷水調下

以上辛散之劑

縮脾飲　消暑氣除煩渴止吐瀉霍亂

碗砂仁研四兩　乾葛二兩　白扁豆炒香去皮二兩　烏梅肉炒去核　草果炙各四兩　甘草炙各四兩

右㕮咀每服四錢水二大碗煎七分以水沉冷服

消導解利之劑

黃連解毒湯　治實火燥亂煩渴畜熱內甚等症此所謂實火宜瀉

黃連去毛　黃芩　黃柏　梔子各一錢

右咀片水煎服

人參白虎湯　治伏暑發渴嘔吐身熱脉虛自汗

人參一錢五分　知母二錢　石膏五錢　甘草炙一錢

右㕮咀入粳米一合水二鍾煎一鍾不拘時熱服如伏暑作寒熱未解宜和五苓散同煎

服伏熱後或冷水沐浴或喫冷物冷氣在胃不散令日漸作寒慄壯熱潭身洒淅宜加桂煎服便解

白虎加蒼术湯　治中暑無汗脉虛弱腹滿身重口燥面垢譫語發黃

石膏二錢知母去粗蒼术米泔水浸晒各一錢甘草五分羌活各一錢右作一劑水二鍾糯米一撮煎至八分不拘時服

竹葉石膏湯　治伏暑內外發熱煩燥大渴

石膏研一兩六錢半夏二錢五分人參二錢麥門冬去心五錢甘草炙二錢淡豆豉二錢糯米一合右㕮咀每服五錢水一鍾入青竹葉生姜各五片煎服

三黃石膏湯　治陽毒發斑身黃如塗朱眼珠如火狂叫欲走六脉洪大燥渴欲死鼻乾面赤齒黃

黃連　黃柏　黃芩各一錢　石膏一兩五錢　山梔子三十箇　香豉二合

右水二鍾姜三片棗二枚㕮咀入細茶一撮煎之熱服

桂苓甘露飲　合敗毒散消暑更捷

以上諸方皆大寒味能鎮墜消毒之劑驅暑之將軍也中用人參者攝氣保中防驟損耳此等藥必重病而後用輕則惟前十方內酌用爲妙

百合湯　病已愈而餘犯者用之最效

柴胡去蘆人參去蘆五分百合一錢二分陳皮去白一錢生地黃七分渴加天花粉胃中煩熱加山梔有微頭疼加羌活川芎嘔吐入姜汁炒半夏胃中飽悶加枳殼桔梗食復者加枳實黃連甚重大便實者加大黃胃中虛煩加竹茹竹葉痢後乾嘔錯語失神呻吟睡不安者加黃連畢角咳喘者加杏仁心中驚惕爲血少加當歸茯神遠志虛汗加黃芪牌倦加白术腹如雷鳴加煨生姜勞復時熱不除加葦蘆烏梅生姜汁

二右咬咀水二鍾姜三片捵法酯煮驚甲煎之

溫服

丸散方類

加味胃苓丸

蒼术五兩　陳皮三兩　厚朴二兩　甘草炙二兩　白术四兩　茯苓二兩　肉桂二兩　猪苓二兩　澤瀉去粗二兩　人參去蘆一兩　黃芩炒二兩

右爲末蜜丸清米湯下每服五六十丸

黃龍丸　治伏暑發熱煩渴嘔吐惡心

連去毛炒二兩　白芍炒二兩

右爲末蜜丸清米湯下每服五六十丸

備用方類

大順散　治胃暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分霍亂嘔吐臟腑不調

甘草一兩　乾姜炮　杏仁去皮尖炒　肉桂去皮各六兩四錢

右先將甘草用白砂蜜炒及入分黃熟次入乾姜同炒却入杏仁候杏仁不作聲爲度用篩篩淨後入肉桂一處搗羅爲末每服三錢水一鍾煎五七分溫服如煩燥井花水調下不拘時候以沸湯點服亦可

此劑也從治火攻則暑厥等劇症則效後仍用辛涼劑調理切不可常用也

龍鬚散　一名甘草散　治中暑迷悶不省人

事及泄瀉霍亂煩渴一服即愈力能解暑毒

白礬生一兩　五棓子生三錢　烏梅捶去仁二兩　甘草炙一錢

右爲末入雄麪拌勻每服二錢新水調下雨一方用清明日麪丸佳

一方加柯子肉滴水爲丸如彈子大細嚼水下名龍涎丸

此瘧劫劑輕症不可用

加味桂苓甘露飲

即桂苓甘露飲外加人參香薷甘草煎服治

黃芪炙一錢五分　人參去蘆甘草炙五分　當歸十分　白朮土炒八分　柴胡三分　升麻三分　陳皮留白一錢　渴加葛根五分　嗽加麥門冬一錢五味子十五粒

補中益氣湯　治暑傷元氣脉弱身虛者用之

一方有白芍藥五分秋冬不用　黃柏三分　以滋腎水瀉伏火加紅花三分入心養血

右作一服水煎午前趁稍熱服

法同前

調中湯

大黃去皮七錢　葛根　黃芩　藁本　白朮　芍藥　桔梗　茯苓去皮甘草炙各五錢

右㕮咀每服五錢水盞半煎八分移時再服得利即止

此下藥也須有生冷麪食積聚者方可用

治傷暑霍亂　轉脬危急者用　吳茱萸三錢同黃連炒至煙起方取去黃連將茱萸煎湯一大盞溫服立愈

附霍亂瘧痢發斑

暑症即發爲熱病吐瀉霍亂積久後發爲瘧痢霍亂瘧痢三症醫書各有專科治法亦詳故不共載姑以主方取効速者附列于左

乾霍亂吐法

暑氣入腹惡心腹痛上吐下瀉瀉如水注此暑火暴發升降不利清濁不分所瀉者皆五臟之津液宜速止之用五苓散或胃苓湯利小便清火實臟甚者桂苓甘露飲此症間有夾食積者溫補但助火反昏沉須加連膏方効

醫家認爲食傷而用下誤矣亦有謂其穢濁當去者不知津液暴涸元氣頓傷當立止之爲上更有吐瀉無物者爲乾霍亂令人立斃急用炒鹽湯或二陳湯探吐之通則易救

丹溪亦用理中湯吐恐熱不敢載方

二陳湯　化痰利氣乾霍亂多煎服之探吐代瓜蒂散瓜蒂性峻而損胃此藥利痰而性平

陳皮去白一錢五分　半夏薑汁炒一錢　茯苓去皮一錢二分　甘草三分

右�once咀水煎服

痢疾方

芍藥湯加減　兼治赤白痢

白芍藥一錢　黃連一錢　枳實一錢　白茯苓一錢　檳榔七分

當歸八分　黃芩一錢　川芎五分　大黃二錢　加滑石二錢

大黃初痢二三日內用一貼動後即去之痢日久者不可用水一鍾半煎至八分和渣汁二匙溫服瘥發未三分溫服日夜三服方効

香連丸　方伯王嵩淮傳自　楚府

木香二兩　黃連炒二兩　枳殼麪炒二兩　枳實麪炒一兩　檳榔二兩　益元散一兩　榆一兩　枳殼麪炒二兩　枳實麪炒一兩　檳榔二兩　陳皮二兩　梔角子一兩半

効如服前藥後尚未全愈即服後劑

胃苓湯

厚朴姜製炒 蒼术泔水浸炒 陳皮一錢 甘草炙五分 澤瀉八分 茯苓八分 猪苓八分 白术一錢 官桂三分

右水二鍾煎至八分溫服

治瘧　不拘久近寒暑老小虛實通用百効神妙

黃芪二錢 陳皮一錢 青皮一錢 當歸一錢 柴胡一錢 前胡各一錢 槟榔七分 肉桂八分 好白术四分半要秤 常山四分

半要秤 烏梅二個 白芍藥炒黃一錢二分

右方姜棗爲引水煎二次將發先一二時服即不發矣　氣虛弱加人參四五分暑甚加香薷一錢孕婦減檳榔三分

發斑方

消斑青黛飲　治邪熱傳裏裏實表虛血熱不散熱氣乘於皮膚而爲斑也

黃連去毛一錢 石膏碎一錢五分 知母五分 柴胡去蘆一錢 甘草五分 人參去蘆五分 犀角鎊一錢 青黛一錢 山梔一錢 生地一錢 大便實者去人參加大黃多寡酌之

右㕮咀水二鍾姜一片棗二枚煎之趁法臨服入苦酒一匙調服

寒溫暑三病有發斑症而暑斑人多忽之不知其形與寒溫同或大如豆或細如線痕或如蚤點甚亦有羊毛疔者皆宜前藥清之

服藥總法

傷寒傷暑溫涼諸症皆邪氣敗正氣也用藥如對敵藥入則邪漸退藥力盡而邪復熾必一服周時即詳勢脈藥對則連進日夜三五服以邪退病安爲止此法惟漢張仲景傷寒隋孫思邈千金方中載此孫云夏月晝五夜三冬月晝三夜五必期病退而後止如禦敵者愈驅逐愈加精銳期於蕩平而後班師此萬全之勝算也自宋以後不傳故取效寡而活人之功疎愚以此法屢治人極有神效

附經驗方

胃氣疼經驗方

五靈脂一錢炒出青烟爲度　石菖蒲一錢炒　砂仁入分　白荳蔻一箇去皮　香附子一錢　木香一錢　青皮五分　陳皮入分　蒼术入分　厚朴入分　乾良姜一錢　玄胡索一錢　烏梅一箇　吏君子五箇　蘇梗三分　水一鍾姜一片煎七分徐徐温服即愈

治心痛神效方

青皮　枳殼　玄胡索各入分　陳皮　當歸

白茯苓　白芍　吳茱萸各七分　三稜　蓬术　檳榔　厚朴各六分　甘草三分

用水煎至八分熱以砂仁六分搥碎入鐺再煎半滾取起傾在木香碗中調温服下　木香一錢預先磨下至重者二帖斷根

治痔瘡經驗方

乾蚯蚓去土炒淨　蓮鬚炒未一兩　槐角子炒淨未三兩　象牙屑炒未一兩　側柏葉白糕者淨二兩　每兩用瞥二錢

淡蜜水爲丸梧子大每服七八十九若加剩

蛸皮一箇用酥炙淨爲末入內更好輕粉服五兩即愈

痢疾極効方

川黃連二兩炒　白朮四錢土炒　木香三錢見火不炒　白芷入分　只殼三錢麩炒　麥芽粉三錢半　川當歸二兩酒浸炒　肉荳蔻五錢麪裹去油　石蓮子五兩去殼淨　蒼术五錢米泔浸炒　白芍二兩麩炒　神麯四錢五分炒

右爲極細末每用一錢白姜湯下紅蜜湯下水扁米湯下服後以火烘手抹膀胱四十九轉

臥一時即思食忌生冷麪食

治牙痛方

用蜘蛛絲裹燈上燒存性加胡椒一粒共研爲末吹入鼻中立止左牙患吹右鼻右牙患吹左鼻

作金散治小兒肥瘡疥癬聖藥雙用效驗　枯礬　鹽　硇砂各等分　烏龍尾即到鈎鹽灰加倍用　輕粉少許　右研末用墨磨調滿燈油塗之二三次瘥愈先洗淨瘡痂海搽宜早晨空心

治大麻風末藥屢次經驗方　蠻金五錢　白牽牛六錢半炒熟半生用　硫黃三錢　蛇床子五錢　苦參五錢　白礬三錢另爲末　紙裹火中煨熟　以上合劑　除雄硫黃各參末外餘藥焙乾爲末入拌勻細入各藥內　皁角刺二錢水溫化開　大黃二錢水浸軟取出切片焙乾爲末　每服只用五錢清酒一碗溫服打出多虫從大便無虫或極臭膿涎亦是過二三日再服以便　又一方　小艾圓灸數次出毒氣根　○洗麻風方　蛇床子　地骨皮　皁角二皮　槐皮　苦參　蒼耳子　防風　白芷　生薑各二兩　川椒一兩　重光　頭一日持末藥用好酒調五錢天未明朝東跪服本日利泄大便有虫出如無虫必有

傷暑全書　卷二

臭膿血出次日用前開藥分作二起煎水一大盆洗以皮破血出爲主第四五日又將末藥五錢調酒早服如大便有虫臭膿等要遍洗三日服一次如無不必用只用二三次不必多用好洗三五次更好　○藥酒方　此方劑作煎藥元氣用藥之後只要禁酒　蒼朮　厚朴　天門冬　華魚羊吃齊保命丸　先服三十劑仍作藥酒　防風　半夏　牛膝　荊芥　白芷　麥門冬　生地　熟地　羌活　白朮　細辛　麻黃　川芎　陳皮　香附　烏藥　砂仁　當歸　天麻　杜仲　玉竹　蔥白　川椒　甘草　蔓荊子　川萆薢　右劑用袋裝將好酒二十斤大壜入藥袋在內泥封口鍋內煮五晝夜取出每日空心早飲一茶鍾午飲一盃臨用宜再造藥渣曬乾爲末米麵打糊爲丸梧子大每服三十丸空心酒送下或用姜汁其藥若用好燒酒更妙

古今名醫品彙

張機　字仲景東漢南陽人舉孝廉官至長沙太守作傷寒論醫方大備後世稱爲醫聖

孫思邈　唐京兆華原人幼稱聖童隋文帝召不拜太宗即位召見拜諫議大夫固辭隱太白山學道養氣得度世之術洞曉天文精究醫業著千金方三十卷

朱肱　號無求子宋吳興人深於傷寒著活人書道君朝詔關投進授奉議郎醫學博士其中論著一二款見節菴內不另載

劉完素　字守眞金河間人少聰敏博學忽遇異人以酒飲之大醉及寤洞達醫術撰運氣要旨論精要宣明論素問玄機原病式然始用涼劑以降心火益腎水爲主自號通玄處士

張元素　字潔古金易州人八歲試童子舉二十七歲試經義進士犯庶讞下第乃學醫洞

徹其術其學則李東垣深得之其論不易
李杲　字明之號東垣元之鎮人也幼好學博經史尤樂醫藥捐千金從張元素盡得其業當時稱爲醫聖東垣十書多其著述
朱震亨　字彦修學者尊之曰丹溪先生元末婺之義烏人也自幼好學日記千言從許文懿公得朱子四傳之學因母病即慨然曰士苟精一藝以推及物之仁雖不仕於時猶仕也乃棄舉業一於醫致力褒然稱醫大成焉

方廣　字約之號古巷休寧人讀儒之服留意醫經爲名醫善用丹溪法
王綸　字汝言號節菴浙江慈谿人官至廣東布政因父病精醫著明醫雜著發丹溪所未發世甚尊信之
陶華　字尚文號節菴餘杭名醫幼讀儒書旁通百氏著傷寒瑣言發仲景所未發大行于世正統間被徵引疾歸時論高之
虞摶　字天民號恒德老人正德花溪人著醫

切於治暑者錄其論并方因錄其姓氏使後之業岐黃者誦其書以攷其世奮然有仰止之思焉安知不與古長桑伯元諸公競駕而馳聲乎
張仲景
傷寒例第三論曰脉盛身寒得之傷寒脉虛身熱得之傷暑
痙濕暍第四論曰太陽中熱者暍是也其人汗出惡寒身熱而渴也

又曰太陽中暍者發熱惡寒身重而疼痛其脉弦細芤遲小便已灑灑然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥若發汗則惡寒甚加溫針則發熱甚數下之則淋甚

按此症一味涼藥清內火辛以散之酸以收之三者爲妙汗下俱不可若加之溫針則速其斃耳

辯太陽病脉第五論曰傷寒二三日陽明少陽證不見者爲不傳也

又曰太陽病發熱而渴不惡寒者爲温病

按温病無尊經隨其所中以脉辯之亦有不中太陽初未頭痛惡寒諸症而庸醫認爲痧火內傷禍不旋踵矣此症不傳經止中一二經慎之慎之

又曰若發汗已身灼熱者名曰風温風温爲病脉陰陽俱浮自汗出身重多眠睡息必鼾語言難出若被下者小便不利直視失溲若被火者微發黃色劇則如驚癎時瘛瘲若火熏之一逆再逆引日再逆促命期

按此症皆春温以内有火内灼非風温外甚也發劇也眠睡語難皆火内灼非風温外甚也自汗風傷衛不惡寒外症輕也止宜辛凉藥内解微發表則愈

孫思邈

傷寒例論曰易稱天地變化各正性命然則變化之迹無方性命之功難測故有炎涼寒燠風雨晦冥水旱妖災蟲蝗怪異四時八節種種施

化不同七十二候日月運行各別終其紀度方得成年是謂歲功畢矣天地尚且如然在人安可無事故人生天地之間命有遭際時有否泰吉凶悔吝苦樂安危喜怒愛憎存亡憂畏關心之慮日有千條謀身之道時生萬計乃度一日是故天無一歲不寒暑人無一日不憂喜故有天行瘟疫病者即天地變化之一氣也斯蓋造化必然之理不得無之故聖人雖有補天之極之德而不能廢之而能以道御之

其次有賢人善於攝生能知撙節與時推移亦得保全天地有斯瘴癘還以天地所生之物以防備之命曰知方則病無所侵矣然此病也俗人謂之橫病多不解治皆曰日滿自差以此致死者天下太半凡始覺不佳即須救療迄至於病愈湯食競進折其毒勢自然而瘥必不可令病氣自在恣意攻人拱手待命斯爲誤矣

按眞人此論從天人合基虛發脉義理源頭上起瀾而議論蒼古渾渾灝灝眞與南華並傳雖論寒哉五飯而溫與暑之秘皆兼之矣敬錄置之座右以爲玄宗之一助醫道特其餘耳

劉河間

中暑之症身熱頭痛背寒面垢自汗煩燥大渴口乾倦怠而身不痛或時惡寒或畏日氣脉虛而弱無問表裏通宜白虎湯并感冒發熱煩渴五苓散桂枝甘露飲黃連香薷飲或雙解散或裏熱甚腹滿而脉沉可下者大承氣湯下之或三一承氣湯尤妙半表半裏者小柴胡湯涼膈天水散

按劉河間論暑症甚詳獨明於諸家用藥頭頭中款可謂得其解者但暑症不分表裏一味清內得寒涼而解苦酸而收不必用下承氣湯走馬之糞也却之却之

李東垣暑傷胃氣論

刺志論云氣虛身熱得之傷暑熱傷氣故也痿論云有所遠行勞倦逢大熱而渴則陽氣內伐則熱舍於腎腎者水臟也今水不能勝火則枯骨而髓虛足不任身發爲骨痿故下經曰骨痿者生於大熱也此濕熱成痿令人骨乏無力故治痿獨取陽明時當長夏濕熱大勝蒸蒸而熾人感之多四肢困倦精神短少懶於動作胸氣促肢節沉痛或氣高而喘身熱五

相搏必加以渴逆病雖互換少差其天暑濕令則一也宜以清燥之劑治之名曰清暑益氣湯主之

清暑益氣湯

黃芪（汗少者減五分）　蒼术（泔浸去皮各一錢五分）　升麻一錢　人參去蘆　白术　橘皮　神麯（炒）　澤瀉（各五分）　甘草　黃檗（酒浸）　當歸身　麥門冬（去心）　青皮（去白）　葛根（各三分）　五味子九個

內經云陽氣者衛外而爲固也炅則氣泄今暑邪干衛故身熱自汗以黃芪人參甘草補中益氣爲君蒼术甘草橘皮當歸身甘辛微温養胃氣和血脉爲臣蒼术白术澤瀉滲利除濕升麻葛根苦甘平善解肌熱又以風勝濕也濕勝則濕不消而作瘧滿悶炒麯甘辛青皮辛温消食快氣腎惡燥急食辛以潤之以黃檗苦辛寒借甘味瀉熱補水虛者滋其化原以五味子麥門冬酸甘微寒救天暑之傷庚金爲佐也

右㕮咀作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱食遠傷暑之病雖互換少差其天暑濕令則一也宜以清燥之劑治之名曰清暑益氣湯主之

清暑益氣湯

黃芪（汗少者減五分）　蒼术（泔浸去皮各一錢五分）　升麻一錢　人參去蘆　白术　橘皮　神麯（炒）　澤瀉（各五分）　甘草　黃檗（酒浸）　當歸身　麥門冬（去心）　青皮（去白）　葛根（各三分）　五味子九個

內經云陽氣者衛外而爲固也炅則氣泄今暑邪干衛故身熱自汗以黃芪人參甘草補中益氣爲君蒼术甘草橘皮當歸身甘辛微温養胃氣和血脉爲臣蒼术白术澤瀉滲利除濕升麻葛根苦甘平善解肌熱又以風勝濕也濕勝則濕不消而作瘧滿悶炒麯甘辛青皮辛温消食快氣腎惡燥急食辛以潤之以黃檗苦辛寒借甘味瀉熱補水虛者滋其化原以五味子麥門冬酸甘微寒救天暑之傷庚金爲佐也

右㕮咀作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱食遠

傷暑全書　卷二　十六

傷暑全書　卷二　十七

有之切莫執一隨病處方爲妙

按暑病原有輕重分傷肖中三款是已但凡感暑而病者皆從肖火而得總謂之傷暑其感火多而勢重者乃爲中暑以內外諸雜症分屬五臟猶爲近理至以五臟分屬肖傷中三者則誤矣其內外諸雜症卽有重輕均從臟腑而發者以分屬之三症豈不泥且左矣名家亦有此誤又何以破後人之迷也

舘動得靜得

丹溪曰若暑之時無病之人或避暑熱納涼於深堂大廈涼臺冷館大扇風車得之者是靜而得之陰症也其病必頭痛惡寒身形拘急肢節疼痛而心煩胍膚大熱無汗此爲陰寒所遏使周身陽氣不得伸越宜用辛温之劑以解表散寒用厚朴紫蘇乾葛藿香羌活蒼朮之類若外既受寒內復傷冰水生冷瓜果之類前藥再加乾姜縮砂神麴之類此皆非治暑也治因暑而致之病也

按靜得動得分中暑傷暑此論出自張潔古

口得寒物身犯寒氣同冬時寒病治之則謬以千里矣

方古菴附

論曰寒則傷形熱則傷氣何以言之人與天地同一橐籥夏月天之氣浮於地表則人之氣浮於肌表況彼盛暑所傷膚腠疎豁氣液爲汗發泄於外是表裏之氣俱虛矣不善攝生者暑熱傷於外生冷戕於中若之何而能運化也是以水穀停積而爲濕熱發爲嘔吐爲泄瀉甚則吐

瀉俱作而揮霍悶亂也若不即病濕熱怫鬱於肉他日爲瘧爲痢之所由矣今大順散非治暑熱之藥乃治暑月飲涼過多爲病之劑也歟了

按此論精當但大順散不可輕用

王節齋附

論曰夏至日後病熱爲暑暑者相火行令也夏月人感之自口齒而入傷心包絡之經其脉虛或浮大而散或弦細芤遲蓋熱傷氣則氣消而脉虛弱其爲症汗煩則喘渴靜則多言身熱而頻心痛大渴引飲頭疼自汗倦怠少氣或下血發黃生斑甚者火熱制金不能平木痛搐不省人事治暑之法清心利小便最好暑傷氣宜補真氣爲要又有惡寒或四肢逆冷甚者迷悶不省而爲霍亂吐利痰滯嘔逆腹痛瀉痢此則非暑傷人乃因暑而自致之病也以其因暑而得故亦謂之暑病然治法不同也

按節齋此論氣脉症方供備種種精妙暑月可錄一遍於座右

古菴節齋以世代不宜列此因原係丹溪附餘姑附之

陶節菴

辯張仲景傷寒論曰傷寒者乃冬時感寒即病之名桂枝麻黃二湯爲當時之傷寒設與過時之溫暑者有何頭焉夫受病之原則同亦可均謂之傷寒所發之時既異治之則不可混也請略陳之夫春溫夏熱秋涼冬寒者四時之正氣也以成生長收藏之用風亦因四時之氣而成風亦溫暖冬時坎水用事天令閉藏水氷地凍風與寒相因而成殺厲之氣人觸冒之腠理鬱塞乃有惡風惡寒之症其餘時月則無此症也仲景固知傷寒乃冬時殺厲之氣所成非比他病可緩故其爲言特詳於此書而略於雜病倘能因名以求其實則思過半矣不幸此書傳世久遠遺帙頗乏　晉太醫令王叔和得散亡之餘詮次流傳其　博矣惜乎以已論混經未免穿

熬用魯陳無已氏因之順文註釋並無缺疑正誤之言以致將冬時傷寒之方通解温者遺禍至今而未已也温暑必別有方今皆失而無徵也我

朝宋景濂學士嘗嘆傷寒論非今書得其旨哉蓋傷寒之初中人必先入表表者何卽足太陽寒水之經此經行身之後自頭貫脊乃有頭疼脊強惡寒之症在他經則無此症矣況此經乃一身之綱維爲諸陽之主氣猶四通八達之衢以此湯通治春温夏熱之病則誤之甚矣

按麻黄桂枝湯原爲冬月傷寒正藥温暑二病不可混施節菴力破從來之迷至於辯仲景書中多遺帙缺誤歸罪於王叔和之詮次陳無已之註釋可謂發前人所未發但仲景醫書專明傷寒故詳於寒病略於温暑原不爲温暑設也

治傷寒用藥大略

論曰四時皆有傷寒治之不可一槩論也冬時氣寒腠理微密非辛甘温不通故以桂枝等湯以治之然風與寒常相因寒傷榮惡寒頭疼脉浮緊而無汗則用麻黄湯開發腠理以散邪得汗卽愈風則傷衛頭痛惡風脉浮緩而自汗則用桂枝湯充塞腠理以散邪汗止卽愈經云辛甘發散爲陽者是也若夫榮衛俱傷又非此二湯所能治也須大青龍湯然此湯太峻又非庸

俗所可擬也予亦有代之者蓋冬時爲正傷寒天氣嚴凝風寒猛烈觸冒之者必宜用辛温散之其非冬時亦有惡寒頭痛之症皆宜辛涼之劑通表裏和之則愈矣若以冬時所用桂枝辛温之藥通治之則殺人多矣曰辛涼者何羌活冲和湯是也兼能代大青龍爲至穩嗚呼一方可代三方危險之藥

按辯寒温暑藥甚明冲和一湯尤爲温涼二

疏穿楊之劑百發百中者也

傷寒變溫熱病

論曰活人書發於温病曰陽熱未盛爲寒所制豈有伏寒既已變而爲温尚可言寒能制其陽熱邪又於熱病曰陽熱已盛寒不能制亦不當復言其爲寒也蓋是春夏陽熱已變其伏寒即非有寒能制其陽熱耳外有寒邪能折陽氣者乃是時行寒疫仲景所謂春分已後秋分節前天有暴寒爲時行寒疫是也三月四月其時陽氣尚弱爲寒所折病熱則輕五月六月陽氣已

盛爲寒所折病熱則重七月八月陽氣已衰爲寒所折病熱亦微是知時行寒疾與温熱二病所論陽氣盛衰時月則同至於論暴寒之寒與伏寒已變之寒自是相違名不正則言不順矣仲景又云其病與温及暑病相似但治有殊耳要在辯其病源寒熱温三者之殊則用藥之冷熱判然矣

按南陽發變字大有慈心至於伏寒之誤南翁亦自然知其然而不取明攻其非恐起後

温病辯

經曰温病之脉行在諸經不知何經之動隨其經之所在而取之

如太陽症頭疼惡寒汗下後過經不愈診得尺寸俱浮者太陽病温也

過時而發不在表也已經汗下亦不在表也經

曰不惡寒而反渴者温病也明其熱自内達外無表症明矣

按傷寒傳經由腑入臟由陽入陰温病不傳經止中一二經或乘某經火或乘某經虚被春時寒氣所中自内發外而作寒熱等症或中腑則腑病或中臟則臟病不論日期始終惟此一二經内經言惟經所動隨經而取自是明明斷案節卷分經又是面以過太陽經不傳别經定爲温病此辯别寒温之口訣所

當佩服者

辯惡寒

論曰惡寒否乎曰傷寒自冬月風寒而成外則有惡寒惡風之症既名爲温則無此症矣曰然則子之言何所據乎經耳經曰太陽病發熱不惡寒而渴者温病也不惡寒則病非因外來渴則明其自内達表

按冬月傷寒由於外感而惡寒是矣曰温症不惡寒非也蓋温症緣陽氣發暢爲春時風寒所迫雖係内熱亦由外感故亦有惡寒等症豈獨温即暑病亦有此症蓋暑屬外火傷于臟腑内外炎炎故熱極戰慄而成惡寒醫不知遂爲傷寒不可不詳辯也

辯温暑涼寒諸症

論曰傷暑與傷寒俱有熱若誤作傷寒治之則不可蓋寒傷形熱傷氣傷寒則外惡寒而脉浮緊傷暑則不惡寒而脉虛此爲異耳經云脉盛身寒得之傷寒脉虛身熱得之傷暑治宜小柴胡湯渴加石膏知母或人參白虎湯天久淫雨濕令大行蒼寒白虎湯若元氣素弱而傷之重者清暑益氣湯治之

夫傷寒二字蓋冬時天氣嚴寒以水氷地凍而成殺厲之氣入觸犯之即時病者爲傷寒乃有惡寒頭疼發熱之症故用麻黄桂枝發散表中寒邪自然熱退身涼有何變症如或頭疼惡寒表症皆除而反見譫語怕熱燥渴大便閉者以法下之大便通而熱愈有何怪症其餘春夏秋三時雖有惡寒身熱頭疼亦微即爲感冒非時暴寒之輕非比冬時氣正傷寒爲重也如冬感寒不即病伏藏於肌膚至春夏秋時共伏寒各隨時氣改變爲温爲熱者因温暑將發又受暴寒故春變爲温病既變之後不得復言其爲寒矣所以仲景有云發熱不惡寒而渴者其理可見温病也暑病亦然比之温病尤加熱不惡寒則病非外來渴則明其熱自内達表無表症明矣治温暑大抵不宜發汗過時而發不在表也

其伏寒至夏又感月寒變爲暑病暑病者即熱病也取夏火當權而言暑字緣其溫熱二症從冬時伏寒所化總曰傷寒所發之時既異治之不可混也若言四時俱是正傷寒者非也此三者皆用辛涼之劑以解之若將冬時正傷寒之藥通治之定殺人矣辛涼羌活冲和湯是也兼能代大青龍湯治傷寒見風傷風見寒爲至穩一方可代三方危蛻之藥如坦夷其神乎哉世俗皆所未知也若表解其裏症具者亦以法下之無惑又傷寒下後過經不愈者亦溫病也已經汗下亦不在表也隨病制宜凡有辛苦勞役之人有患頭疼惡寒身熱加之骨腿酸疼微渴自汗雖浮大而無力此爲勞力感寒當用補中益氣辛溫之劑爲良經云溫能除大熱正此訓也若當和解者即以小柴胡加減和之下症見者即以本方加大黃微利之切勿過用猛烈其害非細若初病無身熱無頭疼便就怕寒厥冷腹痛嘔吐泄瀉脉來沉遲無力此爲直中寒症

宜溫之而不宜汗下也疫癘者皆時行不正之氣老幼傳染相同者是也緣人不近穢氣免傷其六氣若近穢氣有傷真氣故病相傳染正如墻壁回賊人不敢入正氣盛邪氣不敢侵正氣既虛邪得乘機而入與前溫暑治又不同表症見者人參敗毒散半表半裏症者小柴胡裏症具者大柴胡下之無以脉脇以平爲期與其瘧痢等症亦時疫也照常法倒治之

按此辯傷寒傷暑最爲喫緊廣度慈航一披卷而了然者當熟讀精思方得其解斟酌用之方得其妙

辯風溫

論曰風溫人寸俱浮素傷於風因而傷熱風與熱搏即爲風溫其外症四肢不收身熱自汗頭疼喘息發渴昏睡或體重不仁慎勿發汗汗之則譫語煩燥百無精彩病在少陰厥陰二經葳蕤湯選用

重者輕則爲溫重則爲風溫乃病名也朱南陽曾道及之若謂素傷於風因而傷熱風與熱薄即爲風溫者非確論也謂不可發汗乃調溫之訣

虞花溪見醫學正傳

內經曰因於暑汗煩則喘喝靜則多言潔古又曰靜而得之爲中暑動而得之爲中熱中暑者陰症中熱者陽症仲景傷寒論中一症曰中喝即中暑也處而微弱煩渴引飲體熱自汗此蓋傷暑全書　卷二

待勞役體虛而暑邪干衛之候是宜東垣清暑益氣湯等劑益之而愈一症曰熱病即中熱也脉洪而緊盛頭疼身熱口燥心煩此蓋得之於冬感寒邪鬱積至夏而發乃挾暑而成大熱之候是宜黃連白虎解毒等湯清涼之劑調之而愈曰中暑者陰症內傷之爲病也曰中熱者恐亦外感之爲病也曰陰曰陽豈不於斯而明辯之乎學者宜再思之

按暑熱一氣也感暑而病熱原不可分爲二氣中與傷有輕重之別丹溪有胃中傷三名細思總爲傷暑其極重者則稱中耳胃不必言也已有專辯傷寒症分有陰陽暑症屬火多發揚激烈之狀總謂之陽似無所爲陰者惟其感深日久驟發而沉昏不省人事閉目息微此類似陰其實火極氣結痰盛氣閉臟腑不通咽喉噎塞使然乃陽勝非陰也陰症陽症尚不可分況以暑與熱分之益不達矣

暑疫全書　卷二

李文淸見醫學入門

暑病身熱自汗口渴面垢而已餘症皆後傳變或兼內傷必先問其人素虛胃弱或大病大勞後縱暑中傷者宜淸暑益氣素強盛壯實無虛損病者宜祛暑和中

自襲暑氣而言曰中暑自被日逼而言曰中暍然暑初入自口鼻牙頰達于心主胞絡以火從火故古法治暑取冷水灌漑勿嚥

即暑暍症但以手足搐搦爲風手足逆冷爲厥厥與傷寒熱厥義同黃連香薷散暑風乃勞役

內動五臟之火與外火交熾則金衰木旺生風香薷散加羌活或六和湯合消風散素有痰飲因暑鼓動痰熱生風者六和湯合星香散

救痰壅法

暑毒痰火壅塞胸中量體虛實吐之火鬱發之之義也如痰喘氣急痞塞入藥不得者急煎六和湯調麝二釐服

救絞腸沙乾霍亂用

絞腸沙腹痛不可忍或連心痛展轉在地手足亦冷乃腸絞縮在腹須臾能死用熱湯調鹽一兩灌入即安或再用陳艾陳樟木陳壁土各等分水煎連進三四服

救途中熱倒法

若道途卒倒湯藥不便恐氣脫難治急扶陰凉處不可臥濕冷地掬道上熱土放臍上揉開作竅令人尿與其中待求生薑或蒜嚼以熱湯或童便送下外用布蘸

按入門一書雖係時出中間亦頗詳細故錄其數條以備覽暑暍一氣也若中暑中暍之分則強矣

王宇泰見證治準繩

論曰此事難知傷暑有二動而傷暑心火大盛肺氣全虧故身脉洪大動而火勝者熱傷氣也辛苦人多得之白虎加人參湯靜而傷暑火勝金位肺氣出表故惡寒脉沉疾靜而濕勝者身重也安樂之人多受之白虎加蒼朮湯傷暑必自汗肯寒面垢或口熱煩悶或頭疼發熱亦有傷氣而不傷形故也但身體不痛與感風寒宜香薷飲六和湯嘔而渴者浸冷香薷飲或苓散兼吞消暑丸嘔不止者枇杷葉散去茅痛者更有痛甚身如骨碎者神思倦怠殊甚吞來復丹嘔而痰却暑散吞消暑丸或小半夏茯苓湯或消暑飲　又有不寫而腹乾痛者六和湯煎熟調蘇合香丸　暑先入心者心屬南方離火各從其類小腸爲心之府利心經暑毒使由小腸中出五苓散利小便治暑上劑也

暑月身癢如鍼刺間有赤腫處亦名暑風末子六和湯和消風散酒調服暑風而加以吐瀉发作者六和氣藿香正氣散各半貼加全蝎三個有暑毒客於上焦胸膈痞塞湯藥至口即出不能過關或上氣喘急六和湯浸冷調入麝香少許　暑氣久而不解遂成伏暑內外俱熱煩燥自汗大渴喜冷宜香薷飲加黃連一錢繼進白虎湯若服藥不愈者毒深入結熱在裏譫語煩渴不欲近衣大便秘結小便赤澁當用調胃承氣湯或三黃石膏湯

承氣湯必不可輕用

又加減清暑益氣湯

復立變症加減法於後　如心火乘脾乃血受火邪而不升發陽氣伏於地中地者人之脾也必用當歸和血少用黃柏以益真陰如脾胃不足之症須少用升麻乃足陽明太陽引經之藥也使行陽道自脾胃中左遷少陽行春令生萬物之根蒂也更少加柴胡使諸經右遷生發陰陽之氣以滋春之和氣也如脾虛緣心火亢盛而乘其土也其次肺氣受邪爲熱所傷必須黃芪最多甘草次之人參又次之三者皆甘溫之陽藥也脾始虛脾氣先絕故用黃芪之甘溫以益皮毛之氣而閉腠理不令自汗而損元氣也土喘氣短懶言語須用人參以補之心火乘脾須用炙甘草以瀉火熱而補脾胃中元氣甘草最少恐滋滿也若脾胃之急痛幷脾胃大虛腹中急縮腹皮急縮者却宜多用經曰急者緩之若從權必加升麻以引之恐左遷之邪堅戍卒不肯退反致項上及臀尻肉添五味而行陰道故引之以行陽道使清氣出地右遷而上行以和陰陽之氣也若中滿者去甘草咳甚者去人參口乾嗌乾者加乾葛如脾胃既虛不能升浮爲陰火傷其生發之氣榮血大虧榮氣伏於地中陰火熾盛日漸煎熬血氣虧少且心包與絡心主血血滅則心無所養致使心亂而煩病名曰悗悗者心惑而煩悶不安也是由清氣不升濁氣

不降清濁相干亂於胸中使周身血氣逆行而亂經云從下上者引而去之故當加辛溫甘溫之劑生陽陽生而陰長也故曰甘溫何能生血又非血藥也曰仲景之法血虛以人參補之陽旺則能生陰血也更加當歸和血又宜少加黃芩以救腎水蓋甘寒瀉熱火火滅則心氣得平而安也如煩亂猶不能止少加黃連以去之蓋將補腎水使腎水旺而心火自降扶持地中陽氣也如氣浮心亂則以硃砂安神尤鎮固之得煩減勿再服以防瀉陽氣之反陷也如心下痞亦少加黃連氣亂於胸爲清濁相干故以陳皮理之能助陽氣之升而散滯氣又助諸甘辛爲用故長夏濕土客邪火旺可從權加蒼术白术澤瀉上下分消其濕熱之氣濕氣太盛主食不消化故食減不知穀味加炒麪以消之便加五味子麥門冬人參瀉火益肺氣助秋損也此三伏中長夏正旺之時藥也

按此證治準繩中論暑症者至精至密立中舍和王道之宗匠不能具載謹摘其要者錄於左至加減清暑益氣湯尤東垣之知已

名醫類案

繼謙甫治蒙古百戶因食酒肉飲潼乳得霍亂吐瀉症從朝至午精神昏憒已困急來告羅親之脉皆浮數按之無力所傷之物已出矣即以新汲水半碗調桂苓白术散徐徐服之稍得安靜又於墻陰掘地約二寸貯以新水在內攪動待一時澄定用清者一杯再調服渴遂煎錢氏白术散時時服良愈或曰用地漿者何也坤屬地地屬陰土平曰靜煩感至陰之氣又於墻陰貯新汲水以救重陰之氣也陰中之陰能瀉陽中之陽陽霍亂因暑熱內傷所得故用地漿之意也

捉舉父年近六十六月中暑毒霍亂吐瀉昏冒終日不省人事時夜參半請羅視之脉七八至洪大有力頭熱如火足冷如水半身不遂

牙關緊急蓋年高氣弱當暑氣極盛陽明得令之際況陰得而動之中著明矣非甘辛大寒之劑不能瀉其暑熱墜浮溜之火安神明也遂以甘露散甘辛大寒瀉熱補氣加茯苓以分陰陽約一兩水調灌之漸漸省事諸證悉去慎言語節飲食三日以參朮補中湯以意增減旋服理正氣愈十日平復

滑伯仁治一人病自汗如雨至赤身熱口燥心煩盛暑中宜惟幕周密自以自虛亡陽復朮附數劑脈虛而洪數舌上胎黃伹仁曰前藥誤矣熱病熱治醫者死之素問云必先歲氣毋伐天和朮附豈可輕用以犯時令又云脈虛身熱得之傷暑暑家本多汗加剛劑脈洪數而汗甚乃令撤慢開窓少頃漸覺清爽以黃連人參白虎湯三進而汗止大半諸症亦減兼以既濟湯渴用冰水調天水散二日而愈

孫兆治一人自汗兩足冷至膝下腹滿不省事牙關緊急蓋年高氣弱當暑氣極盛陽明得令之際況陰得而動之中著明矣非甘辛大寒之劑不能瀉其暑熱墜浮溜之火安神明也遂以甘露散甘辛大寒瀉熱補氣加茯苓以分陰陽約一兩水調灌之漸漸省事諸證悉去慎言語節飲食三日以參朮補中湯以意增減旋服理正氣愈十日平復

滑伯仁治一人病自汗如雨至赤身熱口燥心煩盛暑中宜惟幕周密自以自虛亡陽復朮附數劑脈虛而洪數舌上胎黃伹仁曰前藥誤矣熱病熱治醫者死之素問云必先歲氣毋伐天和朮附豈可輕用以犯時令又云脈虛身熱得之傷暑暑家本多汗加剛劑脈洪數而汗甚乃令撤慢開窓少頃漸覺清爽以黃連人參白虎湯三進而汗止大半諸症亦減兼以既濟湯渴用冰水調天水散二日而愈

孫朕六脈亦弱而急問其所服藥取視皆陰藥也孫曰此非受病重藥能重病耳遂用五苓散白虎湯十餘貼病少甦再服全愈或問治法孫曰病人傷暑也始則陽微厥而脈小無力醫謂陰病遂誤藥其病厥用五苓散利小便則腹消白虎湯解利邪熱則病愈凡陰脫冷則臂亦冷汝今脫冷臂不冷則下厥上行是如陽之微厥也此症乃先傷濕後傷暑爲濕之症也

丹溪治一人夏大發熱譫語肢體莫舉喜冷飲脈洪大而數以黃芪茯苓濃煎如膏用涼水調服三四次後昏臥如死氣息如常次日方醒而愈

一人夏發大熱大汗惡寒戰慄不自禁持且煩渴此暑病也脈虛微細弱而數其人好啖致勞而虛以人參竹葉作湯調辰砂四苓散數劑而安

項彥章治一人病甚醫皆以爲瘵盡愕束手項

胗之脉細數而且實細數者暑也暑傷氣宜虛今不虛而反實乃熱傷血藥爲之也家問死期曰何得死爲作白虎湯飲即瘥

吳茭山治一婦人冬月偶感患瀝瀝惡寒肴肴發熱惡食乾嘔大便欲去不去諸醫皆以虛弱疾飲治之以二陳補心等藥服不効延及半月吳胗其脉虛而無力類乎傷暑衆不然之究問共病因其婦曰因天寒換着綿衣取綿套一床蓋之須臾煩渴寒熱嘔吐綿延至今耳吳曰誠哉傷暑也綿套牠之盛暑夾熱收入箇中必有暑氣尚今開泄今人謂虛得之易入故病如是其婦曰然遂製藿連香蘇飲連二服而愈

句時一馬夫馳馬山局下忽仆地絕急以五苓大順白虎湯人參五錢服下嘔噦即止鼾睡五鼓方醒索粥連進二三服乃減參稍輕調理數劑而愈

傷暑全書卷之二終

瘟疫一症歷代明哲具有成方如仲景有大青龍湯陽旦湯越婢湯黃芩湯白虎湯大小柴胡湯三承氣湯麻黃升麻湯諸條列瘟疫之見症為汗法下法和法雙解法輕重深淺纖毫備具特散見於諸經條中而未嘗直指其名為瘟疫非不欲明言也其書本傷寒立論而互為區別之書非專論瘟疫之書且上古文辭簡易詳於辨症而不詳於立名欲人從症上細辨則不必名上區別而自無混治之失嗣是而後河間有宣明五氣論則

出海圖書館藏

論瘟疫較詳立法更備如桂苓甘露飲黃連解毒湯三已效方涼膈散人參石膏湯雙解散諸方皆是而亦未正其名易老東垣大羌活湯九味羌活湯立方更備而亦無專書無特名至吳又可先生貫串古今融以心得著時行瘟疫一論真可謂獨鴻蒙揭日月於中天矣顧其書具在而時賢有未見而不用其法或雖見其書嘖嘖稱道而對症施用也知其名而未得其辨症之法耳愚目擊心傷不揣固陋而取吳子之原本或註釋或增訂或刪改意在辨溫疫之通體異於傷寒而尤慎辨於見症之始故首增辨氣辨色辨脈辨舌辨神諸論於開卷使閱者一見瞭然則吳子之書人人可用而瘟疫之橫夭者少生全者多誠斯世斯民之幸也

醫書汗牛充棟。不能盡讀。余自束髮時。即心好之。舉業之暇。勤於緒閱。竊見名賢著作。有能補前人所未備者。則其書必為醫學所宗。如明季又可先生撰溫疫論。大旨謂邪踞募原。當經胃交關之所。立達原飲。三消飲等方。寔發前人所未發。乾隆丁巳。大江南北疫盛行。師其意治之。活人頗衆。益信其為不刊之論。既而客金陵。汪文學先乘出瘟疫明辨一書相示云。是歙邑鄭奠一前輩所著。而得諸同里程氏者。其書本又奇之。論條分縷析。抉別疑似。致為詳盡。余服其智識超而疏解確。遂手錄以歸。歎曰。有是書而又可之論。愈明。碩安得二書相輔而行哉。會同志者聞余言。慨然捐資授梓。因浹與萊堂汪君恭互校讎。釐為四卷。苟能繹其精理。名言。而循而守之。于以消診氣之流行。蹲斯民於仁壽。亦

何難之有哉。于其成也。為述其緣起如此。以告世之讀是書者。乾隆歲次辛未孟秋月上浣三日白沙吳文炘書

吳君坤也潭鄭氏瘟疫明辨一書屬其同志者授梓既成出以示余且問序焉夫余之于醫固東坡所謂扣扣而隱於醫雍正辛亥自淮陰来舍于先業師之東柯草堂鐙牕雨夕相與辨論古今亹亹弗倦也會邑人病疫蔓延仁菴治之輒愈請其故曰醫之為道也辨症精而後施治當頑症之所由辨必乘之于古人之書非不學可嘗試也因出囊中吳又可溫疫論為言其大意余時方涖事帖括未暇究心仁菴亦旋去不復見者廿年于茲矣今吳君之良於醫與仁菴同其篤信是書也亦與仁菴之于又可同則是書之足為醫學所宗已不待問獨是古人著述研精殫思窮極心力其卒業而不傳滅于凝塵敗楮間者何限是書乃獲與又可之論並垂天壤作者之幸歟抑吳君與其同志之功為不可沒也碩安得善學如仁菴者之循習乎是書更有進于其所能辨不知又可論外復有是書其所謂辨即是書之所辨歟抑是書更有進于其所論則有與明辨之者歟俱未可知第其所以為何如也林皋楊瑗拜書

序

醫不難於用藥而難於審症昔陳氏素中著傷寒雜症四卷忽人誤以溫熱病混同傷寒論治特為揭出曰傷寒如何溫熱病如何俾覽者如別黑白其用心可謂仁矣外見吳氏又可溫疫論其症與溫熱病大槩彷彿而實有不同蓋傷寒本常有而溫熱病常有而溫疫則不常有也夫冬傷於寒春必病溫春為溫病夏則為熱病此固無歲無之若溫疫或數年一見焉或數年不一見焉吳氏謂為天地別有一種厲氣人感之其邪連募原舍於夾脊之間附近于胃出表陽裏傳變不有識其鑿空妄談恣用大黃尅削元氣貽人殃枉不亦過歟何以定其為溫疫當天災流行之時沿門闔境老少相似不難雜也其中亦有雜症誤治者況值時疫初起冒昧錯認寃沉苦海差之毫釐失之千里矣此溫

疫明辨一書所以繼吳又可而作也其臨症有雜氣雜色雜舌雜神雜脉五條論治有汗下清和補五法其餘剖析疑似探微抉奧剴切詳明了無剩義得是書而又可論中之旨愈暢善學者研究而有得焉引而伸之觸類旁通凡遇溫熱病與傷寒亦可朗

然明辨之矣肤則謂是書為又可之功臣可為素中之功臣亦可
乾隆壬申立夏日菉堂汪祺識

瘟疫明辨後序

今之好事者椙摭成方輒付剞劂思欲壽世反蒙拆屋起屋之誚其功過未嘗不相半也若刻之得其用及其時者鮮矣醫學至明季猶勝顧其書有秘藏過密有問世而世不傳者故國初以來但以口訣之精詳為醫之宗工大口訣者即秘藏之妙傳諸口者也其後師授之不詳力學之不精習俗之訛變耳目之所移世遠年湮行將失墜矣瘟疫一症前人雖附傷寒書內實與傷寒迥別歟吳又可先生著論詳明宗者絕罕是書復本吳氏條分縷晰反復丁寧力辨傷寒瘟疫之異吳君坤也得之屬同志者付梓其斯道之終不泯歟不絕歟抑人之不盡天扎歟抑是書之精神面目必傳之其人而後明歟當此之時以前人之心傳示諸掌上豈非是書之得其用與時遠勝刻成方而蒙嘗世之誚者乎乾隆辛未秋日

吳原簪希寧拜手并書

瘟疫明辨目次
卷之一
一辨氣
二辨色
三辨舌
四辨神
五辨脉
時疫與風寒異受
辨傳經
兼風
兼寒
兼暑
兼瘧
兼痢
夾痰水
瘟疫明辨　目
夾食
夾鬱
夾血
夾脾虛
夾虫血
夾疝
夾腎虛
夾心胃痛
夾哮喘
卷之二
表症
發熱
惡寒
頭痛
頭眩
頭重
項強痠
腰痛痠
脛痛痠
肩臂痛痠
周身骨節痠痛
身重
盜汗
狂汗
面腫
耳窌腫
周身紅腫
發疹
裏症
煩躁
欲
嘔
渴
頭脹
目脹
背痛痠
膝痛痠
足痛
腕痛
拘攣
自汗
戰汗
瘟疫明辨　目
頭腫
頸項腫
胸紅腫
發黃
發斑

口苦
唇燥
鼻孔乾
臭如烟煤
咽乾
舌燥
舌黍
胸滿痛
腹滿痛
自利
便膿血
小便不利
小便多
嚢縮
譫語
善忘
循衣摸床撮空
身冷
口甘
齒燥
耳聾
臭扇張
咽痛
舌强
舌卷短
脇滿痛
少腹滿痛
便血
大便閉
小便黃赤黑
遺尿
多言
狂
沉昏
多睡
呃逆
吐蚘
卷之四
汗法
清法
補法
四不足
辨似
遺症 蓐病後不表裏症
發腫
發瘡
索澤
婦人
小兒
卷之末
諸方
下法
和法
四損
三復
發頤
發痿
發蒸
妊娠

一辨氣

風寒氣從外收斂入內。病無臭氣觸人。間有作臭氣者。必待數日轉陽明府症之時。亦只作腐氣不作屍氣瘟疫氣從中蒸達於外。病即有臭氣觸人。輕則盈於床帳。重則蒸然一室。且專作屍氣。不作腐氣。以人身藏府氣血津液。得生氣則香。得敗氣則臭。瘟疫敗氣也。人受之自藏府蒸出於肌表。氣血津液。逢蒸而敗。因敗而溢。溢出有盛衰。充塞有遠近也。五行原各有臭氣。木膵金腥心焦脾香腎腐。以臭得其正。皆可指而名之。若瘟疫乃天地之雜氣。非膵非焦。非腥非腐。其觸人不可名狀。非臭觀精者。不能辨之。試察廁間糞氣。與凶地屍氣。自判然矣。辨之既明。治之毋惑。知為瘟疫而非傷寒。則凡於頭痛發熱諸表症。不得誤用辛溫發散。於諸裏症。當清當下者。亦不得遲回瞻顧矣。

二辨色

風寒主收斂。斂則急。面色多綳急而光潔。瘟疫主蒸散。散則緩。面色多鬆緩而垢晦。人受蒸氣。則津液上溢於面。頭目之間多垢滯。或如油膩。或如煙熏。望之可憎者。皆瘟疫之色也。一見此色。雖頭痛發熱。不宜輕用辛熱發散。一見舌黃煩渴諸裏症。即宜攻下。不可拘於下不厭遲之說。

三辨舌

風寒在表。舌多無胎。即有白胎。亦薄而滑。漸傳入裏。方由白而黃。由黃而燥。由燥而黑。瘟疫一見頭痛發熱。舌上即有白胎。且厚而不滑。或色兼淡黃。或粗如積粉。若傳經入胃。則兼二三色。又有白胎即燥。與至黑不燥者。大抵疫邪入胃。舌胎頗類風寒。以兼濕之故。而不作燥耳。惟在表時。舌胎白厚。異於傷寒。能辨於在表時。不用辛溫發散。入裏時。而用清涼攻下。斯得矣。

四辨神

風寒之邪傷人。令人心知所苦。而神自清。如頭痛作寒熱之類。皆自知之。至傳裏入胃。始神昏譫語。緣風寒為天地正氣。人氣與之乖忤而後成邪。故其氣不昏人神情也。瘟疫初起。令人神情異常。而不知所苦。大聚煩躁者居多。或如癡如醉。攪亂驚惕。及問其何所苦。則不自

知即間有神清而能自主者，亦多夢寐不安，閉目即有所見。有所見即譫妄之根，緣瘟疫為天地邪氣，中人心病，中物心傷，故其氣專昏人神情也。

五辨脈

瘟疫之脈，傳變後與風寒頗同。初起時與風寒迥別，風寒從皮毛而入。一二日脈多浮，或兼緊兼緩兼洪而皆浮。迨傳入裏，始不見浮脈，其至數亦清楚而不糊糊，瘟疫從中道而變，自裏出表，一二日脈多沉，迨自裏出表，脈始不沉，乃不浮不沉而數，或兼弦兼大，而皆不浮，其至數則糢糊而不清楚。其初起脈沉遲，勿作陰寒，而氣色舌胎神情，依前諸法辨之。脈象同於陰寒，而數而無力。亦勿作虛視，緣熱蒸氣散，脈不能鼓指，但當解熱，不宜補氣，受病之因有不同，故同脈而異斷也。

辨時行疫癘與風寒異氣

風主疎泄，寒主凝泣，二氣雖有不同，然皆冷而不熱，傷中人也，鬱而不宣，方其初受在表，均宜溫散，麻黃湯、桂枝湯、葛根湯、十神湯、神朮等方，皆散寒之劑，非解熱之劑，治風寒之劑，以解熱之劑，治瘟疫，輕則厥逆亡陽，以散寒之劑，治瘟疫，輕則劒渴譫妄，重則厥逆亡陽，以散寒之劑，治瘟疫，輕則劒渴譫妄，重則枯竭亡陰，此氣之不可不辨也。

辨時行疫癘與風寒異受

風寒從表入裏，自皮毛而肌肉，而筋脈，而胸膈，而腸胃，一層漸深一層，不能越此而入彼，故汗不厭早，下不厭遲，為和解，淺深毫不可紊，以其氣皆屬冷，一層收斂入一層，必待寒化為熱，邪斂入內，方可攻下涼解，否則邪未入裏，預用攻利涼解，虛其裡氣，反引表邪內陷，而成結胸痞利諸險證也，時疫從口鼻而入，先中中焦，後變九傳，其傳自裏出表，雖出表，而裏未必全無邪留，經過之半表，未必全無邪半，故下不厭早，汗不厭遲，為和解，淺深必不可拘，以其氣皆屬熱，能作蒸，不必鬱而此蒸，即帶彼熱，當其未出表時，強欲溫表，在始則引毒熱成燎原之勢，為斑為狂為喘諸凶，在末則傷真陰，

為枯槁沉昏厥逆諸危也。

辨傳經

溫疫傳經與風寒不同。風寒從表入裏故必從太陽而陽明而少陽而入胃。若溫疫則邪從中道而出表入裏。惟視人何經本氣之強弱為傳變故吳又可曰。疫邪有先表後裏者有先裏後表者有但表不裏者有但裏不表者有表勝於裏者有裏勝於表者二句吳又可本作有表裏偏勝者一句。有表而再表者有裏而再裏者有表裏分傳者此為九傳。愚按所謂表者發熱惡寒頭痛項強背痛腰

疼腿膝足脛酸痛自汗無汗及頭腫面腫耳目赤腫項腫。發斑發疹皆是。所謂裏者渴嘔胸滿腹滿腹痛脇滿脇痛大便不通大便不通小便不通小便黃赤澀痛及煩躁譫妄沉昏舌卷舌強口咽赤爛皆是。在風寒從表入裏。三症必待漸次開變而成。故見表症不必兼見裏症。且入裏之後表多自解故見裏證之後不必復見表證若溫疫本從中道而出表。故見表症時未有不兼一二裏症者。且未有不兼見一二半表裏之少陽證者仲景所云。陽明少陽合病必自下利。三陽合病。脈浮大。手臂上。俾欲眠睡。目合則汗。三陽合病。腹滿身重。難以轉側口不仁而面垢。譫語遺尿。皆指瘟疫言。非指風寒言也。且瘟疫屬蒸氣出表入裏。原自不常。有入裏下之。而餘邪不盡。仍可出表者。嘗見譫妄沉昏之後。病愈數日。復見頭疼發熱。復從汗解者。此所謂表而再表。風寒必無是也。更有下證全具。用承氣湯後。裡氣通而表亦達。頭痛發熱。得汗而解。移時復見舌黑胸滿腹痛譫妄。仍待大下而後愈者。此所謂裏而再裏。風寒必無是也。若夫表裏分傳之症。風寒十無一二。疫症十有六七。

但據傳經之專雜以辨之。一經尚見一經證者多風寒。一經祇見二三經症者多疫症。日久漸轉層層者多風寒。一日驟傳一二經。或二三經者多疫症。則雖病有變態。而風寒不混於疫症。疫症不混於風寒。施治自無訛誤矣。

至若辨氣辨色辨舌辨神俱已清楚。而投之以治疫之藥。復有不效者。則以時疫有獨發。有兼夾他症之故。是以辨時疫異於他症矣。至挾他症者。則此人時疫與彼人時疫又有不同。尤當細辨。其兼症凡五種。

夾症凡十種詳列於後。

兼寒

其一有兼寒者。初起一二日。頭痛發熱身痛惡寒。諸表症惡與時疫同。而以脉辨。則不同。時疫多軟散而不浮。兼寒則多浮數浮弦浮大。甚至有浮緊者。再以症辨亦微有不同。時疫多汗。兼寒則無汗為異。亦異於單受寒者。單受寒無煩躁口苦口臭證也。一遇此等。更當辨其受寒與時疫孰輕孰重。疫重寒輕者。煩躁症多。無汗惡寒症少。則當以敗毒

散加知母石膏。或達原飲加羌防柴葛。或六神通解散无捷。寒重疫輕者。惡寒無汗症必甚。煩躁必輕。則只用敗毒散。其寒束於外。無汗惡寒既甚。疫鬱於內。煩躁更甚者。冬月大青龍湯可借用。餘月九味羌活湯最為的當。此症若治寒遺疫。必有斑黃狂衄之變。治疫遺寒。發有厥逆嘔利胸腹痞滿之憂。馴至沉困者不少。不可不知。然此皆為初起一二日言也。若日久則邪疫勃發。寒不能自存。而變為熱。則惟以治疫之法治之而已。

兼風

其二有兼風者。初起一二日。頭痛發熱身痛惡寒。諸表症與時疫同。而以脉辨。則不同。時疫多軟散而不浮。兼風則浮而數者微異。治法不大相遠。即於時疫諸方中加荊防。嗽加前胡杏仁蘇子而已。大抵時疫兼寒。能令病勢增重。兼風。反令病勢易解。以寒主凝泣。則疫邪鬱一分。病勢增痼一分。風主游揚。則疫邪外疏疏一分。病勢解散一分。

兼暑

時疫兼寒兼風。四時皆有。至暑兼一症。惟長夏有之。

初起一二日。與時疫無異。只胸滿嘔利為異。而脉則兼弦細乳遲。不似時疫不浮不沉而數。治法於時疫諸方中。微減發表之味。如用羌即不用獨。用柴即不用前。蓋時疫多汗。暑症更多汗。明邪逼出表汗。則表必虛。故發表之味。不可重複也。寒濕之藥。尤宜減。清熱之味亦宜減。以邪從表出。鬱熱必輕。過用清涼。恐致寒中。而增嘔脹泄利。況表氣太泄。裡氣必虛。易犯厥脫之症。故清涼寒濕不可太多也。最宜加用分利燥脾之品。木通為上。蓋分利則暑與疫皆

從清道而出。邪有去路。止不必徒以寒涼逆折取效也。
間有表見身痛。宜用荊蘇。裡見腹滿。宜用蒼术者。再體
疫兼暑。則病勢反緩。以疫中溫氣屬亢陽。暑為陽中之
陰。陽得陰則解。雖不能盡解。然得一分陰氣。則和一分
亢陽。每見時疫兼暑。其讓妄舌燥諸證反緩者。職此故
也。

兼瘧

時疫有似瘧。有轉瘧。有兼瘧之不同。用藥亦有微異。似
瘧者。寒熱往來。或一日二三次。或一次。而時無定也。時

疫初起多有之。轉瘧者。時疫讓妄煩渴。大劑之後。已經
大汗大下。仍有餘邪不解。復作寒熱。轉成瘧象也。時疫
末路多有之。兼瘧之症。乃寒暑時疫合病也。其症寒熱
有常期。瘧症全具。但熱多寒少。且多燥渴擾亂。熱勢迅
速。神情昏憒。穢氣觸人為異。秋令多有之。時疫所以似
瘧者。因邪氣盤錯於募原。欲出表而不能透達。欲陷裡
而未得空隙。故見半表半裡之少陽症也。治法宜達原飲。
飲。加柴胡為主。時疫所以轉瘧者。因汗下後。邪氣已衰。
正氣未復。邪正相爭。故在先陽氣獨亢。有熱無寒者。今

特疫解。而瘧邪未盡也。仍以瘧法治之。愚按時疫與虐
病不甚相遠。疫乃濕溫二氣合病。瘧乃風寒暑濕四氣相
合病其邪氣之藂而不純相類。瘧邪橫連募原。時疫亦
發於募原。其受邪之處相類但時疫之溫氣發則為亢
陽故宜下宜清之症多瘧之暑停則為鬱滯故宜宣
利之症多耳。所以時疫初起。方用達原飲。與瘧之主方用
清脾飲藥品亦多相類至其傳變則緩急輕重迥乎
不同也。善悟者於此處細參思過半矣。

兼病

時疫本多自利症。表症初起。即每日解數次。稀臭水者是也。詳見後自利條下。更有春夏之交。得時疫即黃。下利紅白。而裏急後重者。名為疫痢。初起慎不可從痢治。蓋痢屬裏證。今兼疫邪之厲熱頭痛。為表裏俱病。先用治疫之法解其表。表解而裏自和。其痢多有不治自愈者。若用治痢之法。先清其裏。裏虛而表邪陷。輕者增其煩躁沉困。重者遂至嘔逆昏憒而危矣。所以古人於疫痢初起。專主倉廩湯。其方乃人參敗毒散一意解表。但加陳倉米。以和中養脾胃。俟表證解後。裏熱症具。方可議清議下。不但香連芍藥承氣之類宜緩。即淡滲分利之劑。亦宜緩投於表症未解之先也。若太陽症不見。而微見少陽之明症者。則柴葛五苓散。不妨借用。痢症夾表。不可清裏。不特時疫兼症為然。凡一切痢症。微兼身熱。即宜慎用苦寒法滲。用之若早。必增嘔逆。此歷驗不爽者。疫症兼利。其熱勢反多緩。亦由痢為暑氣。陽中之陰。能和亢陽。且鬱蒸之熱。有所疏泄故也。若疫毒太甚。驟發即下純紫惡血。或兼見舌煩讝妄諸惡症者。黃連大黃。又在急用。不可拘此論矣。

以上五條。其辨明所以為瘟疫兼症。即詳審。然總以前所備具氣色舌神脈五辨為主。五者之中。必有二三確據。方於疫門求治。否則各按各門施治可也。若混以時疫治之。為害甚矣。

夾痰水

飲入於胃。經蒸變而稠濁者為痰。未經蒸變而清稀者為水。痰與水。一物也。痰能作熱。水能作冷。時疫屬熱症。故夾痰者。更增其熱。脈症治法。無甚參差。但於治疫藥中。加瓜蔞貝母。甚則加牛黃。夾水者。脈症往往相悖。治法則有不同。不可不細辨也。時疫之脈必數。而夾水在胸膈。其脈多緩。甚則遲弦。此脈夾水之辨也。時疫之舌。一經傳裏。即轉黃轉燥轉黑。若有水在胸膈。則煩躁譫妄沉昏。諸症備具。而舌色白潤。間有轉黃黑者。亦必仍有白胎。或滿舌黃黑。半邊夾一二條白色。或舌尖舌本俱黃。中夾一段白色。此舌夾水之辨也。時疫胸滿。心下硬痛。手不可按。一有水在胸膈。心下雖滿痛。按之則軟。略加揉按。則漉漉有聲。此症夾水之辨也。時疫見夾水症。雖有表。不宜純用辛涼發散。純用辛涼。則表必不

解而轉見沉困。有裏症不可遽用苦寒。早用苦寒。必賫加昏憒。此水氣鬱遏熱邪。陽氣受困。宜於發表清裏藥中。加辛燥利氣利水之品。以祛水氣。迫水氣去。鬱遏發然後議攻議涼。則無不效者矣。燥溼則半夏蒼朮。利水則木通茶澤。利氣則萊菔草果木香。甚至有須用大戟芫花者。在時疫雖屬熱邪。往〻有投三承氣黃芩白虎而不效。偶用溫暖藥收功者。遂相訟清熱之非。不知熱邪乃其本氣。夾穢乃其間氣也。

夾食

時疫夾食者最多。而有食填膈上。食入腸胃之不同。入腸胃。則為陽明諸熱症。治法倣於三承氣湯。惟食填胸膈。往〻有脈沉手足冷者。誤認三陰。投以溫劑。亦無一臺熱湧發。見但煩躁倍增。甚則一二日即死。蓋胸中乃陰陽升降之路。食填之。則氣閉。氣閉。則熱鬱於內。故外無發熱症。熱鬱於下。而無所疏泄。誤溫則熱愈鬱。熱鬱於內。故外無發熱症。熱鬱於下。而無於下。故上無口渴症。疫熱以出表為輕。入裏為重。在淺為輕。入深為重。此症一溫。則逼邪入裏。入深。以致速死而無熱症也。如氣色神舌脈。辨得為疫症矣。而過脈沉

手足冷。即當細詢其胸膈。若痞塞悶滿。即是夾食。再驗其舌胎白厚。而微黃。淡黃。益為食填膈上之明驗。於治疫藥中。加枳桔青皮。萊菔麴藥。甚則用吐法以宣之。使膈開而陽氣宣達。然後熱症自見。當解表。當清裏。自無誤治矣。

夾鬱

時疫夾氣鬱者。初起疫症悉同。而多脈沉。手足冷。嘔逆胸滿。頗類夾食。但夾食為有物。為實邪。舌胎厚白而微黃。胸膈滿痛不可按。而亦不移。夾氣為無物。為虛邪。舌胎白薄。胸膈滿痛串動而可按。宜先宣通其鬱。然後解表清裏。自無不效。若不舒鬱而徒發表。則裏氣不能外達。而難於微汗。運用清下。則上氣不宣。多致痞逆。惟於解裏藥中。加蘇梗木香大腹皮香附等類。以宣其氣。則表易解。於清裏藥中。加川貝母以舒其鬱。則裏易和。貝母為舒鬱要藥。但力性緩。必用至五錢一兩。方能奏效。

夾血

時疫傳裡之後。蓄血最多。治之攻裏。茲不具論。惟本有內傷停滯。復感時疫。於初起一二日。疫之表症悉具。而

脈或芤或濇。頗類陽症陰脈。但須細詢其胸腹脇肋四肢。有痛不可按而濡者。即為蓄血確驗。其芤濇非陽症見陰脈。乃表症見裏脈也。治法必兼消瘀。紅花桃仁歸尾赤芍元胡之類。量加一二味。表邪方易解。濇芤之脈方易起。若誤認芤濇為陰脈而投溫劑。輕者變劇。重者斃矣。

夾脾虛

時疫較之風寒。本為難治。以風寒傳變有次序。時疫傳變無常經。風寒表邪一發即散。時疫散而復集。且往往

復之再三。風寒傳裏症。一攻即和。時疫攻而復合。有下至一二十次者。此時疫之難治也。而脾虛者更為難治。蓋時疫必得汗下而後解。脾虛者表不能作汗。裡不任攻下。或得汗矣。而氣隨汗脫。得下矣。而氣從下脫。治此等症。汗勿強汗。發表必兼養正。人參敗毒散是也。下勿輕下。攻裏必兼固氣。生津液。黃龍湯是也。其外症無大分別。惟脈不任尋按。然邪有進退。當其邪進方張之時。脈亦有尋按有力者。不可泥也。必合氣色神情脈證以參白虎湯為主。或屢清屢下。而熱愈甚。舌上燥而無胎。如面色痿黃。神情懶怠。氣息微促。及心悸耳鳴。皆

夾腎虛

時疫夾脾虛者。為難治矣。夾腎虛者。更難。時疫屬熱症。

腎氣虛。則手足冷。時疫屬實邪。腎氣虛。則昏躁悸。膝痿軟。腎虛之中。又有陰虛陽虛之分。時疫必待汗下清而後解。陽虛者。一經汗下。則枯竭之症隨見。陰虛者。一經汗下。則脫絕之症隨見。必須時時見腰痛異常。小便頻數。膝脛冷軟。其人平日。非有淋濁陽痿。即係遺洩好內。須詢明。于通表藥中。加人參白芍。陽虛兼杜仲。陰虛兼知母。以助顧腎氣。免後來意外之變。若入裏當下。必以陶氏黃龍湯為主。當清。必以人參白虎湯為主。或屢清屢下。而熱愈甚。舌上燥而無胎。

或有黑胎。愈清而愈長。或有燥胎。愈下而愈燥。此皆胃虛之證。察其陽明無實邪可據。當從腎虛治以六味地黃湯。易生地。加知柏。王太僕所謂寒之不寒。責以無水。壯水之主。以制陽光者。此也。或仍不應。則合生脈散以滋水之上源。或用四物湯流通經絡。似此熱勢燎原。非杯水所能救。必大作湯液。藥味必以兩計。湯液必以斗計。乃有濟耳。見幾早。十救二三。涸竭已見。十難救一。或更兼脾胃敗症。如嘔吐噦刺之類。湯藥不下。百難救一矣。

夾亡血

疫症亡血有三。其一未病之先。素亡血而陰虛。一感疫則邪熱乘虛煎熬。比陰最易。解表清裏。用藥必步步照顧榮血。如九味羌活湯之用生地。人參敗毒散之用人參是也。其二當受病之時。忽然吐衄。女子崩漏。甚至暈厥無常。勢甚危急。亦疫症常有也。病家但知血之可駭。往往不知受疫。醫家亦忽其客邪。惟汲汲于止血。清涼滋補。多至危殆。不知血由疫逼。惟當治疫。邪解而血自止。此症不遷見於疫在表時。而見於發熱數日之後。人猶易知。惟疫鬱於陰經。而暴見此症者。難識。以其症外無頭痛發熱之可據耳。但見微惡寒而大作嘔。急當視其氣色神脈舌胎。若舌有白胎。氣色有一二疫象。即是疫毒無疑。以達原飲為主。嘔加藿香。脹加青皮。但治疫毒。血症自已。若脫血太甚。而氣欲絕者。加人參以固中氣。俟疫症傳變歸經。然後按經治之。此疫症兼血之最危者。其三。疫邪大張之後。煩熱燥渴之餘。而見亡血證。則又瘟疫常態。詳後血症各條。

夾疝

疫邪夾疝。其腎囊少腹引痛。全是疝症。當照辨氣色神脈舌胎法辨之。一有疫邪。不必治疝。但治疫而疝自消。若依常治疝法。用吳萸桂附茴香諸燥品。輕者變為囊腫。重者變為呃逆噦厥沉昏而莫救矣。

夾心胃痛

凡疫有兼心胃痛者。於其痛時。察其氣色神脈舌胎。若有一於時疫。但治時疫。雖平時因寒而發。此則惟治其熱。蓋以疫邪客於募原。傳於太陰。而發心胃痛之漏疾。使其透發於表。開通鬱疫。使其透發於達原飲中。加木香蒼术。以開通鬱疫。使其透發於表

而痛目已。若誤認平常心胃痛。用桂附薑黃。必致危殆。

夾哮喘

哮喘。乃肺家素有痰火。一受疫邪。其澁熱之氣。從其類而入肺。發其哮喘。遇此當察其氣色神脈舌胎。有疫但治疫。其哮喘自除。若治疫藥中。加貝母瓜蔞。淡芩桑皮。疫邪哮喘並解。法更精密。

以上諸條。凡言兼者。疫邪夾內病。內外夾發者也。二邪自外入者也。凡言夾者。疫邪兼他邪。二邪無發。以疫為重。他邪為輕。故略兼治他邪。而病即解。二邪夾發。如夾水。食。血。氣。痰。等實邪。則以夾邪為先。疫邪為後。蓋清其夾邪。而疫毒始得透達。透達方能傳變。傳變方能解利也。如夾脾虛腎虛。亡血諸虛症。則以治邪為主。養正為輔。蓋疫邪最易傷正。故不可養正遺邪也。如夾痞。嘔心胃痛諸舊病。則但治疫邪。舊病自已。蓋舊病乃新邪所迫而散也。

疫邪見症。千變萬化。然總不出表裏二者。但表證中有裏邪。裡症中有表邪。則又不可不細緊也。故列證分表裏以盡其變。使人一眼瞭然。為

有定見。少救橫夭於萬一耳。

瘟疫明辨卷之二

表症

發熱

時疫發熱。與風寒雜症同。其發藏熱時。氣色神脉舌胎。則不同。辨得為時疫發熱。又當知有淺深表裏之異。不辨無以施治。發熱表症居多。亦有裏症發熱。半表半裏症發熱。餘邪不盡。復出於表發熱。邪退正虛發熱。而表症發熱。脉不浮不沉而數。寸大於關尺。熱在皮膚。捫之烙手。久按反輕。必兼頭痛項强腰痛脛酸。或頭面身體皮膚。有紅腫瘡痛。諸症不必全現。有一於此。便是表症發熱。九味羌活湯。人參敗毒散。六神通解散選用。冬月嚴寒。及惡寒甚者。大青龍湯。葳蕤湯。越婢湯。陽旦湯。可借用。全不惡寒者。白虎湯。黃芩湯。可加減用。裏症發熱。脉或滑。或沉數。或洪滑。閱尺盛於寸。熱必在肌肉筋骨。初捫熱輕。久按熱甚。必兼煩渴。胸腹滿。大便或不通。或自利。或便血及膿。小便黃赤。或讝妄狂昏。諸症雖不必全現。必兼二三症。方是裏症發熱。梔子豉湯。黃連解毒湯。小陷胸湯。三承氣湯。導赤瀉心湯。猪苓湯。天水散選用。半表裏發熱。脉多弦。胸脇滿。或熱或止。或口苦咽乾。目眩耳聾。或目赤。或喜嘔心煩。或兼見表裏症。達原飲。柴葛解肌湯。小柴胡湯選用。時疫初熱時。用藥最要清楚。此處頭緒不差。後傳變多岐。救援必易。不然難於收拾矣。凡見發熱。即當辨其氣色神脉舌胎。為風寒為時疫。係時疫。又當辨在表在裏。在半表半裏。狀時疫見症。純表純裏者少。表裏夾襍者多。表裏夾襍。吳氏達原飲為主。表症多。加羌活。裡症多。加大黃。半表半裏症多。加柴胡葛根淡豉。或表裏症均見。則諸藥全用。即三消飲。取效最多。誠時疫主劑。至已愈數日。而復發熱者。乃餘原伏有不盡之邪。復出於表。當察其證之表裏多寡。以前法治之。大抵愈後復發。則裡熱多而表熱少。雖有當汗宋藥之症。不過葛根柴胡淡豉而已。無更用羌活之理愈後另受風寒。發熱無汗。舌上無胎者。不在此例。時錢最妙。以其性涼而解肌發汗。忌用葛根五苓散。不得無汗之表。又不得煩熱之裏。更有平素虛損。或老人。或大病後復染時疾。屢經汗下。清解。其熱尋已。或全無表裏實證。或大脉數。然空。或較初起洪

渭更甚。或用表藥而身痛更甚。或屢用清熱藥。而煩躁沉昏更甚。或屢用下藥。而舌燥更甚。此皆邪退正虛之發熱也。王太僕所謂大虛有盛候。反瀉含冤也。此時須略去證狀。而消息陰陽虛實。陰虛則熱渴枯竭之症多。責在腎。宜六味地黃湯。熱氣虛。合生脈散。須大作湯液。晝夜頻進。效始捷。陽虛則嘔利悸眩之症多。責在脾。宜六君子湯。黃芩陰虛。歸脾湯。參胡王白散。清燥湯選用。若遇此等症。仍用汗下涼解宣伐。斷無生理矣。又發熱亦為表為裏。為半表半裏。為復為虛。症狀明顯有據者。自易施治。若脈症夾雜糢糊。難於分辨者。須以舌胎為據。初起舌胎薄白。或無胎而潤。屬在表。白胎而厚。或黃微黃。或中黃邊白。中黃尖白。或二三色。屬在半表半裏。黃胎。醬色胎。黑胎。屬裏。舌胎燥。則不論何色。皆屬裏症。屢經汗下後。舌胎潤而發熱者。屬陽虛。無胎而燥者。屬陰虛發熱之表裏虛實。依此辨之。思過半矣。惟虛証發熱。反似實症。即舌胎亦難憑據。又當從病之來路探討。若屢經汗下宣伐。而熱愈甚者。從虛治無疑。或雖經汗下。其熱漸減。藥有效。則仍屬餘邪未盡。不可遽補。致邪熱

內壅。大人年壽。似此虛實錯綜頭。不可不細心體認也。以上辨表裏虛實諸法。雖指發熱時言。然類而推之。凡症皆可依此為辨。惟在學者之善悟耳。

惡寒

瘟疫惡寒與風寒暑濕諸症不同。諸症惡寒無時而勢不甚。時疫惡寒有時而勢甚。惡寒之後。必見發熱。時自熱而不覺寒。時自寒而不覺熱。非若諸症惡寒發熱。氣色神脈舌胎。與發熱同。但有淺深虛實之異。邪淺而在表者。惡寒之時少。於發熱。治法方藥。同於發熱。而以解表為主。邪在半表半裏者。寒熱往來如瘧狀。治法方藥亦同發熱。邪深入裏。失於攻下。而熱深厥深。反欲擁被向火。惡寒而不發熱。或熱亦微。甚則四肢反厥。此雖惡寒。實非寒也。乃陽氣為邪所鬱而不通。以通鬱為主。達原飲。大柴胡湯。三承氣湯選用。使裏氣通而鬱陽發反大熱而煩渴也。此證在惡寒時。最難辨其為熱。須於九竅察之。如目大小皆赤。鼻孔乾唇紅。舌胎黃黑燥。耳鳴或聾。小便黃赤澁痛。大便燥結。或稀黃極臭。或鮮色

或心下至少腹有痛不可按處此皆熱深陽鬱之象大抵周身皆見冷症一二處獨見熱症反當以熱症為主此亦然乃辨寒熱真假之機要也余所見時疫不下數千裏症惡寒者百中一二即四肢厥逆爪甲青紫詢哄所苦亦不惡寒此可得其槩矣至若本係時疫熱症因其人平素虛損衰老及大病之後用攻伐寒涼太過至汗出不止嘔利俱作四肢微厥六脈細濡而惡寒為陽虛乃攻伐太過所致當以參耆蒼术為主寸口脈微者佐以升附欠脈微弱者佐以桂附須知雖屬陽虛却從熱症來而陰必虧桂附亦不可過用當佐以護陰藥為妙如白芍麥冬五味之類此症溫補略緩及溫補不到必死或過用溫補陽雖回而陰竭亦死此處不可不斟酌至當又有宣伐太過而成虛症之惡寒寒涼太早而成實症之惡寒以疫邪方伏於募原未經傳變之時胸膈必多痰滯有見其煩躁而遽用知膏芩連者有因其作渴而遽用生地麥冬者有病者自認火症而恣啖冷水西瓜梨蔗太早者皆能抑鬱陽氣閉邪熱中下二焦冷物停痰滯於上焦每見惡寒症過此惟

以宣導痰滯為主痰滯通則惡寒自止不可過溫致傷

焦瘀熱畜血斑黃呃逆而死不可清涼致胸腹痞滿而

危宜用草果厚朴槟榔木香半夏蒼术萊菔蒼薄導痰

開滯逐水痰滯水去則惡寒止而熱症見隨其傳變以

施涼解攻利之劑乃有效也此法特救藥誤非治正病

耳總之風寒以惡寒為重時疫以惡寒為輕多有初起

惡寒一二日不治邪氣傳變而惡寒自已者與其誤治毋寧俟之若誤認惡寒為真寒用辛溫之藥發散未有不增其病勢者也

寒熱往來

寒熱往來與發熱惡寒異發熱惡寒一時而至寒熱往來寒已方熱熱已方寒亦與瘧不同瘧發有時寒熱長短有定此則寒熱無時長短無定雖不同於瘧而邪俱在少陽半表半裏之間在傳變之初是由輕入重始則寒熱往來繼則熱多寒少再則但熱不寒至晝夜壯熱讝妄煩渴畢現在傳變之後是由重出輕晝夜壯熱漸減而為發熱有時而止又減而為寒熱往來又減而為戰汗至脈靜身涼而愈夫疫邪自裏出表者輕自表入

裏者重。初起寒熱往来。是自表入裏。犯及少陽。裏氣與邪相爭。非繼則邪深入裏。表裏併勢日重。既傳變之後。而寒熱往来。是邪氣向裏。正氣来復。自裏出表。經過少陽。前之晝夜壯熱。邪氣東縮者。至此正氣漸和。而寒熱有時矣。前之邪陽獨盛。亢極無陰作純熱者。至此則陰氣来復。而寒熱相爭矣。前之邪併裏裏。而熱渴日加者。至此則裏氣逐出表邪。而作戰汗矣。治法於未傳變之先。欲由表入裏時。但透達其邪。使易傳化為主。逢原飲是也。於傳變之後。欲自裏出表時。以和解為主。小柴胡湯是也。於慶經汗下之餘。脉或虛微濡弱結代。心或悸動。神或委倦。形或羸弱過甚。當養陰益氣。助正却邪為主。參胡三白湯。炙甘草湯。清燥養榮湯。補中益氣湯是也。

頭痛

時疫頭痛。與風寒不同。風寒是寒束於上部。中下無邪犯上焦。頭苶不甚痛而昏悶。時疫是熱蒸於上部。中下無邪上逆。頭雖甚痛而不昏悶。所謂卓然而痛者是也。驗得氣色神脉若胎。為時疫頭痛。而又有未兼之分。初起頭痛。腦後巔頂目珠略甚。舌胎白而發熱者。太陽頭痛。羌活川芎為主。淡豉酒芩知母生地為輔。額顧脹痛。目痛鼻孔乾。舌胎白而微黃。頗熱而渴者。陽明頭痛也。葛根為主。淡豉石膏為輔。兩額角痛。眉稜骨痛。寒熱往来。口苦咽乾。舌胎中黃邊白。或中段黃。尖上白。少陽頭痛也。柴胡荊芥川芎為主。酒芩石膏為輔。頭痛而三陽症悉具者。吳氏三消飲為主。時疫頭痛。兼見一經症者少。裡症也。三黃石膏湯。小承氣湯。大柴胡湯。防風通聖散。選用舌胎黃。或半截或傍邊有一塊白。胸滿而嘔。頭痛兼眩者。痰厥頭痛也。前胡為主。半夏茯苓枳實。汗下清解後。頭痛心悸。四物湯。去川芎。加丹皮知母黃柏。或歸脾湯。逍遙散。并加生地棗仁。凡頭痛見症混雜。難分表裏者。總以舌胎辨之。

頭眩

時疫頭眩有三。其一風熱頭眩。乃時疫本病。寸口脉多

浮而發熱。荊防芎薄天麻為主。黃芩為輔。煩渴加石膏。其一痰水頭眩。乃時疫兼症。脉沉而弦滑。兼嘔。胸脇滿。悸動。前胡為主。半夏茯苓枳橘膽星萊菔蘇子為輔。然必視時疫大勢屬裏於應用本方中。加此數味可也。其一虛症頭眩。乃時疫變症。多見於汗下清解後。或素有怯證者。如上虛。寸口脉不及。関尺。多汗。少氣。不足以息。心悸。參蒼為主。中虛。関脉不及寸尺。多從嘔利太過而來。不思食。苓术為主。下虛。尺脉不及寸関。腰膝痠厥。二便清滑。六味地黃為主。三虛皆可加天麻。或虛證已見。仍夾有邪疫燥熱。則不妨兼用清熱之品。或補後氣稍實。再為清解亦可。大抵時疫頭眩。多屬熱。少屬虛。治須斟酌。若傷寒從陽頭眩。又當遵仲景法治之。

頭脹

時疫頭脹者。乃胃熱上蒸也。下之則愈。兼表者。防風通聖散。大黃胡湯。吳氏三消飲。無表症者。三承氣選用。病後虛脹。與頭眩參看。

頭重

時疫頭重者。濕熱上壅也。於清涼解表藥中。加蒼术。或利水藥。病後虛重。亦與頭眩參看。又有表裏無病。之在頭中者。其目必黃。當遵仲景法。用瓜蒂散搐鼻。出黃水即愈。

目脹

時疫目珠脹者。陽明經病也。兼表症。葛根葱白湯。加石膏。若胸滿。舌有黃胎。宿食壅陽明。其脉不下行而上逆。故目珠脹。宜平胃散。加山查。麥芽。枳殼。消導之則愈。至屢經清解。而目珠脹痛不愈者。當消息其肝臟以養陰滋血和肝之法治之。如再不愈。則當進而滋腎。

乃乙癸同源之治也。

項強酸

時疫初起。項強酸。兼發熱。乃邪越於太陽經也。羌活為主。狂躁正盛而項強者。熱壅其經脉也。石膏黃芩為主。屢經汗下。發熱已退而復項強者。血燥而筋無養也。四物六味為主。外此若傷寒發痙之項強。則又有仲景之法在。

背痛酸

時疫初起。背痛兼發熱者。邪浮於太陽也。羌活為主。背

肩而脹。無胸脇脹者。邪客募原也。草果厚朴槟榔葉藿于大腹皮為主。屢紙汗下後發熱已退。背痛不止者。經脈血七也。六味生脈四物為主。又有平素勞倦內傷而背痛在膂肯二穴者。當於東垣內傷諸論察之。

腰痛酸

時疫初起。腰痛無發熱者。太陽受病也。獨活為主。無脹者。氣滯也。加檳榔。無重者。夾溼也。加蒼术。牽引少腹及兩脇者。氣滯血瘀也。加青皮烏藥赤芍元胡無理氣血。疏通腎肝。此皆初起實症治法又有即夾腎虛陰傷者。

腰痛獨甚於周身。無酸痠無力。若尺脈無力。後來傳變必危。當於初起在表時。加人參知母生地。預顧其陰。則危殆差減。若徒用伐邪之品。邪之深入者未必去。而陰液大傷。則沉昏舌黑直視失尿諸症見。陰傷氣脫。則脈逆症見。蓋濕乃腎府。為先天根本。腰痛則腎虛。不可不察。要知此時疫初起。腰痛尚有虛實之分。若汗下後。而見腰痛。其為腎虛。不待言矣。宜六味四物。不可疏通。

膝痛酸

時疫初起。膝痛發熱者。邪在太陽經也。獨活槟榔牛膝為主。無軟者。溼甚也。蒼术為主。然此特太陽之一症。初起以解表邪大勢為先。膝痛專藥。一二味而已。若經汗下。表邪大勢已解。則當察其邪氣之有無。正氣之虛實。專治下部。不然。恐致殘廢。倘餘邪不盡留於下部。則仍有熱症。如胃燕。小便黃赤。以黃柏苡仁清溼熱。檳榔木通。滲瀉。筋攣。則泰艽木瓜。筋緩。則蒼术防己。紅腫。則赤芍丹皮續斷芎歸。若無餘邪見心悸。二便頻數。尺脈虛小。則當以補腎為急。六味加牛膝枸杞知母滋益陰

精。

脛腿痛酸

時疫初起。脛痛酸者。太陽經脈之鬱也。獨活為主。燕攣者。治在筋。加秦艽木瓜。無腫者。治在肉。加木通赤芍槟榔。無軟者。屬溼溫。俗名軟腳溫。往往一二日即死。宜白虎加蒼术湯。或蒼术黃柏。此與膝痛頗同。未經汗下。則解表之大劑。加一二味脛痛尚有虛實藥。表症已解。惟留此症。當專治之。若屢經汗下而見虛症。亦以補腎為主。

足痛

時疫初起足痛。有因素有腳氣痼疾者。但治時疫。於解

表虛中。微加檳榔木通。若已經汗下。表裡俱平而足痛不止。則消息其腎家虛實。同膝胫痛法治之。

肩臂痛酸

時疫初起。肩臂痛酸者。手太陽經脉受邪也。解表。則痛自已。經汗下後。而肩臂痛者。有經隧阻滯。血脉空虛之別。經隧阻滯者。脉多有力。證多熱渴。以清熱活血為主。黃芩赤芍歸尾紅花之類。血脉空虛者。證多瘧困。脉多芤濇。養血益氣為主。四物合參芪之類。

腕痛

時疫初起。腕痛者。乃風濕未疾也。初起解表。汗下後。益氣養血。與肩臂痛同治。

周身骨節酸痛

項背腰膝胫足肩臂諸痛。已列於前。則周身之酸痛。俗矣。茲復列周身骨節酸痛者。以痛在一處。邪有尚注痛在周身。邪有分布也。專注之邪。須通其疑注。分布之邪。須解其縛束。故治周身酸痛。疏表其大法也。而酸與痛亦有別。酸輕而淺。痛重而深。酸痛與拘攣又有別。酸痛病在營衛。拘攣病在筋

骨。酸痛拘攣。又有上下淺深前後之不同。在身半以上。為未疾。淺而易解。在身半以下。為本病。深而難祛。合上下之酸痛拘攣。在未經汗下。又有別。才經汗下。屬邪盛。宜宣伐。已經汗下。屬正虛。宜調補。明於此。則酸痛在周身。在一處。按症施治。無不當矣。解表諸方。人參敗毒散。九味羌活湯。六神通解散。大羌活湯。

身重

時疫初起。發熱身重者。濕勝於熱也。蒼术為主。二三日至四五日。傳變之後。汗出更熱。而身重者。熱壅其經脉也。白虎湯為主。傳裏表無熱。而舌燥便秘。腹痛拒按。而身重者。內結而氣不達於表也。三承氣為主。屢經汗下。表熱已退。身重不可移動。脉虛散而無根。舌上無胎。二便自通者。陰陽兩亡。經脉枯竭也。審其陰陽偏勝而治之。偏於亡陰。多燥症。六味合四物為主。偏於亡陽。多脾

自汗

疫邪在內。熱出於表。初起作寒熱時。多自汗。甚至淋漓不止。不可以表虛論。兼頭痛身痛仍以解表為主。羌獨

葛之類。兼煩渴。宜清陽明之熱為主。白虎之類。有結。破結為主。隔胸三承氣之類。若屢經汗下。邪已全退。脉虛。而舌無胎。二便清利如常。內外無熱症。方可從虛斂汗。蓋以時疫得汗。為邪有出路。而宜斂汗者。恒少也。

盜汗

時疫初起。盜汗者。邪在半表半裏也。胸脇痞悶。達原飲無痞悶。小柴胡湯。汗下後。大熱已退。有盜汗者。餘邪不盡也。小承氣。小陷胸。吳氏承氣養榮湯諸方。清其伏匿餘邪。盜汗自止

戰汗

時疫不論初起傳變未後。俱以戰汗為佳兆。以戰則邪正相爭。汗則正逐邪出。然有透與不透之分。凡透者。汗必淋漓。汗後身涼。口不渴。舌胎潤。二便清。胸腹脇肋無阻滯結痛。始為全解之戰汗。否則餘邪未淨。而復熱。則有再作戰汗而解者。有戰汗須三四次而後解者。有戰汗一次。不能再戰。俟屢下而退者。有不能再作戰汗。即加減人。然須驗其是否作汗。作汗之脉。浮而緩。浮為邪還於表。緩則胃氣自和。待汗透自愈。脉若浮洪。浮數。浮滑。

不可服藥。補則戰止而汗不透。留邪為患。汗下。則太過而成虛脫。應聽戰汗透徹。再觀脉症施治。當戰時。或多與熱湯飲之。助其作汗。戰汗之時。脉多停止。勿訝。待戰汗之後。脉自見也。大抵戰汗之脉。以浮為佳。邪出於表也。虛散微濡。應有變。煎獨參湯以待之。防其脫也。貧者米飲調代之。然必察其戰後。係邪淨而氣欲脫。方可用。凡戰汗後。神靜者吉。昏躁者危。氣細者吉。氣粗而短者危。舌瘡不能言者死。目眶陷著死。目轉遲者死。戴眼反折者死。形體不仁。水漿不下者死。戰汗雖為佳兆。亦有吉凶。得戰汗固由治得其宜。邪退正復而致。然不可預也。當見服大發汗藥。毫不得汗。而飲冷水得汗者。又有用下藥得戰汗者。涼血活血得戰汗者。種種不一。當知戰汗。乃陰陽交和。表裏通達。自然而然。非可預致也。

狂汗

時疫陷解。有忽手舞足蹈。踞床投櫈。而後作汗者。最為駭人。然須驗其是否作汗。作汗之脉。浮而緩。浮為邪還於表。緩則胃氣自和。待汗透自愈。脉若浮洪。浮數。浮滑。

浮散。雖有汗。亦為發狂。非作汗也。

頭腫

時疫頭腫。乃風熱壅於上部。太陽之經脉鬱滯巔頂。俗名大頭傷寒。當視表裏輕重。加輕清疏風之品。以散其腫。荊防薄荷蟬退川芎蔓荊菊花之類。如發熱舌胎白表重於裏也。合表藥用。九味羌活湯。人參敗毒散是也。如煩渴舌胎黃者。裡重於表也。合裏藥用。三消飲。涼膈散。大柴胡湯。調胃承氣湯是也。古有用三稜鍼刺出惡血。法亦可用。至發癰膿者。不在此例。

面腫

時疫面腫。風熱溢於上部。陽明之經脉被鬱也。赤腫者方是。治以白芷防風葛根石膏。散其風熱。視表裡之輕重。合頭腫條內諸方。加減用之。若黃腫。乃水氣也。當從水腫治之。

頸項腫

時疫頸項腫。乃陽明風熱。俗名捻頭溫。又名蜨蠓溫。當按頭腫條內表裏諸方。加葛根桔梗牛蒡防風玄參。癰發瞤。不在此例。

耳前腫

時疫耳前腫。乃少陽風熱。俗名黃耳傷寒。小柴胡湯加荊防芎芩元參。亦當與頭腫參看。

胸紅腫

時疫胷前一片紅腫。粟起似痲疹。風熱也。俗名赤膈傷寒。亦於頭面諸條。表裏方中。加荊防連翹赤芍牛蒡土貝。

周身紅腫

時疫周身紅腫。風熱溢於皮膚也。用羌獨升葛芷。疏其皮膚之毛竅。石膏黃芩梔子連翹。清其肌肉之熱。赤芍歸尾紅花生地。活其毒熱之瘀。薰蒸裏症與頭腫諸條參治。

以上頭腫諸條。列之表症者。以初起言也。若見於病後。曾經汗下者。為餘邪不盡。治法則小異。大約見於初起。表邪盛實。用表散之藥為主。清裡之藥為輔。見於病後。裡邪留滯。用清裡之藥為主。表散之藥為輔。以此為權衡。思過半矣。

發黃

時疫發黃有四。一宿食。二畜水。三畜血。四鬱熱。當疫症初轉在表時。胸膈痞悶。目睛黃。面眞正中黃。宿食壅於胃脘也。於末藥中。加山查神麯麥芽萊菔子。俾裡時。小便不利。腹滿而響。面目身俱黃。畜水也。四苓散。加梔子茵陳。胸腹有軟痛處。小便自利。大便黑。而發黃者。畜血也。桃仁承氣湯。熱在下焦。大小便俱不利。而發黃者。鬱熱也。茵陳蒿湯。凡發黃必以二便為辨。二便調。屬上焦。小便不利。屬水。小便自利。而大便黑潤。屬血。大小便俱不利。而發黃者。鬱熱移於胸膈。不必利其小便。但當通其大便。是以茵陳湯。有專功也。發黃當辨其色。上焦宿食發黃。只在面目。不及周身。畜水發黃。周於身。兼微黑而潤澤。鬱熱發黃。兼赤而黯淡。瘀血發黃。亦兼微黑而潤澤。鬱熱發黃。兼赤而鮮明。此即以黃辨黃之法也。

發疹

時疫發疹。熱邪從皮毛出也。與汗同機。以疏散清熱為主。然與他症發疹不同。他症或無裏熱。此則未有不裏熱者。雖以疎散為要。而見紅赤點。頰渴舌胎黃。則硝黃仍須兼施。他症發疹。散而病即愈。此則有屢發而病不衰者。

發斑

時疫發斑。邪熱出於經脈也。雖不及戰汗。亦有外解之機。治以涼血清熱為主。白虎化斑湯。吳氏舉斑湯。犀角地黃湯選用。此亦與他症發斑。又消則愈。此總不以斑之消否為輕重。而惟以裏症為主。每見斑出。而讝妄如故。或斑出數日已消。而沉昏如故。必俟裏熱全清。二便清利而後愈。故治斑藥味。可為輔不可為主。發斑發疹。熱皆在經而不在胃。凡遇煩躁而不渴。目赤而舌白。即是將發斑疹之候。預以清涼解表透毒之藥治之。使邪易出易淨。

以上時疫表症。皆關乎裏。不似他症。表裏兩不相關。故前列各條。皆冠以時疫二字。以明非他病之見症。不可以治他病之法治之。亦不可以此法治他病。總之大綱。實亦辨時疫之細目也。

煩乃心煩。情思不定。神一不安而形如故。躁則形擾。揚手擲足。形不寧而神復亂。煩輕而躁重也。在他証有謂煩屬心。躁屬腎者。煩屬陽。躁屬陰者。在時疫揔屬熱深。在上。則漸近昏沉而不躁。是時疫初起。可即煩躁之形。熱深在下。則漸近昏沉而不煩躁。則非時疫。設氣已神脉舌胎。有時疫確據。亦

但表尚裏之輕症。凡初起憎寒發熱而煩躁者。邪在半表半裏。三消飲。九味羌活湯。六神通解散選用。隆冬寒甚。汗難出者。大青龍湯。歲雖出者。大青龍湯。可借用。舌胎已黃。渴而喜飲。身熱汗出而煩躁者。邪入於胃也。白虎。黃芩。三承氣。小陷胸。三黃瀉心。涼膈散選用。舌胎已黑。煩躁漸沉昏者。邪入心包也。犀角地黃湯。加羚羊角。黃連解毒湯選用。屢經汗下清涼。表裏俱無阻滯而煩躁者。陰傷也。生脉散。六味地黃湯。吳氏諸養榮湯選用。或用解清利滋潤諸法不應。而煩躁加甚者。當細驗舌

黃黑。胎中夾一塊白潤。是為夾水。或平素胸有痰飲。未病之先。曾飲冷物。或初煩躁時。過飲冷水。總使涼物或用清涼太早。皆能停飲於胸膈胃脘之間。寒飲拂鬱其疫熱。外不能達表。內不能傳胃。故煩躁轉甚。驗舌之後。更細按胸脇。滿痛而軟。漉漉有聲。再細察其脉。大寸關。或弦緊。或緩。皆停水確據。當以蒼术半夏菉蕻厚朴。先消其水氣。然後治其煩躁。無不應者。不論舌胎有無黃黑。但煩躁而無小便不利者。雖無水氣在胸脇。而少腹略有滿痛處。即當以導赤瀉心湯。四苓湯。豬苓湯。益

嘔

吳又可曰。時疫有始終無食者。邪不傳胃也。慎勿絕其飲食。此不嘔者也。愚嘗見時疫初起。未發熱時。表症未見。有先作嘔數日者。此疫邪先犯太陰。當辨其口氣無臭氣而不粘者。屬太陰寒症。有臭氣粘厚者。屬太陰疫症。此為先裏而後表。不可遽用清涼。閉遏邪氣。致使不能透達傳化。雖四肢有時厥逆。脉有時沉伏。亦不可用溫熱。致增嘔症。甚有舌心深沉昏者。惟當宣其胃氣。藿香

正氣散寂宜若已發熱而嘔者吳氏達原飲加半夏
三陽表症加羌活葛根柴胡若嘔而煩渴身熱而不
寒者邪在陽明也白虎湯黃芩湯並加半夏若嘔而
黃胸中有滿痛處橘皮半夏湯加枳實山查麥芽川貝
貝母力緩用至五錢或一兩乃能舒鬱散結若嘔而舌
黃心下膈上有滿痛拒按者大柴胡湯若嘔而舌黃或
無少腹有滿痛拒按當視其前後何部不利大便不利
急寒熱已解二便通利胸腹無滿而嘔不止者餘熱在
胃也竹葉石膏湯屢經清下嘔不止而舌無胎多汗心
悸瘥倦者中氣傷也大半夏湯或六君子湯加白蔻屢
經清下倦怠異常四肢漸冷者乃清下太過而中寒也
理中湯甚至加附子然此為治藥之法非治疫之法也
宜詳察之

欬

欬者疫邪夾他邪干肺也有初起在表夾風邪干肺者
脈無涕欬多痰沫必無鼻鳴自汗灑淅惡寒於透表諸
方中加前胡桔梗蘇子杏仁淡豉有夾水干肺者不論

曰苦咽乾。目脹而渴。脉必數。小柴胡湯。加花粉知母。或亦加石膏。或達原飲。加石膏。葛根。邪已入胃。作渴身熱自汗。舌現黃胎。或醬色。或黑燥。當察其胸脇少腹。按之有無痛處而渴者。為有熱無結。脉必洪。宜白虎湯。按之有痛處。為有熱有結。痛在心下。脉必滑大。關上尤甚。小陷胸湯。在臍上及當臍。關中脉必滑大。小承氣湯。在臍下尺中脇。必滑大。調胃承氣湯。心下至少腹俱痛。寸關尺必皆滑大。大承氣湯。痛在左脇不可按。左關脉必弦。或滿或艻。桃仁承氣湯。痛在右脇。不可按。右關脉必弦。或

消或遲。十棗湯。渴而小便不利。少腹不可按。尺脉必數。四苓散。猪苓湯。六一散。汗下後身熱已除。而渴不止。餘邪未盡也。宜將前所用藥。再作小劑以利之。屢經汗下。渴而舌上無胎。胸腹無滿痛。心悸而煩。脉虛細。或浮數或濇。亡陰也。六味合生脉為主。渴與煩躁同機。而渴宜於躁。渴有喜飲。而又有喜熱飲冷飲之分。在他症不喜飲。及喜熱飲。則為真寒假熱。在時疫喜熱飲。多發斑渴不喜飲熱在血分。真寒假熱。百不一見也。時疫初起。只有餘邪。不渴為無餘邪也。

口苦

熱邪在中上二焦。則口苦。非特時疫為然。即感風寒。口苦。味屬少陽熱症。如時疫當發熱。表症正盛時。一見口苦。即於發表諸藥中。倍加清熱之品。輕則黃芩。重則石膏。不但三陽表症如此。即三陰裏症。

手足冷。惡寒嘔利。胸腹滿。不渴。證狀似乎純冷。無熱而一見口苦。即當於溫燥藥中。加利熱之品。如用羊肉當歸。術草果厚朴。必加木通芩澤。甚至加知母黃芩。本吳氏達原之義。口苦為熱症的據。每遇症狀糢糊。寒熱莫辨。必借此以決之。至舌胎黃黑乾燥。煩躁熱渴閉結。又清下之不可或緩者矣。

口甘

口苦口甘。同為熱證。苦為燥熱。在上中二焦。多渴。屬三陽。甘為濕熱。在中下二焦。多不渴。屬三陰。蓋脾胃屬土。稼穡作甘。土邪下涉腎位。水土相蒸。甘味上溢於口。多無嘔吐。人每誤認胃寒。而用溫中之劑。不知溼熱在於下焦。土能尅水。溫燥太過。腎水告竭。總不見熱渴諸症。

惟目不見物。漸至昏沉而死。口甘一症。在諸症初起。猶可用温燥開導之品。而亦不宜過劑。在時疫必以清熱為主。消痰為輔。或胸中停飲太甚。亦不過加蒼术半夏而已。如二陳去甘草。加薑汁炒山梔。薑汁炒黄連。竹茹黄芩等類。為口甘要藥。烏梅更妙。酸能勝甘。蓋五行勉制。自然之理也。或四苓散加山梔亦得。然必以時疫之大勢。為用藥之權衡。斯可矣。

唇燥

唇燥者。陽明熱也。時疫見此。當辨其色。深赤為大熱。宜清下。淡白為亡津液。宜滋潤。色如常。為津液不流通。熱在經脈。宜葛根。

齒燥

時疫齒燥有三。輕淺者為陽明經熱。前板齒燥。身熱口疼。鼻乾不得臥。此將發斑疹。及衄血之先兆。葛根為主。黄芩知母石膏為輔。重者為胃府燥熱。通口皆燥。甚則黑如煤炭。三承氣。三黄石膏選用。至重者為陰火煎熬。亡血太甚。腎水涸竭。當峻補其陰。知母。黄柏。生地。元參。天冬。麥冬。丹皮。每味兩許。大作湯液。加童便金汁。晝夜頻進。若藥輕治緩。則不及矣。

鼻孔乾

時疫鼻孔乾有四。風熱。則鼻鳴。荆防葛根薄荷為主。陽明經熱。則煩躁。葛根石膏為主。胃熱腑症。則大渴舌黄。三黄石膏為主。亡津液。肺燥。麥冬生地五味為主。大抵風熱經熱者。十之五六。腑熱亡液者。十之二三。非謂熱深而鼻孔反不乾也。以煩渴大熱症見。則不覺鼻孔之乾與否耳。

耳聾

耳聾者。少陽邪熱挾痰上壅也。時疫耳聾者多。蓋邪之傳變。出表入裏。必于少陽。又時疫屬熱。亦主上升。挾痰涎濁氣上壅隧道。故耳聾也。治法以疫邪大勢為主。見於初起傳表時。於表藥中。加荆防川芎。見於入裏時。於裏藥中加黄芩知母。屢經汗下。耳聾不愈。不可急治。養陰調胃為主。須待粥食如常。二便調勻。始由漸而愈也。

鼻如煙煤

時疫鼻如煙煤者。邪熱爍肺也。由鼻孔乾而來。急當清下。少緩則肺胃枯絶矣。三承氣合白虎。或三黄石膏加

青黛。或小陷胸加犀角。或犀角大青湯。視其兼症。擇而用之。

鼻孔扇張

鼻孔扇張有三。一痰壅於肺。氣出入有聲。喘欬胸滿不渴。宜瓜蔞貝母桑皮藕子瀉肺。一氣通自愈。一鬱熱於肺。氣出入多熱。有微表東其鬱熱。古人獨主越婢湯。蓋散其外束。清其內鬱也。用於時疫中。以葛根易麻黃。或葛根黃芩黃連湯亦可。一腎氣虛而上逆。氣出入皆微多死。此證必得之屢經汗下。或兼多汗心悸耳聾。急宜大劑六味合生脈散。加牛膝枸杞。或可百救一二。

咽乾

咽乾者。邪熱淫於腸上也。在傷寒為少陽熱證。時疫亦然。宜黃芩甚則佐以花粉知母。

咽痛

時疫咽痛。為熱淫於肺。當視其咽中有結無結。無結者微紅。以桔梗花粉黃芩元參治之。有結者紅腫。當加牛蒡赤芍消其腫。結甚則起粟泡白泡。是為乳蛾。必以針刺去惡血。再服清熱之藥方妙。時疫中常有急喉風。急喉痺二險症。旦發夕死。不可不察也。急喉風。咽痛而喘。乃痰邪夾熱。上壅於肺。古方用膽礬吐其痰涎惡血。或皂角膏吐之。治之稍緩。則氣閉而死。急喉痺。即乳蛾速長。閉塞喉嚨。亦以刺去惡血為主。甚或用刀大開其膿血。此雖見於時疫中。必其人平素貪厚味。多怒鬱。肝火妄動。有以致之也。

舌燥

舌乃心苗。腎竅通其本。脾脈絡其下。時疫舌燥。由大便土燥。中宮堵截。腎水不能上交心火。須察其胎之有無。

與色之深淺施治。白胎而燥。疫邪在表。痰已結於腸上。吳氏達原飲。加石膏川貝蔞仁大黃。此吳氏名白砂胎。熱極不變黃色。下之即黃。不可緩也。黃胎而燥。疫邪傳胃。小承氣。小陷胸。大柴胡。選用。醬色胎而燥。疫邪入胃深及中下二焦。調胃承氣湯。黑胎而燥。疫邪入胃至深。傷及下焦。大承氣湯。燥成塊裂。或生芒刺。熱更甚也。大承氣倍其分兩。大黃須兩許方妙。各燥胎。下之漸減。不即盡淨。為藥已中病。力未到耳。當再下之。有下至三五次。十餘次而後愈者。若屢下而燥胎愈長。不可更下。當

察其腹中。若燥投作响者。痰水結於中焦。脾胃受困。津液不能上潮。改用平胃二陳溫燥之劑。即愈。又腎陰竭涸。愈下愈亡其陰。燥胎不回。目無神。耳聾。心悸。腰痠。再下必死。宜六味地黃湯。合生脉散。至無胎而燥。須辨其色。正赤或深黑。熱歸心包。血分熱極。石膏。知母。黃連。犀角。羚羊角。牛黃。為主。鮮紅。亡陰。二冬。生地。元參。知母。阿膠。人參。為主。大抵舌無胎。則胃無物。可清潤。不可攻下。

舌強附舌瘡

時疫舌本強硬。為熱而無痰。宜清下無疑。須加消痰之藥。無白胎者。已經煎熬。其痰漸燥。佐以川貝栝蔞。小陷胸湯是也。無黑胎者。熱極。痰亦為火。佐以牛黃方效。若無痰。舌色正赤。深紫裂燥而強者。熱毒蘊於心包也。三黃石膏湯。加犀角牛黃。急清其熱。舌強雖與舌燥相類。而燥屬胃。主熱。強屬心。主痰。又舌瘡軟而枯小。與舌強硬而不縮有異。乃虛脫已極。大補及滋潤。或百救一二。若屬經汗下。清熱消痰。而舌強者。又當與舌燥同治。

舌卷短

時疫之舌。一見黃胎。便當下。下後胎黃而變醬色。燥。變黑。變生芒刺。再失下。則由黃而變黑。變卷變短。為下證至急之際。宜大下屢下方和。緩則不救。

胸滿痛

時疫胸滿而不痛者。為邪未結。為無形之氣。稀薄之痰。痛而不滿者。為病在經絡。有虛有實。有虛實相兼。滿而痛者。為邪已結。須分痰食血以施治。屬無形之氣者。按之不痛。時疫初起。邪在募原。多有此症。宜達原飲。加枳桔木香大腹皮。以開豁之。屬稀薄之痰者。時疫二三日邪在半表半裏。多有此症。宜達原飲。加半夏萊菔子。或小柴胡湯。加萊菔子。病在經絡痛而不滿者。初起屬實於解表藥中。加延胡烏藥。舒其經絡之氣血。病久屢經汗下。多虛。於養氣血藥中。倍當歸。更有虛中夾實者。於解表清裏藥中。加乳香沒藥最妙。滿而痛不可按。邪已結矣。痰結者。牽引串痛。煞。燥相類。而燥屬胃。主熱。強屬心。主痰。又舌瘡軟而枯小。與舌強硬而不縮有異。乃虛脫已極。大補及滋潤。或百救一二。若屬經汗下。清熱消痰。而舌強者。又當與舌燥同治。

亦有在膈上者。為危症。嘗吐之。宜瓜蒂散。此二者。不可便下。須待其轉動。方可下之。蓋結在上。焦屬氣分。下之太急。則氣逆嘔吐。外用按捺之法為妙。血結者。不可按。按之軟。脉芤滑弦。宜於解表清裏藥中。加桃仁紅花三七歸尾。甚則桃仁承氣湯。時疫多實多熱。至胸膈滿痛。又屬實邪。非虛症。惟是屢經攻下。胸痛更甚者。乃脘腎兩虛。下氣上逆。宜溫理脾腎。以建中鎮安之。甚則導火歸元。納氣歸腎皆可。然不多見。須消息斟酌。不可輕試。

脇滿痛

脇滿痛。與胸滿痛同。而微有不同者。胃滿痛。有宿食為病。脇滿痛。無宿食為病。乃亦有因宿食在胸膈。而滿痛及脇者。時疫脇滿痛。是疫氣血三者為病。其中亦有滿而不痛。不滿而痛。痛並作之分。其滿而不痛者。慕原之邪。未經傳變。宜達原飲。兼寒熱往來者。大柴胡湯。痛而不滿者。邪分布於少陽之經。宜小柴胡湯。滿痛並著者。當分左右。左屬血。小柴胡去人參。加延胡。歸尾。桃仁。甚者加莪朮三稜。三七。五靈脂。右屬痰與氣。痰。柴胡。倍半夏。加牡蠣菜菔子。甚則白芥子。甘遂。大

花。氣。加青皮萊菔子。木香大腹皮。痰與氣痛。皆無寒熱。而有聚散。痰散仍有所苦。若屢經汗下。清利。而脇痛更甚者。虛證也。氣虛必偏利。養氣為主。血虛必煩熱。養血為主。此亦十中一二。脇痛與胸腹痛不同。胸腹譬之衢。衝塞不能久。脇則譬之衖巷。塞則難歸。用藥須明此意。時疫脇痛。雖有痰氣血之殊。而總不離乎熱。黃芩是為主藥。若別有熱症者。黃連山梔。又所必需。他病脇痛。有寒有熱。不在此例。

腹滿脹

時疫腹滿痛。屬宿食為邪熱所結者。十之七八。屬氣血痰水者。十之二三。蓋腹為胃與小腸之正界。非胸脇少腹之地可比。腹滿而不痛者。屬邪在氣分。屬水穀散漫而未燥結。氣分脉多沉。或弦。水穀脉滑。氣分通腹皆滿。大腹皮。青皮。陳皮。枳桔。為水穀滿有分界。氣分者。厚朴。大腹皮。青皮。陳皮。枳實。為主。時疫為熱症。腹滿亦當清熱。兼以順氣消食可也。若舌多黃胎。雖滿而不痛。為邪已傳胃。宜小承氣湯下之。痛而不滿者。屬邪在血分。屬水穀燥結諸病。他病或有屬冷者。

時疫總屬熱症。痛不可按。而無硬處者。於清裏方中加白芍。不可按而有硬處者。調胃承氣湯。滿痛兼作。為痞滿在氣。燥實在血。大實大熱之症。大承氣湯。諸病腹滿痛或兼自利。當責之虛冷。時疫自利。屬熱結者。須止。不可疑為虛冷。若滿痛而喜燥喜溫。或惡寒。手足冷。清利之益甚。或右關遲緊。此非本病。乃因煩渴飲冷太過或用清涼太過太早之所致。又當以溫燥為主。不可執一。然此亦治藥變。非治本病也。

瘟疫明辨　卷三　十五

少腹滿痛

時疫少腹滿痛。為邪熱結於下焦。下焦乃大腸膀胱。及厥陰分界。與中焦畏。亦有滿而不痛者。而不滿者。痛兼作之不同。初起滿而不痛者。濕勝氣滯也。桃棗厚朴蒼术為要藥。痛而不滿者。手不可近。熱傷厥陰血分也。黃芩以清熱。赤芍歸尾以活血。柴胡以升厥陰之氣。若牽引陰器。及兩胯夾縫者。加蒼艽即愈。滿痛兼作者。不論初起末後。當視其前後。在前小水不利。畜水也。四苓猪苓益元等方選用。在後大便不利。有燥矢也。三承氣選用。以大小便之通塞為辨。固矣。亦當細察其漸變。有硬塊不可按者。屬燥矢。滿痛如鼓不可按而却無者。屬畜血。以此辨之。然矣。外有時疫末路。滿而不痛。痛而不滿。喜溫喜按。為虛證。當細詢來路。若屢經清下太過。當消息溫補。培養陰陽。不可執時疫為實邪熱證。而不變通也。然此亦十中一見耳。

瘟疫明辨　卷三　十六

右滿痛諸症。乃時疫裏症之大端。總屬熱邪內陷。在風寒暑溼諸門。則寒熱虛實俱有。在時疫已經傳變。見於煩渴燥熱既顯之後。其為熱症易辨。若見於未經傳變之先。乃疫毒鬱而未發。多不渴。多不發熱。甚有手足反厥冷者。依風寒治。則當溫。依時疫治。則當清。毫釐千里。反掌生死。當於氣色神脈舌胎五者。細察而詳辨之。

自利

時疫自利。皆熱症也。其所利者。與內虛內冷者自別。冷利之色淡白。熱利之色正黃。甚有深黃醬色者。冷利稀薄。熱利稠粘。虛冷利。散而不臭。熱利臭而多沫。虛冷

易出。熱症多圓。冷利緩。熱利暴注下迫而裏急。此辨時疫熱利與諸冷利之大聚也。時疫初起。有手足厥冷。惡寒。嘔吐。腹痛自利者。全似太陰寒症。辨其為疫。只在口中穢氣作黏。舌上白胎粗厚。小便黃。神情煩躁。即可知其非寒中太陰。是時疫發於太陰也。煩躁輕。則藿香正氣散。煩躁甚。則用達原飲。一二服後。即見三陽熱症矣。此時若用溫中藥。轉見四肢逆冷。手足青黤而死。不可不細察也。時疫初起。頭疼。發熱而自利。九味羌活湯。傳變太陽少陽合病。身熱口苦。咽乾目眩而自利者。黃芩湯。傳變太陽少陽合病。有硬痛處。與大承氣湯。無硬痛處。小承氣湯。小陷胸湯。兼嘔。加半夏。傳裏舌黃讝妄而自利者。按其心下至少腹。有硬痛處。與大承氣湯。無硬痛處。小承氣湯。小陷胸湯。兼嘔。加半夏。傳裏舌黃讝妄而自利者。按其心下至大柴胡。遲用。此在下焦其熱不必以結為主。故雖無硬痛。亦主大黃。時疫自利。而小便不利。腹滿而無硬塊。時作腸鳴者。熱在小腸膀胱而畜水也。四苓散。猪苓湯。益元散。選用。時疫自利。受補者少。至屢經清下。無表裏證自利漸至清穀。而脈微細者。則六君子湯。補中益氣湯。理中湯。又所當酌用也。

便血

時疫便膿血。邪深入也。先當辨其血色。鮮紅者清熱為主。黃芩湯。三黃石膏湯。犀角地黃湯。血色紫黑成塊下者。逐瘀為主。桃仁承氣湯。抵當湯。須按腹脇有痛處用之為確。時疫便血。散悔夾涎水者。脾胃虛而臟腑傷也。歸脾補中八珍可借用。並加烏梅。時疫便血之後。多陰症。神昏耳聾。舌無胎而燥。身痛不可轉側之類。皆是生脈六味加阿膠。峻補其陰。然多不救也。

便膿血

時疫便膿血。與便血有燥濕之分。便血屬燥熱。涼潤為主。便膿血屬溼熱。清熱兼分利為主。時疫初起。頭痛發熱便膿血者。即古所謂疫痢是也。不必治膿血。但解其表。表解則便數自減。決不可早施清裏攻下之藥。即分利清涼。亦所當慎。蓋邪方在表。清裏則邪內陷深入。後極難治。且時疫一見便膿血。則煩渴之熱勢尤緩。蓋熱隨利減也。所以苦寒之品。不可浪用。惟以倉廩湯為主。詳見夾痢條下。時疫傳變至半表半裏。便膿血者。柴葛解肌湯。加蒼澤木通黃芩。時疫傳變入裏。煩渴讝妄。悉具。而便膿血者。黃芩湯。葛根芩連湯選用。兼裏急後重。

腹中拒按者。加檳榔大黃。時疫屢經攻下。而便膿血滑精者。當以養中調氣養血為主。清熱為佐。老人虛人。亦倣此例。

大便閉

時疫屬溫熱。大便閉者少。間有閉者。乃平素胃陽強盛。多燥氣也。夫本來陽盛。復受時疫。則溫熱皆變為燥熱。雖兼表症未得汗。可下。以時疫與傷寒不同。傷寒邪從表入。有表證未得汗。必不可攻裡。時疫邪從內發。雖有表證。每多發表而不得汗。必待裏氣通。而後表始得汗。

所以時疫大便一閉。即有表證。亦當下之。不可逡巡也。若初起未經表散。則當用三消飲下之為當。有表證尚可下。則煩渴譫妄。舌胎黃黑燥烈。卷短。胸腹硬痛諸症俱見。更當分別輕重下之。無起又有大便閉而屢下不通者。則必有夾邪。當審之。有夾水者。水在腸中。則不下而自利。水在胃脘以上。則脈多弦多緩。往來上嘔而不下利。且舌白而心下按之作響。雖用承氣不能下行。故下之不通。當先用半夏茯苓蒼朮消其水。而後下之。亦有可用大陷胸湯者。必胸上痛而手不可近。方為藥與邪敵。有夾氣者。氣滯於胸膈之間。主上逆而不下降。胸腹痞痛。而脈沉。當先以蘇子萊菔子木香檳榔。順其氣而後下之。有氣虛而屢下不通者。屬老人虛人。其脈必無力。其色必悴。其肌肉必緩。其神必散。若下症全具。當與大承氣加人參。一服而宿垢頓下。或陶氏黃龍湯。或麻仁丸。參湯下。酌其裏症之多寡用之。有血虛而屢下不通者。屬婦人產後。癰疽瘡潰後。或平素陰虛。及亡血。其脈必無澀。四物六味生脈。及吳氏諸養榮方。麻仁丸遲用。仍須察煎猪膽汁導之。大凡時疫。大便一閉。即當

下之。然須詢其有無所苦。若無所苦。下尚可緩。有所苦而下之不通。又須察有無夾邪及虛也。當下者十之五。可緩者十之三。夾邪者十之一耳。時疫如此。他病則不然。古語云。傷寒下不厭遲。時疫下不厭早。誠哉斯言也。

小便不利

時疫初起在表時。頭痛發熱。小便不利者。熱入膀胱也。益元散主之。四苓散猪苓湯皆可用。東垣云。小便不利而不渴者。熱在上焦。法當淡滲。小便不利而不渴者。熱在下焦。法當苦寒。此可為據。時疫傳裏。大便閉而小便不

利者。當先通大便。大便通小便自利。此惟時疫為然。他病則否。時疫屢經汗下。小便不利者。陰竭也。為難治。知母黃柏生地麥冬之類治之。或生脈六味皆可。然多至於亡。往往有嘔吐听逆涓滴不能下咽。至湯藥不進者。當用敷臍法。大田螺一枚。搗爛。入麝香三釐。敷臍上。帛束之即通。一見點滴即受湯藥。古法有用葱熨。及井底泥敷少腹者。俱可參用。但未宜於陰竭之虛人耳。

小便黃赤黑

瘟疫明辨　卷上　十三

時疫未傳變時。小便多如常。熱一傳入裏則黃。熱甚則赤。熱入血分畜血則黑。小便可驗裏熱之有無深淺多寡。但不可以作專症。疫邪在表。小便黃。即於解表中加清涼藥。邪入裏。小便黃赤。雖手足逆冷。亦當攻裏逐熱。疫邪已退。表裏俱和。小便黃赤未退。仍當清利餘邪。惟小便黑者。當逐瘀清熱為主。犀角地黃湯加大黃等類。有屢經汗下。清涼太過。表裏俱無熱邪。而滑瀉腹痛。小便黃赤者。當理脾升陽為主。亦治藥非治病也。

小便多

瘟疫明辨　卷上　十四

時疫為濕熱小便多者甚少。傳裏之後。或有小便多者。屢經下後。小便多者。氣虛也。益氣升陽為主。亦有腎虛而小便多者。六味地黃湯加五味子。大抵未下之先。小便多者。屬燥熱。小便必微黃。必煩熱。渴而喜飲。既下之後。小便多者。屬虛。氣虛則不喜飲。而寸脉不及尺。尺脉不及寸。沉不及浮。失治日久。則寒消渴。時疫小便多者如此。若夫風寒小便多。則屬陽虛。不在此例。

遺尿

瘟疫明辨　卷上　十五

時疫初起遺尿者。多屬三陽合病。蓋邪入於陽。則陽實而陰虛。熱盛於表。裏為之不守。又神昏於上。不自知其下部之出入。故遺尿也。合之腹滿身重。口不仁而面垢讝語。仲景獨主白虎湯。此症不可下。以邪全盛在表在經。下之則表邪內陷。故頻上生汗。手足逆冷。尤不可汗。以邪本屬熱。汗之則愈增其熱。故心憒憒。反作讝語。惟以白虎湯清其浮越之熱。若荊蓋燥結鞕痛者。可於本湯內加大黃下之。

囊縮

時疫囊縮。乃熱入於厥陰也。有結有熱則下。有熱無結則清。熱退而囊自縱矣。陰症囊縮。與時疫頗相類。以陰症囊縮。必身冷。厥逆。脉沉也。然一寒一熱。自有不同。陰症囊縮。陰莖痿縮。或全縮入腹。有如婦人。時疫熱欲囊縮。陰莖如常。再以無症辨之。陰症囊縮。小便清。少腹牽引作痛而不滿。喜温拔。多自利。神清不煩。時疫囊縮。小便赤。少腹滿而硬痛拒按。大便秘。煩而神昏。

多言

瘟疫明辨　卷主　十三

時疫多言者。讝語之漸也。疫熱蒸心之所致。治同讝語。

讝語

讝語者。熱蒸心也。時疫一見讝語。即當清熱。然有經熱蒸心而讝語者。邪在三陽。表症多有之。脉浮大。頭痛發熱舌白者是。吳氏三消飲最當。六神通解散。九味羌活湯。防風通聖散。白虎湯。梔子豉湯。皆可選用。有腸熱蒸心而讝語者。脉洪。身熱。汗出。不惡寒。反惡熱。胸中無結者是。白虎湯。黄芩湯選用。有痰涎搏結其熱。聚於中上二焦。而讝語者。脉弦滑。胸痛及心下痛。按之者是。小陷胸湯。大柴胡湯選用。有胃熱蒸心而讝語者。脉洪。身熱。汗出。不惡寒。反惡熱。舌黄。口燥。及苔刺。腹滿拒按者是。三承氣湯選用。輕者只用平胃散。加山查麥芽蘿蔔子即效。有熱入血分而畜血。亦熱蒸心而讝語者。脉沉結。或濇。心下至少腹。凡有痛處拒按而軟者是。犀角地黄湯。桃仁承氣湯。抵當湯選用。有熱入小腸膀胱。畜水之熱。上蒸心而讝語者。脉浮數。少腹滿。小便不利者是。四苓散。猪苓湯。益元散選用。以上皆實症讝語也。至若屢經汗下清理。二便已清利。胸腹無阻滯。六脉虚散結代微弱。而讝語者。陰陽兩虚。神無所倚也。虚在上焦。必心悸神倦。生脉散。加棗仁。天王補心丹。虚在中焦。必面色痿黄。四肢倦怠。歸脾湯。虚在下焦。必耳聾目直視。六味地黄湯。加速志五味龍骨茯神。

狂

時疫發狂者。讝語之甚者也。亦疫熱蒸心之所致。治同讝語。

善忘

時疫善忘者。畜血之所致也。畜血在上焦。其脉乳。胸前

及心下必痛。必拒按而軟。犀角地黃湯主之。蓄血在中焦。其脈或芤。或弦。或濇。兩脇及臍上。必有漏處。拒按而軟。桃仁承氣湯主之。蓄血在下焦。其脈多沉結。臍下必有痛處。拒按而軟。抵當湯主之。善忘雖為蓄血主症。然必驗之大小便。屎雖鞕。大便反易。其色必黑。小便自利。方為蓄血之的證。否則。仍當參之多言譫狂諸法治之。

沉昏

時疫沉昏。熱入至深。極險症也。蓋熱初蒸及心之經。則心神不安。多夢寐。醒時自清。熱心之經漸深。則心神漸

煩。多言。所言皆日用當行之事。無糊塗語。熱及心包。則精神間有昏處。多言間有糊塗語。猶清白語居多。迨熱心包漸深。則心神昏處居多。言多妄見妄聞。甚至疑鬼疑神。非人所見聞者。猶省人語也。至熱直入心臟。則沉昏全不省人事矣。此熱入淺深之次第。見證輕重之辨也。所以多言譫語。熱之浮淺者。梔芩知膚可解。於狂。熱之深結者。硝黃可解。至沉昏。熱已至深者。非犀角、黃連羚羊角、牛黃。莫能解也。沉昏雖係熱深。更有夾痰氣。夾胃結。夾血結之分。胸滿舌白。係夾痰氣。當加川貝瓜蔞半夏萊菔子於犀連諸藥中。舌黃及燥黑。腹滿硬痛者。當加犀連於三承氣湯中。痛而軟者。畜血也。桃仁承氣湯主之。畜血在下焦。其脈多沉結。臍下必有痛處。拒按而軟。抵當湯主之。善忘雖為畜血主症。然無溫二便自利。而神情如故。亦漸昏。由昏而漸沉。乃大虛之危症。大劑生脈散加桂附茯苓。或急救其陽亦未遲矣。

循衣摸牀撮空

時疫循衣摸牀撮空者。熱甚神昏而四肢實也。當察其舌苔白或無苔有熱無結也。犀角黃連石膏為主。舌有燥胎或黃黑燥裂芒刺有熱有結也。大黃芒硝為主。屢經汗下後。胸脇仍有拒痛者。邪未盡也。仍宜清利無拒痛者。陰虛陽亢也。生地麥冬棗仁茯神安神為主。

多睡

疫症初起。多睡兼身重者。熱邪阻滯其經脈也。必有汗。白虎湯無汗或加麻黃。屢經汗下後。表裏無餘。甚二便俱利。而身痛多睡者。陰傷也。四物六味生脈三方合用。大劑養陰方效。失治即危。服此數劑。身痛已和。表裏熱退

而仍多睡者。於三方中加生薑仁即愈。若夫平素脾虛多睡。多痰嗜睡者。一受疫症。必更嗜睡。當於時疫藥中。參之以理脾消痰之品。

身冷

諸病身冷。皆屬陰症。在時疫多屬熱症。須從氣色脈舌胎中辨其端倪。畏係時疫。則當分初中末以治之。不可概也。時疫初起。有身冷自利。腹痛作嘔。全似陰症者。若舌有厚白胎。身有穢氣。心煩多汗。面色油垢。小便黃短數。有一二證現。便是疫耶。直入太陰。先裏後表。

非真陰寒症。無嘔利。薑香正氣散。四苓散。無嘔利。達原飲。服一二劑後。即發熱矣。時疫傳變發熱之後。讓妄沉昏。舌燥。腹滿。便秘。而身冷者。先表後裏症。三承氣大紫胡選用。無結症者。白虎湯。時疫末路。屢經汗下。表裏無邪。胸腹無滿。二便自和。而身冷者。當以脈為主。脈虛細不振者。用藥太過。而成脫症也。急宜溫補。少緩即死。生脈散加薑。附。平補陰陽。冷甚者。加熟附子。時疫身冷一症。最難下手。初起時。若寒熱不辨。且勿妄投湯劑。當少待之。多則一二日。少則半日。多有自行傳變。即發熱煩渴者。此時則易於用藥。若已經發熱傳變之後。變為身冷。則自有口燥舌乾。不得臥諸症在。此時藥不可緩。則熱深厥深。雖下後厥回往往亡陰而死。身冷與惡寒不同。而病機頗同。當與惡寒條參看。

呃逆

時疫呃逆。與傷寒不同。傷寒呃逆。虛實寒熱俱有。時疫呃逆。惟熱結下焦而已。凡見呃逆。即當下之。下之不止。按其臍腹有硬痛拒按處。仍當下之。有下至十數次方止者。總之。逐盡結熱。腸胃通達。其呃自止。慎不可用丁香柿蒂湯。治呃而遺結熱。致成危證也。

吐蚘

傷寒吐蚘。多寒熱錯雜。時疫吐蚘。則有熱無寒。治此症之當汗當清當下。一以傳變之大勢為主。惟加烏梅黃連以安之。膜外用烏梅圓中諸辛熱藥。致成危篤也。

汗法

時疫發解其邪熱而邪熱必有着落。方着落在肌表非汗則邪無出路。故汗法為治時疫之一大法也。但風寒汗不厭早。時疫汗不厭遲。風寒發汗必兼辛温辛熱以宣陽。時疫發汗必兼辛凉辛寒以救陰。風寒發汗治表不犯裏。時疫發汗治表必通裏。其不同有如此。故方疫邪傳變出表時。輕者亦可得表藥而汗散。若重者雖大劑麻黄葛蔥。亦無汗也。必待伏邪盡發。表裏全徹。然後或戰汗。或狂汗而解。所謂汗不厭遲者。此也。辛凉發汗。則人參敗毒散。荆防敗毒散之類是。辛寒發汗。則大青龍。九味羌活。大羌活之類是。發表兼通裏。則吳氏三消飲。六神通解散。防風通聖散之類是。更有不求汗而自汗解者。如裏熱閉甚。用大承氣以通其裏。一不已而再。再不已而三。直待裏邪逐盡。表裏自和。多有戰汗而解。此不求汗而自汗解者一。又如裏熱燥甚。病者思飲凉水。久而不得。忽得痛飲。一盞落枕。而汗大出。汗出即解。此不求汗而自汗解者二。又如平素氣虚。屢用汗藥中。覆杯立汗。此不求汗而自汗解者三。又如陰虚及奪血。枯竭之極。用表藥全然無汗。用大滋陰潤燥生津藥數劑。而汗出如水。此不求汗而自汗解者四。總之疫邪汗法。不專在乎升表。而在乎通其鬱閉。和其陰陽。鬱閉在裏。苦寒攻利以通之。陽亢者。飲水以濟其陰。表裏無一毫阻滯。乃汗法之萬全。此時疫汗法。理不同於風寒。謹撮諸汗症。詳列於左。

發熱　惡寒　無汗　頭項痛　骨痛　腰痛　肩臂痛　膝髀痛　周身肢節痛

下法

時疫下法。與傷寒不同。傷寒下不厭遲。時疫下不厭早。傷寒在下其鬱結。時疫在下其鬱熱。傷寒裏症全罷。時疫裏症雖罷。與不罷。但兼裏症即

瘧上焦有邪亦可下。若必待結至中下二焦始下則危
下之不通而死者。傷寒一下即已。仲景承氣諸方。多
過三劑。時疫用下藥。至少三劑。多則有一二十劑者。時
疫下法有六。結邪在胸上。貝母下之。貝母本非下藥用
至兩許即能結邪在胸及心下。小陷胸下之。結邪在胸
脇連心下。大柴胡湯下之。結邪在臍上。小承氣湯下之。
結邪在當臍及臍下。調胃承氣湯下之。痞滿燥實。三焦
俱結。大承氣湯下之。此外又有本質素虛。或老人。久病。
或屢汗屢下後。下證雖具。而不任峻攻者。則麻仁丸。蜜
煎導法。豬膽導法為妙。下法之輕重緩急。總以見證為
主。詳列於後。

急下證

舌乾　舌卷　舌短　舌生芒刺　舌黑　齒燥
鼻如煙煤　胸腹滿痛　狂　沉昏　發熱汗多
身冷　呃逆

當下證

舌黃　讝語　善忘　多言　協熱利　頭腰痛
煩　躁

緩下證

舌淡黃胎　微渴　大便閉　小便黃赤　潮熱
齒燥

以上諸症。緩下者不下。則必漸至里而為當下症。當下
者緩下。則必加重而為急下症。急下者失下。則雖下
之多不通而致結熱自下逆上。此便滿直至心下。又逆
上透過膈膜。有至胸滿如石。咽喉鋸響。目直視反白。
或瞎盲。瞳散。耳聾。九竅不通。雖古有神丹。莫之能救矣。
列更有畜血畜水諸下法。前已散見諸條。茲再詳列
以便翻閱。

畜水證

小便不利　大便微利

畜血證

小便自利　大便黑　他若畜水畜血。在胸脇。不當
下者。此不贅。

清法

時疫為熱證。未有不當清者也。其在表宜汗。使熱從汗
減。汗法亦清法也。在裏宜下。使熱從下洩。下法亦清法

也。若在表已得汗而熱不退。在裏已下而熱不解。或未有熱無結。則惟以寒涼直折。以清其熱而已。故清法可濟汗下之不逮。三者之用。可合而亦可分。時疫當清熱邪之淺深。熱之淺者。在營衛。以石膏黃芩為主。柴胡葛根為輔。熱之深者。在胸膈。花粉知母蘆仁梔子豆豉為主。熱在腸胃者。當用下法。不用清法。或下而兼清亦可。熱入心包者。黃連犀角羚羊角為主。熱直入心臟。則難救矣。用牛黃犀可十中救一。須用至錢許。少則無濟。

非若小兒驚風諸方。每用分許。即可有效。當清諸症。詳列於左。

熱在營衛證

身熱汗自出。不惡寒反惡熱　身重　頸面項紅腫　周身紅腫　斑疹　鼻孔乾　唇燥　煩躁　遺尿　舌胎白

熱在胸膈證

身熱反減　渴　嘔　欬　咽乾　譫語　多言　胸前紅腫　舌胎厚白

熱在腸胃證

便血　便膿血　餘悉見下證條中

熱在心包及心證

狂　沉昏　多睡　舌黑

和法

寒熱並用之謂和。補瀉合劑之謂和。表裏雙解之謂和。因時疫之邪氣實。人之平其亢厲之謂和。所謂寒熱並用者。因時疫之熱。夾有他邪之寒。故用此法以和之也。凡方中有黃連與生薑同用。黃芩與半夏同用。石膏與蒼术同用。知母與草果

同用者。皆是。所謂補瀉合用者。因時疫之邪氣實。人之正氣虛。故用此法以和之。凡方中有參芪歸芍。與硝黃枳朴同用者。是。所謂表裏雙解者。因疫邪既有表症。復有裏症。故用此法以和之。凡方中有麻葛羌防柴前。與硝黃梔芩蒼澤枳朴合用者。是。所謂平其亢厲者。因時疫之大勢已去。而餘邪未解。故用此法而小其劑。緩其時日。或用清法而變其湯劑。易為丸散者。皆是。凡此和法。雖名為和。實寓有汗下清補之意。疫邪尤有宜和者。凡熱不清。用清涼藥不效。即當

其熱之所附麗。蓋無形之熱。為虛而無形之氣。如感夏炎熱。遇風雨即解。故人身之熱氣清即退。有所附麗之熱。為實而有物。如洪爐柴炭。雖沃以水。尤有沸騰之憂。必撤去柴炭而熱始退。凡熱之所附麗。非痰即血。徑清其熱。不去其物。未能有效。必視其附麗何物。於清熱諸方。加入何藥。效始能捷。此和法之精微神變者也。宜和之症。詳列於左。

寒熱往來　盜汗　口苦　咽乾　頭眩　舌強　渴　胸脇滿　耳聾　目直視　目不明　小便黃　嘔吐下利而心下

痛　口乾舌強而惡寒　大小便閉而寒熱　痞滿而悸　二便自利而舌胎　形體瘦損而舌胎　凡此表裏虛實寒熱相兼者不可枚舉。引此數端。可以類推。其有似和而實非和證者。詳後辨似條。

補法

時疫本不當補。而有屢經汗下清解不退者。必待祛而愈。此為病藥所傷。當消息其所傷在陰在陽。以施補陰之法。疫邪為熱症。傷陰者多。然亦有用藥太過反傷陽者。則補陰補陽。又當酌其輕重。不可偏廢。凡遇用汗下清和。而煩熱加甚者。當補陰以濟陽。所謂寒因寒用。

舌乾無胎　舌黑無胎　耳聾　目直視　目不明　服清涼藥渴不止　服清涼藥煩熱加甚　服攻下藥舌胎愈長　服攻下藥舌胎芒刺燥裂愈甚

服清涼藥身熱愈甚　身體枯瘦　用利水藥小便愈不通　腰膝痠軟　周身骨節痛不可移動　多睡

當補陽證

多冷汗　汗出身冷經日不回　小便清而多　大便清穀　嘔吐用清熱開導藥愈甚　自利用清下藥愈甚　痞滿

外此。更有四損。四不足。三復症。當補。詳見後。

四損

大勞。大慾。大病。久病後。為四損。氣血兩虛。陰陽並竭。後受疫邪。正虛則邪入愈深。邪深則傳化難出。汗下傷正。而正脫。補助鬱邪。而邪錮。多不可治。然補瀉兼施。間有愈者。有補瀉合用之法。有先補後瀉之法。有先瀉後補之法。凡人參敗毒散。人參白虎湯。黃龍湯。竹葉石膏湯。皆補瀉合用之法也。先用汗下。後施補劑。先瀉後補之法也。當詢病之來路。斟酌施治。尤當審現在之症。若純見實證。亦不可以疑似之見。悞人大凡周身俱見大實大熱之症。而一

二處獨見實症。則吃緊照顧其虛。周身俱見虛象。而一二處微見虛象。則吃緊幹旋其實。此治病之權衡也。若夫汗之而表症愈增。如頭痛身痛更甚之類。清下而裏症愈增。如煩渴痞滿更甚之類。則大虛有盛候也。急宜補之毋疑。既辨其症。尤當細辨其脈。凡遇脈之浮候盛大者。須謹察其沉候有無力處。六部脈皆盛者。須謹察其一部一候之真無力。便可設有未退。酌用清利。攻利為早。其病益甚。以上四不足。果得其一部一候有獨見。若神之妙。合前條四損。總不可正治其邪。必以養正為要。先服養

之脈理精詳。則燭照無遺矣。其損證之狀甚多。當參

四不足條看。

四不足

四損由人事。四不足由天稟。四損在暫時。四不足在乎素。然四不足。亦有由四損而來者。不可以四損之外。便無不足。四不足者。氣血陰陽也。氣不足者。息語言難出也。感邪雖重。反不成脹滿痞塞。凡遇此症。總宜宣伐。必以養氣為主。血不足者。面色癯黃。唇口刮白也。感邪雖重。面目反無陽色。總宜攻利。必以養血為

主。陽不足者。或四肢厥逆。或肌體惡寒。恒多泄瀉。至疫此等症。總欲攻利清熱。必先之以溫補。待其虛回。實症全見。然後以治實之法治之。陰不足者。自然五液枯竭。肌膚甲錯。感邪雖重。應汗無汗。應厥不厥。遇此等症。經宜攻利。必先之以養陰。待其氣化津回。邪多不治自退。設有未退。酌用清利。攻利為早。其病益甚。以上四不足。

仍當調補其虛。養正以和邪。祛邪以安正。互相加減。送為進退。直待邪盡去而正不傷。方為善治。

三復

三復者。勞復。食復。自復也。勞復者。大病後因勞碌而復也。不必大費氣力。即梳洗沐浴。亦能致復。之則復熱諸證復起。惟脈不沉實為辨。輕者靜養自愈。重者必大損臟府。待其表裏融和方愈。誤用攻下。清涼。必致不救。安神養血湯主之。若因飲食過多而復者。舌胎必復黃。輕則損穀自愈。重則消導始愈。若無故自復者。乃伏邪未盡也。當問從前所見何證。服何藥而解。今仍用前藥。以滌其餘邪則愈。時疫復症。有復至再三者。屢復之後。必兼四損四不足症。宜參前條加減進退之法治之。

辨似

凡病皆以虛實寒熱四字為大綱。時疫何獨不然。但虛實寒熱之真者易辨。似者難辨。前所列時疫表裏諸證。皆實邪熱邪。而實熱中亦有虛寒。四損四不足。皆虛邪寒邪。而虛寒中亦有實熱。余於逐條下已細辨之矣。茲有實症似虛。虛症似實。熱症似寒。寒症似熱。尤不可不細辨。故復通論而詳述之。所謂實症似虛者。即以表症論之。頭痛發熱。邪在表也。其脈當浮。證當無汗。而反自汗。脈無力。用發表藥。而身反疼痛。則似虛矣。故人惑於多自汗。而誤用桂枝湯者有之。惑於脈無力。而誤用建中湯者有之。惑於太陽篇。發熱惡寒。脈微弱。為無陽。而誤用四逆湯者有之。不知此等症。在時疫中。皆半表半裏。熱症之似寒症之似虛者也。又以半表半裏也。其脈當弦。而反浮。其口當渴。而有脈反沉。口不渴為內寒。而誤用理中者有之。不知此症。在時疫中。皆半表半裏。熱症之似寒者也。其脈沉者。邪伏在募原而未出表。故脈不浮。非陽虛也。其不渴者。邪未傳變。未入胃府。故不能消水。非內

此半表半裏之似寒者也。又以裏症論之。口燥咽
不得臥。邪在裏也。其脈當滑。其身當熱。其便當結。滑按
作洪。統云。滑者。陰氣有餘也。主痰飲。宿食。吐逆。諸症。
為氣血熾灼之候。主煩。主咽乾。表裏俱熱。二便濇痛。
而脈反沉微濇弱。身反四逆厥冷。大便自利。則
全似虛冷矣。人惑於脈之沉微弱濇。而用參茸者有之。惑於厥逆。而用桂附者有之。不知此等症。在時疫皆裏熱之似寒也。裏實之
似虛也。其脈沉微弱濇者。乃邪熱結於腸胃。氣不達於
營衛也。其身反厥冷者。乃邪熱結於裏。結於下。氣不達於

外。通於上也。其自利者。乃熱結痢流也。此裏證之實證
似虛。熱症似寒者也。總之時疫為熱因。與風寒之寒因
大異。故脈症雖有似虛似寒之時。而一辨其為時疫。則
屬邪自外至
不當為所惑也。所謂虛證似實者即以表證論之。頭痛
發熱身疼痛。自汗脈浮大。邪在表也。而屢用表散清涼
藥不惟不減。其症轉甚者。非藥力之不到。乃正氣不能
傳藥力達表。陰液不能隨陽氣作汗也。此邪在表時。虛
症之似實者也。氣虛者。加參芪於表藥即汗。陰竭者。加

潤劑於表藥即汗。若不知其氣血之兩虛。而宣表不已。
勢必暴厥而成脫症矣。更以半表半裏論之。胸脇痛耳
聾。嘔吐。如瘧狀。脈弦。邪在半表半裏也。而屢用和解消
導藥。不惟不減。其症更加者。非藥力之不到。乃中焦膿
胃傷而氣不運。肝木傷而火燥逆也。此疫邪在半表半
裏時。虛症之似實者也。必合四君六君於和解藥中。合
四物於清解藥中。始能戰汗而解。若更消導清解不已。
必至胃氣絕而死。更以裏症論之。舌胎黃黑裂燥芒刺。
胸腹脇膪硬痛。大小便閉六脈數大。邪在裏也。而屢用

攻利藥。或總不得利。或後更甚。非藥力之不峻。乃正
氣不能傳送腸胃。血液不能滋潤腸胃也。氣虛者。助氣
以資傳送。血枯者。養陰以藉濡滑。氣行津化。方得通利。
此疫邪傳裏時。虛證之似實者也。若不知其虛竭。而恣
意攻利。必沉昏癡頓而死。總之藥不中病。則傷正氣。傷
其下。則正氣浮越而上逆。傷其中。則正氣解散而外張。
脈症雖有似實似熱之時。而一詢其來路。若治之太過。
則虛氣從內奪。正氣奪則虛。明眼人不當為所惑也。夫
證而虛實互異。用藥懸殊。而生死攸分。將以何者為

之把柄乎。曰。以開卷所列氣色神脈舌胎。辨其是非疫。以曾經誤治與未經誤治。辨其時疫之為實虛別得其大綱。更細玩前所列各症。條分縷析之詳。又得其細目。則似是而非之症。斷不能惑矣。余於前各條下。每症已細辨其虛實。而此復重言以通論之者。正以前散見於諸條。恐讀者畧過。故復總論以提撕其為吃緊處也。至若寒疝似熱。則傷寒諸症有之。時疫絕無。故不論及云。

遺症屬病後不表裏症

發腫

時疫大勢已平。寒熱已解。而面目肢體浮腫。有食滯中宮。水停心下。氣復未歸三種。當分別以施治。食滯中宮者。乃病後脾胃大虛。不能消穀。病者胃中枯燥。偏欲多食。停心下臍上。則水不得上輸於肺。亦不能通水道下輸膀胱。故溢於肢體。而為浮腫。其症以心下臍上有硬處。按之則痛為異。小便或利或不利。當用平胃散加枳實山查麥芽萊菔子青皮神麯為主。硬處消。則腫自愈。或加茶澤。薏苡利水亦可。水停心下者。乃脾虛不能消水也。與食滯異者。心腹無硬痛。小便不利也。用茶澤車前木通之類。利其小便而愈。氣復未歸者。吳又可所謂病後氣復血未復。氣無所歸。故作腫也。不可治腫。調其飲食。節其勞役。靜養自愈。其異於停水食滯者。水停身重。小便不利。氣腫身輕。小便自利。食滯腹中有結。氣腫腹中自和也。

發頤

時疫愈後。有發頤者。乃餘熱留於營血也。速以解毒清熱活血疎散為主。誤則成膿。不出。而牙關不開。咽喉不利。多不能食而死。毒內陷而復舌燥神昏亦死。出膿後氣虛血脫亦死。故宜早治也。古方以普濟消毒飲為主。發在耳後。以柴胡川芎為君。在項下。以葛根為君。在項後或巔頂。加羌防。此症不可輕補於未潰之先。補早必成膿。尤不可純用寒涼於將發之際。恐閉遏而毒不得泄。故必兼疎散為要。外治。以蔥水時時洗浴之。

發瘡

瘡愈後。發瘡者極多。餘熱淫於肌肉也。多服清涼養

伏痿

濕疫愈後。四肢不能動移者。熱傷筋脈也。吳氏諸養榮湯酌用。輕者粥食調理自愈。

索澤

時疫愈後。身體枯瘦。皮膚甲錯者。熱傷其陰也。養陰為主。吳氏諸養榮湯酌用。亦有粥食調理自回者。

發蒸

時疫愈後。有發骨蒸如勞瘵者。乃餘熱留於陰分也。不可以其羸瘦。而遽用虛損門治法。必察其六府。有結邪者。經行已盡。則血海空虛。邪必乘虛而陷入血海。若見

腰脇及少腹滿痛者。大柴胡湯加桃仁赤芍。逐其血室之邪。始愈。凡婦人受疫。但見譫語。即當詢其經期。以防熱入血室之漸。

妊娠

妊娠感時疫。須治之於早。則熱不深入而傷胎。當汗當清之症。當速治不待言。當下之症。尤不可遲。若因妊娠而下傷胎之說。因循畧遲。則胎受熱蒸。而反易墮。一見此症。速下其熱。其胎反安然無事。蓋有病則病受之。內

婦人

婦人時疫。悉與男子同。惟當經期則治法畧異。以其屬乎血室也。凡遇感疫值經期者。治法必兼少陽。以少陽與厥陰為表裏。厥陰為藏血室。血室一動。邪必乘虛而

疫。當下失下。至於舌黑腰痛。少腹下墜至急。則其胎多死。用大人治疫清解諸法。減小劑料以治之則愈。小兒不能言。遇當下症。既不知其讓妄。復難驗其舌胎。則當驗其唇。ㄙ赤而燥。即是下症。此幼科之要訣也。

孕婦

孕婦受時疫。而時見驚搐。類於驚風。誤治多死。胎膜中。自欲墮矣。此時下亦墮。不下亦墮。然一ㄱ之胎。母猶可救十中二三。不下則母無生理。胎亦不能獨存。同一墮胎。而此善於彼。當明言於病家。而後施治下藥。雖三承氣皆可用。惟芒硝當慎。以其專主傷胎。非大實大熱大燥。不可試也。

小兒

小兒受時疫。悉與大人同。而時見驚搐。類於驚風。誤治多死。用大人治疫清解諸法。減小劑料以治之則愈。小兒不能言。遇當下症。既不知其讓妄。復難驗其舌胎。則當驗其唇。ㄙ赤而燥。即是下症。此幼科之要訣也。

大青龍湯　六神通解散
九味羌活湯　葵豉湯
大羌活湯　人參敗毒散
吳氏達原飲　小柴胡湯
炙甘草湯　柴胡四物湯
參胡三白湯　清脾飲
大承氣湯　小承氣湯
調胃承氣湯　人參白虎湯
黃龍湯　六味地黃湯
生脈散　四物湯
越婢湯　陽旦湯
黃芩湯　梔子豉湯
黃連解毒湯　小陷胸湯
導赤瀉心湯　豬苓湯
天水散益元散　柴葛解肌湯
吳氏三消飲　六君子湯
興脾湯　清燥湯

大柴胡湯
補中益氣湯
防風通聖散
瓜蒂散
平胃散
涼膈散
桃仁承氣湯
吳氏舉斑湯
三黃瀉心湯
橘皮半夏湯
大半夏湯
十棗湯
白虎湯
白虎舉斑湯
大陷胸圓
八珍湯
麻仁丸
荆防敗毒散
吳氏清燥養榮湯
三黃石膏湯
逍遥散
葛根葱白湯
吳氏承氣養榮湯
四苓散
茵陳蒿湯
犀角地黃湯
藿香正氣散
竹葉石膏湯
理中湯
二陳湯
白虎加蒼术湯
大陷胸湯
抵當湯
葛根芩連湯
天王補心丹
倉廩湯
四君子湯
附子湯
建中湯
吳氏蒌貝養榮湯
吳氏柴胡清燥湯
吳氏參附養榮湯
柴葛五苓散
異功散
吳氏安神養血湯
普濟消毒飲
吳氏柴胡養榮湯
吳氏人參養榮湯
犀角大青湯

大青龍湯
麻黃　桂枝　杏仁　石膏
甘草炙

加薑棗煎

六神通解散　趙法有川芎羌活細辛
麻黃一錢　甘草一錢　黃芩二錢　蒼术二錢
石膏一錢半　滑石一錢半　豆豉十粒

加葱薑煎

九味羌活湯
羌活一錢半　防風一錢半　細辛五分　蒼术一錢半
白芷一錢　川芎一錢　黃芩一錢　生地一錢
甘草一錢

加生薑葱白煎

要黎湯　一方有乾葛無菊花
要黎二錢半　麻黃五分　白薇五分　青木香五分
羌活五分　杏仁五分　川芎五分　甘草五分
石膏一錢半　菊花一錢半

白水煎

大羌活湯
羌活　防風　細辛
白术　川芎　黃芩　蒼术
甘草　防巳　知母　獨活
黃連

白水煎

人參敗毒散
人參　茯苓　甘草　枳殼
桔梗　柴胡　前胡　羌活
獨活　川芎　薄荷

加生薑煎

吳氏達原飲
檳榔二錢　厚朴一錢　草果仁五分　知母一錢
黃芩一錢　芍藥一錢　甘草五分

小柴胡湯
柴胡　黃芩　人參　半夏

甘草
加生薑大棗煎
炙甘草湯
人參　甘草炙　桂枝　阿膠炒粉
麥冬　生地　大麻仁
加生薑大棗水酒各半煎
柴胡四物湯
柴胡　半夏　人參　黃芩
甘草　當歸　川芎　白芍
生地
加薑棗煎
參胡三白湯
人參一錢半　白芍一錢半　柴胡二錢　白芍一錢半
白茯苓一錢半
白水煎。若脉微弱。口渴心煩。加麥冬五味子。若煩。口苦心下痞。加黃連枳實。若不眠。加竹茹。
枳朴黃芩湯
青皮　柴胡　厚朴　黃芩

半夏　甘草
茯苓　白朮
加生薑煎
大承氣湯
大黃四錢酒炒硝二錢　厚朴二錢　枳實一錢
白水煎
小承氣湯
大黃四錢　厚朴一錢　枳實一錢
白水煎
調胃承氣湯
大黃二錢酒炒硝二錢　甘草一錢
白水煎
人參白虎湯
石膏　知母　甘草　人參
加粳米煎
黃龍湯
大黃三錢　芒硝二錢　厚朴一錢半　枳實一錢
甘草一錢　人參一錢半　當歸二錢

加生薑五斤大棗一枚煎
六味地黃湯　熟地　山藥　山萸肉　茯苓
丹皮　澤瀉
新汲井水煎
生脉散　人參　麥冬　五味子
白水煎
四物湯　白芍　熟地　川芎　當歸
新汲井水煎
越婢湯　麻黃　石膏　甘草
加生薑大棗煎
陽旦湯　桂枝　芍藥　甘草　黃芩
加生薑大棗煎
黃芩湯　黃芩　甘草
加大棗二枚
梔子豉湯　梔子　香豉
先煮梔子後入香豉白水煎
黃連解毒湯　黃連　黃柏　黃芩　梔子等分
白水煎
小陷胸湯　黃連　半夏　栝蔞實
先煎栝蔞實後內二味白水煎
導赤瀉心湯　黃連酒洗　黃芩酒洗　山梔薑汁炒　滑石飛
知母盞酒拌犀角鎊　麥冬去心　茯苓各一錢　甘草生　人參
加燈心生薑大棗煎
豬苓湯　豬苓　茯苓　阿膠　澤瀉

滑石各一兩
白水煎
天水散加硃砂名益元散
滑石六錢　甘草一錢
研細末井水或燈心湯調
柴葛解肌湯捷法加石膏一錢
柴胡　葛根　甘草　黃芩
芍藥　羌活　白芷　桔梗
加薑棗煎

吳氏三消飲
檳榔　厚朴　草果　知母
黃芩　芍藥　甘草　羌活
葛根　柴胡　大黃
加薑棗煎
六君子湯
人參　白朮　茯苓　炙草
陳皮　半夏
加薑棗煎

調脾湯一方無白芍
人參　白朮　黃芪　茯神
棗仁　遠志　木香　當歸
白芍　炙甘草
加桂圓肉薑棗煎
清燥湯
蒼朮一錢炒白朮五分炒黃芪一錢半人參三分
茯苓三分　黃連一分炒黃柏二分炒
陳皮五分　猪苓二分　澤瀉五分　升麻三分
當歸二分酒洗生地黃二分
白水煎
大柴胡湯
柴胡二錢　大黃二錢　枳實一錢
半夏一錢　白芍一錢　黃芩一錢
加生薑三錢大棗一錢煎
吳氏清燥養榮湯
知母　天花粉　當歸身　白芍

甘草　生地汁
加燈心煎
陳皮
補中益氣湯
人參　白朮炒
陳皮　當歸
加薑棗煎
黃芪蜜炙　炙草
三黃石膏湯
升麻蜜炙　柴胡炒
黃柏　黃芩
淡豆豉　府黃
黃連　梔子
加生薑大棗細茶煎熱服
防風通聖散又名雙解散
防風　大黃
當歸　芍藥
芒硝　荊芥
麻黃　桅子
連翹　甘草
桔梗　石膏
滑石　薄荷
黃芩　白朮
川芎
加生薑葱白煎
逍遥散

柴胡　當歸　白芍
茯苓　甘草　薄荷
加煨薑煎
瓜蒂散
甜瓜蒂炒黃赤小豆
共為末熟水或薑水調量虛實服或用嗆鼻
葛根白湯
葛根　芍藥　知母
加葱白生薑煎
平胃散
蒼术　厚朴　陳皮
加薑棗煎
吳氏承氣養榮湯
知母　當歸　芍藥
大黃　枳實　厚朴
加薑煎
涼膈散
芒硝　大黃酒浸　山梔
連翹

白朮
川芎
甘草
生地黃

黃芩酒炒　甘草
加竹葉蜜煎
四苓散吳氏有陳皮無白朮亦名四苓散
茯苓　猪苓
白水煎
桃仁承氣湯
大黃　芒硝
桂枝　甘草
白水煎
菌陳蒿湯
菌陳　大黃
白水煎　梔子
吳氏舉斑湯
白芍一錢　當歸一錢　升麻五分　白芷七分
柴胡七分　穿山甲二錢炙
加薑煎
犀角地黃湯
犀角　生地
丹皮　芍藥

白水煎
三黃瀉心湯湯液論有黃芩　保命集有甘草
大黃　川黃連
以麻沸湯漬之須臾絞去滓溫服
藿香正氣散
大腹皮　紫蘇　藿香　甘草
桔梗　陳皮　茯苓　桃仁
厚朴　半夏麴　白芷　蒼朮
加薑棗
橘皮半夏湯
陳皮　半夏
加生薑煎
竹葉石膏湯
人參　半夏　麥冬　甘草
竹葉　石膏
加粳米生薑煎
大半夏湯
半夏　人參　白蜜

以水和藥窒揚之二百四十遍再煎

理中湯　人參　白朮　炒乾薑　炙甘草

十棗湯　芫花熬　甘遂　大戟等分

大棗十枚煮湯內藥末強人服一錢七

陳湯　陳皮　半夏　茯苓　甘草

白虎湯　石膏　知母　甘草　加粳米

白虎加蒼术湯　即白虎湯加蒼术

白虎舉斑湯　石膏　知母　甘草　人參　白水煎

大陷胸湯　芒硝一升　甘遂一錢為末

先煮大黃去滓內芒硝煮一二沸內甘遂末溫服

大陷胸圓　大黃八兩　芒硝　薄荷炒　杏仁去皮尖各半升

合研取彈大一丸別搗甘遂末一錢白蜜二合煮

服

抵當湯　水蛭三十箇熬黑　蝱蟲三十去頭足翅　桃仁三十去皮尖研　大黃四兩酒浸

白水煎

八珍湯　人參　茯苓　白朮　甘草　當歸　熟地　白芍　川芎

葛根芩連湯　葛根　黃連　黃芩　甘草　白水煎

麻仁丸　麻仁二升　芍藥半斤　大黃去皮一斤　枳實一斤

厚朴一尺去皮炙杏仁一升去皮尖熬別作脂

煉蜜丸

天王補心丹一方有石菖蒲四錢無五味子　方有甘

生地四兩酒洗人參五錢　元參五錢炒丹參五錢炒

茯神五錢　遠志五錢炒去心　棗仁一兩炒

五味子一兩炒　天冬一兩去心　麥冬一兩去心　當歸一兩洗

柏子仁一兩去油炒

蜜丸硃砂為衣燈心湯下

荊防敗毒散

荊芥　防風　柴胡　羌活

獨活　前胡　川芎　枳殼

人參　甘草　桔梗　茯苓等分

加薄荷葉煎

倉廩湯

人參　茯苓　甘草　前胡

柴胡　羌活　獨活　桔梗

枳殼　川芎

加薄荷葉煎

四君子湯

人參　白朮　茯苓　炙甘草

加薑棗煎

異功散

人參　白朮　茯苓　炙甘草

陳皮

加薑棗煎

附子湯

附子　白朮　白茯苓　白芍

人參

白水煎

吳氏安神養血湯

茯神　棗仁　當歸　遠志

桔梗　芍藥　地黃　陳皮

甘草

加龍眼肉煎

建中湯此小建中湯

桂枝　芍藥　甘草

白水煎
普濟消毒飲
黃芩　黃連
元參　生甘草
薄荷　連翹
馬屁勃　白殭蠶
白水煎
吳氏蔓貝養榮湯
知母　花粉
瘟疫明辨　卷下　十七
橘紅　白芍
白水煎
吳氏柴胡養榮湯
柴胡　黃芩
花粉　當歸
知母
加生薑大棗煎
吳氏柴胡清燥湯
柴胡　黃芩
人參　桂枝
桔梗　柴胡
鼠黏子　板藍根
升麻
白水煎
吳氏蔓貝養榮湯
當歸一錢　白芍一錢
瘟疫明辨　卷下　十八
附子七分炮炒乾薑一錢
白水煎
犀角大青湯
犀角上　大青中
升麻中　黃連中
山梔中
水二鍾煎一鍾
柴葛五苓散
柴胡　葛根
豬苓　白朮
茯苓　桂枝
人參　麥冬
當歸身　白芍
甘草
白水煎
吳氏人參養榮湯
人參　麥冬
當歸身　白芍
甘草
知母　五味
知母　陳皮
瘟疫明辨　卷下　十九
附子七分炮炒乾薑一錢
白水煎
犀角大青湯
犀角上　大青中
升麻中　黃連中
山梔中
水二鍾煎一鍾
柴葛五苓散
柴胡　葛根
豬苓　白朮
茯苓　桂枝
知母　地黃
陳皮　甘草
生地三錢　人參一錢
瘟疫明辨　卷下　二十
玄參中　甘草下
黃芩中　黃柏中
終

跋

自又可出而溫疫明特其書流布於人間者尚寡吾鄉劉氏鏤板以廣其傳救世之心亦云切矣奈何世之人遵信弗篤終不能按證施方起沉疴而救夭枉也庚午秋吳孚坤也持此本示余謂得自金陵客舍汪子嶼峰見而悅之相與訂正者有年今欲壽諸梨棗以當寶筏余披閱再過其辨論詳明證治精備雖不習岐黃之業者亦可以對證檢方救危急於反掌比挽回造化之功豈淺鮮哉是書出而火接薪傳不惟又捉筆之苦心與今日梓行之善舉均可不泯書之幸歟抑世之幸歟白沙臧錫麟跋

廣瘟疫論序

瘟疫一證歷代明哲具有成方如仲景有大青龍湯陽且湯越婢湯白虎湯大小柴胡湯三承氣湯麻黃升麻湯諸條列瘟疫之見證為汗法下法和法雙解法輕重深淺纖毫備具特散見於諸經條中而未嘗直捐其名為瘟疫非不欲明言也其書本傷寒立論而瘟疫自上古文辭簡易詳於論瘟疫之書且上古文辭簡易詳於辨證而不詳於立名欲人從證止細辨則本必於名上區別而自無混淆之失嗣是而後河間有宣明五氣論則論瘟疫較詳立法更備如桂苓甘露飲黃連解毒湯三色效方涼膈散人蔘石膏湯雙解散諸方皆是而亦未亟其名易老東垣大羌活湯九味羌活湯立方更備而亦無專書無特名至吳又可先生貫串古今融以心得著時行瘟疫一論真可謂獨闢鴻蒙揭日月於中天矣顧其書具在而時賢有未見而不用其法或雖見其書而不能信者無怪矣有口誦其書嘖嘖稱道而對證施方仍多不用其法口則曰此時證也而手則仍用傷寒之方拘傷寒之法者比比皆然愚揣其情必非知而不用也知其名而未得其辨證之法耳愚目整心傷不

揣固陋而取吳子之原本或註釋或增訂或刪改意在辨瘟疫之體異於傷寒而尤慎辨於見證之始故首增辨氣辨色辨脉辨舌辨神諸論於開卷使閱者一見瞭然則吳子之書人人可用而瘟疫之糝天者少生全者多誠斯世斯民之幸也上元戴天章自序

麟郊甫識於存存書屋

乾隆四十八年歲在癸卯夏五月望日孫男嗣琦謹書

六淫之邪中人爲病風寒尤甚益風者善行數變其勢猛急寒者收引拘束其氣堅凝故其病人也不假少貸而爲患至速各家醫書均首列中風傷寒二門以示後學習是業者咸致力於風寒以求諸病擯而无之觸類引伸固無所不概若執而守之亦不免刻舟求劍而廢遺實繁雖長沙有論後學註釋繁多究使指歸不定以致溫溫時疫漏而不講迨災又可瘟疫論出稍使人知燒與傷寒只塗異歸不可拘傷寒瀋南沿疫微其辨悉猶未若廣瘟疫論之提綱挈領

曉暢明白能使不習醫者洞然領畧也予於庚寅偶得此書故友王村舟言是書乃金陵前董麟郊公載公存存書屋之稿本近爲僕徵鄭氏所刻發坊未久板已散失坊間竟無覓處予每惜之庚子遷居北城偶識國子學正戴敬咸先生乃知麟郊公爲先生之祖因叩及是書藏本與予所得者相校譬一字無訛雖鄭氏前刻未嘗存存書屋之來由道出情似掠美然非其前刻傳則予亦不得覩見而無由與敬翁先生擬與共源毋因遞悉梓行以繼前徽王寅冬正在

付梓尚未蔵工而敬翁先生忽嬰疾而逝令其嗣掇
輯成是書囑予紀其本末予亦不敢以固陋辭謹敘
其事以紀麟郊公之作美於前而得其賢嗣繼美於
後庶此不刊之書得以永垂雷壇救濟生靈實可主
張長沙之功而庶醫林後學於不淺矣
乾隆四十八年歲次昭陽單閼氏皐月會稽沈懋聲
拜撰

張仲景傷寒論不止爲傷寒一證用也經絡腑臟表
裏洞然譜讀者誠擴而充之運用不窮故爲醫門聖
書獨瘟疫一證治法又別其始末疑似之交非更有
善本剖析精詳終不免臺釐千里之誤此洞庭吳氏
之書紹仲景而獨闢其奧也況瘟疫病多眞傷寒病
少其於濟世尤急舊稱長沙於傷寒論外兼有治疫
之書而世遠失傳洵可惜也余弱冠習舉子業兼從
田淑姜先生讀軒岐素諸書於吳氏書
究心嗣嵇山家叔授以存存書屋廣瘟疫論抄本知
爲鄉先輩麟郊戴瞻公所著命管篇分類亦從吳氏書
折衷而出內增辨證八兼證五夾證十條分縷析尤
爲壽世良法數年來每於風雨雞鳴講明切究及臨
證時覺有得心應手之妙益信是書之爲功大也辛
丑冬晤贈公文孫未堂先生幸將出其藏本刊板行
世庶可公諸海內用垂不朽並囑余誌其端末爰敬
跋數言以附卷後
乾隆四十七年歲次壬寅冬十月既望江寧後學程
家垚葵百氏頓首拜識

先大父北山先生以通儒窮醫學所論著傷寒雜病諸書及紘論註瘡論註廣瘟疫論凡十數種皆先世父雪村先生行楷細字錄藏於家近書坊中有刻本瘟疫明辨四卷祖啟購閱之即先大父存存書屋廣瘟疫論也雖易其名幸未改竄其文不知何人誤刻爲紘人鄭某之書在先大父固不爭此而子孫見之不容不正也因出存書逐原本校而刻之以糾譌傳廣先德因嘆傷寒一書註者百家至程郊倩實爲獨闢鴻獨闢鴻濛後有慈溪柯韻伯論翼出而傷寒之書嘆觀止矣瘟疫一證古無成書至吳又可實爲獨闢鴻濛更有先大父此書出而瘟疫之書嘆觀止矣事固有更閱數千年而後得所折衷者此類是也代生名賢氏何幸歟

乾隆四十七年歲在壬寅秋七月望後二日孫男祖啟謹識

上元縣志

戴天章字麟郊邑庠生少師林青雷習舉子業好學強記所讀經史能通部遊背如瓶瀉水壯謂時文手祿不足爲研求有用之學自天目地理算數射弋以及書畫琴奕之類無不探微極要尤精醫理博覽深思活人無算謝之金揮不受四方淹雅名流至必下榻請教性樂推解發粟中或棄就貧輒贈餘資歸而舉火課諸子督以勤苦力學晚號北山學者稱北山先生長子瀚字巨川雍正元年癸卯一甲第二人恭

縣示

遇

子官御史再遇

單恩勅贈文林郎翰林院編修例贈中憲大夫乾隆辛卯孫翼

單恩馳贈朝議大夫如其官

廣瘟疫論目次
上元戴天章麟郊甫著
卷之一
一辨氣
三辨舌
五辨脉
時疫與風寒異受
兼寒
兼暑
兼痢
兼痛
夾食
夾血
夾腎虛
夾疝
夾咳喘
卷之二
表證
發熱
寒熱往來
頭眩
二辨色
四辨神
時疫與風寒異氣
辨傳經
兼風
兼瘧
夾痰水
夾鬱
夾脾虛
夾吐血
夾心胃痛
惡寒
頭痛
頭脹
目脹
項强酸
背痛酸
腰痛酸
脇痛酸
胫痛酸
足萸
肩背痛酸
腕痛
周身骨節酸痛
拘攣
身重
自汗
盜汗
戰汗
狂汗
頭腫
面腫
頸項腫
卷之三
裏證
耳旁腫
胸紅腫
周身紅腫
發黃
發疹
發斑
煩躁
嘔
渴
口甘
唇燥
齒燥
鼻孔乾
耳聾

鼻如烟煤　鼻扇張
咽乾　咽痛
舌燥　舌強
舌疵　舌卷短
胸滿病　脇滿痛
腹滿病　少腹滿痛
白利　便血
便膿血　大便閉
小便不利　小便黃赤澁
少便多　澁屎
讝語　多言
善忘　狂
循衣摸床撮空　沉昏
身冷　多睡
吐蚘　呃逆
卷之四　下法
汗法　和法
清法　四損
補法

四不足　三復
辨似
遺證爲病後不表裏證
發腫　發頤
發瘡　發癍
索澤　發蒸
婦人　妊娠
小兒
藥
諸方

一第一〇三　冊　續修四庫全書　第　頁　正　內

廣瘟疫論卷之一

一辨氣

風寒氣從外收斂入內。病無臭氣觸人。開有作臭氣者。必待數日轉陽明府證之時。亦只作腐氣。不作屍氣。瘟疫氣從中蒸達於外。病即有臭氣。觸人輕則盈於床帳。重則蒸然一室。且專作屍氣。不作腐氣。以入身藏府氣血津液。得生氣則香。得敗氣則臭。瘟疫敗氣也。人受之自藏府蒸出於肌表。氣血津液逢蒸而敗。因敗而溢。溢出有盛衰。充塞有遠近也。五行原各有臭氣。木膟金腥心焦脾香腎腐。以臭得其正。皆可指而名之。若瘟疫乃天地之雜氣。非膟非

腥非焦非腐。其觸人不可名狀。非鼻觀精者不能辨之。試察廁間糞氣與凶地屍氣自判然矣。辨之既明。治之毋惑。知為瘟疫而非傷寒。則凡於頭痛發熱諸表證。不得誤用辛溫發散。於諸裏證當下者。亦不得遲回瞻顧矣。

二辨色

風寒主收斂。斂則急。面色多鮮急而光潔。瘟疫主蒸散。散則緩。面色多鮮緩而垢晦。入受蒸氣。即津液上溢於面頭目之間。多垢滯。或如油膩。或如煙熏。望之可憎者。皆瘟疫之色也。一見此色。雖頭痛發熱不宜而用辛散發散。一見舌黃煩渴諸裏證。即宜吹下。不可拘於下不厭遲之說。

三辨舌

風寒在表。舌多無苔。即有白苔亦薄而滑。漸傳入裏。方由白而黃。由黃而燥。由燥而黑。瘟疫一見頭痛發熱。舌上即有白苔。且厚而不滑。或色兼淡黃。或如粉。若傳經入胃。則兼二三色。又有白苔即燥。與至黑不燥者。大抵疫邪入口。舌苔頗類風寒。以兼濕之故。而不作燥耳。惟在表時舌苔白厚異於傷寒。能辨於在表時。不用辛溫發散。入裏時。和用清潤。故下斯得矣。

四辨神

風寒之邪傷人。令人心神所苦。而神自清。如頭痛作寒熱之類。皆自知之。至傳裏入胃。始神昏譫語。緣風寒為天地正氣。人氣與之乖忤。而後成邪。故其氣不昏人神情也。瘟疫初起。令人神情異常。而不知所苦。大槩煩燥者居多。或如癡如醉。擾亂驚悸。及問其何所苦。則不自知。即間有神清而能自主者。亦昏昏夢夢。不安閉目。即有所見。即有所見。譫妄之根緣。瘟疫為天地邪氣中人。入病中物。傷故其氣。專昏人神情也。

五辨脈

瘟疫之脈傳變與風寒頗同。初起時與風寒迥別。風寒從皮毛而入。一二日脈多浮。或兼緊兼緩。兼洪而皆浮。迨

傳入裏。始不見浮脈。其至數亦清遲而不糢糊。瘟疫從中道而變。自裏出表。一二日脈多沉。迨自裏出表。脈始不沉。乃不浮不沉而數。或兼弦兼大。而皆不浮。其至數則糢糊而不清楚。其初起脈沉遲。勿作陰寒。陷沉者邪在裏也。遲者邪在陰分也。脈象同於陰寒。而氣色苔神情依前諸法辨之。自不同於陰寒。或數而無力。亦勿作虛視。緣熱蒸氣散。脈不能鼓指。但當解熱。不宜補氣。受病之因有不同。故同脈而異。斷也。

辨時行疫癘與風寒異氣

風主疎泄。寒主凝泣。二氣雖有不同。然皆冷而不熱。其中人也。鬱而不宣。方其初受在表。均宜溫散。麻黃湯桂枝湯芎蘇十神神术等方。皆散寒之劑。非解熱之劑。非散寒之劑。屬濕溫二氣合成熱而不冷。其中人也。直而不行。之氣初傳在表。即宜凉解。大青龍湯六神通解散九味羌活湯歲摩湯大羌活湯人參敗毒散。皆解熱之劑。非散寒之劑也。以解熱之劑治風寒。輕則寒中喘利。重則厥逆亡陽。以散寒之劑治瘟疫。輕則渴讝妄。重則枯竭亡陰。此氣之不可不辨也。泣通濇

辨時行疫癘與風寒異受

風寒從表入裏。自皮毛而肌肉。而筋脈。而胸膈而腸胃。一層不能越此而入。彼故汗不厭早。下不厭遲。為和為解。淺深毫不可紊。以其氣皆屬熱熱能作燄。不必鬱變而此燄即帶彼熱。當其未出表時。強欲溫表。在始則引毒熱成燎原之勢。為斑劒狂喘諸凶。在末則傷眞陰。為枯槁沉疴。皆願逆諸危也。

辨傳經

溫疫傳經與風寒不同。風寒從表入裏。故必從太陽而陽明而少陽而入胃。若溫疫則邪從中道而出表入裏。惟視人何經本氣之強弱為傳變。故吳又可曰。疫邪有先表後裏者。有先裏後表者。有但表不裏者。有但裏不表者。有表裏俱病者。有表而再表者。有裏而再裏者。有表裏分傳者。此為九傳。愚按所謂表者。發熱惡寒。頭痛項強。背痛腰疼。腿膝足脛酸痛。自汗無汗。及頭腫面腫。耳目亦腫。項腫發斑發疹皆是。謂裏者。渴嘔胸滿。腹滿腹痛。脇滿脇痛。大便不通。大便泄

濕小便不通小便黃赤濁病及煩躁譫妄沉昏舌強口咽赤燥皆是在風寒從表入裏裏證
鬱而成故見表證不必兼見裏證且入裏後表象自解
故見裏證之後不必復見表證若瘟疫本從中道而出表
證見表證時未有不兼一二裏證者且未有不兼見一二
半表裏之少陽證者仲景辨治陽明少陽合病必自下利
三陽合病脈浮大上關弦細沉遲陽明合則汗三陽合病
腹滿身重難以轉側口不仁而面垢譫語遺尿皆指瘟疫
則非指風寒言也且瘟疫屬燕氣出表入裏原自不常有
入裏亦之而不盡仍可出表者當見證妄沉昏之後

病愈數日復發寒發熱復從汗解者此所謂表而再表
亦達頭痛發熱得汗而解者此所謂裏而再裏風寒必無是也若
仍待大下而後愈者此所謂裏而再裏風寒必無是也若
去表裏分傳之證風寒十無一二疫證十有六七但據傳
經之專雜以辨之一經專見一經證者多疫證日久漸轉
二三經證者多疫證日久漸轉屬者多風寒一日驟傳一
二經或二三經者多疫證則雖病有變態而風寒不混於
疫證疫證不混於風寒施治自無訛誤矣

至若辨氣辨色辨舌辨神俱已清楚而投之以涼藥逆折取效也間有表見身痛宜用香蘇散

見腹滿宜用蒼术者再時疫兼暑則病勢反緩以疫中寒氣屬亢陽暑爲陽中之陰陽得陰則解雖不能盡解然得一分陰氣則和一分亢陽每見時疫兼暑其證妄語燥諸證反緩者聊此故也

兼瘧

時疫有似瘧有轉瘧有兼瘧之不同用藥亦有微異似瘧者寒熱往來或一日二次或一次而時無定也時疫初起多有之轉瘧者時疫證妄煩渴大劇之後已經大汗大下汗有餘邪不解復作寒熱轉成瘧象也時疫未路多有宜清之證多瘧之暑氣停則爲痎瘧也其證寒熱有常期瘧證之兼瘧之證初起寒重熱輕者全具但熱多寒少且多燥渴擾亂譫語勢迅速神情昏憒穢氣觸人爲異秋令多有之時疫所以似瘧者因邪氣盤錯於膜原欲出表而不能透達欲陷裡而未得半降故見半表半裡之少陽證也治法宜達原飲加柴胡爲主時疫所以轉瘧者因汗下後邪氣已衰正氣來復邪正相爭故在先陽氣獨亢有熱無寒者今則以陰液潮回而寒熱相爭矣在先邪氣熏蒸晝夜燥熱無休也時者今則邪氣潮退正氣漸復而寒熱發作有時矣治法以養正爲主祛邪佐之小柴胡湯炙甘草湯柴胡四物湯參胡三白湯是餘邪之盛衰視陰陽之盈虛酌而用之至若兼瘧之證最爲難治異又可曰瘧疾二三發或七八發後忽然譫妄煩熱發渴不惡寒舌上苔刺心腹痞滿飲食不進下證漸具此時疫證見而瘧證隱也以疫證方藥治之則劇治之如法脈靜身涼每日或間日寒熱復作有常期者時疫解而瘧邪未盡也仍以瘧法治之愚按時疫與瘧病不甚相遠疫乃溫濕二氣合病瘧乃風寒暑溼四氣合病其邪氣之襍而不純相類瘧邪橫連募原時疫亦然於募原其受邪之處相類但時疫之溫氣發則爲亢陽故宜下宜清之證多瘧之暑氣停則爲鬱滯故宜宜利之證多耳所以時疫初起方用達原飲與瘧之主方用清脾飲

一遇此等更當辨其受寒與時疫孰輕孰重疫重寒輕者煩躁證多無汗惡寒少則當以敗毒散加知母石膏或達原飲加羌防柴葛或六神通解散尤捷寒重疫輕者寒無汗證必甚煩躁必輕則只用敗毒散其寒來於外無汗惡寒既甚疫鬱於內煩躁更甚者冬月大青龍湯可借用餘月九味羌活湯最爲的當此證若治寒遺疫必有瑕疵利胸膈痞滿之變劇黃狂岫之變治疫遺寒復有厥逆嘔利至沉困者不少不可不知然此皆爲初起一二日言也若日久則邪疫勃發表裏不能自存而變爲熱則惟以治疫之法治之而已

其一有兼風者初起一二日表證與時疫悉同惟鼻塞鼻鳴噴嚏咳嗽與時疫略異脈亦多浮而與時疫之不浮不沉而數者微異治法不大相遠即於時疫諸方中加荊防咳加前胡杏仁蘇子而已大抵時疫着寒能令病勢增重兼風反令病勢易解以寒主凝泣則疫邪內斂一分病勢增痼一分風主游揚則疫邪外疏一分病勢解散一分泣全清

兼暑

時疫兼寒兼風四時皆有至若兼暑一證惟長夏有之初

藥品亦多相類至其傳變則緩急輕重迥乎不同也善悟者於此處細參思過半矣

兼痢

時疫本多自利證表證初起即每日解數次稀臭水者是也詳見後自利條下更有舂夏之交得時疫即兼下利然自而裏急後重者名爲疫痢初起懊不可從痢治證痢屬裏證今兼疫邪之發熱頭痛爲表裏俱病先用治疫之法解其表表解而裏自和其痢多有不治自愈者若用治痢之法先清其裏裏氣虛而表邪陷輕者增其煩躁沉困重者遂至嘔逆昏憒而危矣所以古人於疫痢初起專主倉廩湯其方乃人參敗毒散一意解表但加陳倉米以和中養脾胃俟表證解後裏熱證具方可議清議下不但香連芍藥承氣之類宜緩即淡滲分利之劑亦宜緩投於表證未解之先也若太陽證不見而微見少陽陽明證者則柴葛五苓散不妨借用痢證夾表不可清裏不特時疫兼證爲然凡一切痢證微兼身熱即宜愼用苦寒淡滲用之若早必增嘔逆此歷驗不爽者疫證兼利其熱勢反多緩亦由痢爲暑氣陽中之陰能和亢陽且鬱蒸之熱有所疏泄故也若疫毒太甚驟發即下純紅純紫惡血或兼見舌燥譫妄諸惡證者黃連大黃又在急用不可拘此論矣

以上五條其辨明所以爲瘟疫兼證固已不悖逐類詳審然總以前所備具氣色舌神脈五辨爲主五者之中必有一二確據方於疫門求治否則各按各門施治可也若混以時疫治之爲害甚矣

夾痰水

飲入於胃經蒸變而稠濁者爲痰未經蒸變而清稀者爲水痰與水一物也痰能作熱水能作冷時疫屬熱證故夾痰者更增其熱脈證治法無甚參差但於治疫藥中加瓜蔞貝母甚則加牛黃夾水者脈證往往相悖治法則有不同不可不細辨也時疫之脈必數而夾水在胸膈其脈多

緩甚則遲弦此脉夾水之辨也時疫之舌一經傳裏即轉黃轉燥轉黑若有水在胸膈則煩躁譫妄沉昏諸證備具而舌色白潤間有轉黃黑者亦必仍有白苔或滿舌黃黑半邊夾一二條白色或舌尖舌本俱黃中夾一段白色此舌夾水之辨也時疫胸滿心下硬痛手不可按一有水在胸膈心下雖滿痛按之則軟略加揉按則漉漉有聲此證夾水之辨也時疫見夾水脉證雖有表不宜純用辛涼發散純用辛涼則表必不解而轉加昏憒此水氣鬱遏熱邪陽氣受困苦寒早用苦寒必轉加辛燥利氣利水之品以祛水氣迨水氣去鬱遏發然後議攻議涼則無不效者矣燥濕則半夏茯苓利水則水通苓澤利氣則氣旅草果木香甚至有須用大戟芫花者在時疫雖屬熱邪往往有投三承氣苦乃白虎而不效偶用溫暖藥收功者迭相訟清熱之非不知熱邪乃其本氣夾雜乃其間氣也

夾食

時疫夾食者最多而有食填膈上食入腸胃之不同入腸之路食填之則氣閉氣閉則熱鬱於下而無所疏泄譫妄沉昏則熱鬱於內故外無發熱證熱鬱於下故上無口渴證疫熱以出表為輕入裏為重在裏為輕入深為重此神舌脉辨得為疫證矣而遇脉沉手足冷即當細詢其胸膈若疙塞悶滿即是夾食再辨其舌苔白厚而微兼淡黃益為食填膈上之明驗於治疫藥中加枳桔青皮萊菔子藥甚則用吐法以宣之使膈開而陽氣宣達然後熱證自見當解表當清裏自無誤治矣

夾鬱

雖有疫氣鬱者初起疫證悉同而多脉沉手足冷逼迫胸滿頗類夾食但夾食為有物為實邪舌苔厚白而微黃膩膈滿痛不可按而亦不移夾氣為無物為虛邪舌苔白薄胸膈滿痛串動而可按宜先宣通其鬱然後解表清裏自無不效若不舒鬱而徒發表則裏氣不能外達而難於徹汗遽用清下則上氣不宣多致疙逆惟於解表藥中加蘇梗木香大腹皮香附等類以宣其氣則表易解於清裏藥中加川貝母以舒其鬱則裏易和貝母為舒鬱要藥但力性緩必用至五錢一兩方能奏效

夾血

時疫傳裏之後。畜血最多。治從攻裏。茲不具論。惟本有內傷停瘀。復感時疫。於初起一二日。疫之表證悉具。而脉或芤或滑。廑類陽證。陰脉但須細詢其胸腹脇肋四肢有痛不可按而濡者。即為畜血確驗。其乳濟非陽證見陰脉。乃表證見裏脉也。治法必兼消瘀。紅花桃仁歸尾赤芍元胡之類。量加一二味。表邪方易解。若乳濟為陰脉。而投溫劑。轉變劇重者危矣。

夾脾虛

時疫較之風寒本為難治。以風寒傳變有次序。時疫傳變無常經。風寒表邪一發即散。時疫散而復集。且往往復之再三。風寒傳裏證一攻即和。時疫攻而復合。有下至一二十次者。此時疫之難治也。而脾虛者更為難治。蓋時疫必得汗下而後解。脾虛者表不能作汗。裏不任攻下。或得汗而氣從下脫。治此等論汗勿強汗。攻裏必兼固發表。必兼養正。人參敗毒散是也。下勿輕攻裏。必兼固氣生津。液黃龍湯是也。其外證無大分別。惟脉不任尋按。然邪有進退。當其邪進方張之時。脉亦有尋按有力者。不可泥也。必合氣色神情厥以相參。如面色赭黃。神情倦怠。氣息微促。及心悸耳鳴。皆脾虛中氣不振之象。更須通體合參。如通體皆見有餘實象。而獨見一二虛象。則虛象反為掩蔽。須權衡標本。凡證之屬裏屬中焦下焦屬五臟皆為本。若實證居標。虛證居本。則虛證為重。虛實關頭。必着意審詳。庶幾無失。

夾腎虛

時疫夾脾虛者為難治。夾夾腎虛者更難。時疫屬熱證。腎氣虛則手足冷。時疫屬實邪。腎氣虛則眩暈。悸。腰膝痠軟。腎虛之中又有陰虛陽虛之分。時疫必待汗下清而後解。陽虛者一經汗下。清則脫絕之證隨見。陰虛者一經汗下。則枯竭之證隨見。必須時時諦察。凡在表時見腰痛異常。小便頻數。脉脛冷軟。其人平日非有淋濁陽痿。即係遺洩好內。須詢明。于通表藥中加入參白芍。陽虛兼杜仲。陰虛兼知母。以照顧腎氣。免後來意外之變。若入裏當下。必以陶氏黃龍湯為主。當清必以人參白虎湯為主。或屢下而燥更甚。舌上燥而無苔。或有黑苔愈清而愈長。或有燥苔愈下而愈燥。此皆腎虛之證。察其陽明無實邪。可攙當從腎虛治。以六味地黃湯易生地加知柏。王太僕所謂寒之不寒。責以無水。壯水之主。以制陽光者此也。或仍不應。則合生脉散以滋水之上源。或用四物湯流通經絡。

似此氣勢燎原非急水所能救必大作湯液藥味必以
計湯液必以斗計乃有濟耳見幾若早十救二三涸竭已見
十難救一或更兼脾門敗證如嘔呃哦利之類湯藥不下
百難救一矣

夾㾦血

疫證㾦血有三其一未病之先素㾦血而陰虛一受疫則
邪熱乘虛前熱㾦陰最易解表清裏用藥必步步照顧榮
血如九味羌活湯之用生地人參敗毒散之用人參是也
其二當受病之時忽然吐衄女子崩漏甚至血暈昏厥勢
甚危急亦疫證常有也病家但知血之可駭往往不知受

廣瘟疫論　卷之一　夾㾦　壹

疫醫家亦忽其客邪惟汲汲于止血清涼滋補多至危殆
不知血由疫逼惟當治疫疫邪解而血自止此證不遠見
於疫在表時而見於發熱數日之後人猶易知惟疫鬱於
陰經而暴見此證者難識以其證外無頭痛發熱之可據
耳但見微惡寒而大作嘔急當視其氣色神脈舌苔若舌
有白苔氣色有一二疫象即是疫毒無疑以違原飲爲主
嘔加藿香脹加青皮但治疫毒血證自已若脫血太甚而
氣欲絕者加人參以固中氣俟疫證傳變歸經然後拔經
治之此疫證兼血之最危者其三疫邪大張之後煩熱灼
渴之餘而見㾦血證則又瘟疫常態詳後血證各條

夾心胃痛

時疫有兼心胃痛者於其痛時察其氣色神脈舌苔若有
一千時疫但治時疫雖平時因寒而發此則惟治其熱蓋
以疫邪客於募原傳於太陰而發心胃痛之病疾於達原
飲中加木香蒼朮以開通攄疫使其透發於表而痛自已

夾哮喘

哮喘乃肺家素有痰火一受疫邪其淫熱之氣從其類而
入肺發其哮喘遇此當察其氣色神脈舌苔有疫但治疫
其哮喘自除予治疫藥中加貝母瓜蔞淡豉桑皮疫邪哮
喘並解法更精密

以上諸條凡言兼者疫邪兼他邪一也二邪自外入者也凡
言夾者疫邪夾內病內外夾發者也二邪兼發以疫爲
重他邪爲輕故略兼治他邪而病即解二邪夾發如夾
水食血氣痰等實邪則以夾邪爲先疫邪爲後蓋清其

疫邪見證千變萬化然總不曰表裏二者但表證中有裏邪裏證中有表邪則又不可不細察也故列註分表裏以盡其當又細辨以盡其變使人人臨證胸有定見少救橫天於萬一耳

表證

發熱

時疫發熱與風寒雜證同其發熱時氣色神脉舌苔則不同辨得爲時疫發熱又當知有淺深表裏之異不辨無以施治發熱表證居多亦有裏證發熱半表半裏發熱餘邪迫而發也

發熱兼頭痛項強腰痛骨節痠或頭面身體皮膚有紅腫疼痛諸證不必全現有一於此便是表證發熱九味羌活湯人參敗毒散六神通解散選用冬月嚴寒及惡寒甚者大青龍湯葳蕤湯越婢湯陽旦湯可借用全不惡寒者白虎湯黃芩湯可加減用裏證發熱脉或滑或洪數或沉滑關尺盛於寸熱必在肌肉筋骨初摸熱輕久按熱甚必兼煩渴胸腹滿大便或不通或自和或結血及膿小便黃赤或讝妄狂昏諸證雖不必全現必兼二三證方是裏證發熱栀子

或湯黃連解毒湯小陷胸湯三承氣湯導赤散瀉心湯猪苓湯天水散選用半表半裏發熱脉多弦胸脇滿或熱或止或口苦咽乾目眶耳聾或目赤或喜嘔心煩或兼見表裏證達原飲柴葛解肌湯小柴胡湯選用時疫者熱時用藥最要清楚此處頭緒不差後傳變多危救援亦易不然難於收拾矣凡見發熱即當辨其氣色神脉舌若爲風寒爲時疫係時疫又當辨在表在裏在半表半裏然時疫見證純表純裏者少表裏夾雜者多表裏夾雜吳氏達原飲爲主表證多加羌活裏證多加大黃半表半裏證多加柴胡葛根淡豉或表裏證均見則諸藥全用即三消飲取效最多誠時疫主劑至已愈數日而復發熱者乃慕原伏有不盡之邪復出於表當察其證之表裏多寡以前法治之大抵愈後復發則裏熱多而表熱少雖有當用表藥之證不過葛根柴胡豆豉而已無更用羌活之理若愈後另受風寒發熱無汗舌上無苔者不在此例時疫愈後復熱無汗重用葛根五錢最妙以其性涼而解肌發汗既不碍無汗之表又不碍煩熱之裏更有平素虛損或老人或大病後復染時疾屢經汗下清解其熱轉甚或全無表裏實證或六脉豁然空或較初起洪滑更甚或用表藥而身痛更甚或屢用清熱藥而煩躁昏沉更甚或屢用下藥而舌燥

黃色苔黑苔屬裏舌苔燥則不論何色皆屬裏證屢經汗下後舌苔潤而發熱者屬陽虛無苔而燥者屬陰虛發熱而燥有似實證之表裏虛實依此辨之思過半矣惟虛證發熱舌苔亦難憑據又當從病之來路探討若屢經汗下而熱不減藥有效則仍屬餘邪未盡不可遽補致邪熱復壅天人年壽似此虛實關頭不可不細心體認也

以上辨表裏虛實諸法雖指發熱時言然類而推之凡諸證皆可依此爲辨惟在學者之善悟耳

時疫惡寒與風寒暑濕諸證不同諸證惡寒之後必見發熱熱時自愈甚時淫惡寒有時而勢甚惡寒之後必見發熱熱時自愈而不覺寒寒時自寒而不覺熱非若諸證惡寒發熱之相兼也時疫惡寒傳裏之後少在表之時多而辨氣色神脈舌苔與發熱同但有淺深虛實之異邪淺而在表者惡寒之時少於發熱治法方藥同於發熱而以解表爲主邪在半表半裏者寒熱往來如瘧狀治法方藥亦同發熱邪深入裏失於攻下而熱深厥深反欲擁被向火惡寒而不發熱或熱亦微甚則四肢反厥此雖惡寒實非寒也乃陽氣爲邪所鬱而不通以通鬱爲主達原飲大柴胡湯三承氣

湯選用使裏氣通而鬱陽發反大熱而煩渴也此證在惡寒時最難辨其爲熱須於九竅察之如目大小皆赤鼻孔乾唇紅舌苔黃黑糝耳鳴或聾小便黃赤牙痛大便燥結或發黃斑或鮮血或心下至少腹有痛不可按處此皆熱證之象六脈周身皆見洪大一二處獨見熱證反當以熱論爲主反此亦然乃辨寒熱真假之機要也余所見時疫不下數千裏證惡寒者百中一二即四肢厥逆爪甲青紫詢其所苦亦不惡寒此可得其槩矣至若本係時疫熱證因其八平素虛損衰老及大病之後用攻伐寒涼太過至汗出不止嘔利俱作四肢微厥大脈細濡而惡寒爲陽虛乃攻伐太過所致當以參朮爲主寸口脈微者佐以升柴尺脈微者佐以桂附須知雖屬陽虛却從熱論治不可用溫補陽雖回而陰竭亦死此處不可不斟酌至當又有宜伐太過而成虛證之惡寒涼太早而成實證之惡寒以疫邪方伏於募原未經傳變之時胸膈必多痰滯有見其煩躁而遽用知膏芩連者有因其作渴而遽用生地麥冬者有病者自認火證而恣啖冷水西瓜梨蔗大早者皆能抑鬱陽氣壅開邪熱熱過於中下二焦冷物停痰滯不可消凉致胸腹痞悶而危宜用草果厚朴槟榔木香半夏茯苓蒺藜導痰開滯逐水疾滯水去則惡寒止而熱證見隨其傳變以施凉解攻利之劑乃有效也此法特救藥誤非治正病耳總之風寒以惡寒爲輕多有初起惡寒一二日不治邪氣傳變而惡寒自已者與其誤治毋寧俟之若誤認惡寒爲真寒用辛溫之藥發散未有不增其病勢者也

寒兼在表與發熱惡寒一時兼寒熱往來
寒已方熱熱已方寒亦與瘧不同瘧發有時寒熱長短有定此則寒熱無時長短無定雖不同於瘧而邪俱在少陽半表半裏之間在傳變之初是由輕入重如則寒熱往來繼則熱多寒少再則但熱不寒至晝夜壯熱漸減而為發熱有時而止又減而為寒熱往來又減而為戰汗至脈靜身凉而愈夫疫邪自裏出表者重自表入裏者重初起寒熱往來是自表入裏犯及少陽裏氣與邪相爭犯繼則邪深入裏表裏俱病而為熱晝夜壯熱而勢日重既傳變之後而寒

熱往來是邪氣向裏正氣來復自裏出表經過少陽前之晝夜壯熱邪氣乘勝者至此正氣漸和而寒熱有時矣前之邪陽獨盛亢極無陰作純熱者至此則陰氣來復而寒熱相爭矣前之邪併表裏而熱渴日加者至此則裏氣逐出表邪而作戰汗矣治法於未傳變之先欲由表入裏時但透達其邪使易傳化為主既傳變之後欲自裏出表時以和解為主此小柴胡湯是也於屢經汗下之餘脈或虛微濡弱結代心或悸動神或萎倦形或羸弱過甚當養陰益氣助正却邪為主參胡三白湯炙甘草湯清燥養榮湯補中益氣湯是也濡仝與

頭痛與風寒不同風寒是寒束於上部中下無邪犯上逆頭雖甚痛而不昏悶時疫是熱蒸於上部中焦邪俱在少陽焦頭不甚痛而昏悶所謂卓然而痛者是也驗得氣色神脈舌苔為時疫頭痛而又有表裏之分初起頭痛腦後項目珠暗甚舌苔白而發熱者太陽頭痛也羌活川芎為主豆豉酒芩知母生地為輔額顱脹痛目痛鼻孔乾舌苔白而微黃煩熱而渴者陽明頭痛也葛根為主淡豉石膏為輔兩額角痛眉稜骨痛寒熱往來口苦咽乾舌苦中黃邊白或中辰黃尖上白少陽頭痛也柴胡荊芥川芎為主

酒芩石膏為輔頭痛而三陽證悉具者時疫頭痛尚見一經證者少雜見二三經證者多此方尤為多效頭痛甚者加豆豉芎防滿其頭目頭痛舌苔黃心下滿蒸蒸發熱者陽明裏證也三黃石膏湯小承氣湯大柴胡湯防風通聖散選用舌苔黃或生芒刺或焦黑或半截或傍邊有一塊白胸滿而嘔頭痛兼吐者痰厥頭痛也前胡為主半夏萊菔子枳橘山查麥芽為輔兼煩熱者加大黃枳實汗下清解後頭痛心悸四物湯去川芎加丹皮知母黃柏或歸脾湯逍遙散并加生地棗仁凡頭痛見證混雜難分表裏者總以舌苔辨之

時疫頭眩有三其一風熱頭眩乃時疫本病寸口脈多浮而發熱煩渴加石膏其一痰水頭眩乃時疫兼證脈沉而弦滑兼嘔胸脇滿悸動前胡爲主半夏茯苓枳橘膽星萊菔蘇子爲輔然必視時疫大勢屬表屬裏於應用本方中加此數味可也其一虛證頭眩乃時疫變證多見於汗下清解後或素有怯證者如上虛寸口脈不及關尺多汗少氣不足以息心悸參耆爲主中虛關脈不及寸尺多從嘔利太過而來不思食苓术爲主下虛尺脈不及寸關腰膝痠厥二便清滑六味地黃不妨兼用清熱之品或袖後脈氣稍實再爲消解亦可大抵時疫頭眩多屬熱少屬虛治須辯酌若傷寒邪入陽頭眩又當遵仲景法治之

頭脹

時疫頭脹者乃胃熱上蒸也下之則愈兼表者防風通聖散大柴胡湯吳氏三消飲無表證者三承氣選用病後虛腹與頭眩寒看

頭重

時疫頭重者溼熱上壅也於清涼解表藥中加蒼术或利

氷蓼痢後虛重亦與頭眩寒看又有表裏無病病在頭中者其目必黃宜當遵仲景法用瓜蒂散搐鼻出黃水即愈

目脹

時疫目珠脹者陽明經病也兼表證葛根葱白湯加石膏若胸滿舌有黃苔宿食也鹽陽明其脈不下行而上逆故目珠脹宜平胃散加山查麥芽枳殼消導之則愈至屢經清解而目珠脹痛不愈者當滋息其肝臟以養陰滋血和肝之法治之如再不愈則當進而滋腎乃乙癸同源之治也

項強酸

時疫初起項強酸兼發熱乃邪越於太陽經也羌活爲主狂躁正盛而項強者熱壅其經脈也石膏黃芩爲主屢經汗下發熱已退而復項強者血燥而筋無養也四物六味爲主外此若傷寒發痙之項強亦陽漏風之項強則又有仲景之法在

背痛酸

時疫初起背痛兼發熱者邪浮於太陽也羌活爲主背痛而脹兼胸脇脹者邪客募原也草果厚朴槟榔萊菔子大腹皮爲主屢經汗下後發熱已退背痛不止者經脈血亞也六味生脈四物爲主又有平素勞倦內傷而背痛在膏

腰痛發

時疫初起腰痛兼發熱者太陽受病也獨活爲主兼脹者氣滯也加枳橘兼重者次滯也加蒼朮萆薢少頃及兩脇者氣滯血瘀也加青皮烏藥赤芍元胡兼理氣疏瘀通腑此皆初起實證治法又有即次腎虛陰傷者腰痛獨甚於周身兼酸痠無力若尺脉無力後來傳變必危當於初起在表時加人參知母生地預顧其陰則危殆差減若徒用伐邪之品邪之深入者未必去而津液大傷則昏沉舌黑直視失溺諸證見陰傷氣脫則厥逆證見盡腰乃腎府

爲先天根本腰痛則腎虛不可不察要知此時疫初起腰痛尚有虛實之分若汗下後而見腰痛其爲腎虛不待言矣宜大味四物不可疏通

膝痛酸

時疫初起膝痛發熱者邪在太陽經也獨活桃椰牛膝爲主兼軟者濕甚也若木爲主然此特太陽之一證初起以解表邪大勢爲先膝痛專藥一二味而已若經汗下表邪已解則當察其邪氣之有無正氣之虛實專治下部不然恐致殘廢倘餘邪不盡留於下部則仍有熱證如骨蒸小便黃赤以黃柏苡仁清熱桃椰木通通壅滯舒筋

則秦艽木瓜舒筋緩則蒼朮防己紅腫則亦當以清熱爲主若無餘邪見心悸二便頻數尺脉虛小則當以補腎爲急六味加牛膝枸杞知柏滋益陰精

脛腿痛酸

時疫初起脛痛酸者太陽經脉之鬱也獨活爲主兼膨者治在筋加秦艽木瓜兼腫者治在肉加木通赤苓槟榔兼軟者屬濕溫俗名軟腳溫往往一二日即死宜白虎加蒼朮湯或蒼朮黃柏此與膝痛頗同未經汗下則解表之大勢加一二味脛痛當藥表證已解惟留此證當專治之若屢經汗下而見虛證亦以補腎爲主

足痛

時疫初起足痛有因素有腳氣痼疾者但治時疫於解表藥中微加桃椰木通若已經汗下表裏俱平而足痛不止則消息其腎家虛實同膝脛痛法治之

肩背痛酸

時疫初起肩背痛酸者手太陽經脉受邪也解表則痛自已經汗下後而肩背痛者有經隧阻滯血脉空虛之別經隧阻滯者脉多有力證多熱渴以清熱活血爲主黃芩赤芍歸尾紅花之類血脉空虛者證多疲困脉多芤濇養血益氣爲主四物合參蔞之類

痛疫初起腕痛者乃風注未疾也初起解表汗下後益氣養血與肩背痛同治

周身骨節酸痛

項背腰膝脛足肩背諸痛已列於前則周身之酸痛備矣茲復列周身骨節酸痛者以痛在一處邪有尚注痛在周身邪有分布也專注之邪須通其壅分布之邪須解其縛束故治周身酸痛與拘攣又有別酸痛舉動如常拘輕而淺痛重而深酸痛重而深難解表其大法也而酸與痛亦有別酸變屈伸不利酸痛病在營衛拘攣病在筋脉合酸痛拘攣又有上下淺深前後之不同在身半以上為未疾淺而易解在身上以下為本病深而難已經汗下者又有別未經汗下與已經汗下屬邪盛宜宣伐已經汗下屬正虛宜調補明乎此則酸痛在周身在一處按證施治無不當矣解表諸方人參敗毒散九味羌活湯六神通解散大羌活湯

身重

時疫初起發熱身重者淫勝於熱也蒼朮為主二三日至四五日傳變之後汗出更熱而身重者熱壅其經脉也白虎湯為主傳裏表無熱而舌燥便秘腹痛拒按而身重者內結而氣不達於表也三承氣為主屢經汗下表熱已退身重不可移動脉虛散而無根舌上無苔二便自通者陰陽兩亾經脉枯竭也審其陰陽偏勝而治之偏於亾陽多脾胃證六君合生脉燥證六味合四物為主偏於亾陰多脾胃證六君合生脉為主陰陽俱竭生脉合六味為主

自汗

疫邪自內蒸出於表初起作寒熱時多自汗甚至淋漓不止不可以表虛論兼頭痛身痛仍以解表為主羌獨柴葛之類兼煩渴直清陽明之熱為主白虎之類有熱有結破結為主留胸三承氣之類若屢經汗下邪已全退脉虛而時疫得汗為邪有出路而宜斂汗者恒少也

盜汗

時疫初起盜汗者邪在半表半裏也胸脇痞悶達原飲無痞悶小柴胡湯汗下後大熱已退有盜汗者餘邪不盡也小承氣小陷胸吳氏承氣養榮湯諸方滑其伏匿除邪盜汗自止

戰汗

時疫不論初起傳變末後俱以戰汗為佳兆以戰則邪正相爭汗則正逐邪出然有透與不透之分凡透者汗必淋

滴汗後身凉口不渴舌苔淨二便清胸腹脇無阻滯結痛始爲全解之戰汗否則餘邪未淨而復熱則有再作戰汗而解者有戰汗須三四次而後解者有戰汗一次不能再戰待屢下而退者有不能再作戰汗即加沉困而死者總視其本氣之强弱何如耳凡戰汗之時不可服藥補則戰止而汗不透留邪爲患汗下則太過而成虛脫應聽戰汗也徹再觀脈證施治當戰時或多與熱湯飲之助其作汗之脈以浮爲佳邪出於表也虛散微濡應有變煎獨參湯以待之防其脫也貧者米飲聊代之然必察其戰後係

邪淨而氣欲脫方可用凡戰汗後神靜者吉昏躁者危氣細者吉氣粗而短者危舌痿不能言者死目眶陷者死目轉運者死戴眼反折者死形體不仁水漿不下者死戰汗雖爲佳兆亦有吉凶得戰汗固由治得其宜邪退正復而致然不可强也當見服大發汗藥毫不得汗而飲冷水得汗者又有用下藥得戰汗者涼血活血得戰汗者生津益氣得戰汗者種種不一當知戰汗乃陰陽交和表裏通達自然而然非可强致也

狂汗

時疫臨解有忽手舞足蹈跳床投榻而後作汗者最爲險

人然須驗其是否作汗作汗之脈浮而後浮爲邪還於表後則胃氣自和待汗透自愈脈若浮洪浮數浮滑浮散雖有汗亦爲發狂非作汗也

頭腫

時疫頭腫乃風熱薰於上部太陽之經脈鬱滯巔頂俗名大頭傷寒當視表裏輕重加輕清疏風之品以散其腫荊防薄荷蟬退川芎葛根荊芥之類如發熱舌苔白表重於裏也合表藥用九味羌活湯入參敗毒散是也如煩渴舌苔黃者裏重於表也合裏藥用三消飲亦膈散大柴胡湯調胃承氣湯是也右有用三稜鍼刺出惡血法亦可用至

發癰膿者不在此例

面腫

時疫面腫風熱濫於上部陽明之經脈被鬱也亦腫者方是治以白芷防風葛根石膏散其風熱視表裏之輕重合頭腫條內諸方加減用之若黃腫乃水氣也當從水腫治之

頸項腫

時疫頸項腫乃陽明風熱俗名捻頸溫又名鼻疳溫當按頭腫條內表裏諸方加葛根桔梗牛蒡防風荊芥參薑膿發不在此例

耳旁腫

時疫耳旁腫乃少陽風熱俗名蕈耳傷寒小柴胡湯加荊防芎芍元參亦當與頭腫參看

胸紅腫

時疫胸前一片紅腫漸起似瘧疹風熱也俗名赤膈傷寒亦於頭面諸條表裏方中加荊防連翹赤芍牛蒡土貝

周身紅腫

時疫周身紅腫風熱溢於皮膚也用羌獨升柴葛芷疏其皮膚之毛竅石膏貝芩梔子連翹清其肌肉之熱赤芍歸尾紅花生地活其衰熱之瘀兼裏證與頭腫諸條參治

以上頭腫諸條列之表證者以初起言也若見於病後曾經汗下者為餘邪不盡治法則小異大約見於初起表邪盛實用表散之藥為主清裏之藥為輔見於病後裏邪稍溢用清裏之藥為主表散之藥為輔以此為權衡思過半矣

發黃

時疫發黃有四一宿食二畜水三畜血四鬱熱當疫證初轉在表時胸膈痞悶目珠黃面黃正中黃宿食壅於胃脘也於表藥中加山查神麴麥芽萊菔子專裏時小便不利腹滿而響面目身俱黃亦水也四苓散加梔子茵蔯豬苓不以斑之消否為輕重而惟以裏證為主每每斑出而證

安如故或斑出數日已消而昏沉如故必衹裏熱未清二便清利而後愈故治斑藥味可爲輔不可爲主發斑發疹熱皆在經而不在胃凡遇煩躁而不渴目赤而舌白即是將發斑疹之候預以清涼解表透毒之藥治之使邪易出易淨

以上時疫表證皆關乎裏不似他證表裏兩不相關故前列各條皆冠以時疫二字以明非他病之見證不可以此法治他病之亦不可以治他病之法治之亦不可以神原吾苔辨之百不失一是五者爲辨時疫之大綱亦辨時疫之細目也

煩躁

煩乃心煩情思不定神不安而形如故躁則形復揚手擲足形不寧而神復亂煩輕而躁重也在他證有謂煩屬心躁屬腎者煩屬陽躁屬陰者在時疫總屬慘熱淺在上則見煩躁之形熱深在下則漸近昏沉而不煩躁是時疫初起可即煩躁之輕重辨病勢傳變之輕重不煩躁則非時疫設氣色神脈舌苔有時疫確據亦屬但表不裏之輕證凡初起憎寒發熱而煩躁者邪在半表半裏三沖飲九味羌活湯六神通解散選用隆冬寒甚汗難出者大青龍湯感發汗後餘熱未清者白虎湯裏證已成者承氣下之邪入於胃也白虎黃芩三承氣小陷胸三黃瀉心涼膈散選用舌已黑煩躁漸近昏沉者邪入心包也犀角地黃湯加羚羊角黃連解毒湯選用屢經汗下清涼表裏俱無阻滯而煩躁者陰液傷也生脈散大味地黃湯吳氏諸養榮湯選用或用汗解清利滋潤諸法不應而煩躁加甚者當細驗舌苔若黃黑苔中次一塊白澀是爲夾水或平素胸有痰飲或未病之先曾飲冷物或初煩躁時過飲冷水冷物或用清涼太早皆能停飲於胸膈胃脘之間

兼飲物者其疫熱勢不能達表內不能傳胃故煩躁轉甚驗舌之後更細按胸脇滿痛而軟漉漉有聲再細察其脈右寸關或絃緊或緩皆停水確據當以蒼朮生夏萊菔厚朴先消其水氣然後治其煩躁無不應者不論舌苔有無黃黑但煩躁而兼小便不利者雖無水氣在胸脇而少腹略有滿痛處即當以導去散瀉心湯凹苓湯猪苓湯益元散利其小便所謂心邪不從心瀉而從小腸瀉也

嘔

吳又可曰時疫有始終能食者邪不傳胃也慎勿絕其飲食此不嘔者也愚嘗見時疫初起未發熱時表證未見有

先作嘔數日者此疫邪先犯太陰當辨其口氣無臭氣而不粘者屬太陰寒證有臭氣粘厚者屬太陰疫證此為先裏而後表不可遽用清涼閉遏邪氣致使不能透達傳化雖四肢有時厥逆脈有時沉伏亦不可用溫熱致增嘔證甚有舌紫昏沉者惟當宣其胃氣藿香正氣散最宜若已發熱而嘔者吳氏達原飲加牛夏兼三陽表證加羌活葛根柴胡若嘔而煩渴身熱而不惡寒者邪在陽明也白虎湯黃芩湯並加牛夏若嘔而舌黃胸中有滿痛處橘皮生夏湯加枳實山查麥芽川貝乃能舒鬱散結若嘔而舌黃心下腦上有滿痛拒按者大柴胡湯若嘔而舌黃胸中有滿痛拒按當視其前後何部不利大便不利胃承氣湯小便不利四苓加木通或益元散利之則愈寒熱已解二便通利胸腹無滿而嘔不止者餘熱在胃也竹葉石膏湯屢經清下嘔不止而舌無苔多汗心悸痰倦者中氣傷也大半夏湯或六君子湯加白蔻屢經清下倦怠異常四肢漸冷者乃清下太過而中寒也理中湯甚至加附子然此為治藥之法非治疫之法也宜詳察之

欬

欬者疫邪夾他邪干肺也有初起在表夾風邪干肺者脈

兼浮欬多痰沫必兼鼻鳴自汗灑淅惡寒於透表藉方中加前胡桔梗蘇子杏仁淡豉有夾水飲干肺者不論表裏脈必兼緩欬必多清痰兼舌白心悸胸滿或嘔或吞酸於表裏藥中加桑皮生貝杷葉茯苓川貝母萊菔子有疫熱傳裏燥火熏肺者脈必數欬必無痰有痰亦難出而咽痛於裏藥中加花粉黃芩川貝蘆仁有病後陰傷肺燥者脈必濇欬必無力舌必赤而無苔吳氏清燥養榮湯加麥冬元參知母貝母有屢經汗下或平素陰虛腎氣上逆者欬必兼上氣顴必時赤足脢必滿痰脈必散六味加枸杞五味牛膝疫邪兼欬者少即有之亦非大有關係之證宜以病之表

裏大勢爲主加治法藥於本方療之

渴

渴乃熱象時疫爲熱證而有不渴者蓋初起溼熱相兼爲蒸氣熱未勝溼則鬱悶心煩而不渴熱已大盛在經而不在胃則煩燥身熱而不渴在下而不在上則燥結而不渴在血分不在氣分則昏沉而不渴疫邪初從太陰發者胸腹滿嘔而不渴此外無有不渴者矣初起在表發熱頭痛舌白而渴脈必不沉而數六神通解散加石膏葛根或九味羌活湯加石膏葛根牛表半裏口苦咽乾目脹而渴脈必數小柴胡湯加花粉知母或亦加石膏或達原飲加石膏葛根或黑燥當察其胸脇少腹按之無痛處而渴者爲有熱無結脈必洪宜白虎湯按之有痛處爲有熱有結痛在心下脈必滑大關上尤甚小陷胸湯在臍上及當臍關中脈必滑大小承氣湯在臍下尺中脈必滑大調胃承氣湯心下至少腹俱痛寸關尺皆滑大大承氣湯痛在左脇不可按左關脈必弦或滑或澀右關脈必弦或滑或澀桃仁承氣湯痛在右脇不可按尺脈必數四苓散猪苓湯小便不利少腹不可渴不止節邪未盡也宜將前所用藥再作小劑以利之屬

加石膏葛根邪已入胃作渴身熱自汗舌現黃苔或醬色或黑燥當察其胸脇少腹按之無痛處而渴者爲有熱無結脈必洪宜白虎湯按之有痛處爲有熱有結痛在心下脈必滑大關上尤甚小陷胸湯在臍上及當臍關中脈必滑大小承氣湯在臍下尺中脈必滑大調胃承氣湯心下至少腹俱痛寸關尺皆滑大大承氣湯痛在左脇不可按左關脈必弦或滑或澀桃仁承氣湯痛在右脇不可按尺脈必數四苓散猪苓湯小便不利少腹不可渴不止節邪未盡也宜將前所用藥再作小劑以利之屬

口苦

熱邪在中上二焦則口苦非特時疫爲然即感風寒口苦亦屬少陽熱證如時疫當惡寒發熱表證正盛時一見口苦即於發表諸藥中倍加清熱之品輕則黃芩重則知母再重則石膏不但三陽表證如此即三陰裏證手足冷惡寒嘔利胸腹滿不渴證狀似乎純冷無熱而一兼口苦即當於溫燥藥中加利熱之品如用半夏蒼朮草果厚朴必加木通芩澤甚至加知母黃芩本吳氏達原之義口苦爲熱證的據每遇證狀糢糊寒熱莫辨必借此以決之至舌苔黃黑乾燥煩躁渴閉結又清下之不可或緩者矣

口甘

口苦口甘同爲熱證苦爲燥熱在上甘爲溼熱在中下二焦多渴屬三陽甘屬三陰蓋脾胃屬土稼穡

作甘土邪下涉腎位水土相蒸甘味上溢於口多兼噁吐人每誤認胃寒而用溫中之劑不知溼熱在於下焦土能勝水溫燥太過腎水告竭總不見熱渴諸證惟目不見物漸至昏沉而死口甘一證在諸證初起猶可用溫燥開導之品而亦不宜過劑在時疫必以清熱爲主消痰爲輔或胸中停飲加甚不過加蒼朮半夏而已如二陳去甘草加薑汁炒山梔薑汁炒黃連竹茹黃芩等類爲口甘要藥烏梅更妙酸能勝甘蓋五行尅制自然之理也或四苓散加山梔亦得然必以時疫之大勢爲用棄之權衡斯可矣

唇燥

脈宜葛根

齒燥

時疫齒燥有三輕淺者爲陽明經熱前板齒燥身熱目疼鼻乾不得臥此將發斑疹及衄血之先兆葛根爲主黃芩知母石膏爲輔重者爲胃腑燥熱通口皆燥甚則黑如煤炭三承氣三黃石膏選用至重者爲陰火煎熬亾血太甚腎水涸竭當峻補其陰知母黃柏生地元參天冬麥冬丹皮每味兩許大作湯液加童便金汁晝夜兼進若藥輕治緩則不及矣

鼻孔乾

時疫鼻孔乾有四風熱則鼻陽荊防葛根薄荷爲主陽明經熱則煩躁葛根石膏爲主胃熱腑證則大渴吞黃三黃石膏爲主亾津液肺燥麥冬生地五味爲主大抵風熱經熱者十之五六府熱亾液者十之二三非謂熱深而鼻孔反不乾也以煩渴大熱症見則不覺鼻孔之乾與否耳

耳聾

耳聾者少陽邪熱挾痰上壅也時疫耳聾者多蓋邪之傳變出表入裏必干少陽又時疫屬熱熱至上升挾痰濁氣上壅閉道故耳聾也治法以疫邪大勢爲主見於初起傳表時於表藥中加荊防川芎見於入裏時於裏藥中加黃芩知母屢經汗下耳聾不愈不可急治養陰調胃爲主須待粥食如常二便調勻始由漸而愈也

鼻如煙煤

時疫鼻如煙煤者邪熱燥肺也由鼻孔乾而來急當清下少緩則肺胃枯絕矣三承氣合白虎或三黃石膏加青黛或小陷胸加犀角或犀角大青湯視其兼證擇而用之

鼻孔扇張

鼻孔扇張有三一疾篤於肺氣出入有聲喘欬胸滿不渴

宜瓜蔞貝母柴胡桔梗枳殼薄荷甘草出入多熱有微表束其鬱熱古人獨主越婢湯蓋散其外束清其內鬱也用於時疫中以萬根易麻黃或萬根黃芩黃連湯亦可一鬱開腎氣虛而上逆氣出入皆微多死此證必得之屢經汗下或兼多汗心悸耳聾急宜大劑六味合生脉散加牛膝枸杞或可百救一二

咽乾

咽乾者邪熱淫於膈上也在傷寒爲少陽熱證時疫亦然宜黃芩甚則佐以花粉知母

咽痛

時疫咽痛爲熱淫於肺當視其咽中有結無結無結者微紅以桔梗花粉黃芩元參治之有結者紅腫當加牛蒡赤芍消其腫結甚則起紫泡白泡是爲乳蛾必以針刺去惡血再服清熱之藥方妙時疫中常有急喉風急喉痺二險證旦發夕死不可不察也急喉風咽痛而喘乃痰邪夾熱上壅於肺古方用牖攦吐其痰涎惡血或皂角膏吐之治之稍緩則氣閉而死急喉痺即乳蛾速長閉塞喉嚨亦以刺去惡血爲主甚或用刀大開其膜血此雖見於時疫中必其人平素食厚味多怒鬱肝火妄動有以致之也

舌燥

時疫舌燥白灰炎土燥中宮堵截腎水不能上交心火須察其苔之有無與色之深淺施治白苔而燥疫邪在表痰已結於膈上吳氏達黃色下之即黃不可疑也黃苔而燥疫邪傳胃小承氣陷胸大柴胡選用醬色苔而燥疫邪入胃深及中下二焦調胃承氣湯黑苔而燥疫邪入胃至深傷及下焦大承氣倍其分兩大黃燥成塊裂或生芒刺熱更甚也大承氣須兩許方妙各燥苔下之漸減不即盡淨爲藥已中病力味到耳當再下之有可至三五次十餘次而後愈者若屢下而燥苔愈長不可更下當察其腹中若揉按作响者痰水結於中焦脾胃受困津液不能上潮改用平胃二陳溫燥之劑即愈又腎陰竭涸愈下愈入其陰燥苔不退目無神耳聾心悸腰痿再下必死宜六味地黃湯合生脉散至無苔而燥須辨其色正赤或深紫熱歸心包血分熱極石膏知母黃連犀角羚羊角牛黃爲主鮮紅入陰二冬生地元參知母阿膠人參爲主大抵舌無苔則胃無物可清潤不可攻下

舌强　附舌瘡

時疫舌本强硬爲熱而兼痰宜清下無疑須加清痰之藥

兼白苔者膈間求極其燥佐以生軍多用柴胡湯是也兼黃苔者已經前熬其痰漸燥佐以川貝栝蔞醫陷胸湯是也兼黑苔者熱極痰亦爲火佐以牛黃方效若無痰舌色正赤深紫裂燥而强者熱毒蘊於心包也三黃石膏湯加犀角牛黃急清其熱舌强雖與舌燥相類而燥屬胃主熱强屬心主痰又舌痰軟而枯小與舌强硬而不縮有異乃虛脫已極大補及滋潤或百救一二若屬經汗下清熱消痰而舌强者又當與舌痰同治

舌卷短

時疫之舌一見黃苔便當下失下則由黃而變醬色變燥變黑變生芒刺再失下則變卷縮爲下證至急之際宜大下屢下分和緩則不救

胸滿痛

時疫胸滿而不痛者爲邪未結爲無形之氣稀薄之痰痛而不滿者爲病在經絡有虛有實有虛實相兼滿而痛者爲邪已結須分痰食血以施治屬無形之氣者按之不痛時疫初起邪在募原多有此證宜達原飲加枳桔木香大腹皮以開豁之屬稀薄之痰者時疫二三日邪在半表半半裏多有此證宜達原飲加半夏萊菔子或小柴胡湯加萊菔子消息斟酌不可輕試

脇滿痛

脇滿痛與胸滿痛同而微有不同者胸滿痛有宿食爲病脇滿痛無宿食爲病乃亦有因宿食在胸腹而滿痛及脇者時疫脇滿痛是痰氣血三者爲病其中亦有滿而不痛痛而不滿滿痛並作之分其滿而不痛者募原之邪未經傳變宜達原飲兼柴胡往來者大柴胡湯痛而不滿者邪

分布於小腸若小腸宜小柴胡湯滿痛並作者宜分左右
腸血小柴胡去人參加延胡歸尾紅花桃仁甚者加莪朮
三稜三七靈脂右屬痰與氣痰大柴胡倍半夏加牡蠣
萊菔子甚則白芥子甘遂大戟芫花氣加青皮萊菔子木
香大腹皮痰與氣痛皆無常所而有聚散痰散仍有所苦
氣散則無所苦若屢經汗下清利而脇痛更甚者虛證也
氣虛必嘔利養氣爲主血虛必煩熱養血爲主此亦十中
一二脇痛與胸腹痛不同胸腹痛之衝衢塞不能久脇則
譬之僻巷塞則難開用藥須明此意時疫脇痛雖有痰氣
血之殊而總不離乎熱熱甚黃芩是爲主藥若別有熱證者黃

連山梔又所必需他病脇痛有寒有熱不在此例

腹滿痛

時疫腹滿痛屬宿食爲邪熱所結者十之七八屬氣血痰
水者十之二三蓋腹爲胃與小腸之正界非胸脇少腹之
地可比腹滿而不痛者屬邪在氣分屬水穀散漫而未燥
結氣分脈多沉或弦水穀脈滑氣分通腹皆滿水穀滿有
分界氣分者厚朴大腹皮青皮陳皮枳桔爲主水穀者半
夏山查麥芽神麯萊菔子枳實爲主時疫爲熱證腹滿亦
當清熱兼以順氣消食可也若舌多黃苔雖滿而不痛爲
邪已傳胃宜小承氣湯下之痛而不滿者屬邪在血分屬

陰分界與中焦異水有滿而不痛痛而不滿滿痛兼作之
不同初起滿而不痛者濕勝氣滯也枳朴蒼朮爲要
藥痛而不滿者手不可近熱傷厥陰血分也黃芩以清熱
赤芍歸尾以活血柴胡以升厥陰之氣若牽引陰器及兩
腰夾經者加秦艽即愈滿痛兼作者不論初起末後當視
其前後在前小水不利當用茯苓猪苓澤瀉元等方選用
在後大便不利有燥矢也三方氣選用小便利而大便色
黑者當血也抵當湯桃仁承氣湯選用以大小便之通塞
爲辨固矣亦當細察其滿痛而有硬塊不可按者屬燥矢
滿痛如鼓不可按而却無塊者屬濕當脾中滿痛拒按而

少腹滿痛

時疫少腹滿痛爲邪熱結於下焦下焦乃大腸膀胱及厥

較者屬當血以此辨之然外有時疫兼證而不
痛而不滿喜溫拒者爲虛證當細詢來路若屢經清下
大過當消息溫補以培養陰陽不可執時疫爲實邪熱證
而不變通也然此亦十中一見耳

右滿痛諸證乃時疫裏證之大端總屬熱邪內陷在風
寒暑溼諸門則寒熱虛實俱有在時疫已經傳變見於
煩渴燥熱既顯之後其爲熱證易辨若見於未經傳變
之先乃疫邪鬱而未發多不渴多不發熱甚有手足反
厥冷者依風寒治則當溫依時疫治則當清毫釐千里
反掌生死當於氣色神脈舌苔五者細察而詳辨之

自利

時疫自利皆熱證也其所利之物與內虛內冷者自別冷
利之色淡白熱利之色正黃或有深黃醬色者冷利稀黃
熱利稠粘虛冷利散而不臭熱利臭而多沫虛冷易出熱
證勢圖冷利緩熱利暴注下迫而裏急此辨時疫熱利與
諸冷利之大槩也時疫初起有手足厥冷惡寒嘔吐腹痛
自利者生似太陰寒證辨其爲疫只在口中穢氣作臭舌
上白苔粗厚小便黃神情煩躁即可知其非寒中太陰是
時疫發於太陰也煩躁輕則藿香正氣散煩躁甚則用達
原飲一二服後即見三陽熱證矣此時若用溫中藥轉見

四肢逆冷手足青紫而死不可不細察也時疫初起頭疼
發熱而自利九味羌活湯傳表太陽少陽合病身熱口苦
咽乾目眩而自利者黃芩湯兼嘔加半夏傳裏舌黃讝妄
而自利者按其心下至少腹有硬痛處與大承氣湯無硬
痛處小承氣小陷胸大柴胡遲用此在下其熱不必以結
爲主故雖無硬痛亦主大黃時疫自利而小便不利腹滿
而無硬塊時作腸鳴者熱在小腸膀胱而清水也四苓散
猪苓湯益元散遲用時疫自利受補者少至屢經清下無
表裏證自利漸至清穀而脈微細者則六君子湯補中益
氣湯理中湯又所當酌用也

便血

時疫便血熱邪深入也先當辨其血色鮮紅者清熱爲主
黃芩湯三黃石膏湯犀角地黃湯血色紫黯成塊下者逐
瘀爲主桃仁承氣湯抵當湯須按腹脇有痛處用之爲確
時疫便血散胸次漉水者脾鬲虛而臟腑傷也歸脾補中
八珍可借用並加烏梅時疫便血之後多凹陷證神昏耳
聾舌無苔而燥身痛不可轉側之類皆是生脈六味加阿
膠峻補其陰然多不救也

便膿血

時疫便膿血與便血有燥濕之分便血屬燥熱涼潤爲主

便膿血屬淫熱清熱兼分利爲主時疫初起頭痛發熱便膿血者即古所謂疫痢是也不必治膿血但解其表表解則便數自減決不可早施清裏攻下之藥即分利清涼亦所當愼蓋邪力在表清裏邪則內陷深入後極難治且時疫一見便膿血則煩渴之熱熾反緩蓋熱隨利減也所以苦寒之品不可浪用惟以倉廩湯爲主詳見爽痢條下時疫傳變至半表半裏便膿血者柴葛解肌湯加苓澤木通黃芩時疫傳變入裏煩渴譫妄惡具而便膿血者黃芩湯葛根芩連湯選用兼裏急後重腹中拒按者加檳榔大黃下而便膿血滑利者當以養中調氣養血爲主清熱爲佐老人虛人亦倣此例

大便閉

時疫屬淫熱大便閉者少間有閉者乃平素胃陽强盛多燥氣也夫本來陽盛復受時疫則淫熱皆變爲燥熱雖兼表證未得汗可下以時疫與傷寒不同傷寒邪從表入有表證未得汗不可攻裏時疫邪從口發雖有表證每每發表而不得汗必待裏氣通而後表始得汗所以時疫大便一閉即有表證亦當下之不可逡巡也若初起未經表散則當用三消飲下之爲當有表證尚可下則煩渴譫妄舌苔黃黑燥裂卷短胸腹硬痛諸證備見更當分別輕重下之無疑又有大便閉而屢下不通者則必有夾邪當審之有夾水者水在腸中則不下而自利水在胃脘以上則脈多弦多緩往往上嘔而不下利且舌白而心下按之作響雖用承氣不能下行故下之不通當先用半夏茯苓蒼朮消其水而後下之亦有可用大陷胸湯者必胸上痛而手不可近方爲藥與邪敵有夾氣者氣滯於胸膈之間主上逆而不下降胸腹串痛而脈沉當先以蘇子萊菔子木香檳榔順其氣而後下之有氣虛而屢下不通者屬老人虛人其脈必兼無力其色必悴其肌肉必緩其神必散若下證全具當與大承氣加人參一服而宿垢頑下或胸氏選用仍須蜜煎豬膽汁導之大凡時疫大便一閉即當下之然須詢其有無所苦若無所苦下尚可緩有所苦而下之不通又須察有無夾邪及虛也當下者十之五可緩者十之三夾邪者十之一耳時疫如此他病則不然古語云傷寒下不厭遲時疫下不厭早誠哉斯言也

小便不利

時疫初起在表時頭痛發熱小便不利者熱入膀胱也益

元散主之四苓散猪苓澤瀉皆可用東垣云小便不利而渴者熱在上焦法當淡滲小便不利而不渴者熱在下焦法當苦寒此可爲據時疫傳裏大便閉而小便不利者當先通大便大便通小便自利此惟瘟疫爲然他病則否時疫厥經汗下小便不利者陰竭也爲難治知母黃柏生地麥冬之類治之或生脉六味皆可然多至少腹如鼓而不救也凡小便不利日久下關不通必反於上往往有嘔吐呃逆涓滴不能下咽至湯藥不進者當用敷臍法大田螺一枚搗爛入麝香三釐敷臍上帛束之即通一見黑滿即受湯藥古法有用葱熨及井底泥敷少腹者俱可參用但不宜於陰竭之虛人耳

小便黃赤黑

時疫未傳變時小便多如常熱一傳入裏則黃熱甚則赤熱入血分畜血則黑小便可驗裏熱之有無深淺多寡但不可以作專證疫邪在表小便黃邪入裏小便黃赤雖手足逆冷亦當攻裏逐熱疫亦已退表裏俱和小便黃赤未退仍當清利餘邪惟小便黑者當逐瘀清熱爲主犀角地黃湯加大黃等類有厥經汗下清涼太過表裏俱無熱邪而渴腹痛小便黃赤者當理脾升陽爲主亦治藥非治病也

小便多

時疫爲淫熱小便多者甚少傳裏之後或有小便多者乃胃土變爲燥熱也急下之厥經下後小便多者大便閉而小便不利者當先氣升陽爲主亦有腎虛而小便多者屬燥熱小便必微黃必煩熱子大抵未下之先小便多者屬燥熱他病則否時疫渴而喜飲既下之後小便多者屬虛氣虛則不喜飲而寸脉不及尺浮不及沉陰虛則喜飲而尺脉不及寸沉不及浮失治日久則變消渴時疫小便多者如此者夫風寒小便多則屬陽虛不在此例

遺尿

時疫初起遺尿者多屬三陽合病蓋邪入於陽則陽實而陰虛熱盛於表裏爲之不守又神昏於上不自知其下部之出入故遺尿也合之腹滿身重口不仁而面垢譫語仲景獨主白虎湯此證不可下以邪全盛在表在經下之則表邪內陷故額上生汗手足逆冷尤不可汗以邪本屬熱汗之則愈增其熱故心愦愦反作譫語惟以白虎湯清其浮越之熱若別兼燥結痞痛者可於本湯內加大黃下之

囊縮

時疫囊縮乃熱入於厥陰也有結有熱則下有熱無結則清熱退而囊自縱矣陰證囊縮與時疫頗相類以陰證囊縮

縮必身冷厥逆脈沉時疫襄縮亦身冷厥逆脈沉也然一寒一熱自有不同陰證襄縮陰證襄縮或全縮入腹有如婦人時疫熱厥襄縮陰證如常可以兼證推之陰證襄縮小便清少腹牽引作痛而不渴語溫按多自利神清不煩時疫襄縮小便赤少腹滿而硬痛拒按大便秘煩而神昏譫語

多言

時疫多言者譫語之漸也疫熱蒸心之所致治同譫語

譫語

譫語者熱蒸心也時疫一見譫語即當清熱然有經熱蒸心而譫語者邪在三陽表證多有之脈浮大頭痛發熱舌白者是吳氏三消飲最當六神通解散九味羌活湯防風通聖散白虎湯梔子豉湯皆可選用有腑熱蒸心而譫語者脈洪身熱汗出不惡寒反惡熱胸中無結者是白虎湯黃芩湯選用有痰凝搏結其熱聚於中上二焦而譫語者脈弦滑胸痛拒按者是小陷胸湯大柴胡湯選用有胃熱蒸心而譫語者脈滑實大舌黃及黑及燥及芒刺腹滿拒按者是三承氣湯選用輕者只用平胃散加山查麥芽蘿蔔子即效有熱入血分而發血血熱蒸心而譫語者脈沉結或澁心下至少腹必有痛處拒按而軟者是犀角地黃湯桃仁承氣湯抵當湯選用有熱入小腸膀胱

齊水之熱上蒸心而譫語者脈浮數小腹滿小便不利者是四苓散猪苓湯益元散選用以上皆實證譫語也至若屢經汗下清理二便已清利胸腹無阻滯六脈虛散結代微弱而譫語者陰陽兩虛神無所倚也虛在上焦必心悸神倦生脈散加棗仁天王補心丹虛在中焦必面色痿黃四肢倦怠歸脾湯虛在下焦必耳聾目直視六味地黃湯加遠志五味龍骨茯神

狂

時疫發狂者譫語之甚者也亦疫熱蒸心之所致治同譫語

善忘

時疫善忘者畜血之所致也畜血在上焦其脈芤胸前及心下必痛必拒按而軟犀角地黃湯主之畜血在中焦其脈或芤或弦或澁兩脇及臍上必有痛處拒按而軟桃仁承氣湯主之畜血在下焦其脈多沉結臍下必有痛處拒按而軟抵當湯主之善忘雖為畜血主證然必驗之大小便風雖韓大便反易其色必黑小便自利方為畜血之的證否則仍當參之多言譫狂諸法治之

昏沉

時疫昏沉熱入手深極險證也蓋熱初蒸及心之經則心

神不安多夢囈醒時自滿
言所言皆日用常行之事
有昏處多言間有糊塗語
則心神昏處居多言多妄
見聞者猶省人語也至熱
次此熱入淺深之次第見
熱之浮淺者梔芩知膏可
至沉昏熱之至深者非犀角黃連羚羊角牛黃莫能解也
昏沉雖係熱深更有夾痰氣夾胃結夾血結之分胸滿舌
白係夾痰氣當加川貝瓜蔞半夏菉菔子於犀連諸藥中

舌黃及燥黑腹滿硬痛者當加犀連於三承氣湯中痛而
軟者當血加桃仁丹皮赤芍於犀連藥中治昏沉之大法
備矣以上皆實證更有虛證亦所當知屢經汗下清利之
後表裏無熱胸腹無阻二便自利而神情困倦而漸昏由
昏而漸沉乃大虛之危證大劑生脈散加桂附甚者為
急救其陰陽亦不逮矣

循衣摸床撮空

時疫循衣摸床撮空者熱盛神昏而四肢冀也當察其舌
舌苔白或無苔有熱無結也犀角黃連石膏為主舌有燥
苔或黃黑燥裂芒刺有熱有結也大黃芒硝為主屢經汗

下後胸脇仍有拒痛者邪未盡也仍宜清利無拒痛者陰
虛而陽尤也生地麥冬棗仁茯神安神為主

多睡

時疫初起多睡兼身重者熱邪阻滯其經脈也有汗白虎
湯無汗或加麻黃屢經汗下後表裏熱愈甚二便俱利而
身痛多睡者陰傷也四物六味生脈三方合用大劑養陰
方效失治即危服此數劑身痛已和表裏熱退而仍多睡
者於三方中加生棗仁即愈若夫平素脾虛多睡多痰嗜
睡者一受疫證必更嗜睡當於時疫藥中參之以理脾消
痰之品

身冷

諸病身冷皆屬陰證在時疫多屬熱證須從氣色神脈舌
苔中辨其端倪果係時疫則當分初中末以治之不可亲
也時疫初起往往有身冷自利腹痛作嘔全似陰證者若
舌有厚白苔身有穢氣心煩多汗面色油垢小便黃短數
有一二證現便是疫邪直入太陰先裏後表非真陰寒證
兼嘔利藿香正氣散四苓散無嘔利達原飲服一二劑後
即發熱矣時疫傳變發熱之後譫妄昏沉舌燥腹滿便秘
而身冷者先表後裏證三承氣大柴胡選用無結證者白
虎湯時疫未路屢經汗下表裏無邪胸腹無滿二便自利

而身冷者當以脉爲主脉虛細不振者用藥太過而成脫證也急宜温補少緩卽死生脉散加茂术苓芍平補陰陽冷甚者加熟附子時疫身冷一證最難下手初起時若寒熱不辨且勿妄投湯劑當少待之多則十二日少則半日多有自行傳變卽發熱煩渴者此時則易於用藥若已經發熱傳變之後變爲身冷則自有口燥舌乾不得臥諸證在此時藥不可緩緩則熱深厥深雖下後厥回往往亾陰而死身冷與惡寒不同而病機頗同當與惡寒條參看

呃逆

時疫呃逆與傷寒不同傷寒呃逆虛實寒熱俱有時疫呃逆惟熱結下焦而已凡見呃逆卽當下之下之不止按其臍腹有硬痛拒按處仍當下之有下至十數次方止者總之逐盡結熱腸胃通達其呃自止慎不可用丁香柿蒂湯治呃而遺結熱致成危證也

吐蚘

傷寒吐蚘多寒熱錯雜時疫吐蚘則有熱無寒治此證之當汗當清當下一以傳變之大勢爲主惟加烏梅黃連以安之慎勿用烏梅圓中諸辛熱藥致成危篤也

汗法

時疫貴解其邪熱而邪熱必有着落方着落在肌表時非汗則邪無出路故汗法爲治時疫之一大法也但風寒汗不厭早時疫汗不厭遲風寒發汗必兼辛温辛熱以宣陽時疫發汗必兼辛凉辛寒以救陰風寒發汗治表不犯裏時疫發汗治表必通裏其不同有如此故方疫邪傳變出表時輕者亦可得表藥而汗散若重者雖大劑麻黃羌葛亦無汗也以伏邪發而未盡之故亦有不用表藥而自汗淋漓邪終不解者蓋自汗緣裏熱鬱蒸而出乃邪汗非正汗也必待伏邪盡發表裏全徹然後或戰汗或狂汗而解所謂汗不厭遲者此也辛凉發汗則人參敗毒散荆防敗毒散之類是辛寒發汗則大青龍九味羌活大羌活之類是發表兼通裏則吳氏三消飲六神通解散防風通聖散之類是更有不求汗而自汗解者如裏熱閉甚用大承氣以通其裏一不已而再再不已而三直待裏邪逐盡表裏自和多有戰汗而解此不求汗而自汗解者一又如裏熱燥甚病者思得凉水久而不得忽得痛飲飲畢落枕而汗大出汗出卽解此不求汗而自汗解者二又如平素氣虛屢用汗藥不得汗後加人參於諸解表藥中覆盃立汗此

不求汗而自汗解者三又如陰虛及奪血枯竭之極用表藥全然無汗用大滋陰潤燥生津藥數劑而汗出矣此不求汗而自汗解者四總之疫邪汗法不專在乎升表而在乎通其鬱閉和其陰陽鬱閉在表辛宗辛寒以通之鬱閉在裏苦寒攻利以通之陽亢者飲水以濟其陰陰竭者開導血凝者消痰必察其表裏無一毫阻滯乃汗法之萬全此時疫汗法理不同於風寒謹撮諸汗症詳列於左

發熱　惡寒　無汗　頭項痛　背痛　腰痛　肩背痛　腸胃脹痛　周身肢節痛

咽逆

當下證

舌乾　舌卷　舌短　舌生芒刺　舌黑　齒燥　鼻如烟煤　胸腹滿痛　狂　沉昏　發熱汗多　身冷

舌黃　讝語　善怒　多言　協熱利　頭脹痛　頭躁

緩下證

舌淡黃苔　微渴　大便閉　小便黃赤　潮熱　齒燥

以上諸證緩下者不下則必漸重而為急下證急下者失下則雖下之多不通而致結熱自下逆上脈浮直至心下又逆上透過膈膜有逆胸滿如石咽喉銳痛目直視反白或瞎盲瞳散耳聾九竅不通雖有神丹莫之能救矣外更有吾血

之結邪在膜下小承氣湯下之結邪在膜及膜下調胃承氣湯下之痞滿燥實三焦俱結大承氣湯下之此外又有本質素虛或老人久病或屬汗屢下後下證雖具而不任攻攻者則麻仁丸蜜煎導法豬膽導法為妙下法之輕重緩急總以見證為主詳列於後

急下證

舌乾　舌卷　舌短　舌生芒刺　舌黑　齒燥　鼻如烟煤　胸腹滿痛　狂　沉昏　發熱汗多　身冷

舌黃　讝語　善怒　多言　協熱利　頭脹痛　頭躁

緩下證

舌淡黃苔　微渴　大便閉　小便黃赤　潮熱　齒燥

以上諸證緩下者不下則必漸重而為急下證急下者失下則雖下之多不通而致結熱自下逆上脈浮直至心下又逆上透過膈膜有逆胸滿如石咽喉銳痛目直視反白或瞎盲瞳散耳聾九竅不通雖有神丹莫之能救矣外更有吾血

前水諸下法前已散見諸條茲再詳列以便繙閱

畜水證　小便不利　大便微利

畜血證　小便自利　大便黑　他若畜水畜血在胸脇不當下者叱不贅

清法

時疫爲熱證未有不當清者也其在表宜汗使熱從汗洩汗法亦清法也在裏宜下使熱從下洩下法亦清法也若在表已得汗而熱不退在裏已下而熱不解或本來有熱

無結則惟以寒涼直折以清其熱而已故清法可濟汗下之不逮三者之用可合而亦可分時疫當清者十之六七則清法不可不細講也凡清熱之要在視熱邪之淺深熱之深者在腦脇花粉知母葉仁梔子豆豉爲主熱在腸胃者當用下法不用清法或下兼清亦可熱入心包者黃連犀角羚羊角爲主熱直入心臟則難救一須用至錢許少則無濟非若小兒驚風諸方每用分許即可有效當清諸證詳列於左

熱在營衛證

寒熱汗自出　不惡寒反惡熱　身重　頭面項紅腫　周身紅腫　斑疹　鼻孔乾　唇燥　煩躁　遺尿　舌苔白

熱在胸膈證

身熱反減　渴喔　欬　咽乾　譫語　多言　胸前紅腫　舌苔厚白

熱在腸胃證

便血　便膿血　餘悉見下證條中

熱在心包及心證

狂　沉昏　多睡　舌黑

和法

寒熱並用之謂和補瀉合劑之謂和表裏雙解之謂和平其亢厲之謂和所謂寒熱並用者因時疫之熱邪之淺深熱之深之寒故用此法以和之也凡方中有黃連與生薑同用黃芩與半夏同用石膏與蒼朮同用知母與草果同用者皆是所謂補瀉合用者因時疫之邪氣實人之正氣虛故用此法以和之凡方中有參芪歸芍與硝黃枳朴同用者是所謂表裏雙解者因疫邪既有表證復有裏證故用此法以和之凡方中有麻葛羌防柴前與硝黃梔芩澤枳朴合用者是所謂平其亢厲者因時疫之大勢已去而餘邪

未解故用此法以和之或用下法而小其劑料緩其時日或用清法而變其湯劑易為九散者皆是凡此和法雖名為和實寓有汗下清補之意疫邪尤有宜和者凡熱不清而昏倦痞利不止者當補陽所謂養正以却邪者是四君異功生脉六君理中建中附子等方酌用諸證詳後

當補陰證

舌乾無苔　舌黑無苔　耳聾　目直視　目不明　服清凉藥渴不止　服清凉藥煩熱加甚　服攻下藥舌苔愈長　服攻下藥舌苔反刺燥裂愈甚　服清凉藥身熱愈甚　身體枯瘦　用利水藥小便愈不通

腰膝痠軟　周身骨節痛不可移動　多睡　多冷汗　汗出身冷經日不回　小便清而多　大便利清穀　嘔吐用清熱開導藥愈甚　自利用清下二愈甚　痞滿

當補陽證

四損

大勞大慾大病久病後為四損氣血兩虛陰陽並竭復受疫邪正虛則邪入愈深邪深則傳化難出汗下傷正而正脫補則鬱邪而邪纏多不可治然補瀉兼施間有愈者此為病藥所傷當消息其所傷在陰在陽以施補陰補陽之法庶邪狂熱證傷陰者多然亦有用藥太過而傷陽者

補瀉合用之法有先補後瀉之法有先瀉後補之法凡人參敗毒散人參白虎湯黃龍湯竹葉石膏湯皆補瀉合用之法也先用補劑後施汗下先補後瀉之法也先用汗下後施補劑先瀉後補之法也當詢病之來路揣酌施治尤當審現在之證若純見實證亦不可以疑似之見懼人大熱之證而一二處微見虛象則吃緊幹凡周身俱見大實大熱之證而一二處獨見虛象則吃緊幹照顧其虛周身俱見虛象而一處獨見實證則吃緊幹旋其實此治病之權衡也若夫汗之而表證愈增如頭痛身痛更甚之類清下而裏證愈增如煩渴痞滿更甚之類則大虛有盛候也急宜補之毋疑既辨其證尤當細辨其脈凡遇脈之浮候盛大者須謹察其沉候有無力處六部脈皆盛者須謹察其一部有獨無力處果得其一部一候之真無力便可畧其諸部諸候之假有餘從而施治有獨見若神之妙夫既詢得其來路之大槩又察得其輕重之確據再加之脈理精詳則燭照無遺矣其損證之狀甚多當參後四不足條看

四不足

四損由人事四不足由天禀四損在暫時四不足在平素然四不足亦有由四損而來者不可以四損之外便無不足四不足者氣血陰陽也氣不足者少氣不足以息語言

三復

三復者勞復食復自復也勞復者大病後因勞碌而復也不必大費氣力即梳洗沐浴亦能致復復則復起惟脈不沉實為辨輕者靜養自愈重者必大補以調其胃和其脾待其表裏融和方愈誤用攻下清涼必致不救宜神養血湯主之若因飯食過多而復者舌苔必復黃輕則損穀自愈重則消導始愈若無故自復者乃伏邪

未盡也當問從前所見何證服何藥而解今仍用前藥以滌其餘邪則愈○時疫復證有復至再三者○屢復之後必兼四損四不足證宜察前條加減進退之法治之○

辨似

凡病皆以虛實寒熱四字爲大綱○時疫何獨不然○但虛實寒熱之眞者易辨○似者難辨○前所列時疫表裏諸證○皆實邪熱邪○而實熱中亦有虛寒○四損四不足皆虛邪寒邪○而虛寒中亦有實熱○余於逐條下已細辨之矣○然有實證似虛○虛證似實○熱證似寒○寒證似熱○尤不可不細辨○故復通論而詳述之○所謂實證似虛者○即以表證論之○頭痛發熱○

邪在表也○其脈當浮○證當無汗○而反自汗○脈無力○用發表藥○而身反疼痛○則似虛矣○故人惑於多自汗○而誤用桂枝湯者有之○惑於脈無力○而引仲景太陽篇發熱惡寒○脈微弱爲無陽○而誤用建中湯者有之○惑於身疼痛○而引仲景若本痙身體疼痛○當溫其經○誤用四逆湯者有之○不知此等證在時疫○皆裏熱之似寒也○裏實之似虛者也○其自汗者○疫熱在表○實證之似虛者也○其自汗者○疫熱自裏蒸出於表○非表虛也○其脈無力者○熱主散漫○散漫則脈軟○非比寒主收斂而脈緊也○身體反疼者○伏邪自裏而新出於表○非比陽虛不任發表也○此表證之實證似虛者也○又以半表半裏論之○寒熱往來○胸脇滿○邪在半表半裏

用桂附者有之○惑於自利○而用參朮乾薑者有之○不知此等證在時疫○皆裏熱之似寒也○裏實之似虛也○其自利者○邪熱結於裏○結於下○氣不達於外○逆於上也○其自利者○乃邪熱結於腸胃○氣不達於營衛也○其身反厥冷○脈滑者○乃邪熱結於裏○結於下○氣不達於外○逆於上也○其自利者○乃熱結旁流也○此裏證之實證似虛○熱證似寒者也○總之時疫爲熱四與風寒之異○因大異○故脈證雖有似虛似寒之時○而一辨其爲時疫○則屬邪自外至○邪氣盛則實○大都反見虛寒假象○明眼人不當爲所惑也○所謂虛證似實者○即以表證論之○頭痛發熱○身疼痛○自汗脈浮大○邪在表也○而屢用表散清涼藥不懈○不減○其證轉甚者○非藥力之不

到乃正氣不能傳藥力達表陰液不能隨陽氣作汗也此邪在表時虛證之似實者也氣虛者加參芪於表藥即汗陰虛者加潤劑於表藥即汗若不知其氣血之兩虧而宜表不已勢必暴厥而成脫證矣更以半表半裏論之胸脇痛耳聾嘔吐如瘧狀脉弦邪在半表半裏也而屢用和解消導藥不惟不減其證更加者非藥力之不到乃中焦脾胃傷而氣不運肝木傷而火燥逆也此疫邪在半表半裏時虛證之似實者也必合四君亦和解藥中台四物於清解藥中始能戰汗而解若更消導清解不已必至胃氣絕而死更以裏證論之舌苔黃黑裂燥苡刺胸腹脇腑

硬痛大小便閉六脉撒大邪在裏也而屢用攻利藥或總不得利或利後更甚非藥力之不峻乃正氣不能傳送腸胃血液不能滋潤腸胃也氣虛者助氣以資傳送血枯者養陰以藉濡滑氣行津化方得通利此疫邪傳裏時虛證之似實者也若不知其虛攻利必昏沉痰頓而死總之藥不中病則傷正氣傷其下則正氣浮越而上逆傷其中則正氣解散而外張脈證雖有似實似熱之時而一詢其來路若治之太過則屬氣從內奪正氣奪則虛明眼人不當為所惑也夫一證而虛實互異用藥稍訛而生死攸分將以何者為辨證之把柄乎曰以開卷所列氣色

神脉舌苔辨其是疫與非疫以會經誤治與未經誤治辨其時疫之為實為虛則得其大綱更細玩前所列各證條分縷析之詳則得其細目則似是而非之證斷不能惑矣余於前各條下每證已細辨其虛實而此復重言以通論之者正以前散見於諸條恐讀者易過故復總論以提撕其為吃緊處也至若寒證似熱則傷寒諸證有之時疫絕無故不論及云

遺證　編病後不表裏證

發腫

時疫大勢已平寒熱已解而面目肢體浮腫有食滯中宮

水停心下氣復未歸三種當分別以施治食滯中宮者乃病後脾胃大虛不能消穀病者首中枯燥偏欲多食食停心下膈上則水不得上輸於肺肺亦不能通調水道下輸膀胱故溢於肢體而為浮腫其證以心下膈上有硬處按之則痛為異小便或利或不利當平胃散加枳實山查麥芽萊菔子青皮神麯為主硬處消則腫自愈或加苓澤兼利水亦可水停心下者乃脾虛不能消水也與食滯異者心腹無硬痛小便不利也用苓澤車前木通之類利其小便而愈氣復未歸者吳又可所謂病後氣復血未復氣無所歸故作腫也不可治腫調其飲食節其勞役靜養自愈

其異於停水食滯者。水停身重。小便不利。氣腫身輕。小便自利。食滯腹中有結氣。腫腹中自和也。

發頤

時疫愈後有發頤者。乃餘熱留於營血也。治以解毒清熱活血疎散為主。誤則成膿不出。而牙關不開。咽喉不利。多不能食而死。毒內陷而復吞燥神皆亦死。出膿後氣虛血脫亦死。故宜早治也。古方以普濟消毒飲為主。發在耳後以柴胡川芎為君。在項下以葛根為君。在項後或巔頂加羌防。此證不可輕補於未潰之先。補早必成膿。先不可純用寒涼於將發之際。恐閉遏而毒不得發。故必兼疎散為要。外治以葱水時時浴之。

發瘡

時疫愈後發瘡者。極多餘熱淫於肌肉也。多服清涼養氣血葉自愈。

發痿

時疫愈後四肢不能動移者。熱傷筋脈也。吳氏諸痿養榮湯酌用。輕者粥食調理自愈。

索澤

時疫愈後身體枯瘦。皮膚甲錯者。熱傷其陰也。養陰為主。吳氏諸養榮湯酌用。亦有粥食調理自愈者。

發熱

時疫愈後有發骨蒸如勞瘵者。乃餘熱留於陰分也。不可以其羸瘦而遽用虛損門治法。必察其六府有結邪。則仍攻其邪為主。次察其氣道有痰涎。則仍利其痰涎為主。數者俱無。然後以清熱為主。或無邪而陰傷。方可純用養陰之藥。或分其餘和之。更妙。

婦人

婦人時疫。悉與男子同。惟當經期則治法異。以其關乎

血室也。凡遇感疫值經期者。治法必兼少陽。以少陽與厥陰為表裏。厥陰為血室。血室一動。邪必乘虛而犯之。須分適來因受病而止。適來受病而自行。適斷而受病。三種則虛實自見。凡經水適來而受疫氣遽止者。必有瘀血。要再察其脇腹少腹有牽引作痛拒按者。必以清熱消瘀為主。小柴胡加赤芍延胡桃仁歸尾丹皮。凡經水適來而受疫氣疫病。雖發而經水照常自行者。不必治其經。血但治其疫邪。而病自愈。蓋病本未犯血室。故經血自行如常也。仲景所謂勿犯胃氣及上二焦。必自愈者。正指此非謂總不用藥也。凡經水適斷而受邪者。經行已盡。則血海空虛。邪

必乘虛而陷入血海若見腰脇及少腹滿痛者大柴胡湯加桃仁赤芍逐其血室之邪如愈凡婦人受疫但見晝日明了至夜譫語即當詢其經期以防熱入血室之漸

妊娠

妊娠感時疫須治之於早則熱不深入而傷胎當汗當清之證當速治不待言當下之證尤不可遲若因妊娠忌下傷胎之說因循留遲則胎受熱蒸而反易墮一見譫語下其熱其胎反安然無事蓋有病則病受之內經所謂有故無殞者於此見之此歷驗不誣者妊娠受疫當下失下至於舌黑腰痛少腹下墜至急則其胎多死腹中自欲隨矣此時下亦墮不下亦墮然下之胎墮母猶可救十中二三不下則母無生理胎亦不能獨存同一墮胎而此善於彼當明言於病家而後施治下藥雖三承氣皆可用惟芒硝當慎以其專主傷胎非大實大熱大燥不可試也

小兒

小兒受時疫悉與大人同而時見驚搐類於驚風誤治多死用大人治疫清解諸法減小劑料以治之則愈小兒不能言渴當下症既不知其譫妄復難驗其舌苔則當驗其唇唇赤而燥即是下證此幼科之要訣也

廣瘟疫論方目

大青龍湯　六神通解散
九味羌活湯　蓑衣黃湯
大羌活湯　人參敗毒散
吳氏達原飲　小柴胡湯
衆甘草湯　柴胡四物湯
參胡三白湯　清脾飲
大承氣湯　小承氣湯
調胃承氣湯　人參白虎湯
黃龍湯　六味地黃湯
生脉散　四物湯
越婢湯　陽旦湯
黃芩湯　梔子豉湯
黃連解毒湯　小陷胸湯
導赤瀉心湯　豬苓湯
天水散益元散　柴葛解肌湯
吳氏三消飲　六君子湯
歸脾湯　清燥湯
大柴胡湯　吳氏清燥養榮湯
備中益氣湯　三黃石膏湯

防風通聖散　逍遙散
瓜蒂散　葛根葱白湯
平胃散　吳氏承氣養榮湯
涼膈散　四苓散
桃仁承氣湯　茵蔯蒿湯
吳氏舉斑湯　犀角地黃湯
三黃瀉心湯　藿香正氣散
橘皮半夏湯　竹葉石膏湯
大半夏湯　理中湯
十棗湯　二陳湯
白虎湯　白虎加蒼朮湯
白虎舉斑湯　大陷胸湯
大陷胸圓　抵當湯
八珍湯　葛根芩連湯
麻仁丸　天王補心丹
荊防敗毒散　倉廩湯
四君子湯　異功散
附子湯　吳氏安神養血湯
建中湯　普濟消毒飲
吳氏葵貝養榮湯　吳氏柴胡養榮湯
吳氏柴胡清燥湯　吳氏人參養榮湯
吳氏參附養榮湯　犀角大青湯
柴葛五苓散

附方

升麻葛根湯　治寒暄不時多疾疫

升麻　葛根　未詳　芍藥　加生薑

頭痛加芎藭白芷　身痛者加羌活防風　五月退去升麻

胡黃芩湯風　五加黃芩石膏　頭面腫加防風前胡

芩芎黃芩石膏　咽痛加桔梗　瘡出又退解毒等　咽痛加人參

廣瘟疫論方

大青龍湯　治脈浮緊發熱汗出而煩躁者主之　汗出惡風者不可服之而服之必衄衄後惡寒者亦不可服之

麻黃　桂枝　甘草炙　杏仁　石膏　加薑棗煎　此本傷寒方　涼解之法

六神通解散一法有川連羌活細辛　治寒濕相搏頭痛多兼內寒者

麻黃一錢　甘草一錢　黃芩二錢　蒼木二錢　石膏一錢半滑石一錢　豆豉十粒　加葱薑煎　此本傷寒方　涼解之法

九味羌活湯　治傷風傷寒兩感頭痛發熱惡寒身體疼痛或咳嗽流涕或鼻塞聲重或痰飲內停或內傷生冷或挾濕氣或瘴瘧之病

羌活一錢半　防風一錢半　細辛五分　蒼木二錢半　白芷一錢　川芎一錢　黃芩一錢　生地一錢　甘草一錢　加生薑葱白煎　此本傷寒方　涼解之法

麥斐湯　方有乾葛無菊花　涼解之法

姜斐二錢半　麻黃五分　白薇五分　青木香五分　羌活五分　杏仁五分　川芎五分　甘草五分　石膏一錢半　菊花一錢半

大羌活湯　涼解之法

白水煎

羌活　防風　細辛
白朮　川芎　藁本
甘草　防已　知母
黃連　杏仁　石膏
白水煎

人參敗毒散　涼解之法

人參　柴苓　甘草
桔梗　柴胡　前胡
獨活　川芎　蒲荷　口乾去蒲加黃芩
加生薑煎　此本涼散之法　唐本加柳枝

吳氏達原飲　初起有疫

檳榔二錢　厚朴一錢　草果仁五分　知母一錢
黃芩一錢　芍藥一錢　甘草五分

白水煎

小柴胡湯　考正注卯

柴胡　黃芩　人參
甘草　半夏

加生薑大棗煎

炙甘草湯　考正注卯

人參　桂枝
阿膠拌炒　生地　麥門冬

麥冬　生地
加生薑大棗水酒各半煎
柴胡四物湯　考正於和
柴胡　半夏
甘草　當歸
生地
加薑棗煎
參胡三白湯　考正於和
人參一錢半　白木一錢半　柴胡二錢　白芍一錢半
白茯苓一錢半

白水煎若脈微弱口渴心煩加麥冬五味子若煩口
苦心下痞加黃連枳實若不眠加竹茹
清脾飲
青皮　柴胡
半夏　甘草
草果　厚朴
茯苓　黃芩
加生薑煎　白木
大承氣湯
大黃四錢酒炒　芒硝二錢　厚朴二錢　枳實一錢
白水煎

小承氣湯
大黃四錢　厚朴一錢　枳實一錢
白水煎
調胃承氣湯
大黃三錢酒炒　芒硝二錢　甘草一錢
白水煎
人參白虎湯
石膏　知母　甘草
加粳米煎
青龍湯

大黃三錢　芒硝二錢　厚朴一錢半　枳實一錢
甘草一錢　人參一錢半　當歸二錢
加生薑五片大棗一枚煎
六味地黃湯
熟地　山藥　山萸肉
丹皮　澤瀉
新汲井水煎　茯苓
生脈散
人參　麥冬　五味子
白水煎

四物湯　川芎　當歸　白芍　熟地
　新汲井水煎
越婢湯　麻黃　石膏　甘草
　加生薑大棗煎
陽旦湯　桂枝　芍藥　甘草　黃芩
　加生薑大棗煎
黃芩湯

黃芩　芍藥　甘草
　加大棗煎
梔子豉湯　梔子　香豉
　先煮梔子後入香豉白水煎
黃連解毒湯　黃連　黃柏　黃芩　梔子等分
　白水煎
小陷胸湯　黃連　半夏
　栝蔞實

導赤瀉心湯　黃連　酒洗　黃芩　酒洗　山梔薑汁炒黑
　先煎栝蔞實後內二味白水煎
知母　鹽酒拌　犀角鎊　甘草　生地
麥冬去心　茯苓各一錢
　加燈心生薑大棗煎
豬苓湯　豬苓　茯苓　澤瀉　阿膠
滑石各一兩
　白水煎

天水散加硃砂名益元散　滑石六錢　甘草一錢
　研細末井水或燈心湯調
柴葛解肌湯楼法加石膏一錢　柴胡　葛根　甘草　芍藥　羌活　白芷　黃芩　桔梗
　加薑棗煎
吳氏三消飲　枳椇　厚朴　草果　葛根　芍藥　甘草　知母　羌活

黃芩　柴胡
加薑棗煎　大黃
六君子湯
人參　白朮
陳皮　干夏
加薑棗煎
歸脾湯　一方無白芍
人參　白朮　黃芪　茯神
棗仁　遠志　木香　甘草
白芍　炙甘草　當歸
加桂圓肉薑棗煎

清燥湯
蒼朮一錢炒　白朮五分炒　黃芪一錢半　人參三分
茯苓三分　黃連一分炒　黃柏二分炒　甘草二分
陳皮五分　猪苓二分　澤瀉五分　升麻二分
柴胡一分　五味子九枚　神麯　分炒　麥冬二分
當歸二分酒洗　生地黃二分
白水煎
大柴胡湯
柴胡一錢　大黃二錢　枳實一錢　黃芩一錢
半夏一錢　白芍一錢
加生薑三錢大棗一錢前
吳氏清燥養榮湯
知母　天花粉　當歸身
甘草　生地汁　陳皮
加燈心煎
補中益氣湯
人參　白朮　黃芪　茯神
陳皮　當歸　木香　甘草
加薑棗煎

三黃石膏湯
黃柏　黃芩　黃連
淡豆豉　麻黃　石膏
加生薑大棗細茶煎熱服
防風通聖散又名雙解散
防風　大黃　當歸
芒硝　荊芥　麻黃
連翹　甘草　桔梗
滑石　薄荷　黃芩
川芎　白朮　石膏　梔子　枳藥

加生薑葱白煎　去蓋表至通裡之義
逍遙散　白芍　白朮
柴胡　當歸　薄荷
茯苓　甘草
加煨薑煎
瓜蒂散
甜瓜蒂炒黃赤小豆
共爲末熟水或鹽水調量虛實服或用搐鼻
葛根葱白湯
葛根　芍藥
知母　川芎
加葱白生薑煎
平胃散　陳皮　甘草
蒼朮　厚朴
加薑棗煎
吳氏承氣養榮湯
知母　當歸　芍藥　生地　黃
大黃　枳實　厚朴
加薑煎
涼膈散　芒硝　大黃　山梔　連翹

黃芩湯炒　甘草　薄荷
加竹葉蜜煎
四苓散吳氏有陳皮無白朮亦名四苓湯
茯苓　猪苓　澤瀉　白朮
白水煎
桃仁承氣湯
大黃　芒硝　甘草　桃仁
桂枝　白朮
白水煎
茵陳蒿湯
茵陳　大黃　梔子
白水煎
吳氏舉斑湯
白芍一錢　當歸一錢　升麻五分　白芷七分
柴胡七分　穿山甲二錢炙黃
加薑煎
犀地黃湯
犀角　生地　丹皮　芍藥
白水煎
三黃瀉心湯湯液論有黃芩　保命集有甘草

大黃　川黃連
以昧沸湯漬之須臾絞去滓溫服
藿香正氣散
大腹皮　紫蘇　藿香　甘草
桔梗　陳皮　茯苓　蒼朮
厚朴　半夏麴　白芷
加薑棗
橘皮半夏湯
陳皮　半夏
加生薑煎
竹葉石膏湯
人參　半夏　麥冬　甘草
竹葉　石膏
加粳米生薑煎
大半夏湯
半夏　人參　白蜜
以水和藥蜜揚之二百四十遍再煎
理中湯
人參　白朮　炒乾薑　炙甘草
白水煎

十棗湯
芫花熬　甘遂　大戟等分
大棗十枚煮湯內藥末強人服一錢七
二陳湯
陳皮　半夏　茯苓
白虎湯
石膏　知母　甘草
加粳米
白虎加蒼朮湯
即白虎湯加蒼朮
白虎舉斑湯
石膏　知母　甘草
白水煎
大陷胸湯
大黃二兩　芒硝一升　甘遂一錢為末
先煮大黃去滓內芒硝煮一二沸內甘遂末溫服
大陷胸圓
大黃八兩　芒硝　葶藶炒　杏仁去皮尖各半升
合研取彈大一丸別搗甘遂末一錢白蜜二合煮服

水蛭三十箇 蝱蟲三十箇去翅足炒 桃仁三十去皮尖研 大黃四兩酒煮
白水煎

八珍湯

人參 茯苓 當歸 熟地
白朮 甘草 白芍 川芎
加薑棗煎

葛根芩連湯

葛根 黃芩 黃連 甘草
白水煎

麻仁丸

麻仁二升 芍藥半斤 大黃去皮一斤 枳實一
厚朴一尺去皮 杏仁一升去皮尖熬別作脂
煉蜜丸

天王補心丹一方有甘菊蕎無五味子一方有甘草
生地四兩酒洗 人參五錢 元參五錢炒 丹參五錢炒
茯神五錢 遠志五錢去心炒 棗仁二兩炒
五味子一兩 天冬一兩去心炒 麥冬一兩去心炒 當歸一兩酒洗
柏子仁一兩炒去油
蜜丸硃砂爲衣燈心湯下

荊芥 防風 柴胡
獨活 前胡 川芎
人參 甘草 桔梗
加薄荷葉煎 此李濬若行之疫病

倉廩湯
人參 茯苓 甘草 羌活
柴胡 芜活 獨活 枳殼
枳殼 川芎 前胡 桔梗
加陳倉米生薑煎

四君子湯

人參 白朮 茯苓等分
加薑棗煎


異功散

人參 白朮 茯苓
陳皮 炙甘草
加薑棗煎

附子湯

附子 白朮 白茯苓
人參 白芍
白水煎

崇氏安神養血湯
茯神　棗仁　遠志
桔梗　芍藥　當歸　地黃　甘草
加龍眼肉煎
建中湯此小建中湯
桂枝　芍藥　甘草
加生薑大棗飴糖煎
普濟消毒飲
黃芩　黃連　人參　橘紅
元參　生甘草　桔梗　柴胡
薄荷　連翹　風豉子　板藍根
馬屁勃　白殭蠶　升麻　青
白水煎
吳氏蔞貝養榮湯
知母　花粉　貝母　栝蔞實
橘紅　白芍　當歸
白水煎
吳氏柴胡養榮湯
柴胡　黃芩　陳皮　甘草
花粉　當歸　白芍　生地
知母
加生薑大棗煎
吳氏人參養榮湯
人參　麥冬　遠五味　地黃
歸身　白芍　知母　陳皮
甘草　甘草
白水煎
吳氏參附養榮湯
當歸一錢　白芍一錢　生地三錢
附子七分炮　乾薑一錢　人參一錢
白水煎
犀角大青湯
犀角上　大青中　元參中
升麻中　黃連中　黃芩中
山梔中
水二鍾煎一鍾



柴葛五苓散　時疫並病氣陽明証者宜
柴胡　葛根
猪苓　白朮
金匱竹葉湯　原治產後風表虛而未除頭痛
竹葉　葛根　防風　桂枝　桂枝
人參　甘草　炮附子　生薑　紅棗
一云加半夏
此方用竹葉葛根桂枝防風桔梗解外之風無汗
汗自固裡之脫甘草黃芩調陰陽之氣而使其平乃
表裡並清之法凡風熱外淫而裡氣不固者宜之此
劉氏保慶多效

葛根湯　治汗後行痙表
葛根　前胡　黃芩　甘草　葛根　麥門冬　劉方有
大青神湯
葛根　香附　淡豉　甘草　升麻　葛根　麻黃　白芷　加薑
大青神木散　治山嵐瘴氣一月者痛楚至甚瘧時去
白芷　蒼朮　厚朴　茯苓　甘草　芍藥　石菖蒲

郭右陶先生著

痧脹玉衡全書

序

憶昔癸未秋。余在燕都。其時疫病大作。患者胸腹稍滿。生白毛如羊。日死人數千。竟不知所名。有治之以鍼。血出。病隨手愈。於是城中舁而就醫者。亦日經李君見之。曰。此痧脹也。桃

以千計。皆得愈而去。頃之。症變而爲嗽。嗽甚輕。不半

日隨斃。時李君已出都。有知者曰。此亦痧也。用前法挑之。亦隨愈焉。余時目擊其事。歸而與知醫者言之。卒疑信交半。無何。則吾鄉人有棄穢藏感痧。倒用錢物。蘸油而刮。及此多用挑。然挑痧之法盛行矣。先走鄉

時未有論及。後人稍有青筋之說。仍略而不詳。因而求人之信者少。疑者益多。用藥之方。遂置之不論。人不幸犯是症。無得全者。噫是可憫也。友人右陶郭君明理讀書。旁捘醫學。見近之患痧者日益衆。而治痧者不聞。乃精心殫思。推原於小兒痧疹之理。兼求之

醫者不道。及考諸醫書。古

古方。多有不言痧而見痧之意者。且驗之諸所救療。無或爽。因以自信。遂發願廣之天下後世。爲百千萬人命之救。著有玉衡一書。


右陶之心切矣。右陶之功大矣。右陶嘗言。痧本無定脈。凡脈與所患之症不相應者。卽爲痧之脈。痧亦無定症。或感風感食感勞感痰而以本症治之不效者。皆爲痧之症。治爲痧之法。於是書也。右陶治痧之功乎全。而世人將讀其書以治痧。兼以治右陶之所不及治。右陶之心。於是大快。雖不欲居其功又安歸

哉。余既見痧之事。又信右陶之說。敢爲之言。雖然。不足爲愚者道也。

昔

康熙十四年乙卯重陽日

里人王庭題



自敘

嘗論一元運化。升而爲天。凝而爲地。人生其中。道配三才。惟其有氣。所以大之兵農禮樂。小之屠釣工商。缺一不可。而況炎帝肇創。嘗藥療病。尤斯人生死所係者乎。歷代相沿。神醫迭出。載籍紛紛。惟救疾苦。就急療痧一症。時有懸命須臾。兆變頃刻者。竟置不論。如雲林龔先生所誌諸書。歷有年矣。迄今誦法不衰。時多宗之。然云青筋所謂痧也。惜自古以來。從未論及。是以其疾往往不治。余竊以爲生死甚大。望醫如望救溺。詎可聽人之有是疾而不爲之生全乎。余高曾以經術起家。箕裘累葉。余少列宮墻。讀古惠鮮懷保。慨然有恫恤生民之志。嘗願爲悉者解困危

者甦命。因編閱仲景東垣丹溪諸先生論。而帖括所拘。有懷未展。鼎革以後。播遷不一。或羈留武水。或跋涉秦溪。每憶昔年尋章摘句。不過滄窶一身。毫無裨益於世。既而旅食江淮。浪遊吳越。所在時行瘍脹。被禍不少。余心惻然。思得一術以濟之。竊恐世人犯而不識。多有坐視其死者。故凡遇杏林先輩

未嘗不造而問焉。見松隱異人。未嘗不就而請焉。即冊籍所載。鮮不於晤對之間。互相參攷。然於瘍也。究不得一要旨。已後返棹檇李。接求高會所遺前賢諸秘葦。有其傳。變難治異症。或定於濂洛大儒。或議諸楚粵高士。雖篇頁零星。各有同異。皆透參靈素甲乙諸經。以推廣仲景先生之意。惜專籍無傳。沉卧日久。雖獲遺言。猶必酌量於累黍之度。而神

明其治法焉。此非昔人無是疾。今人始有是疾也。抑非昔人之病可略。今人之病當獨詳也。余所以念茲在茲。日孜孜焉從事筆墨間。惟此救人是論。要不外夫推已之心。俾天下咸慰及人之願。斯已耳。昔人有言。道之貴。以治身。其緒餘以爲天下。余獨不敢云治身與爲天下有二也。蓋醫之爲

可施至於風氣之邪。年歲之多寡。精力之厚薄。必須以己爲斷。然後原疾量藥。貫微徹幽。度節氣而候溫凉。參脉理而合輕重。始乃取應如神。提於桴鼓。不然。鹵莽從事。是猶南轅而返北轍也。烏可得哉。

皆

大清康熙十四年歲次乙卯燈月檇李郭志遂右陶氏自序於裕賢堂

參閱姓氏

朱介齋　徐日藷旭始　葉尹公端木

戴履吾三　陳麟閣遠　金敏鎮子政

施鑒范韓友　聞鳳詔翰貢　李御元龍

沈偉侯菴　姚弘猷公亶　徐剛振子大

彭楨兆基　王士榮培元　何溶新畧

王沆宋臣　李葵生西雯　馮幹致章

曹繼耀舒文　王彩霽夏　姚敏修遜躬

孫渭璜熊襲

王師吉叔公

李國日紫崗　朱宏猷臣　兄志達聖翼

潘慾功用成　陸渭宙眉　弟世宏次鰲

陸震材南軒　陸愈叔韓

凡例

一言有不實治有不效者一旬不載

一藥有不當用有不明者一味不入

一據症用治立方制宜非痧不錄

一按脉閱筋恐人有惧詳之有據

一砭刺痧筋必須紫黑毒血據爲實見

一載雜症健取兼痧諸病虛實悉在所略

一心腹痧痛刮放即愈不煩醫藥者不多載入

一治驗不過一二三四惟略見治法爲準餘不多

贅

一余近地氣稟柔弱故方中分兩從乎減少便能取效此雖傳示四方不敢多加

一製方分兩甚少若遇西北風高土燥之地剛強勇壯之人其分兩必須加倍或加二倍三倍方能有效

一飲湯規則云稍冷者九分冷一分温也云微冷者八分冷二分温也云微温者冷者四分之三温者四分之一也

痧脹玉衡書卷之上目次

痧脹發蒙論
玉衡要訣
痧分表裡辨　治痧宜看凉熱
辨舌辨　大小便宜通
咽喉治法　治痧當絕其根
痧原論　治痧當分經絡
痧與雜症輕重不同治痧三法
痧前禁忌　痧後禁忌
痧脹凶症　痧爲百病變症
醫家當識痧筋　放痧有十
放痧須放盡　痧有放刮不盡辨
用藥不效　用藥必效
用藥大法　痧有實而無虛辨
怪病之謂痧　痧筋不同辨
寒痧辨　放痧不出治法
放痧數次不愈　數犯痧症
痧脹昏迷與雜症不同

痙筋原於血中之毒
慢痙必須速治　痙症治要宜明
治痙須先明百病　刺腿灣痙筋法
刮痙法　用針說
痙脹用藥不厭多　痙脹宜下辨
痙後治雜症宜知　當知不信之說
玉衡書脉法
痙脉十二經辨　痙脉外感內傷辨
痙脉要訣　痙脉有似險症辨
痙脹玉衡書　目次　二
痙脉似氣血有餘辨
方書脉訂宜參　脉貴審於幾先
痙脉決生死法
以下細述發蒙論不盡
暗痙辨　傷寒兼痙　痙症類傷寒
痙類瘧疾　瘧疾兼痙
痙脹玉衡書卷之中
偏身腫脹痙　閉痙　落弓痙
噤口痙　角弓痙　撲鴨痙
傷風咳嗽痙　痘前痙脹　痘後痙脹
胎前產後痙　胎前痙痛論　產後痙痛論
倒經痙　痙熱頭汗痙　狂語附痙
老弱兼痙　瘡症兼痙　弱症兼痙
痙變勞瘵　臌脹兼痙　痙變臌脹
半身不遂痙　內傷兼痙　紫疱痙
痰喘氣急痙　痙瘋　痙重
眼目痙　瘟痙　頭眩偏痛痙
流火流痰痙　咳嗽嘔噦痙
痙脹玉衡書卷之下　目次　三
霍亂痙　絞痛痙
痙痫　蛔結痙　頭痛痙
心痛痙　腰痛痙　小腹痛痙
痙塊　痙變吐血鼻衄傷便紅
吐蛔瀉蛔痙　痙變腫毒
玉衡備用要方
五風散痙湯　荊芥湯　陳皮厚朴湯
稜木湯　藿香湯　薄荷湯

紫蘇厚朴湯　防風勝金湯　必勝湯
紫朴湯　獨活紅花湯　射干兜苓湯
當歸枳殼湯　荊芥銀花湯　桃仁紅花湯
清涼至寶飲　紅花湯　如聖散
寶花散　沉香麝金散　圓紅散
化毒丹　三香散　三香丸
救苦丹　冰硼散　牛黃丸
細辛大黃丸　和脾宣化飲　消疽解毒散
牛黃八寶丹　活絡透毒飲　忍冬解毒湯
撥雲散　賽金化毒散　加味活命飲
參歸化毒湯　參苓歸朮散　參苓凱和解飲
沉香丸　沉香阿魏丸　丁沉阿魏丸
阿魏丸　蘇木散　蒺藜散
探吐法　當歸枳殼湯　清氣化痰飲
蒲黃飲　烏藥順氣湯　降香桃花散
木通湯　枳實大黃湯　荊芥薄荷湯
連翹薄荷飲　失笑散　便用七方
絕妙方　藥性便覽　瘍方徐議

評半夏藿香止吐評荊芥細辛防風獨活卷尾另有後記

痧症發蒙論

鵝李郭志遂右陶著

夫君子生于斯世不屑爲天下無所用之人則必求爲天下所必需之人故君子不爲良相則爲良醫蓋良相濟世良醫濟生其所以行我心之不忍者事有相符而道有相類也余于傷寒瘟疹驚風瘧痢與夫胎前産後等症俱所潛心姑不具贅獨是痧之一症長也故痧有放之不出刮之不起便云凶而且放痧數次不愈刮痧數次不疼便聽命于天而垂斃者往往皆然若夫業醫諸友責在救人推其心豈非當世之所謂君子與然其間或有云諸書不載痧名滿洲因而謂非藥可療不知載籍之內原有云絞腸痧者有云乾霍亂者有云青筋者有云白虎症者有云中惡者此皆痧之見于諸書但略而不詳未有專家然不見有云是宜絶藥誠彰明較著而可徵也況痧有爲真頭痛朝發夕死夕發旦死寄于頭痛之條痧有爲真心痛亦朝發夕死夕發旦死寄于心痛之例此二症者雖屬不治若知其原可痧者而療之亦可挽之深而重者脹塞腸胃壅阻經絡直攻乎少陰心君非懸命于斯須即將危于旦夕扶之不起呼之不應即欲刮之放之而痧脹之極已難于刮放矣嗚呼病隣十死誰不傷心痧症至此信乎非藥不能救醒非藥莫能回生則刮放之外又必用藥以濟之然後三法兼備救生而生全庶乎斯人之得有其命也其如世有刮痧放痧之人僅有刮放之能而已餘俱非所長也故痧有放之不出刮之不起便云凶而且放痧數次不愈刮痧數次不疼便聽命于天而垂斃者往

救在醫者必當急爲赴援匪若他症之可以遷延時日姑且慢爲調治也邇來四方疫氣時行即今丑寅年間痧因而發鄉邨城市之中俱見有此等症或爲暗痧或爲悶痧或爲痧痛或爲落弓痧噤口痧挾鶩痧角弓痧盤腸痧或又因傷寒瘧痢與夫胎前産後等症而痧兼發甚至關門被褊隣里相傳可不重悼余嘗遇此等症臨危急救難以屢指其治之大略有三法焉如痧在肌膚者刮之而愈痧在血肉者放之而愈此二者皆其痧之淺焉者也蟲亦輕若夫痧

回況痧有爲頭面腫脹一似大頭瘟痧有爲咽喉鎖閉一似急喉風痧有爲眩暈昏悶一似中風中暑痧有爲昏暗氣逆身體重痛一似鷲魂落魄此皆其勢在危急者不及者非藥將何以救之乎而況痧有頭痛寒熱類于傷寒咳嗽煩悶類于傷風與夫因瘧而兼痧因痧而化瘧或又痢以痧發痧緣痢生而痧症百出傳變多端更不特如此而已也諸如鼻紅吐紅瀉血便血由痧而得者有之更有大腫大毒流火流痰由痧而生者有之或又有胎前產後投劑必當用藥無須看脉之真假認症之的確然後投劑必當用藥無庸如痧在肌膚當刮但刮痧在血肉當放即放痧在腸胃經絡與肺肝腎三陰當藥即藥若痧氣非行不能表裏傳變皆周當三法兼用務在救人於將危而回生於將死之治此等症隨處救人確有奇驗竊恐前人無論難啓後賢因著爲集仍不敢秘以公諸世庶幾其有以行我忘之不忍而幸不爲斯世無所用之人與

瘍脹玉衡書要語

瘍分表裏辨

瘍之初發必從外感。感於肌表。人不自知。則入於半表半裏。故胸中作悶。或作嘔吐。而腹痛生焉。此可以刮瘍而愈。不愈用荊芥湯蘿香湯之類而遞用之。瘍感於半表半裏。人不自知。則入於裏。故欲吐不吐。欲寫不寫。瘍毒衝心。則心胸大痛。瘍毒攻腹。則盤腸弔痛。此可以放瘍而愈。不愈用陳皮紫朴湯稜木湯之類而遞用之。

瘍中於裏。人不自知。則瘍氣壅阻。惡毒逆攻心膂。立時發暈。即欲刮瘍而瘍不起。即欲放瘍而扶之不起。必不得放。即扶起放之。而發暈之時。氣血不流。放之亦無紫黑毒血流出。即有些須。亦不能多。略見紫黑血點而已。此瘍毒入深大凶之兆。斯時病家求救甚切。方可用藥。余但審脈辨症。的係風寒暑濕氣血食積痰飲。何因而施治。令其甦醒。氣血流動。然後扶起放瘍。漸以調治。如不醒。即撾斗黃丸三香丸救苦丹之類以救之。如此重症。必須醫者慈心大發。立時連進湯丸方能有救。遲則必死。

治瘍宜看寒熱

瘍犯太陽則頭痛發熱。犯少陽則來犯陽明則面目如火。但熱而不寒。犯太陰則腹痛。犯厥陰則少腹痛或腰痛面皆身犯手心則心痛或心脹其頭額冷汗如珠。而身或熱或涼。犯乎肺則咳嗽痰喘。微熱甚則身涼。犯乎肝則洩瀉小便溺血。甚則身熱。犯乎大腸則痢下膿血。重則嘔吐身熱。犯乎肝則沉重不能轉側。晡熱內熱。甚則譫語。

治瘍當辨身涼身熱蓄身涼者內熱者宜透其肌。

唇舌辨

瘍者。急症也。若昏迷不醒。口不能言。其心胸煩悶。一種難過之苦。將何以辨之。治宜先觀其唇舌色黑者。黑色而知熱極。淡紅色。雖熱。用藥不可太冷。又要看有胎無胎。其症始有治法矣。

大小便宜通
瘍症危急大便不通急宜放瘍而攻之小便不通宜放瘍而分利之

咽喉治法

瘍症危急若犯咽喉則痙喘如鋸先放其瘍急川薄荷鼠粘子連翹山豆根之類以清之或兼用冰硼散以吹之然後餘症俱從緩治

治瘍當絕其根

瘍之為害治之雖愈若有未除即復肆毒又徧週

身如在表者已刮在中者已放而在內者少有未消一喫米飲或熱湯熱酒即復由內而攻表遂徧週身如在內者已治在表者未刮即復由外而攻內若表裏俱盡治矣而在中者未放亦復傳徧表裏如此可叫得而比也故治瘍當絕其根

瘍原論

瘍症先吐瀉而心腹膠結從傷暑伏熱而發者多徧身腫脹炎痛難忍四肢不舉舌強不言名一寒氣冰伏過時變為火毒而發瘍者多

治瘍當分經絡

腰背顴頁連風府脹痛難忍足太陽膀胱經之瘍也兩目紅赤如桃唇乾口燥腹中絞痛足陽明胃經之瘍也脇肋腫脹痛連兩耳足少陽膽經之瘍也腹脹板痛不能屈伸四肢無力泄瀉不已足太陰脾經之瘍也心胸引痛身重難移作脹作脹足厥陰肝經之

瘍也痛連腰腎小腹脹硬足少陰腎經之瘍也咳嗽聲啞氣逆發喘手太陰肺經之瘍也半身疼痛麻木不仁左足不能屈伸者手太陽小腸經之瘍也半身脹痛倦仰俱廢右足不能屈伸者手陽明大腸經之瘍也病重沉沉昏迷不醒或狂言亂語不省人事手少陰心經之瘍也或獨語一二句手厥陰心胞絡之瘍也胸腹熱甚揭去衣被乾燥無極手少陽三焦之瘍也

瘍與雜症輕重不同

痂與雜症往往相兼。但當首重治痂兼醫雜症。蓋痂症急而雜症緩也。

胎前產後有痂當並重處治。產後宜温痂症宜凉也。故治蓋胎前宜補痂症宜攻。用藥治痂必須斟酌。

治痂三法

肌膚痂用鹽酒之。則痂毒不內攻。血肉痂。看青紫筋刺之。則痂毒有所泄。腸胃脾肝腎三陰經絡痂。治之須辨經絡藏腑。在氣在血。則痂之攻內者可消可散可驅。而絕其病根也。

痂前禁忌

痂忌熱湯熱酒粥湯米食面物。蓋飲熱湯熱酒觸湯則輕者必重重者立斃。米食諸物。恐結成痂塊。日久變出奇疾。甚難救療。如有幸而食消。不殞命者。不可以此為例也。

痂後禁忌

痂症略鬆胸中覺餓。設或一粥進飲食。即復痂脹。立可變重。是必忍耐一二日。為留一分可萬全。

痂脹囚症

痂有心胸高起。如傻傻者。亦治背心一點痂者。亦勿弓及張者。亦勿腰腎一點痂者。亦勿心胸左右有一點痂者不治。腸肋痂者不治。四肢臃痂者。難治。景如煙煤者。亦勿舌卷囊縮者。亦勿環口黧黑者。亦勿頭汗如珠。喘而不休者。亦勿昏迷不醒。放痂不出。點痂不收。大痛服藥不應者。亦勿。

痂為百病變症

諸凡百病。勢極傷人。然亦有未即臨危。尚可緩延時日。而忽然變病。遂致便危。不治者何也。蓋百病之中。有或因病而感夏月暑熱時行之氣。有或淋漓不潔。穢惡衝人。而兼之平時伏毒淡藏。一時痂症。均可乘隙竊發。所貴醫者識窾。先治其痂。後理其病。所謂急則治其標。緩則治其本者。此類是也。

醫家當識痂筋

痂症輕者脈固。如常重者脈必變異。若醫家但識夫脈不識痂筋。勢必據脈用藥。而脈虛虛病變實。誠不可悟。若取脈痂不合者。認痂筋有無。有則據痂用藥。無則據脈用藥。乃無差誤。故余

凡醫家當識瘍筋

放瘍有十

一在頭頂心百會穴　一在印堂

一在兩太陽穴　一在喉中兩旁

一在舌下兩竅　一在雙乳

一在兩手十指頭　一在兩臂灣

一在兩足十指頭　一在兩膕灣

凡瘍有青筋紫筋或現於數處或現於一處必須用鍼刺之先去其瘀血然後據瘍用藥治其脾肝腎及腸胃經絡瘍萬不失一

瘍脹玉衡書　卷上

放瘍須放盡

當見人犯瘍症甚一放瘍者放之以爲放瘍之法止於此矣不知放瘍之本固有善於彼者不善於此亦有善於此者不善於彼使病家延一放瘍之人略知一二未識其全則血肉之瘍有放而未盡者矣苟醫者不識瘍筋見其瘍之已放而毒浪用藥藥不能治及於血肉之分或瘍症復發瘍毒肆攻而輕者變重傷肝創愈作脹故瘍氣益盛而放刮俱難盡此又當先用破氣之藥以順之而再放刮如此則瘍毒皆可漸消也

瘍脹玉衡書　卷上

用藥不效

凡病用藥得宜未有不效而瘍症竟有得宜不效者何也夫瘍者熱毒也熱毒川藥宜涼不宜溫宜消不

宜補湯劑入口必須帶冷冷則直入腸胃而肌膚血肉之間雖有良劑安能得至乎此治瘧者莫先於刮之放之也如刮之放之而肌膚血肉之毒已除然後將腸胃脾肝腎三陰之毒用藥以驅之藥固未有不效者也然亦有刮之放之而藥有不效者是非藥不效也蓋其時雖放之或有未盡雖刮而刮之或有未到則是肌膚血肉之毒猶在故即用藥而藥有不效耳若刮已到放已盡而瘧症猶在則是瘧毒惟在腸胃脾肝腎三陰經絡非藥將何以治之乎

用藥必效

瘧症危極昏迷不醒即扶之不起呼之不應雖欲刮放而不可刮放乃更有用藥以救之而能必其效者何也蓋瘧症用藥必須帶冷冷雖未能即周於肌膚血肉之間而昏迷不醒乃瘧之熱毒衝於心膈故心不能自主而昏迷若藥帶冷入口即從心膈間順流而下則熱毒之氣在心膈間者隨藥而消故昏者復明迷者復醒即有不醒者乃食積血痰所阻若能攻而下之未有不醒者矣此余治瘧所以又用藥而必得其效也

用藥大法

瘧氣壅遏未有不阻塞於中故作痛作脹用荊芥防風之類從表而散用青皮陳皮之類從中而消用枳實大黃之類從大便而下用木通澤瀉之類從小便而行用山查蔔子之類所以治其食之阻用金銀花紅花之類所以治其血之壅用柴梢蓬朮之類所以治其積之滯也

瘧有實而無虛辨

瘧者天地間之厲氣也入於氣分則毒中於氣而作腫作脹入於血分則毒中於血而為蓄為瘀凡遇食積痰火氣血即因之阻滯結聚而不散此瘧之所以可畏也故人之壯實者有瘧脹之症飲熱酒熱湯而變者固然即人之虛弱者有瘧脹之症飲熱酒熱湯而變者亦無不然至如人有雜病兼犯瘧症是為雜病變端而亦畏夫熱酒熱湯人不知覺遂遭其禍則是瘧之發又何論人之虛實乎夫惟人之實者犯之固即以有餘治之而虛者犯之亦當以有餘治之蓋

其有餘者非有餘於本原乃有餘於瘀毒也論者以爲人之寶者固可以有餘治之而人之虛者以有餘治之則益虛其虛矣而不知非然也夫人有瘀毒如家之遇賊寇也人有虛實如家之有厚薄也假若賊寇操戈已入於室內矣而乃以家之貧財之薄也其賊寇可不驅而出之乎吾見家有賊寇必先驅之爲是人有瘀毒亦無不先驅之爲是也故瘀發不論虛實驅毒在所當先溫補必於收後此瘀之所以有實而無虛也

怪病之謂瘀

方書所載怪病之謂瘀此古人之格言也是以中風痰厥昏迷不醒及流痰腫痛俱責之痰然有治痰而痰得其治者十中一二有治痰而痰不爲所治者十有八九是非痰之不可治也蓋因其瘀之凶危膠於方書之語成謂其痰之使然而中風痰厥昏迷之類遂有不可名言者矣余於中風痰厥昏迷之類嘗有治痰而得其效矣詎敢曰一一非痰然其間因瘀而有是症者雖今之時氣使然何乃十有八九余切其脈而不洪滑即有可疑或症有口渴身熱脈變而爲沉遲或症有不渴身熱脈變而緊數此皆脈症不合須識其瘀一取青紫筋色而辨之自有確見若醫者惟執爲痰以治之便成大害然則古人所謂怪病之謂瘀而瘀之爲怪更有甚於痰也則是瘀之爲病之謂瘀而瘀之爲怪更有甚於痰也則是瘀之爲害莫有大於此者豈可付之不論不議耶

瘀筋不同辨

瘀筋有現有微現有伏而不現瘀筋之現者毒入於血分者多作隱作現者毒入於氣分者多微現者毒阻於氣分者多伏而不現者毒結於血分者多夫瘀筋之現者人皆知刺而放之矣其微現者乃其毒之阻於腸胃而瘀不爲所治者十無一血即微有血而點滴不流治療之法但宜通其腸胃而瘀筋自現然後依其瘀筋之現刺而放之若乃瘀筋之伏隱作現者人又皆知依其現而放之矣至有伏而不現者雖欲放而無可放吾觀善放瘀之人未有能識其爲瘀者所以瘀症之禍往往人受其

害而不覺若斯者必從其脈之不合於症而辨之必取其所發之病在緩所見之症候更倏有其甚急者即病與症之不合又可辨其爲痧則痧毒之結聚不散者自可細詳治療之法結於血者散其瘀結於食者消其食而攻之結於痰積者治其痰積而驅之則結散之後痧筋必然復現然後刺而放之其痧可得而理也如是之痧亦有可治若繼余之藥者甚勿以其痧症之凶危而棄之與

寒痧辨

痧脹玉衡書　卷上　十七

痧症之發未有其寒者矣而亦有其痧之爲寒非痧之有眞寒也蓋因世人知痧之熱而服大寒之飲以至於是然寒飲服於犯痧之人即愈者有不即愈者是何以故夫犯痧症必其無食無積無血所阻於中方可服寒飲而得其效若一有食積血阻於中而服大寒之飲則食不消積不行血不散而痧毒及冰伏凝阻於中未有得寧者矣嘗見高巖窮谷之中山路迢遙行旅感暑熱之氣往往有一飲山澗之水而即斃者是名寒痧若幸過放痧之人及得其識其痧

放痧不出治法

痧症危急莫善於先放其痧乃今更有放痧而血不流者雖痧筋隱隱無可如何故放痧之人往往過此便云凶若余則不然是其放痧雖血不流而亦有可救者即至昏迷不醒勢在臨危若審其無食積血痰阻滯於中用寶花散冷服或陰陽水或泥漿水或晚蠶沙水或細辛水或白沙糖梅水擇一方而用之俟其稍醒然後扶起再行別法療治至如有因血瘀而

放之不出用童便桃仁紅花之類以救之有因飯後便犯痧症多用鹽湯或碧湯冷飲以生去新食食入痧脹用蔔子山查麥芽之類以消之有積痧阻用梹榔大黃之類以驅之阿魏丸之類以治之或痰血凝結昏迷欲次不省人事用菜油二兩麝香一錢調下立甦此爲良法如是先去食積血痰之阻滯者則痧筋自然復現痧氣自然散行而後可刮即刮可放即放當藥即藥蓋緣痧症初發未攻壞臟腑故耳乃知初起放痧不出凶症未始不可以挽回也醫者甚毋以其放痧不出昏迷如从見爲凶極而棄之與

放痧數次不愈

痧症愈則即愈不愈須防其有內潰之憂故治痧之法刮之放之宜愈不愈即當用藥以治之至若雜症之兼乎痧也亦宜刮宜放而急宜用藥以治其痧爲要案此治痧者不可一日無治法亦不可一日無藥也乃今有不用藥而惟恃乎放痧覓有其放痧數次不愈者或乃曰彼無昏迷不醒之重症可無害於事也不知放痧數次不愈則必日甚一日內有伏毒盤踞臟腑雖不見有昏迷不醒之事而痧毒之攻擊於臟腑間者甚可危也且放痧何以數次不愈乎蓋惟人有食積血痰阻滯其毒故痧不盡放而不盡設有能消除其食積血痰則痧毒無阻尚烏有不愈者耶惟其不用藥而惟恃乎放痧故痧毒不盡勢必攻壞臟腑醫者愼毋以放痧數次不愈爲輕症而忽視之與

數犯痧症

痧症有緊有慢人多不識幸遍來南方砭刺有人將曉痧症一二然亦不克逐症詳明蓋痧可襲惜故有云痧當砭刺刺即救人有云痧不可刺刺即多犯此語一出遂致誤人不淺然亦有可辨者蓋痧症之初犯者邪氣勝夫元氣雖人壯實而不免痧症多犯者由元氣虛則易感觸夫邪氣是以有數患痧症之人或有十日半月一發或有一月二月一發常患痛非刮則放所以有痧不可刺刺即多犯之說爾不知痧之易感必由於胃氣本虛遂乃數犯乎當用絕痧方乞其胃氣則痧自斷又用參茸大補之味以實之痧

未名不斷者矣然必瘧症已痊之日全無些須瘧毒然後可服以絶其根否則稍有瘧氣未除此等之藥斷不可服恐其中有甘辛温熱大補之味反益助其邪毒爾

瘧脹昏迷與雜症不同

雜症若重或至昏迷均可以延時日獨瘧症之昏迷則有不容少待者何也夫雜症昏迷不過痰氣血澇或虚極而發暈已也故可以延時日至於瘧而昏迷不醒僅是瘧氣衝心猶有可解若爲瘧毒所攻則毒

血一衝勢必攻壞臟腑未有少延者矣故瘧脹昏迷不醒者須防立死其毒與食積痰氣必結聚心腹胸膈之間而經絡不轉氣血不運蹦欲放而血不流欲刮而瘧不顯此所以救之者又必急用藥以治之也其治之之法惟視其食積痰血氣阻及暑熱伏熱臟氣之類以治之有食消食有積消積有痰血氣阻即散其痰血氣阻有暑熱伏熱臟氣所觸即散其暑熱伏熱臟氣則胸膈一舒昏迷自醒然後驗其紫筋青筋以刺之而或刮或藥惟其症之所發以施其救人之術與

瘧筋原於血中之毒

夫醫首重望聞次貴問切人皆知之矣至於瘧而望聞有所未明問切有所未盡醫其可以已乎吾觀世有暗瘧而人不識往往多誤則爲不取瘧筋以驗之蓋針鋒所刺不過鋒尖微微入肉有瘧毒者方有紫黑血流若無瘧毒者其鋒尖雖刺無滴全無故瘧有瘧筋可辨亦如別病之有別症可辨也然則瘧筋所現者其青紫之色所原者乃本於血中之有其毒與

夫血中有毒既無可消自宜知放放有不盡則宜刮宜刺凡以驅夫瘧毒之所留滯者而救其大命焉爾奈何有不信瘧者徒受夫瘧症之實禍而甘心於自斃乎

慢瘧必須速治

瘧若緊者只在頃刻慢者或期至十日半月而灾期至一月二月而灾其有期至三四月而灾此誠瘧之慢矣而余謂必須速治者毋乃憂人之太過乎而不知其非也夫瘧之致人於灾者雖有如是之久而

其瘍毒蔓延於腸胃經絡間者正多凶險之處即如瘍毒滯結於身之或左或右或上或下或裏或中或表既有若是之滯結者總不猶然若是之滯結而已也將且在內者先壞臟腑在中者先損經絡在表者先潰肌肉雖未即斃而其難治之形必然先見若一不治使成灰症慢瘍之可畏也如是安可以玩日之慢而不速爲之蚤治乎

瘍症治要宜明

瘍無食積瘀血而瘍氣壅盛者冷服瘍氣壅阻於食積而無血瘀者稍冷服瘍有毒盛而血瘀者微溫服瘍入於氣分而毒壅者宜刺瘍入於血分而毒壅者宜放瘍痛而絞動者瘍毒壅阻於食積之氣分也瘍痛而不移者瘍毒壅於血分而有瘀也瘍發於頭面上部者瘍之毒氣上壅也瘍蹙於手足下部者瘍之毒血下注也瘍有上吐下瀉者瘍氣上下衝激也瘍有煩悶氣脹者瘍氣壅塞於心膈也瘍有惡寒發熱者瘍氣遏抑於肌表也瘍有胸膈偏痛者毒血流滯於經絡也瘍有結滯腸胃者食積血瘀爲腫爲脹也

瘍症不與雜症俱發則已若與雜症俱發醫者但能治其瘍症不能治其雜症假使雜症有害不幾誤人於死者不在瘍症而在雜症乎夫天下有能治百病而不能治瘍者余固責其有誤於人矣茲有犯雜症兼瘍之疾而業醫治瘍者更不能治雜症獨可無責其有誤人之罪乎即如人有勞弱本原不足之症兼犯瘍症凶危延一治瘍者治之聆其言則云我固善治其瘍焉始則用克伐之藥以治其瘍脹之極可謂有病則病受之雖甚克伐亦無害於本原矣迨至瘍

已散去五六尚存三四則用藥之法雖宜尚重瘀症又當顧慮本原惟在略用克伐而不傷本原者爲是若一過用克伐便傷本原豈不有誤於不足之症乎況瘀氣散去八九惟是略有一二用藥尤宜保護本原而稍治其瘀焉至於瘀患悉平惟有本原不足則自應以補益爲先然後可云能治其病而無誤也若不先明於本原不足之症而用藥失宜救剂無法則其誤人之罪其能免乎即此一端可例百病故吾謂治瘀須先明百病

刺腿灣瘀筋法

腿灣上下有細筋深青色或紫色或深紅色者肌膚白嫩者方有紫黑色即是瘀筋刺之方有紫黑毒血其腿上大筋不可刺刺亦無毒血反令人心煩腿兩邊硬筋上筋不可刺刺之恐令人筋弔若臂灣筋色亦如此辨之其餘非親見不明白故不具載至如頭頂心一針惟取挑破略見微血以洩瘀毒之氣而已不可直刺其指尖刺之大近指甲雖無大害當如令人頭眩若一放用藥治之宜盡慮到不然一有不及其禍不測應刺法不過針鋒微微入肉不必深入

刮瘀法

背脊頸骨上下及胸前脇肋兩背肩臂瘀用銅錢蘸香油刮之或用刮舌剌子腳蘸香油刮之頭額屬上瘀用棉紗線或蔴線蘸香油刮之大小腹軟肉內瘀用食鹽以手擦之

用鍼說

嘗覽古人遺言東南卑溼之地利用砭所謂針剌出毒者即用砭之道也但放瘀之人俱用鐵針輕者一針即愈重者數剌不痊蓋因瘀毒入深一經鐵氣恐

不能解余惟以銀針剌之則銀性最良入肉無毒以之治至深之瘀毒不尤愈於鐵針乎此余所以剌瘀筋者獨有取乎銀針也

瘀脹用藥不厭多

凡傷寒雜症所犯止有一症用藥不貴乎多瘀症凶暴非常變幻百出如犯在氣分有兼痰兼血在血分有兼食兼積或又有兼外感內傷往往皆然不可執一放用藥治之宜盡慮到不然一有不及其禍不測此所以不厭乎多也

痧脹宜下辨

傷寒食未化下之太早反引寒邪入胃變而爲熱熱邪固結所食不能消化乃成結胸若痧脹新食固宜以吐爲先至所食既久壅然痧脹雖所食消化未盡下之無害蓋痧脹非有寒邪入胃變成熱結之患但因痧毒在腸胃則腸胃中肌肉作腫作脹盤腸絞痛徧及臟腑故外宜用刮放以泄毒於表內可即下以攻毒於裏則腫脹自當之以潛消而食積亦因之以通利原無結胸之可憂也然痧脹固非傷寒熱結者比但下之必須內兼食積又宜以漸而進中病即止

痧後治雜症宜知

痧退後竟治雜症固所宜然但痧後餘毒或尚存些須按脉而脉已不顯辨症而症已若清此時用藥若即認爲惟是雜症已爾僅以治雜症之藥治之設使稍有相犯吾恐斯人尚不得保其命也蓋痧後猶痘後痘後之症固不可合痘餘毒而單治雜症痧後之症又豈可合痧餘毒而單治雜症乎此治痧後雜症又不可不深慮而干雜症劑中更兼解毒活血乃能收全功也

當知不信之誤

凡人有病則宜治將死則宜救乃有犯痧不信夫痧者是其智之所短即其數之所盡也故人有犯乎慢痧猶可纏綿時月而病日深若犯乎緊痧未有不立時凶危而入於死如此不信眞數盡之人也即告之以痧症之禍而彼仍泰然不覺雖有熱心無益於事故不信之誤人自當知嘗見一士不信痧忽然犯緊痧暗症咽喉疼痛喘急如鋸發熱沉重胸中飽悶吹

藥服藥喉中益痛痛連耳際或時在左或時移右痰脹昏迷凶危之極始雖盡速幸而審明痧症急爲放痧湧出毒血甚多刮痧徧體俱有服藥至晚而安痰脹亦消喉痛亦止緣不守痧禁飲溫酒熱茶立時復發而終此眞痧毒之爲害也嗚呼惜哉更見同時三女一犯此症刮痧而愈一犯此症放痧而愈一犯此症認爲喉鬱治之而死信者如此不信者如彼痧其可忽也耶

痎脉外感內傷辨

傷食之痎脉多戰動傷暑之痎脉多洪滑而疾數傷風之痎脉多浮而緩傷寒之痎脉多沉伏或形如雀啄傷寒多變異不常傷氣之痎脉多弦而澀之痎脉多沉細

痎脉要訣

痎症之脉與諸症之脉不同如傷寒傷風自有傷寒傷風之脉若傷寒傷風一兼痎症其脉必變病必凶暴是也凡遇雜症有痎皆然

治驗

一川戍屠兄夫人忽然昏迷沉重痰涎壅盛已三日矣延余往視診脉洪大無倫身不發熱口不乾燥惟不省人事余曰脉症不合此痎脹也刮痎稍醒用沉香鬱金散荊芥湯加山稜蓬术枳實紫朴砂仁微冷飲之三劑而愈

一沈雲溪年老一子七歲發熱五日狀類傷寒昏迷沉重服傷寒藥病勢益甚將在臨危其脅突彩雲延余往視診其脉形如雀啄怪脉已現不可復救但細按左關指下或時厥厥動搖此暗痎而人不覺也幸其年幼可抱而起視其腿灣有紫筋三條刺之血流如注不愈用阿魏九大黃九黃連末微冷飲之又用荊芥湯加山查葡子梹榔細辛微冷飲之連服二頭服方知人事次日脉復如常痎氣退盡但身熱未痊乃用傷寒陽明胃經藥三劑而愈余治痎不及具述各舉一二爲例以見痎症不可忽也

余之痎脉要訣至矣盡矣痎症之脉莫有外於此矣議者以爲余之秘夫脉而不盡其脉之所以然者

正在此也嗟嗟人之議余也以余之論瘧脈而脈有未明也抑思余之刊刻是書也將以曉天下之人使天下咸識夫瘧症之禍也豈有所秘而不言者乎即如傷寒自有傷寒之脈非虛語也夫冬月正傷寒頭疼惡寒身熱無汗脈必緊盛故見夫人迎緊盛之脈若餘月雖有頭疼惡寒身熱無汗總名傷寒脈未有其人迎緊盛者此冬月所以有正傷寒之脈也假若冬月有正傷寒之症不見有正傷寒緊盛之脈或變而為沉遲或變而為微細是脈症之不合也多矣而又取青筋紫筋之色以辨之則瘧症之發可驗而知也且如傷寒有兩手無脈曰雙伏一手無脈曰單伏必有正汗也此以汗之將來一時脈伏言之非云時時脈伏而有汗也若所犯傷寒症已如是而脈之伏也日日如是則是脈與脈伏正汗之說不合獨不可以驗其瘧症之因乎又如傷寒傳經熱症有云氣口緊盛傷食之驗若人症犯胸中飽悶宜乎氣口脈緊盛矣及按其氣口之脈不見緊盛反若空虛是脈症之不合更可以驗其瘧之發矣若更取青紫筋色而辨其的確以治其瘧尚何疑乎斯此類推餘症可以

瘧脈有似陰症辨

瘧毒之氣阻抑於經絡血肉之間故其脈多沉伏即有別病兼瘧者亦然如人有傷寒脈沉微無力是直中三陰經之脈也治以陰症用熱藥有何疑哉然嘗見有用之而愈者有用之而不愈者有用之而愈者有用之而不愈者則人又將曰陰症之藥不可驟用此豈其認脈之不真而治傷寒

之有未當與夫亦惟為傷寒兼瘧瘧毒變幻而有此悔爾余似莫辨故一服溫補熱藥瘧毒變幻而有此悔爾余嘗臨症治傷寒按之見有沉微或伏之脈一似直中三陰經而其外現症候稍有不合於三陰經症便服瘧筋而驗之有則為瘧無則為陰施治之藥或涼或熱萬不失一且放瘧服藥之後血肉經絡之分通而無阻即按其脈便不復如前之沉微或伏矣余然後按脈辨症用藥以治其傷寒藥未有不得其效者至如雜病兼瘧有沉微或伏之脈亦以此法驗之誠至

當不易之論也

瘧脉似氣血有餘辨

瘧之毒氣衝激於經絡血肉之分故其脉多洪數或沉緊或大而無倫或洪實有力種種不一若症脉稍有不合便當審其瘧筋有無有則候其放瘧之後再診其脉之來復何如以斷其病之寒熱虛實施治若無卽以其脉斷其寒熱虛實用藥余嘗治一勞弱吐紅之症其脉洪實有力他醫遇此以爲勞弱吐紅脉忌洪實兼之症候凶危謝事而去余惟見其病勢之輕可重當緩當急之定論乎詎意古人之所以示我者固有先得我心而昭然筆之於書也余是以一再思之乃知所謂脉伏不可診者若謂必須求他症以

暴而疑之爰視其腿灣有青筋色先放其瘧六脉遂和症候亦平又付散瘧消食去積之藥氣血無阻凶暴潛消飲食漸進後用六味地黃丸及十全大補湯服之勞弱不足之症亦愈蓋因其向來病氣俱從瘧氣而洩所以一用補藥遂得全效也

方書脉句宜參

凡古人載籍所以垂訓者不知幾經籌畫幾經筆削乃註之於書後人竟以一覽不明便置之高閣毋乃有負古聖賢作書者之心乎余嘗博覽遺言若其有得於心固然不忍釋手卽令有疑於已亦且數四低徊然後得一夕豁然洞灼而大悟也有如方書所載諸瘧脉伏不可診也之句余嘗疑之若以爲治病之道求所以辨明虛實寒熱之法斟酌輕重緩急之宜惟脉是恃若脉伏既不可診醫者將何以斷其病之屬虛屬實屬寒屬熱之所致而於用藥之際更有可

辨之方有其治法焉爾故余於諸痛脉伏者固推而驗於筋之青者紫者識其爲瘧卽於諸病不痛而脉伏者亦必推而驗於筋之青者紫者識其爲瘧蓋緣瘧毒氣壅血阻於經絡間故脉有伏而不現爾若以針刺之血流而氣亦洩毒始無所壅阻而脉乃復其常爾至於瘧之重者傷在腸胃三陰針刺有所不到血流有所不盡余惟從夫食積血痰所阻之毒以治之脉且隨藥而復則病有未愈者始可憑脉以用其藥然後思古人之所謂不可診者信乎諸痛脉伏之

不可診也古人之詔我者誠有所見也哉

脉貴審於幾先

痧之重者形之於脉前言已概之矣至如雜病兼痧始發甚微疑似莫辨所謂審脉之道則又吾筆所難書吾言所難罄惟在醫者臨症之際神明其意於切脉之中斬截其痧於方發之始蓋痧之慢者詎云日久必壞臟腑損經絡潰肌表乎即其輕而又輕者雖不至驟傷其命而於雜病之中一有兼痧不能審治其病將經綿難愈即愈亦必數數復發疾苦相連此

痧之所以可畏當預審之於幾先也

痧脉決生死法

脉微細者生脉實大急數者重脉洪大無倫者凶一部無脉者輕一手無脉者重兩手無脉者死六脉無根放痧服藥不應者不治諸怪脉現放痧服藥不應者死

此下細述發蒙論所不書

凡屬暗痧之類人多不識誤中其禍故悉列之於前庶令人一開帙而注目焉

下卷痧痛人所易明故姑置之於後

暗痧辨

心中悶悶不已欲食不食欲坐如常即飲溫熱不見凶處更無心腹膜背疼痛之苦但漸漸憔悴日甚一日若不知治亦成大害此痧之慢而輕者也放之即愈亦有頭痛發熱心中作脹類於傷寒亦有寒熱往來似瘧非瘧悶悶不已亦有咳嗽煩悶有似傷風亦有頭面腫脹兩目如火亦有四肢紅腫身體重滯不能轉側此痧之慢而重者也誤喫熱湯熱酒熱物遂乃沉重或昏迷不醒或痰喘氣急狂亂見凶如遇是症必先審脉辨症的確果係何因在表者刮在中者放在裏者或丸或散或煎劑必須連進數服俟其少安漸爲調理

治驗

一余三嬸母寡居四月間忽然昏迷沉重不省人事顏色俱變漸漸黑色二弟驤武次衡延他醫治之莫識其病適余至視疾診之左脉洪大右脉沉微余曰此暗痧也審其腿灣有青筋三條刺之紫

黑血流如注不醒刮痧亦不醒川芎香蘇飲加砂仁併荊芥湯稍冷服之不醒次日用寶花散薄荷湯加大黃丸微冷服亦不醒至五日復刮痧用三香散加砂仁湯溫下而後醒漸調理乃痊

一余友朱其章一老僕六月發熱沉重昏迷不醒黑胎芒刺舌短狂罵不避親疎其章延余往視診其脉六部俱伏余曰此痧之重極者也彼親中有厲姓善放痧使二人極力扶起從腿灣有青筋三條紫黑毒血湧出甚多不愈用防風勝金湯稍冷服二劑痧退服小柴胡湯而痊

余用寶花散蒺藜散稍冷湯飲之又用紫蘇厚朴湯微冷服次日痧退少甦但身重如石不能轉側舌上黑胎芒刺不退用紅花湯合清凉至寶飲治之以漸而愈

一麓庵朱兄一婢十二歲六日不食頭面微腫余適與于茂生至麓庵宅即令脾出診脉衆立一消食方余曰脉微面腫殆其痧乎刺腿灣上一針紫黑血流不愈用寶花散稍冷湯飲之一服而痊

傷寒兼痧

凡傷寒頭痛寒熱諸症或當暑天或觸穢氣或疫癘所感忽犯痧脹是惟認脉看筋辨之先治其痧痧退之後乃治傷寒若悞飲熱湯熱藥慢者猶可緊者立時見凶

治驗

一余甥坦卜文士長子十二歲頭痛身熱無汗他醫皆治其傷寒不應余診之六脉微綴乃知其傷寒兼痧者也刺腿灣青筋三條紫黑毒血湧出甚多不愈用防風勝金湯稍冷服二劑痧退服小柴

胡湯而痊

一車姓者五月傷寒十四日忽爾發昏沉重卧不能轉延余診之余曰此傷寒犯痧若不先治其痧余不敢任不信延他醫治之益昏迷不醒復求余余曰痧氣衝心故昏迷痧毒入於血分經絡間故病不能轉側若先治痧尚有瘳日即求余治先放痧不愈用寶花散圓紅散及防風勝金湯俱微冷服痧退後治傷寒而痊

一余次女四月間頭痛發熱屬傷寒太陽經症用

羌活冲和湯加減治之稍愈至第四日原照傷寒治之不應更面赤身熱心胸悶悶不已六脉洪大無倫余曰此傷寒兼犯瘍症當看瘍筋刺之余女不信至晚疾益甚始欲放瘍在左腿灣下刺青筋一針流紫黑毒血餘更有細青筋不甚現是緣不纔阻故瘍筋有隱隱者爾服信多纏綿一日瘍氣身纔未愈次日指上瘍筋復必勝湯三頭服稍覺現刺血九針服藥未愈侯至夜右腿灣復現青筋二條刺出毒血服圓紅散乃少安後又驟進飲食復發熱面赤用山查子柴胡陳皮之類飲之不應脉仍洪大無倫此瘍毒復發而然刺兩足十指青筋去其毒血用必勝湯稍冷服二劑未已偶飲稍溫茶立刻狂言也用冷井水二碗飲之更冷服藥五劑然後瘍氣乃清但病久身虛發量服參湯而甦後用十全大補湯加減治之調理二月而瘥

瘍症類傷寒

瘍寒集中僅有四症類傷寒至於瘍症頗傷寒較之四症尤爲凶暴而傷寒書內從未載及故醫者不識夫傷寒頭痛惡寒發熱屬足太陽膀胱經風寒宜表是寒從肌表而入故宜發散爲先若瘍症頭痛是瘍毒之氣上攻頭面三陽不因外感寒氣其惡寒發熱雖在肌表是時行之氣所感由呼吸而入搏激於肌表之中作爲毒熱內熱則外寒故亦惡寒治宜先刺巔頂放瘍以洩其毒用藥惟在透窺解毒順氣爲主若誤認傷寒足太陽膀胱經症用羌活麻黃發表太甚反助瘍毒火邪益張其燄勢必惡毒攻衝作腫作脹立時見凶故瘍症與傷寒其頭痛惡寒發熱雖同治之當異要知瘍症宜清凉則瘍毒可內解傷寒宜辛散則寒氣可外舒固不可以治瘍症也不可以治傷寒者治瘍症也

治驗

一林管家長子六月發熱五日昏迷不醒余診之病似傷寒而脉沉微無力實非傷寒症也問腿灣下瘍筋放紫黑毒血三劍指頭九針不愈用阿魏化作大黃丸凉茶飲之昏迷遂醒越兩日身凉乃

痧

一車文顯次子惡寒發熱十二日昏迷沉重不省人事適余至鄉延余診之見其面色紅黑十指頭俱青黑色六脈洪數皆曰新婚燕爾症必屬陰余曰非也若以陰治一用溫補熱藥始迫其次矣夫脈洪數者痧毒搏激於經絡也十指青黑者痧毒血流注也面色紅黑者痧毒升發於頭面三陽也及視腿灣痧筋若隱若現放之微有紫黑血點而已其父素知痧患便云此眞痧也奈前因暗痧救之余用寶花散晚蠶沙湯冷飲之漸醒痧筋復現於左腿灣二條刺出紫黑毒血如注乃不復如前之昏迷矣但發熱身重不能轉側肩背多痛用大劑桃仁蘇木烏藥香附白芷蔡木澤蘭獨活山查徵温服之漸能轉運猶身熱不凉大便不通用蔴子麥芽枳實大黃紫朴桃仁温服便通熱減後調補三月而痊

一方居安內室正月頭痛惡寒發熱心胸煩悶口渴咽乾頭汗如雨痰喘面黑十指頭俱有黑色已五日矣延余診之氣口脈虛時或欬指左手三部洪數無倫余曰非痧而有是脈恐不能生矣因看痧筋幸其弟善放痧見有青筋曰此真痧也刺頂心一針左臂灣一針右腿灣一針毒血已去不愈余想其飯後起病即以碧湯稍冷多服吐去宿食煩悶痰喘頭汗俱除餘症未愈次日其弟復爲放痧飲以陰陽水一碗亦未愈余用柴胡山查連翹紅花蔴子枳實荆芥花粉加酒製大黃貳錢俟微冷服二劑大便通而安追後十餘日吐涎沫此又因穢氣所觸而復痧也令其刮痧少安用藿香正氣湯稍冷服之腹痛頓止後用補中益氣湯十全大補湯調理如舊一甦復先惡寒發熱嘔穢心煩服他藥非逃不醒或謂陰虛而然余診之六脈沉微手足大熱唇舌鮮紅身體重痛余曰痧毒衝心入於血分瘀滯故爾不信連易三醫莫任復求余治呼之不應扶之不起用晚蠶沙煎湯徹冷服次以寶花散煎炒仁

湯微冷送下稍醒然後扶起放痧數十針未愈用桃仁延胡索蘇木烏藥紅花香附山查一劑始能轉側後服小柴胡湯寒熱俱除調補兩月而痊

痧類瘧疾

痧有寒熱往來類乎瘧疾或昏迷沉重或狂言亂語或痰喘不休或心胸煩悶叫喊不止或嘔噦吐痰睡卧不安或大小便結舌黑生苔如此重極脉必變異不與瘧同宜細辨之

治驗

一沈昌齋七月間患脹悶大便不通舌焦胎厚延余治瘧左脉浮大而虛右脉沉細而澁愚意瘧疾見凶脉不應虛且澁視其乳下有青筋刺出紫黑毒血二針令其刮痧不愈用散痧消毒活血之劑加大黃三錢稍冷服之大便通諸症退惟寒熱未已用小柴胡湯治之後用四君子調治而痊

瘧疾兼痧

瘧疾卧床往往有因暑熱相侵心中迷悶或時疫之氣相感兼犯乎痧瘧因痧變勢所必至不可漫以爲瘧而忽視之也瘧之爲害尚可延久痧之爲害必至傷人即令痧之輕者苟不知治纏擾於身不克驟愈雖或幸愈數復難痊自非先治其痧決難全愈兼痧之禍可勝道哉

治驗

一錢拱宸內室患瘧發熱不凉痰嗽煩悶口渴不食余胷之氣口脉虛左三部微澁而數此兼痧之症也令其放痧用散痧順氣活血解毒藥不愈次日又放痧脉始弦數又如前劑服之不復煩悶矣後用柴胡雙解飲三劑瘧愈止用消痰順氣藥加童便飲五劑痰嗽俱痊

一余三子五月間患瘧凶暴左脉沉微右手脉伏驗有腿灣手臂青筋刺出紫黑毒血稍覺胸中爽快用寶花散沉香丸稍冷服之大便通諸症退惟寒熱未已用小柴胡湯治之遂用大黃丸併服可扶而起次日復傷食又患兼痧凶暴始減用散痧消食順氣解毒藥五劑稍安後又傷食發熱用山查荷子青皮陳皮紫朴白芥

于四劑。大便不通。加枳實大黃。便通熱減。惟病久虛極時覺眩暈心跳。夜睡不寧。用棗仁茯神人參黃芪熟地。加熟附子一二片。煎服夜睡神安調補四月而痊

一沈恒生內室。六月間瘡疾。日晡寒熱已八日。忽壯熱不已。昏沉不醒。延余診之。左脈弦數不勻。右脈虛而沉滿。余曰。左不勻。右虛滿。非瘡脈也。始其爲瘡之變症。非瘍而何。刺左膂青筋一針。紫黑毒血流出如花。不愈服荊芥湯。加薤香荀子紫朴梹榔。併化毒丹。微冷飲之。稍醒。次日復刺指頭紫黑血三針。用荊芥湯加枳實大黃。微冷飲之。熱退後用三乔散。運動其氣。調理一月而痊

瘍脹

徧身腫脹

瘍者暑熱時疫惡毒之氣。攻於裏則爲痰喘爲血瘀。昏逆沉重。不省人事者。元氣壯實。內不受邪。不入於裏。即散其毒於肌膚血肉之表。爲腫爲脹。若誤飲熱湯熱酒。使成大害。此瘍之暗者。宜從脈與處辨之。

治驗

一翰黃聞兄一婢。久生瘡患。腹大如臌。手足俱腫。

延余診之。左脈微數。右脈弦有力。方見脈症相對。內作腫作脹。其脈必然洪數。有力方見脈症相對。乃可治其瘍毒。今左脈微數。右脈歇指。脈症不合。必慢瘍爲患也。視其腿灣果有瘍筋青色。刺五針。紫黑毒血流之如注。未愈。又刺指頭毒血二十針。用寶花散併付桃仁紅花湯八服。服後腫脹俱消如舊。

一翰黃聞兄長女。手足俱腫。將延於腹。延余診之。六脈弦細沉遲。知其緩慢瘍之變亦也。云宜先放

其瘍緣畏刺不放。余辭不用藥。恐藥氣稍冷。不能治及於血肉之分也。越六日。腫脹益甚。復延余治。令其僕婦爲主女放瘍三十餘針。紫黑毒血已出。用寶花散稍冷服之。併用散瘍解毒消瘀順氣之劑治之。以其瘍久綿延。難於速效。計服二十四劑。方得腫脹俱消。安平如舊。

一賈峰青偏身腫脹。服藥不應。延余治之。余見心口將平。臍有青筋。余曰危哉。診脉無根。殆不可療。然視其指上腿灣青筋交現。刺出毒血甚多。彼又謂瘍瘡不當服藥。遂已。後至二月餘。終成真臟而久惜哉。

一余隣許姓者。有子四歲。頭面胸腹。手足偏身俱腫脹紅色。頭汗如珠不絕。求余診視。兩關兩尺皆洪大滑實。兩寸厥厥動搖。此傷食之瘍。感於脾經故偏身肌肉腫及。看其瘍筋不現。刮瘍不起。此因誤飲熱湯。瘍氣內攻。壅塞衝心。故偏身作腫。脹惟衝心心臟不受。其害故上干頭面。化而爲汗。出之如珠。皆心液也。用紫朴湯加大黃九。微冷飲之。脹消汗止而愈。

瘍毒衝心發暈悶地

一似中暑中風。人不知覺。即時而斃。此瘍之急者。如略有甦醒狀起。放瘍不愈。審脉服藥施治。如發暈不醒扶之不能起。必須審脉辨症的確。果係何因。先用藥數劑灌醒。然後扶起放瘍。漸爲調治。

治驗

一汪君芙內室。六月間發暈昏迷。延余診之。兩寸孔而散。餘脉如常。但重按之。時見欲指。此暑熱藏氣觸犯心經之瘍也。扶之不起。先用寶花散薄荷湯併藿香湯冷服。稍醒。扶起刺出毒血三針。不愈。用沉香阿魏九。薄荷湯微冷飲之。漸安。後用四物湯調理而愈。

落馬瘍

倏忽昏迷不醒。或瘀喘不已。眼目上吊。形如小兒落乃之症。此暗瘍難識。必須審脉辨症。的是瘍毒。看其身體凉熱。唇舌潤燥。何如。然後治之。

治驗

一盛洪烈子。九月間。發熱口渴。昏悶不醒。兩目上翻。延余診視。六脉微細而伏。先用寶花散加砂仁湯。灌下而甦。扶起放痧十二針。去紫黑毒血。用救苦丹併細辛大黃九。加砂仁湯。稍冷下之。又川防風散。痧湯加金銀花丹參山查茵子而痊。

一陳公玉八月間。時常身熱口中微渴。煎滾茶飲之。倏然沉重昏迷不醒。余診之。左尺沉細動止不勻。右寸脉浮而乳。此腎虛而痧犯之。腎水之痧逆行干母肺金。故痰氣壅盛而發暈也。用獨活紅花湯入貝母牛膝同煎。加童便飲之。更進圓紅散而醒。然後扶起放痧二日後。痧氣清。用補中益氣湯。六味地黃丸調理而愈。

噤口痧

默默不語。語亦無聲。形如啞子。此乃痧氣壅盛。熱痰上升。阻逆氣管。故咽喉閉塞而然。治宜先放其痧。審其肺腎脾三經之脉。爲要。然後推詳餘經之脉。則知病之所本矣。

治驗

一吳子瑞一女。十一月間。忽然痧脹。心中煩悶。昏沉不語。子瑞善放痧。稍醒。語更終日無聲。余診之。左關有力。右脉沉伏。傷氣之痧也。此女日爲後母所詈。故有此變。用陳香圓一隻。煎湯徹冷飲之。稍有聲焉。未愈。次日。左脉弦長而動。余曰。怒氣傷肝。痧氣猶阻於肝經之故。刺腿彎紫筋三針。血流如注。又刺頂心臂指二十餘針。乃用三香散。陳皮厚朴湯加延胡索香附微温飲之。乃痊。

角弓痧

心胸脹極。痧毒內攻。故頭項向上。形如角弓反張。是臟腑已壞。必症也。不可以治。

撲鷄痧

痰涎壅盛。氣急發喘。喉聲如鋸。痛若喉鷄。但喉鷄之症。喉內腫脹。若痧。則有如喉鷄之腫脹。又形若急喉風。但喉風之腫痛而不移。若痧。則痛無一定。且痧有痧筋。喉鷄無痧筋。此可辨也。

治驗

一施襄先痰氣壅盛吹乖痰藥益凶暴痛極余診之脈多怪異此三焦命門之痧也問脅痛筋刺十一針腿灣青筋刺三針出紫黑毒血甚多不愈用沉香鬱金散救苦丹清茶冷飲之外吹冰硼散又用荊芥銀花湯微冷飲之三劑而痊

一周龍生喉痛之極痰涎壅盛延余余曰痧也不信飲熱湯至夕而殂

傷風咳嗽痧

痧從時氣所感因而咳嗽肺經受傷不可以傷風治之益傷風以疏風爲主若痧則純乎疏風非其所宜當刮痧爲先宜清喉順氣凉肺散痧爲主若專重疏風縱非緊痧急症亦必咳嗽日甚纏綿不已勞嗽等症由此而成愼之愼之

治驗

一徐茂公傷風咳嗽日晡微寒發熱余診之右寸脈浮而乾餘脈虛而無力時氣所感肺經之痧也其弟爲之放痧刮痧稍可不服藥至十餘日咳嗽不止余用荊芥連翹防風桔梗山查前胡牛蒡湯加前胡山豆根稍冷飲之

漸愈

痘前痧脹

痘本先天因時而發必由外感至如痧者亦時疫之氣所感作脹作痛面胎元之毒因之俱發凡痘未見熱之前痧脹必心胸煩悶痰涎壅塞甚至昏迷沉重不省人事此其候也其小兒滑疾之脈類於痧症厥厥動搖之脈雖若疑似難明然痧有痧筋可辨宜先刺出毒血而後用藥清理之則痧自退痘自起矣若痘點既形觸穢痘隱者諸痘科自悉不贅

治驗

一夏子亮幼子五月發熱痰喘氣急四肢戰動兩目無神不省人事口熱如爐面有隱隱紅紫細點延余看痘閱其腿灣有紫筋兩條余曰兩目無神四肢戰動痘之候也隱隱微點痘之形也口熱如爐紅紫之色熱之盛也但是痰喘氣急有腿灣紫筋兩條必痘因痧脹而發治宜先放其痧後發其痘則痘自起用針刺出毒血隨用荊芥連翹防風紅花青皮桔梗枳殼山查前子一劑俟稍冷飲之

其瘡即發至十二朝乃瘥

瘡後瘧脹

瘡後中氣多虛有感必傷尤宜防護嘗有小兒瘡後收靨脫痂安然無事一遇暑熱所侵或穢惡所觸即成瘧脹往往有忽然生變人多認爲惡瘡所致即瘡科任事者亦以爲然竟不知其瘧之爲害有如斯也

治驗

一胡丹宸子七歲八月出瘡脫痂光潔飲食如常行步如舊迨二十五朝忽然叫喊不已發寒欲死

皆以爲惡瘡餘毒使然求余治之左右手六部俱微細而伏余思惡瘡餘毒兆變脈當沉緊有力今微細而伏若此脈症不合視其瘧筋歷歷可指刺出紫黑毒血不愈用荊芥銀花湯合和脾宣化飲稍冷飲之即甦後小腹痛變爲痢疾用當歸五錢山查一錢熟大黃五分加童便微温飲之稍安後獨用當歸山查四劑而痊

一張可久女十五歲瘡後三十二朝忽然發寒沉重不能轉側延余診治右脈微細左脈洪大時一歌指視其指頭黑色青筋歷歷刺出毒血不愈用降香桃花散合枳實大黃湯稍冷飲之不愈用三香丸微溫服而痊後傷食爲穢氣所觸腹痛刮瘧服稜术湯加明礬二分微冷飲之而安

胎前産後瘧

孕婦之瘧最易傷胎産後之瘧須防惡阻較之平人更甚當急爲救療庶於瘧毒未攻壞臟腑之時可以施治若屬暗瘧發於此時胎前瘧脈澗於有孕産後瘧脈雜於惡阻又無心腹痛據瘧從暗發須當究其

症候察其聲色看有瘧筋急宜刺破肌膚瘧攏尤重油鹽至若瘧毒橫行肆攻臟腑莫可挽回慎毋草草以誤人也

治驗

一趙方亨內室懷娠六月寒熱交作煩悶不安延余時瘧在始發脈固未現初不覺其爲瘧用藥不應忽爾昏沉次日余診左手脈伏面目微黑乃識其瘧刺腿灣青筋六針出毒血少愈用桑寄生紅花香附益母草荊芥細辛荷子神麯沖砂仁末微

冷服而安。後用小柴胡湯退熱。又參苓歸地健脾養血。乃痊。

胎前瘀痛論

胎前瘀痛。毒氣攻胎。胎尚懷胎孕絞動。傷胎殞命。況瘀有毒血攻衝。胎孕嬌嫩。決難安靜。至如安胎用白朮當歸茯苓之類。瘀所大禁。苦一慞用。立時瘀脹凶危。瘀症利用荊芥防風以散瘀。連翹薄荷以清熱。產後所不宜。況瘀症脹極。尤重大黃枳實枳殼以通其積。滯而產後之藥更不可不禁。惡用此傷產後之氣分也。且產婦服藥宜溫。瘀症服藥宜冷。若瘀而用溫脹之氣。難於制治。加童便以清熱消瘀。產後瘀症俱得其宜矣。

治驗

一顧月溪內室。產後三日。腹中絞痛。脹大如斛。惡露不通。延余診之。余思產婦腹脹痛亦僅微疼。今產婦大腹絞痛。異常。非產婦本症及按脈洪數有力。余曰此產後兼瘀脹也。當取其餘有不可通用者。是以棄就一方。為臨症之法。散瘀用獨活細辛破血用桃仁紅花。順氣用香附烏藥陳皮。解毒用金銀花紫花地丁。消食用山查蔔子神麯麥芽。如產後利用薑灰肉桂以溫血。瘀症所大禁。瘀症利用荊芥防風以散瘀。連翹薄荷以清熱。產後瘀症俱得

痧筋驗之不信漫服藥後益覺昏迷不醒復求余治勢已危極痧筋不現先取童便一杯飲之少甦開十指筋刺出紫黑毒血二十一針然後扶起放腿灣痧六針絞痛稍定用獨活紅花湯微溫服之迨痧毒消盡脹痛盡止惡露俱通後調補乃痊

一蔣南軒內室產後八日惡露去血過多忽惡寒發熱胸中脹悶垂危延余脈洪大無倫余思惡露不盡猶可今惡露去盡何以驟得此脈因語之曰脈甚凶若兼痧可救南軒善放痧信余言入視痧筋紫紅色者二條放毒血余復診之不復洪大又刺指臂出紫黑毒血三十餘針用獨活細辛柴胡金銀花丹參益母草牛膝石斛烏藥山查陳皮四劑微溫服之寒熱脹悶俱除後調補而愈

一單公廉內室產後六日適體痠痛寒熱如瘧昏悶異常延余六脈時有數指閉左中指右無名指微帶黑色乃知兼痧之症刺指上紫黑毒血七針臂上毒血一針舌底下紫黑毒血一針昏悶痠痛稍緩用獨活桃仁蘇木香附童便盡黃山查微溫

服二劑　痛悶俱除但寒熱未已再入血餘花丹參益母草皮柴胡獨活血灰牛膝山查服四劑調補月餘而健

劍經亦經行之際適遇痧發經阻逆行或鼻紅或吐紅或肚腹腫脹臥牀不能轉側者是也肚腹不痛亦爲暗痧若痧毒攻壞臟腑者不治

治驗

一沈弘先內人經期發熱鼻血如注昏迷沉重肚腹作脹延余診之脈伏余曰兼痧而經逆者也弘先善放痧刺腿灣二針出紫黑毒血不愈余用桃仁紅花獨活細辛山查香附青皮加童便飲之經行調理而愈

痧熱　頭汗痧狂譫語附

痧氣壅盛發爲熱症或熱而不涼或日晡發熱或潮熱往來皆痧毒之氣阻而不通搏激肌表發而爲熱不識者認爲外感傳經熱症發汗溫飲即慢痧邪緩勢必痧氣益盛變出頭汗發狂種種重症不知外感

之脉浮數而緊熱症之脉洪數有力瘧症之脉終有不同或有可疑須看瘧筋有無辨之即明

治驗

一沈極先夏月日晚發熱五日不凉諸藥不效反益昏悶煩躁余診之右三部及左關俱微細無力余見其病氣有餘脉反若不足知非眞不足乃瘧脉之變者也先令刮背上瘧又於十指管灣刺出紫黑毒血三十餘針不愈用冷茶送寶花散二服又以陳皮厚朴湯主之倍加玄胡索香附煎湯稍冷服四劑而瘥

一邵洪玉內室日晡發熱頭汗如雨延余六脉震動不常故知其瘧刺出十指紫黑毒血二十針不愈煎紫朴湯稍冷服三劑瘧氣已盡用大黃三錢枳實陳皮厚朴各一錢煎湯温飲下其結熱退身凉後調用補中益氣湯夕用六味地黃丸調理而痊

一蔣亨夏月潮熱往來已六日矣服他藥熱極不凉發譫語延余左脉俱微右脉俱洪大非瘧

脉不若是之異也視其乳下青毒血不愈用桃仁澤蘭等分煎日漸調理半月而痊

瘧煩瘧睡

瘧氣衝於心胸故心煩或嗜睡此之類輕而且淺人多誤以心煩嗜睡治之日甚一日緊急勢必日漸凶險故併錄之以示戒

治驗

一王培元適會於其弟宋臣書室云及心煩之甚已非一日將服他藥余診之脉雖不合止而不服盖此等瘧甚多姑二條刺出紫黑湯平服神情始定

一余弟驥武每心煩嗜睡自識藥而拴此由中氣虛故易感瘧其瘧便欲刮放不具述然亦瘧之一症也姑錄之以廣其說

老弱兼瘧

先有痰火咳嗽之疾忽爾喘急痰喉聲如鋸或頭

汗如油喘而不休心胸煩悶莫可名狀雖云痰火危篤往往有之然亦有兼感時氣或穢氣所觸驟然勢盛者凡治必宜細細察脈按症先清其痰次治其痰然後漸補氣血則標本兼得其理矣

治驗

一汪子建母七旬有餘素犯痰火老弱之症忽痰涎壅盛喘急不休喉聲如鋸延余診視六脈不勻有如雀啄雖老弱痰火之脈嘗有歇指亦不足怪然視其驟然作變病必有異余曰此兼痰症尚可治也閱其左腿灣下有青筋二條刺之紫黑血流如注先用散痰消食豁痰順氣之劑併進牛黃抱龍丸病勢漸安後惟補其氣血乃痊

一盛君和母五十歲痰火多年忽面赤頭汗遍身俱腫喘急煩悶倍常延余診視余思老年痰火固所宜然何面赤頭汗徧身俱腫之驟也及按其脈又與症相合不可據以爲痰然若竟以老弱痰火治之終覺疑指有細紅絲筋歷歷可驗則其

也明矣先治其痰刺指頭二十餘針去其毒血次用稍冷湯服寶花散面赤頭汗自身腫俱除喘急亦漸和緩唯是老弱痰火爲終身之疾

瘡症兼痧

瘡痛者心火血熱所致故火盛面膿腫作痛然膿瘡避痛必漸漸而極非若兼痧之驟故凡瘡湯兼痧其腫痛必多可畏處況瘡瘍脈多洪數兼痧脈固不同其筋色又有可驗也

治驗

一潘子亮女十八歲患瘡已半載忽一日飲酒後膿瘡大盛或以其酒助血熱且食鵝鴨發毒之味膿瘡腫痛由斯而極治以涼血活血解毒托裏之劑更覺昏迷飽悶延余治之脈不洪數而反沉微余曰脈不對症必痧使然刺出指頭毒血又刺頭頂心一針神情方始清爽但胸中飽悶用順氣散痧消毒之味四劑微冷飲之兼外搽合掌丸飽悶安細視其十指有細紅絲筋歷歷可驗則其之爲老弱變症

先有勞弱不足之症或吐血時發或微微乾嗽兩顴唇口鮮紅或骨蒸發熱不已一觸犯時氣傳染或穢惡之氣相犯必兼瘧脹或多痰喘或咽喉如梗或心腹脹悶煩躁發熱較之平時不足之症益覺沉重此宜以瘧爲主治之令瘧毒退盡方可治其本症不然勞弱未見凶危瘧禍已在目前矣

治驗

一婦人吐血乾嗽晝涼夜熱已久忽午後發熱異常脹悶沉重他醫以爲怒氣血虛用養血化痰順氣填胸左關必須有力平時勞弱脈亦自宜弦數內有鬱血上中二部亦當見乳何脈不對症者是看其左腿灣有紫筋數條歷歷可指其爲兼瘧之症明矣故昏迷痰喘先刺其瘧筋出其毒血倍用寶花散清茶微冷飲之方得神情清爽不復痰喘昏迷脹悶沉重之勢但勞弱由於本原不足綿延未愈

氣之劑病熱益盛昏迷痰喘不省人事延余左關微緩無力右關似緊非緊餘脈應指不勻余思怒氣填胸左關必須有力平時勞弱脈亦自宜弦數內有鬱血上中二部亦當見乳何脈不對症者是看其左腿灣有紫筋數條歷歷可指其爲兼瘧之症明矣故昏迷痰喘先刺其瘧筋出其毒血倍用寶花散清茶微冷飲之方得神情清爽不復痰喘昏迷脹悶沉重之勢但勞弱由於本原不足綿延未愈

瘧變勞瘵

瘧症有惡飲熱湯者有反喜飲熱湯者惟其喜飲熱湯瘧症益莫能識慢瘧所以變成勞瘵也原其瘧毒之始入於氣分令人喘嗽吐痰發熱聲啞盜火毒傷肺肺爲嬌臟若不知治變成百日緊勞輕者數年難愈卒至危亡瘧毒之始入於血分重者毫變在即輕者歲月延捱若乃毒瘧胃口必須去盡而愈毒瘧肝經損壞內潰吐血數發勢極多危毒瘧心胞絡更加凶險不待時日毒於腎經腰脊疼痛嗽痰咯血日甚一日不可得瘥凡瘧毒遺患總成勞瘵治須識之於始凡臟腑之病俱可療治莫咎其終若一潰腑臟不治

治驗

一王君瑞內空咳嗽吐痰發熱左背疼痛已年餘矣延余診之六脈浮緊洪數脈症不合又無瘧筋但用刮瘧痛減服散瘧清熱消痰順氣四劑而愈一楊音節瘧脹不服藥惟放瘧三次胃脘間成一大塊咳嗽吐痰發熱不食日漸危瘦延余診之右關脈尤而緊餘脈俱數余曰內有瘀血必吐出而

可解。用桃仁蘇木澤蘭白蒺藜香附烏藥酒煎服之。吐紫黑血碗許。更用活血引下之劑加童便溫服之而愈。

一左元峰痧脹。放痧三次。不服藥。痧根不絶。變成勞瘵。咳嗽咯血。音啞。發喘。骨瘦如柴。脉洪大無倫。余辭不治。又二月而終。

臌脹兼痧

先有臌脹而痧氣乘之。臌脹益甚。在臌脹不可先醫在痧氣自宜早治。

治驗

一江雲甫肚腹脹急如臌。臍突筋青。心口將平。余診之。知爲血臌之症。其指頭黑色。此臌症之所無也。視指上有青筋兼痧無疑。刺二十餘針。又刺臂灣腿灣青筋五針。俱去其毒血。略鬆。用蒺藜散微温飲之。臍下青筋漸退。後刈臌症之藥。導去惡水。日服治臌香圓九二月餘。臌症盡平。永不復發。

痧變臌脹

痧者毒也。慢痧之毒。遷延時日。滯肌膚腸胃血肉之中。若不早治。即成真臌。

治驗

一嚴天玉次子。氣急作脹。胸腹飽悶。臍下有青筋突起。心口將平。此慢痧成臌也。刺腿灣青筋六針。出紫黑毒血甚多。又刺指頭出毒血二十四針。臍上青筋即淡色。腹內覺鬆。用寶花散微冷服。腹脹漸消。其後不復用藥施治。但恐其根未除。日後復發。姑誌之以例其餘。

半身不遂痧

心主血。痧毒入於血分。故易攻心。此痧症所以發昏也。若痧之慢者。衝激遲緩。未逆於心。留滯經絡。或在於右。或在於左。爲半身疼痛。或麻痺不仁。如此半身六一

遂總因痧毒之遺害也。治之者見有痧筋急宜刺破。然後用藥以散其毒。活血以消其痧。痧則痧根既拔。其症漸痊。若不知治。綿延日久。痧毒益深。勢不可遏。當又有變症難愈矣。

治驗

一章道庵屢患咯血。發熱不凉。左半身疼痛不已。

行步艱難延余診視初不覺其爲痧也細思寒症不合之處檢其痧筋刺之用桃仁澤蘭獨活烏藥煎二劑微溫服吐血疼痛俱愈永不復發

一盛成年朝涼夜熱氣急半年服藥不應反加右半身疼痛不能俛仰咳嗽吐痰飲食減少成勞弱不足之症棹舟迎余脉不見弦數而微細時有歇指脉症不合閱其痧筋刺二十餘針用姜黃旋覆花丹參橘紅赤芍玄胡索澤蘭山查角刺穿山甲二劑微溫服疼痛吐痰俱除後朝用六味地黃丸夕用補中益氣湯朝涼夜熱俱愈

內傷兼痧

人有內傷詎無外感外感之症不獨風寒即夏月暑熱之氣時疫傳染之氣穢觸犯之氣一受於身亦如外感然則內傷者本病外感者標病故傷寒集中有內傷兼痧之症此之集中有內傷兼痧之症治洪主意先辨痧症治其標後審內傷治其本

治驗

一曹洪宇子之外戚爭奪家産涉訟公庭有老婦造其家互相爭毆發熱沉重咳嗽吐痰胸中脹悶諸親戚惟恐斃於曹姓室中延醫書來王見更邀余往視青來幾不敢任余憐憫此婦情彼此俱敗若一救之不特活婦一命亦且保全兩家是亦大德余爲診之知其內傷兼痧症也刺痧筋二十餘針付寶花散微溫服之脹悶稍緩定一方即於青來廂中取藥用桃仁赤芍澤蘭玄胡索紅花陳皮烏藥獨活治其內傷服後下黑糞瘀血俱消諸症俱愈但其舊有不足之症非參不可後青來用參芪大補乃健而歸

紫疱痧

痧症不內攻則外潰余於發蒙論中已略陳其概矣無如痧症變異更有難盡述者即若爲腫爲毒之外又有發爲紫血疱者此眞痧之異者也余故記之以例其餘

治驗

一余隣許秀芝女嫁爲養媳婦手足下半身俱腫大腹亦脹發出兩腿足紫血疱如圓眼大密難數

記皆云此癇瘋之症服藥益甚芝秀芝憐惜其女載與俱歸求余治視疱多可畏及見有疝筋發現於腿灣方知痧者猶樹之根疱者猶樹之葉也遂爲放痧三針又刺指頭痧二十一針盡去其毒血復診其脈六部俱和殆其痧毒之氣已散但存肌表紫疱而已用蘇木紅花澤蘭桃仁烏藥枯梗川芎牛膝二劑溫服凡紫血疱盡收靨結痂而愈

一痰喘氣急痧

先有痰喘氣急而痧脹因之先治其痧後治其痰氣

無令痧爲本病之助兼有痧脹而痰喘氣急因之但治其痧而痰喘氣急自愈若痧有寒熱不清痰喘氣急者兼和解痧有有熱無寒痰喘氣急者兼清熱痧有食結不化痰喘氣急者兼消食順氣痧有大便不通小便不利痰喘氣急者急攻其裏痧有痢下膿血或赤或白痰喘氣急者急攻其積痧有瘀血凝滯小便利大便黑痰喘氣急者急消其瘀痧有嘔吐紫黑血或鮮血痰喘氣急者當慮痧毒攻壞臟腑不痛者可治痛而不已者難治服藥不應者死

治驗

一祖南軒四月發熱頭痛脹悶昏迷痰喘氣急延余六脈無根余曰脈法六脈無根者死若爲痧脹而然則有救其家善放痧因閱痧筋放之不愈余用沉香鬱金散圓紅散稍冷服又用化毒丹一服昏迷即醒脹悶痰喘氣急俱平更用防風散痧湯加青皮連翹山查萵子熟大黃一錢服之發熱頭痛俱已六脈如舊

一費道元內室痰喘氣急脹悶不已延余左三部脈浮緊而數右三部脈如無余曰痧脹暗發也其兄善放痧刺乳下出紫黑毒血二針如注六脈復舊余用和脾宣化飲二服稍冷飲之痰喘氣急脹悶俱痊

一錢公肅子二月晚間痰喘氣急發熱身重腹中絞痛延余脈沉微刮痧放痧不愈用藿香湯稍冷服之又用稜术湯加大黃五分微溫服之諸病俱痊

痧瘋

瘋者。天地間鬱氣所感。發而爲瘋。蓋惡毒之氣。壅於血肉。散於肌表。留於經絡。以成瘋症。最惡候也。若痧者亦時行惡毒之氣變爲大瘋。尚何疑乎。余昔在泰溪。嘗見一人犯大麻瘋症。眉髮俱脫。面目頹敗。手足攣。遇一老者爲之放痧三次。曰此痧瘋也。傳汝一方。金銀花六錢。黃芩一錢五分。皂角刺一錢。赤芍二錢。紅花二錢。牛膝三錢。苦參四錢。生地二錢。水煎日服。日漸而痊。若余於此症。固未嘗治。及不敢虛載治驗。適余經見老者所治有然。故附錄之。以見痧症之亦有是變焉。

痧重

痧症始發勢雖凶暴。未必身重。若飲熱湯熱酒。痧毒即阻塞於經絡血肉之間。徧身重痛。不能轉側。放痧之後。治宜消瘀解毒爲先。初起易治。久則難治。放痧服藥不效者死。

治驗

一邵光先十二月。腹中微痛。幅蔽醋水。以爲胸中受寒。服薑湯一碗。徧身大痛。腹脹身重。不能轉側。迎余。右脈俱伏。放痧。川當歸枳殼湯加炒黃連。用桃仁紅花湯微溫服。次日痧毒之氣漸減。又放痧服如前藥而愈。

一莫乘雲。次子頭痛發熱。胸中脹悶。飲熱湯一碗。徧身疼痛不能轉側。臥床不起。服他藥益昏沉。延余右寸氣口脈虛。左寸微細。關洪緊有力。知其痧也。刺指頭出毒血九針。少愈。用消瘀活血解毒藥三劑而痊。

眼目痧

痧者。火毒也。若犯痧症。適與心主之火相合。故痧毒逆衝。最要防攻心之患。今少陰心君不受邪。逆犯厥陰肝母。故兩目紅腫如桃。甚則眼珠突出。最爲凶險。然他症患目。惟在於目。若因痧爲患。必然先覺心中煩悶。而目疼因之。苟不知參治。則痧毒已泰陽位。其火勢之炎熱。輕則壞目。重則須命。治宜先刺頭頂百會穴。以瀉毒氣。當放者放。刮者刮。用清火活血順氣之劑。加牛膝石斛以引火歸原。誠爲良法。

一江道誠患心中煩熱頭眩忽兩目紅腫大痛飲熱茶熱酒眼珠掛出左目尤甚至晚即昏花不醒益覺沉重此誤飲延余診視左脉微細無痕瘍之為害也放瘍不愈用金銀花酒草連翹黑山梔枳殼升皮赤芍牛膝石斛草決明加竹葉一針十指二十二針去毒童便微冷飲之眼珠始收調理而愈

瘟瘍

寒氣鬱伏於肌膚血肉之間至春而發變為瘟症是名瘟瘍又暑熱傷感凝滯於肌膚血肉之中至秋而發亦名瘟瘍但春瘟瘍毒受病者少不相傳染時或有之秋瘟瘍毒受病者多老幼相傳甚至一家數人犯瘍其發也必惡寒發熱或腹痛或不腹痛似瘧非瘧或氣急發喘頭面腫脹胸膈飽悶或變下痢膿血輕者牽連歲月重者危急一時治宜放瘍消食積為主俟瘍毒已溃然後和解清理除其寒熱建脾養血補其中虛

治驗

一洪公震九月惡寒發熱吐痰咳嗽胸中煩悶口渴舌胎延余診之左脉時有欲指右脉沉而有力刺瘍肌毒血不流後卧床不醒益覺沉重此誤飲熱湯為害也用陰陽水一碗加明礬二分飲之又次日瘍肌復現刺臂灣一針十指二十二針去毒用消食去積之藥加熱大黄一錢微冷飲之少愈血用活血解毒藥諸症漸鬆調理而痊

一公震內室同時惡寒發熱頭面腫脹心胸煩悶似大頭瘟診之六脉俱伏此瘟瘍也放瘍不愈先飲微冷葛湯次用透發消毒下氣之劑加牛膝三錢同煎微冷飲之一公震次子十月寒熱如瘧心腹絞痛吐瀉不已六脉沉緊亦瘟瘍為害也用沉香阿魏丸清茶微冷下併和脾宣化飲入大黄一錢同煎微冷飲之次日再服如前而愈

頭眩偏痛瘍

瘍氣漫者上升於三陽頭面頭痛心煩不安宜刮瘍不愈用清凉之劑治之

治驗

一高1023 子 醫家 6 反三引

一鍾仲宣數數頭眩。日漸益甚。或時右偏頭痛。脈症不合。刮瘍不藥而痊。

一潘尚峰苦頭眩。或左偏頭痛。服他藥不應。延余。脈微與症不合。放瘍不愈。用清熱下氣之劑而痊。

流火流痰瘍

瘍毒傳變不待時日。朝發於足而足腫痛。夕流於手而手腫痛。朝發於肌膚而肌膚紅腫。夕入於裏而痰喘不休。此等之瘍。乍隱乍現。乍來乍去。按之脈而瘍脈或不現。最難識認。如瘍毒所流及之處熱者。似流火而非流火。腫者似流痰而非流痰。或痛極難忍。或痒痛不已。又瘍之變者也。欲知此瘍。須看病勢凶暴。症多變。殆其瘍與不信。服熱湯二日而殂。

余診其脈厥厥動搖。數而又疾。余曰。脈異於常而不比流痰流火之輕緩者。驗之於瘍。筋發現刺之無一癸。敬峰晚間右大腿紅腫痛。方已。喉旁發腫而痛延余。脈不見異。初不覺其為瘍也。只見時症犯疑。然後憑脈所犯。風寒暑濕及食積痰血氣阻分治之。斯能有效。如或不覺。便成疡症。

治驗

一張宏原內室。日間左足小腿紅腫大痛。暮即腹痛而足痛止。次日左足小腿又復紅腫大痛而腹痛又止。來去不常。痛無一定。延余診之。六脈如常而微數。此平人之脈也。難據為瘍。但症異。凶暴須看瘍筋發現。便有實據。可從瘍而理也。扶看腿灣有青筋三條。刺之。紫黑毒血流出甚多。反加痰喘。此放瘍有未盡故也。用荊芥金銀花湯加土貝母二錢。微冷服二劑。少愈。次日左足腿灣下。又現瘍筋一條。刺去毒血。併刺鎮頂一針。服前湯加牛膝三錢。二劑瘍退。服紅花湯半月。腫痛俱痊。

一萬隆生次子。清晨臂上紅腫大痛。次日變為足腿上紅腫大痛。乍來乍去。按之脈而瘍症多變。殆其瘍與不信。服熱湯二日而殂。

一吳敬峰晚間右大腿紅腫痛。方已。喉旁發腫而痛延余。脈不見異。初不覺其為瘍也。只見時症犯此者多。細看兩臂瘍筋。刺出毒血如注。診氣口脈洪實。用紫朴湯倍山查葡子加大黃一錢。微冷飲之。食消便下而安。

咳嗽嘔噦瘍

瘍毒之氣上凌肺金。故氣逆發哈而咳嗽。痰涎上湧。

或嘔噦惡心或面目浮腫或心胸煩悶此熱毒入於氣分瘍筋往往不現治以刮瘍爲主間有入於血分者必有瘍筋然後刺之臨症用藥宜理瘍毒爲主若以傷風咳嗽治之則悞矣

治驗

一俞仲嘉長女五月發熱咳嗽嘔吐痰涎胸中脹悶面目浮腫延他醫服傷風痰嗽之藥四劑心中益脹悶遂止不藥將及一月余偶過求余診之右寸脈虛知其爲瘍之變症也刮瘍訖用防風散瘍湯加貝母薄荷童便微冷飲之即瘥

一王惟誠咳嗽發哈不絕聲面目俱腫嘔痰不已更吐鮮血延余治之六脉弦緊且數此瘍毒之氣搏激於筋脉間故見脈乃爾刺指頭出毒血三針令多爲刮瘍用寶花散加童便微冷服又用圓紅散微温服而瘥

霍亂瘍

痛而不吐瀉者名乾霍亂毒入血分宜放瘍新食宜吐久食宜消食消下結宜攻痛而吐瀉者赤人氣分宜刮瘍不愈視有瘍筋則放宜調其陰陽之氣爲主須知腸胃食積宜驅不宜止止則益痛者此因瀉糞穢氣所阨治宜暑用藿香半夏正氣然必須防食積血滯或消或攻或活血瘀藥未可亂投

可亂施燥濕之劑俱在所禁温煖之藥未可亂投

治驗

一沈篆玉九月間乾霍亂腹中盤腸大痛放瘍三十餘針又王君先爲之刮瘍不愈余用寶花散加大黄先煎茶稍冷飲之面痊

一彭君明暖間腹中大痛吐瀉數十次痛益甚延余診之右脈乳而滑右脈弦細而澁此痛食已從吐瀉而盡乃毒入血分血瘀作痛也放瘍不愈用獨活紅花湯調紅散微温飲之吐瀉腹痛少愈次

日服前藥吐瀉腹痛俱已

一童敬橋內室吐瀉腹痛自刮痧服陰陽水痛益甚余用三香九微冷飲之而安

絞痛痧

心腹絞絞大痛或如梗或如純轉或如筋吊或如雖觸或如刀割痛極難忍輕者亦斂斂絞痛脹悶非常放痧可愈若不愈必審脈症何因辨暑穢食積瘀血所阻施治須連進數服俟其少安方可漸爲調理此症世多放痧數次不愈聽命於天不肯服藥遂至痧毒攻壞臟腑惟死而已惜哉

治驗

一廉齋朱先生夫人夏月痧痛危急刮痧放痧不愈更易三醫莫敢任事舉家無措宋臣王兄邀余往視六脈微伏治之未愈其晚絞痛如前明晨賢郎宗伊兄復邀余右手脈伏更放痧三十二針兼刮痧乾川寶花散沉香九清茶稍冷飲之併用散痧解毒活血順氣之劑親友尚恐無救留余俟飲後坦君雲夏王兄曰睡矣何如余曰睡則神情已

定氣血漸和始將安越翼日乃瘳

一賈公清作瀉腹痛如絞延余脈洪大數實放痧不愈用烏藥順氣湯加大黃下積而痊

一故友龍庵朱兄夫人公範母也口吐痰涎腹中絞痛醫治沉重六日不愈延余診之左脈微伏余曰痧也令刮之少安用藥不服次日復昇沉大痛舉家驚惶親戚填門復延余剌左中指一針出毒血兼令刮痧不愈用降香桃花散衝砂仁湯微冷送下併用防風散痧湯加山豆根茜草丹參金銀花山查葡子稍冷服而安

一何君雅子正月盤腸絞痛延余脈伏令刮痧用沉香鬱金散稜术湯冷飲之稍愈黃昏時復絞痛非常叫喊不已復邀余用細辛大黃九清茶冷飲之又用紫朴湯而痊

腸痧痧

痧症不忌食物痧毒裹食結成痧塊於脇面痛其痧塊變痛甚多故爲難治且治痧惟在初發者不識或飲熱湯毒血凝結日慢痧不至脹急傷人亦成腸痛

瘧之日久勢必難散

治驗

一朱子佩夫人身熱吐痰脇痛欲圊湯益嘔噫不已延余左脈洪數右脈似伏余曰瘧也予佩剌其腿灣瘧筋二針不愈服童便嘔噫稍減余用阿魏丸大黃丸白湯微冷下身熱吐痰俱已又用必勝湯微冷下三服而瘥

一王養初子佩母舅也吐痰脇痛悞吃圊肉放瘧數次日久不愈延余診之余辭不治以瘧毒裹圊結成瘧塊不可解耳況日久攻壞臟腑雖藥無益後易數醫變噦旁發腫而殁

瘧痢

夏傷於暑秋必瘧痢疾初發必先泄瀉腸胃泄瀉必致空虛內虛則易感觸穢惡之氣即成瘧痛或大氣炎熱時行疫癘感動腸胃因積而發亦致瘧痛夫痢不兼瘧積去之後便可得瘧即甚極藥無不效若一兼瘧勢必殺痛異常止治其痢用藥無效或變痢如豬肝色或變痢如屋漏水或變痢惟面紅水或變噤口不食嘔噦凶危或變休息久痢歲月綿延常良法

治驗

一曾奉先七月間發熱下痢血水日百餘次肛門急迫腹痛異常嘔噦不食延余治之六脈遲數不常或時歇指此瘧痢也刮瘧放瘧乾痛乃減半用沉香阿魏丸砂仁湯稍冷飲之用當歸山查紅花枳實赤芍澤蘭青皮蔔子梹榔各一錢熟大黃五

分加童便一鍾稍冷飲二服痢下赤白甚多諸症俱愈

一余弟驤武下赤白痢日數十餘次腹中大痛大便窘迫余診之六脈微細放瘧二十針又刮瘧不愈用寶花散沉香阿魏丸稍冷湯飲之腹痛漸寧用當歸山查陳皮梹榔紅花烏藥各一錢熟大黃八分加童便飲之赤白俱下痛亦漸安後用當歸一兩山查二錢服之赤白痢全愈

一癸仲嘉內室腹中絞痛臨急氣逆余診六脈無根此瘍脈也放瘍不愈用沉香陳皮烏藥山查荷子加童便稍冷飲之漸希用當歸一兩服四劑而愈

一吳瑞雲發熱脹悶沉重放瘍後痢下紫血他醫以瘍氣已清但治其痢勢在危篤舉家驚惶延余六脈洪大不勻此瘍氣未清瘍毒尚盛也令刮瘍乾用當歸枳殼湯入童便冷飲之次以蘇木紅花五靈脂茜草烏藥香附當歸赤芍以導其瘀乃安後發餘毒於肛門邊出膿而愈

蛔結瘍

瘍毒攻胃故蛔死入於大腸與宿糞相結腹中大痛是爲蛔結

治驗

一朱子佩女瘍發痛極頭汗如雨延余診之脈乳而洪實放瘍不出刮瘍不起用細辛大黃九微冷服又用荊芥銀花湯稍冷服又三日瘍筋乃現放之服藥如前腹痛不止至十九日用藥加大黃大便下死蛔三條結黃亦下痛尤不止又現瘍筋放之服前藥乃愈

頭痛瘍

瘍毒中於臟腑之氣閉塞不通上攻三陽巔頂故痛入腦髓發暈沉重不省人事面青頭痛朝發夕死夕發旦死急刺破巔頂出毒血以泄其氣藥性破其毒氣清其臟腑爲主瘍毒中於臟腑之血壅瘍不流上衝三陽頭面肌肉故肌肉腫脹目閉口塞心胸煩悶急刺破巔頂及諸青筋出毒血藥宜清其血分破其壅阻爲要

治驗

一張顯如頭痛發暈沉重六脈俱伏刺巔頂一針餘瘍筋俱刺少甦復診其脈流宕而上魚際用清氣化痰飲冷服而安

一汪路眞內室頭面紅腫發熱頭痛心胸逆悶診脈乳而疾刺右腿灣三針血流如注冷服紅花膏子半盃用酒黃飲三劑而瘍

心痛疰

疰毒衝心扉之於氣則痛時止痰涎壅盛卒迷煩悶此其候也治宜刺手臂服順氣之劑爲主疰毒攻心扉之於血則大痛不已昏沉不醒此其候也治宜刺腿灣服活血之劑爲主遲則難救

治驗

一鄭延旦次子心中暴痛口吐痰涎迷悶不能出聲延余兩寸沉而伏關尺澀而緊刺疰筋二十針用烏藥順氣湯冷飲四劑而安

一嚴瑞宇三女飯時心中暴痛昏沉不醒日暮延余六脈已絕辭之次日而烈

腰痛疰

疰毒入腎則腰痛不能俛仰若悞飲熱湯熱酒必然煩躁昏迷手足搐搦舌短耳聾垂斃而已

治驗

一黃敬宇內室腰中大痛強硬如杖悞飲熱酒發狂大腸經疰也刺腿灣青筋四針毒血成流不愈用枳實大黃湯冷服半夜疰退少安後調理而愈

一鍾孟芳小腹大痛放疰二次不愈延余治之脈數而疾余曰疰毒已攻壞臟腑矣辭之半月而亡

疰塊

痧毒留於氣分成氣痞痛留於血分成血塊痛壅於食積阻滯成食積塊痛盛因刮痧放痧稍愈痧毒未盡不用藥以消之故施治之法在氣分者用沉香砂仁之類治之在血分者用桃仁紅花之類治之食積凝滯者用萵子梹榔之類治之或氣血二分俱有餘毒者當兼治之若更兼食積所阻有餘毒者當併合治之

治驗

一王介甫內室腹痛放痧二次忽左脇有塊屢痛不止臥不安延余脈芤而沉微此毒留滯不行之故用蘇木散併三香散合桃仁紅花湯微溫服攪消痛減而痊

一陳奉山腹中絞痛放痧三次變右脇下塊大痛不止臥不能起延余脈沉實而弦緊此食積爲患用阿魏丸併枳朴湯加牛膝治之而痊

一夏少溪內室腹痛放痧稍愈左脇下變成塊痛口吐痰涎臥床不起延余脈沉而微滑用沉香阿魏丸加貝母白芥子治之而痊

一張弘先痧脹變爲胸前左乳之上有一點痛齒之半年後吐血而殂

痧變吐血鼻衄便紅

痧毒冲心則香迷痧毒冲肺則氣喘痰壅甚則鼻衄痧毒入肝則胸脇疼痛不能轉動甚則血湧山吐而出痧毒流於大腸則大便血流於膀胱則小便血治宜先清其痧毒之氣順其所出之路則氣自順而血自寧矣若不知治緊則變在頃刻遲則變成勞弱或時時便血溺血難愈

治驗

一孫盛元痧脹放痧不服藥變筋骨疼痛十日後吐血甚多疼痛不愈延余診其脈芤此痧氣已退尚存瘀血用桃仁紅花活血之劑四服而痊

一潘國安痧脹鼻衄是痧氣由衄而泄用清涼至寶飲而痊

一周瑞亭子六歲痧痛大便紅延余令放痧服散痧消瘀活血之劑而痊

一何君叔女痧痛溺血甚多延余令放痧不愈用

荊芥薄荷湯加茯苓益母金銀花牛膝連翹治之而痊

吐蛔瀉蛔痧

痧毒入胃胃必熱脹熱脹之極蛔不能存因而上湧乘吐而出或蛔結腹痛不大便或蛔入大腸由大便而出與傷寒吐蛔伏陰在內者不同治宜清其痧脹爲主

治驗

一蔣公尚次女發熱心痛口多痰涎吐蛔二條延余右關沈細面疾餘脈洪數刮痧刺腿灣一針微有紫黑血點服連翹薄荷飲三劑痧退服小柴胡湯身涼而愈

一沈存原痧脹吐不止延余脈洪而緊刮痧乾用藥加熱大黃一錢微冷飲之吐止脹消後二日復痧脹吐蛔一條脈復洪緊更用熟大黃一錢微冷飲之痧退而安

一湯仲文腹脹大痛延余診之脈散亂無根此蛔結也痧實始之放痧後用散痧去其毒之劑加大黃二錢微冷飲之大便下死蛔二條痛宿糞而愈

痧變腫毒

痧毒不盡留滯肌肉腠理之間即成腫毒宜先放痧用散痧解毒之藥以除其根然後審其毒之所發照十二經絡臟腑分陰陽寒熱虛實治輕則消之重則拓之虛則補之實則瀉之若紅腫甚者屬陽用涼冬解毒湯加引經藥以治之白色不紅平腫不易起發者屬陰用參歸化毒湯加引經藥以托之毒有半陰半陽用活絡透毒飲加引經藥透之穿破之後皆用神仙太乙膏貼之若腫毒無膿止有毒水流出或膿少血多用飛龍奪命丹研碎些須填太乙膏中拔去毒水血膿後單用太乙膏貼之毒口難收用紅肉散摻之肉黑者用代刀散以豬花絮微摻之即變紅色易膏自愈

治驗

一姜雲卿偏身疼痛背發一赤黑斑痛甚求余視診之脈沉微指頭黑色自述熱伏此非變證毒用冷園藥而成背疽也令去其園藥放痧後用散痧去其毒之劑加大黃已絕用參芪姜桂熱附子溫托之外敷以代刀散

黑變紅色貼太乙膏而痊。

一蘇成中長子暑月吐瀉腹中絞痛。刮痧痛止。兩臂紅腫且痒求余一方用香薷飲一劑而痊。

一葛弘先內室瘍痛不吐不瀉盤腸絞絞疼痛難忍放瘍後頸項生毒出膿而愈。

一趙公瑛寒熱頭眩心胸煩悶刮痧而愈。肛門邊發餘毒出膿成漏為終身之疾。

玉衡傳用要方

防風散瘍湯　瘍有因於風者此方主之

防風　陳皮　細辛　荊芥　枳殼各等分

頭面腫加薄荷甘菊　腹脹加大腹皮厚朴

手足腫加蔴蓳仙斗藤　內熱加連翹知母

痰多加貝母瓜蔞仁　寒熱加柴胡獨活

吐不止加童便　小腹脹痛加青皮

血滯加茜草丹參　咽喉腫加山豆根射干

一食積腹痛加山查萊菔子　心痛加玄胡索蓬术

赤白痢加槟榔　口渴加花粉

面黑血瘀也加蘇木紅花　放瘍不出借細辛蘇木桃仁荆芥

穢臭加藿香薄荷

水二鍾煎七分稍冷服

荊芥湯　瘍有鬱氣不通者此方主之

荊芥　防風各一錢　川芎　三分　連翹各八分　青皮　山查萊菔子　心煩熱去川芎加黑山梔

有積加枳椇
氣壅加烏藥香附
鬱悶不舒加細辛
大便不通加枳實大黃
小便不通加木通澤瀉
咳嗽加桑皮枇杷
水二鍾煎七分稍冷服

陳皮厚朴湯　痧有因於氣阻者此方主之
陳皮　紫朴　山查　烏藥
痧脹玉衡書　卷下　十六
青皮　等分

痰多加白芥子貝母
血瘀加玄胡索香附桃仁
口渴加薄荷花粉
水二鍾煎七分稍冷服

痧筋不現加細辛荊芥
頭汗加枳實大黃
稜木湯　痧有因於食積者此方主之
山查　萊菔子　蓬术　青皮
烏藥　枳實各一錢

痰多加白芥子
血壅加桃仁紅花
食積加山稜蓬术
鬱熱加香豉紫朴
小便不通去川芎加薄荷射干
喉痺加大力子

藿香湯　痧有因於殲氣者此方主之
藿香　香附各四分　薄荷七分
山查　連翹各一錢
水二鍾煎七分冷服

薄荷湯　痧有因於暑者此方主之
薄荷　香薷　連翹各一錢　紫朴
金銀花　木通各七分
水二鍾煎七分冷服

紫蘇厚朴湯　痧有暑脹不已者此方主之
痧脹玉衡書　卷下　十七
紫蘇　香薷　紫朴　枳殼
紅花　青皮　陳皮　萵子
山查　等分

水二鍾煎七分冷服

防風勝金湯　痧有因於食積血滯者此方主之
防風　烏藥　乾葛
枳殼各七分　萵子二錢極細
山查　連翹　赤芍各一錢　金銀花
水二鍾煎七分稍冷服

必勝湯　痧有因於血實者此方主之
紅花　香附各四分　桃仁去皮尖　大黃
貝母　山查　赤芍　青皮
五靈脂各一錢
水二鍾煎七分徵温服
紫朴湯　痧有食氣壅盛者此方主之
紫朴　山查　萄子　山稜
蓬朮　枳實　連翹　青皮
陳皮　細辛等分
水二鍾煎七分稍冷服

獨活紅花湯　痧有因於血鬱者此方主之
獨活　紅花　桃仁去皮尖　蒲黃
玄胡索　白蒺藜炒為末　烏藥各一錢
香附三分　枳殼七分
水二鍾煎七分稍冷服
射干麻芩湯　治痧似傷風咳嗽
射干　桑皮　麥冬　桔梗
香附　花粉　貝母
水二鍾煎七分徵温服
清涼至寶飲　此清痧熱之劑
薄荷　地骨皮　丹皮
黑山梔　杉殼　甘菊　金銀花等分
水一鍾煎七分稍冷服　嗽甚加童便飲
當歸枳殼湯　此養血和中之劑
歸身　山查　枳殼
赤芍　青皮　茜草
丹參　續斷各一錢
水二鍾煎七分徵温服
荆芥銀花湯　此治血滯之劑
荆芥　紅花　青皮
金銀花　赤芍各一錢　香附三分　烏藥五分
白蒺藜去刺搗末八分

玄參　花粉　等分細辛倍加
水二鍾煎七分稍冷服

紅花湯　此治血痰之劑
紅花　酒黃　青皮各一錢　香附四分
貝母二分　枳殼六分

水二鍾煎七分微温服

如聖散　治瘧咽喉腫痛此方主之
牛蒡子　蘇梗　薄荷各一錢　甘菊
金銀花　川貝母　連翹　枳殼各一錢

桔梗五分　烏藥四分

水煎微温加童便冲服

寶花散　此治瘧之仙劑
鬱金一錢　凡方中用此味後有瘧方俱當開細辛二兩
降香三錢　荆芥四錢

共爲細末每服三匙清茶調參服

沉香鬱金散　此治瘧氣寒凝之劑
沉香　木香　鬱金各一錢　烏藥三錢
降香二錢　細辛五錢

共爲細末每服三匙清茶調參服

圓紅散　治血鬱不散
沒藥置箸內放爐上炭火炙去油爲末三錢　細辛四錢
桃仁去皮尖　玄胡索　惰香各一錢

共爲末每服一錢紫荆皮湯温服

化毒丹　治瘧痰氣壅盛
金銀花　薄荷各一錢　細辛　枳殼各五錢
川貝母二兩

共爲細末每服六分細茶稍冷下

三香散　治過飲冷水瘧不愈者
木香　沉香　檀香等分

共爲細末每服五分砂仁湯微冷下

三香丸　治過服冷水痞悶者
木香　沉香　檀香各五錢
蔔子各八錢　五靈脂六錢　砂仁

共末水煮爲丸微温白湯下

救苦川　此治瘧氣鬱悶之劑
枳實　蔔子各一錢　鬱金二錢　烏藥

連翹 各八錢

共末淸茶稍冷下

冰硼散　治痧咽喉腫痛

硼砂　玄明粉 各二錢　天竹黃 各二錢　硃砂 分

共末吹入喉中

牛黃丸　治痰涎喘急

胆星　天竹黃 各三錢　雄黃 五分

硃砂 五分　牛黃　麝香 各四分

共末甘草水爲丸如梧桐子大每服二九淡生薑湯稍冷下

治痧大便乾結氣血不通煩悶壅塞

細辛大黃丸

盛昏沉者

細辛　大黃　枳實　紫朴

麻仁　青皮　桃仁 去皮尖 等分

共末水發爲丸每服一錢重者二錢再重三錢和脾宣化飲

治痧氣食結胸中飽悶腹內絞痛

此湯主之

薑皮　萄子　細辛　煎如

大腹皮 去黑膜黑豆湯泡洗　麥芽 各一錢　山查 二兩煎湯代水

先濃煎山查湯煎六味稍冷飲之

消疳解毒散　治痧後牙疳

人中白 三錢　兒茶　冰片 三分

官硼　青黛 水飛各一錢　薄荷

甘草　黃連 各五分　冰片　牛黃

珠子 各一分　雨前茶 五分

研細以無聲爲度先用濃茶拭淨去其腐肉吹之

牛黃八寶丹　善化痧後諸般惡毒惡瘡此丹有靈氣

雄黃 透明者 玄參 各五錢　蓮花 炒

川黃連 土炒　羚羊角

川貝母 炒淨　乳香 出汗盡

琥珀　青黛 水飛各二錢　冰片 各二分

雞矢 水飛五錢　牛黃　珍珠 四分

右十五味如法製爲細末聽用外將搗淨金銀花二兩甘菊一兩甘草五錢胡桃肉一兩紫花地丁二兩長流水五碗砂鍋內慢火煮至及半取汁將渣絞乾以綿濾清系柴火熬膏入煉熟老蜜適前再熬至粘餙將前末和丸每丸三分年幼者一丸年長者二丸每日蜜調服

活絡透毒飲　治痧後熱毒流連疼痛不已發癰却不易來者以此湯頻活之

羌活　紅花　荆芥　牛蒡子　木通　當歸　牛膝　蟬蜕

忍冬解毒湯　治痧後餘毒竊發者以此消之

金銀花　甘菊　荆芥穗　青皮　連翹等分

水煎溫服

養金化毒散　治痧後熱毒流連疼痛不已發癰發疔者

乳香　沒藥各由汁　川貝母去心炒　雄黃　黃連　天花粉各一錢生用　大黃二錢半炒半晒　甘草七分生用　牛黃二分　冰片分半　珠子四分研細無聲爲度

共爲極細末用窯湯調服

加味活命飲　治一切痧後留滯熱毒發爲腫毒疔疽以此方消之

穿山甲土炒　金銀花　大黃各三錢　歸尾　陳皮各一錢五分　花粉　生地　薄荷　赤芍　甘草節　生

撥雲散　治痧後餘毒在肝兩目流紅甚至起瞼

水煎溫服

白芷　防風　貝母　乳香各一錢
皂角刺五分
毒在背加皂刺一錢五分　沒藥五分
毒在胸加瓜蔞仁二錢　毒在頭面手足加金銀花五錢

水二大鍾煎八分空心溫服忌醋併諸毒物大人切禁房事

參歸化毒湯　治痧後餘毒流連氣血虛不能卽潰以此化毒托出之

人參　當歸　黃芪　甘草

金銀花　牛膝　紅花　貝母
山查　皂角刺　白芷　等分

水二鍾加胡桃肉一個煎七分空心溫服

奏凱和解飲　痧退之後調理和解者此湯主之

金銀花　土貝母　牛蒡子　山藥
白扁豆　山查　荊芥　當歸各一錢
人參四分　甘草三分

水二鍾加核桃肉一個蓮肉六粒煎七分空心溫服

參苓歸朮散　痧退之後痧氣已絕氣血虛弱者以此補之

人參　白茯苓　當歸　白芍藥　陳皮　黃芪
熟地黃　甘草

水煎空心溫服

沉香丸　治痧氣忽胸腹脹痛迷悶昏沉

沉香　檳榔各五錢　萵子　枳實
厚朴各七錢　山稜　蓬朮　廣皮

天仙子卽朱蓼子各六錢
木香三錢　薑黃五錢　白豆仁　烏藥各四錢

水發爲丸如菜豆大每服三十丸砂仁湯稍冷下

沉香阿魏丸　治痧氣壅血閉昏迷不醒偏身沉重不能轉側

五靈脂　廣皮各一兩　青皮　天仙子
薑黃　蓬朮　山稜各七錢　枳實六錢
白豆仁　烏藥各五錢　木香　沉香各二錢

阿魏一錢　如前法冷湯下
丁香阿魏丸　治痞食積成塊堅硬突起不移者
下日夕叫喊病久不食者
丁香　肉　神麴
蔔子　五靈脂　蓬朮　厚朴　各八錢
青皮　枳實　各一兩
山稜　檳榔　各七錢　白豆仁　烏藥
水發爲丸如菉荳大每服十九紫朏皮溫湯下
薑黃　各五錢　木香　沉香　各三錢　阿魏二錢
丁香一錢

阿魏丸　治食積壅阻痧毒氣滯血凝疼痛難忍
頭面黑色手足俱腫胸腹脹悶
玄胡索　蘇木　五靈脂　天仙子　各一兩
枳實　山稜
蓬朮　廣皮　薑黃　各七錢　烏藥　五錢
厚朴　檳榔
降香　沉香　各三錢　阿魏二錢　烏藥　五錢　香附　四錢
蔔子一兩
水發爲丸如菉荳大每服十五丸砂仁湯稍冷下

蘇木散　治痧毒血瘀成塊堅硬突起不移者
蘇木二兩　白蒺藜　搗去刺
玄胡索　桃仁　去皮尖　各一兩
五靈脂七錢　降香
赤芍藥　各六錢　大黃五錢　烏藥
山稜　蓬朮　陳皮　紅花
皂角刺　香附　酒炒　各四錢　獨活三錢
共爲細末每服二錢溫酒下

蒺藜散　治食積瘀血痧毒凝滯成塊日久不愈者
白蒺藜　搗去刺　二兩　澤蘭　薑黃
蔔子　查肉　茜草　土貝母　淨　各一兩
玄胡索　五靈脂　各一兩　枳殼　七錢
金銀花　八錢　烏藥　青皮　各六錢
桃仁　去皮尖　兩二錢
共末每服一錢溫酒下

探吐法　用鹽湯或蘇湯稍冷服令吐去新食以
解痧毒所用必須多飲則吐

當歸枳殼湯　消食順氣和血之劑
歸尾　枳殼　萵子各二錢　紫朴八分　赤芍各一錢　山查
水煎微冷服

清氣化痰飲　治痧疹痰氣壅塞之劑
貝母二錢　薑黃一錢　青皮　紫朴各七分　細辛　橘紅各八分　荊芥六分　烏藥五分
水煎冲砂仁末五分微冷服

蒲黃飲　治痧毒散遊引火下行之劑
痧脹玉衡書　卷下　三十
蒲黃　蒲黃各一錢
水煎微冷服

烏藥順氣湯　治痧氣內攻之劑
山稜　蓬木　萵子　白芥子　玄胡索各一錢　烏藥各八分　紅花七分　香附四分　枳殼　青皮
水煎稍冷服

降香桃花散　治痧毒中腎之劑
降香五錢　牛膝　桃花　大紅鳳仙花各七錢　白芍　共末黑砂糖調童便和服

木通湯　治痧毒結于膀胱之劑
牛膝三錢　丹皮　細辛　金銀花　澤蘭　木通　玄胡索各一錢
水煎加童便微溫服

枳實大黃湯　治痧毒結於大腸之劑
痧脹玉衡書　卷下　三十一
枳實　赤芍　青皮　桃仁去皮尖　大黃酒浸　大麻仁
金銀花　槐花　黃芩　連翹各一錢　大黃三錢
水煎微溫服

荊芥薄荷湯　治痧氣血阻塞之劑
荊芥　薄荷　白殭蠶　梅丈甘草各一錢　青皮　陳皮等分
水煎微冷服

連翹薄荷飲　治瘍癰積氣壅之劑
香附　荊芥　枳殼　山查
陳皮　連翹　薄荷等分
水煎加砂仁五分梢冷服　木香二分　唐冲
失笑散　治瘍後毒氣退盡尚留瘀血在胸膈間
積血作痛
蒲黃　五靈脂等分
共爲末每服二錢　酒下
便用七方

一方　用井水河水各一半同服治瘍痛
一方　用泥漿水服之治瘍痛
一方　用白沙糖攪極水服治瘍痛
一方　用細辛爲末同砂仁湯冷服治瘍痛
一方　用晚蠶沙爲末白滾湯冷服治瘍痛
已上五方治瘍癌無食積阻滯者
一方　用明礬四分白湯一碗冷服治瘍痛
一方　用食鹽一撮白湯一碗冷服治瘍痛
已上二方乃吐新食阻瘍毒之味必多飲方吐
少則不效

絶瘍方　治數患瘍症必瘍症已愈然後可服以絶其根否則稍有瘍氣未除斷不可服恐甘者作脹熱者助邪反害之矣
甘草　明礬　食鹽各一錢
乾薑三錢
其爲細末米飲搗爲丸每服五分白湯溫下新犯瘍者一二服即愈久犯瘍者十服全愈不復發矣蓋用甘草以助胃用乾薑川烏以充胃用明礬以解毒用食鹽以斷瘍誠爲良方但烏薑性熱恐人有方有不宜故勿服止用五分爲則惟取其能絶瘍根焉爾若人屬虛寒者必加倍多服方能有效
藥性便覽
荊芥　透肌解表散瘍毒瘍筋隱隱不發者非此不現用四分至八分
防風　透肌發表爲風使之助寒熱往來瘍毒壅滯過不發者非此不通用三分至七分

止

羌活　瘍症忌其發表太過若頭痛或又因受寒而起更兼瘍症欲用之引太陽經止許用半分至二分

連翹　消瘍毒解諸經火邪清熱而不滯治瘍之要藥也用七分至一錢

陳皮青皮　陳行瘍氣青伐肝氣瘍氣壅阻鬱結不行者非此不利用六分至一錢

枳殼枳實　破瘍氣驅毒氣除脹氣下食氣積滯壅塞者非此不開但枳殼性緩枳實性速各有所宜用五分至一錢五分

桃仁　破瘀活血瘍爲血阻非此不流瘍爲血滯非此不順去皮而用爲皮味薄而阻血路也用七分至一錢六分

秦艽　活血驅風消瘍毒筋骨疼痛壯熱不清者非此不解用三分至六分

川芎　上行頭目頭角骨痛者必需下通血海肝臟不華者當用用一分至三分止恐提瘍氣上騰也

桔梗　入肺經爲諸藥之舟楫其性上而復下故能引枳殼破膈中至高之氣用六分至八分

香附　行血中之氣恐其香燥須川便製欲其行血必要酒炒取其微血在乎醋炒用三分至八分

木香　行滯氣燥濕氣驅寒氣開鬱氣散結氣瘍後腹痛不解者此要藥也用一分至三分

檀香　瘍後心腹疼痛不休胸膈脹悶寒涎氣滯得此而行若瘍之始發當知忌用用一分至三分

砂仁　順氣開鬱散瘍消食此始終可用之要藥也用三分至一錢

穿山甲　土炒爲末透瘍消癰破瘍托毒善走經絡之神劑也但經終有諸藥所不到者非此不達用一分至三分止恐損

童便　解痧毒消痰降火最速定痛治血痢痢下血水諸藥莫及

天蚕　能治血分之痰在山甲透經絡以破瘀毒用須炒末白一分至二分

烏藥　善行周身之氣凡痧氣阻滯者得此無處不到用三分至五分

紅花金銀花茜草　活血解痧毒用六分至一錢

山查荷子麥芽神麯　痧為食壅取其善消而不

大黃　大便不通痧氣閉塞非此不能攻而下之用五分至一錢五分

木通車前澤瀉　痧氣鬱阻小便不利在所當求若熱鬱太重不因小水更在所禁用二分至五分

黃連黃芩　冷性凝滯恐用須酒炒或薑汁製

生地　凉血血瘀者非其

熟地白芍　補血致血瘀者忌用

參苨白朮　用之恐補毒氣痧所大禁

甘草　用之恐成痧塊難治在所忌用

白茯苓　恐其滲濕實其痧氣俱在禁例

細辛　透表破血散痧之要藥也用七分至一錢

薑黃　其性雖濕善能消痰下氣破惡血用二分至四分

貝母　川者專消熱痰土者兼破瘀血用一錢至

一錢五分

白芥子　脇下之痰非此不達用四分至六分

半夏白芷蒼朮　性燥忌用

竹瀝　性寒忌用用須薑汁方走經絡

雄黃牛黃膽星天竹黃　消痰九中宜用

麝香　開竅散痧功亦甚大

當歸　頭身尾各有所宜用須斟酌

柴胡　和解表裏專治少陽膽經寒熱往來用六分至一錢

乾葛　散陽明胃經之邪兼能解渴用六分至八

分

前胡　疏風消痰治嗽表熱者宜用四六分至八分
桑皮　治嗽清肺用四分至八分
枇杷　瀉肺嗽用三分至五分
杏仁　瀉肺潤腸胃利氣消痰誕去皮尖用用四分至一錢
參冬天冬　潤肺消痰一治其本一治其標去心用之用七分至一錢五分
山稜蓬术　食積心疼痧毒阻滯痞悶者宜用六分至八分
五靈脂　善消宿血血塊瘀滯不散非此不破用五分至八分
龜甲　去兩肋酥炙爲末破宿血勝於靈脂在胸者用上半截在下者用下半截
蘇木　敗惡血新瘀者黃及用五分至一錢五分
玄胡索　活血行氣氣血凝滯作痛用五分至一錢
荷蕾　通上竅下利水氣治暑氣之要藥用五分至一錢
紫朴　寬中治噫消痰下氣用六分至八分
牛膝　活血引痧氣下行用八分至二錢
木瓜五味子　陰敗忌用
升麻　禁用恐提痧氣上升而難遏也
肉桂附子吳茱萸　禁用恐助痧毒立刻有變也
乾薑　過服寒冷之水宜少用之善散寒氣也若用之不當亦能助熱毒當忌
麻黃　發表太過禁用
薄荷　辛凉利竅消腫解毒清氣清喉用五分至一錢
紫蘇　疏風順氣身熱當用三分至六分
明礬　解痧毒消痰定痛用之探吐宿食甚妙
玄參　清氣消痰滋陰潤肺但色黑止血痧有瘀血忌用
花粉　性沉寒止渴痧毒未清者忌用恐凝滯痧氣也
角刺　透毒能引諸藥至於痧毒血痧之所立奏

	其功
牛蒡子	解痧毒清喉中要藥用七分至一錢
乳香	消瘀血而不傷新血痧症用之以治血結
	用五分至一錢
黑砂糖	活瘀血解痧毒故瘀血作痛者得此則
	安
沒藥	痧痛用之破瘀血用四分至一錢
食鹽	解痧毒定痛用之吐去新食
芋艿	治痧熱解毒有痧患者食之甚美

晚蠶沙	解痧毒治熱
阿魏	破積聚逐惡血其功甚大
大麻仁	潤大腸腸胃燥結者宜用
	其中分數如遇西北強壯人當加一二三倍

痧方餘議

鬱金價貴時有以薑黃者其二味湍涼之性雖有不同然以之治痧下氣消瘀薑黃未爲無效若欲人心經散鬱消瘀則痧毒攻心者非鬱金不能

立毒其功薑黃有所不及故方中所載鬱金切勿以薑黃代之

穿山甲土炒用凡疰毒瘀血壅塞阻而不通得此透入經絡引諸藥所不能到者即到所犯經絡血分之所識者其留意焉

黑丑通上徹下痧毒脹滿必須用此於丸散中救人立功凡破氣之味俱莫能及但耗散真氣恐人有疑方有不宜故方中不載

大黃治食積阻痧毒余爲丸以備急用其功莫大若

痧脹之極必須急服此以攻之恐病有宜有不宜故方中雖載不及細加惟審病症緩急輕重而行之

五黃毒分兩凡三分稱合湯下

評牛蒡薤香止吐

凡治吐症用半夏藿香獨痧症作吐半夏性燥須防益助火邪斷不可用若藿香惟取其正氣以治穢觸然亦必痧毒無阻乃可俟冷飲之倘或痧氣有害於中膠用此以止吐反有閉門逐盜之憂如腸胃中有食積血瘀留滯痧毒用藿香燥止吐適長其毒是

宜知忌、下通瘍詳其吐自止

評荆芥細辛防風獨活
瘍症寒熱不由外感往往毒從臭竅而入搏激肌表
羌活麻黄俱在所禁若用荆芥細辛善能透竅蓋惡
毒之氣由竅而入故用之以治瘍脹亦由竅而泄若
防風乃臣使之味僅取爲透竅之佐不比麻黄羌活
專主發表反有升宣火毒之慮也至如獨活發散治
熱其性至顚而還力不能過發且可活血解瘍毒是
瘍症最要之味與

瘍脹玉衡書卷之下終

續敘

吾稽古今醫學備悉萬病獨不明瘍因而人鮮其傳
無奈世之患者比比也既有此病不可不求有以治
之余因以治之所驗悉其症之所由於甲寅歲著玉
衡一書偕同人互相參訂急而行之亦濟生之念所
不得已也書中凡敘瘍說似已具詳而年來瘍之變
幻更有隱伏於別病中者傷人最多非惟世所罕識
猶余前書之所未及因又有瘍刻之續凡以因時所
犯略採異驗爲集夫亦謀諸同人非敢以自矜也幸
天下不以多贅而忽諸

大清康熙十七年戊午歲季秋吉旦郭志邃右陶父
載識

瘍脹玉衡書後卷目次
瘍脹右施法
瘍脹痲疹不同辨
痘疹獨觸相同
諸痛類瘍辨
論脹
治瘍救人脈論
傷風瘍脉辨
瘍脹吉胎論
痲疹後復瘍脹
傷寒黃癍兼瘍
呃逆瘍
自汗盜汗驚惶瘍
咽喉諸症兼瘍
類瘋瘍
翻胃噎膈瘍
筋風瘍
放瘍辨
瘍脹治猶痲疹論
兼瘍傷寒不同辨
諸症不類瘍辨
凝塞聚結辨
瘍筋統說
眩暈瘍脉辨
痲疹兼瘍脹
瘍類陰症
盤腸瘍
瘍類三症
口舌兼症
黃氣病兼瘍
筋骨疼痛瘍
久瀉肉脫瘍
婦人隱疾瘍
耳痛瘍
腫毒夾瘍辨
地葡瘟瘍
急救逆症要法
麻木酸痒瘍
黃疸瘍
驚風痰熱瘍
羊毛瘟瘍
瘍脹類痲疹
痲疹夾瘍脹蛔結
瘍脹破逆論

鶴李郭忠遠右陶著

痧脹看症法

治病須憑脈若犯痧脹則脈不對症症不合脈或去痧筋爲據亦惟視舛焉且痧脹有爲食積阻滯者有爲血痰阻滯者或阻於上或阻於中或阻於下又或阻於左或阻於右或阻於兩脇苟非辨症的確求其中病也難矣故治痧脹一見脈之不合先看痧筋次審氣色三聽聲音四推犯病之由其間或有食積血痰阻於上中下左右各處之分須細辨其病原後用藥不誤也凡痧脹有一部獨異有六脈俱異即有異之中亦有陰陽虛實脈之神氣可辨要非一端可執尚其審諸

放痧辨

或曰子於痧也有先用藥而放刮者有先放刮而用藥者非放與刮治更無別法與曰放刮之法猶犯傷寒太陽經症必用羌活麻黃等藥少陽經症必用柴胡黃芩等藥症有所犯治有所宜凡氣分有痧宜用放刮血分有痧宜用放此不易之法至臟腑經絡有痧不拘不對症不合脈或去痧之候痧疹在他方有名厝子有名蚤疹在檣李則名痧子而痧脹亦名爲痧不可不辨痧疹因傷風肌表必虛虛則毒氣乘虛而泄故藥雖或涼仍可用熱飲若痧脹或因穢氣所觸或因暑氣所感或動時行不正之氣或乘伏寒伏熱過時而來總不起於外傷風熱故肌表必實實則熱毒之氣既脹於胸腹腸胃之中若更用熱飲則熱氣適助其腫脹無從而泄故犯此者有立時脹死此不可不辨也

痧脹治猶痲疹論

痲疹之發必欲盡透故治痲疹須要見於肌表者多多則毒氣俱泄然後腸胃不留餘毒治痧在肌表者用刮在血肉者用放亦猶治痲疹須盡透肌表之謂也

瘡瘍瘕癤相同

瘡瘍爲穢氣所觸即時作變瘂脹也痲疹爲穢氣所觸即時作瘂脹亦瘂脹也若暑氣時行不正之氣感爲瘂者詎無相類者與

治驗

一陳姓婢十四歲四月壯熱煩悶腹痛身重瘡瘂遍體脉微而細觸穢之症也閉腿灣瘂筋放七鍼手指放十餘鍼俱紫黑毒血煩悶稍鬆用寶花散阿魏丸清茶微冷飲之又付活血順氣之劑腹痛刮或放用藥治之

諸痛類瘂辨

瘂脹玉衡書　後卷　四

腹痛不一有食有氣有火有冷有虫有積俱似瘂非瘂不可無辨食者失饑傷飽聚中脘作痛其症遇食即疼胸膈飽悶似瘂者一然按脉氣口必然有力可辨若因冷食入胃食與寒氣相搏於中則心胛鬱結胸脇滿悶中脘作疼似瘂者二然按脉氣口必然無力但有嘈雜衝胸噯氣吞酸可辨氣者因怒氣所傷不得發越胸膈氣塞衝激心胛嘔逆惡心吐不能出其疼手不可按坐臥不定奔走叫呼似瘂者三然按脉兩關必然洪大餘部俱必應指及刮之無瘂瘂筋

不現可辨火者因熱作痛胃火上逆嘔吐酸水必煩口渴欲飲飲入即吐其症手足溫煖面帶陽色似痧者四然按脉六部洪數又與痧類難以細分必看痧筋兼用刮法可辨冷者久屬虛寒沉寒作痛其脉必然平軟似痧者五但飲熱則安飲冷痛發可辨虫者胃脘疼痛有如刀劃痛極按心搔爬難定兼之脉息無倫徐疾不一似痧者六然虫必有因各有所喜如茶虫喜食茶葉糖虫喜食糖物或泥或粘或酒或鹽其為虫也必有一好食之便安若遇楡椰五靈脂殺

虫等藥或藥性力薄不能驅逐而出勢必咬齧翻動腸胃更加疼痛可辨積者舊有宿積聚結腸胃忽因行動作痛作疼似痧者七然痧筋罕現刮痧無影可辨如是辨之的確方知痧痛詳明治之得法然此諸痛又有兼痧者將論脉閱筋而加察焉鮮有不得其理矣

諸症不類痧辨

凡心腹脹痛因痧既知之矣痧症仍有不痛不脹者或兼痧或暗痧誤飲温熱便致凶危等也余竊謂凡

論脹

脹者氣之閉也氣為毒壅故作腫作脹所以治痧先

當治氣如食阻其氣於上則吐之食壅其氣於中則

消之食化而結其氣於下則導之凡諸積之阻滯凝

然凡下竅閉者多上吐或吐蛔或吐血當導氣於下

中竅閉則下瀉或瀉水或瀉蛔當行氣於中上竅閉

而復升則作悶或頭疼或上腫俱當用清涼引下之至如氣為毒壅必傷血分若乃血為毒壅破血為先血為毒聚且結敗血為要故治痧必兼治血蓋血活毒氣行血破毒氣走血敗毒氣散如是毒氣不留治斯效也

凝壅聚結辨

凝壅聚結皆血分痧毒惡症其間有輕重之別凝者初犯之症壅者凝多而壅聚者血滯一處故痧毒中血分結為重聚次之壅又次之

變爲輕疑以紅花澤蘭爲主甚以延胡索桃仁爲主聚以蘇木茜草爲主結以五靈脂降香爲主輕者用藥不可重重則恐傷本原重者用藥不可輕輕則治之不效

治驗

一尹鈞萬咳嗽痰喘有以緊勞治之病日增背鞠如弓手足踡緊不能展動嗽則胸腹百骸弔痛延余診之脉洪大無倫此毒血壅聚也兼又難刮難放先以圓紅散微冷飲之兩手稍鬆漸爲放刮訖又以圓紅散加三七鬱金末微温飲之更以蘇木茜草爲主多加順氣活血之類如前飲之計日放痧一次者四日用藥一服者五遂痊

一萬君安內室兩脇如痞拔之則痛心胃間高起服藥難療延余左脉微細右脉洪大此慢痧痧毒結聚也計放痧三次付以五靈脂降香爲主加桃仁延胡索及消食行氣之類日用一服計十二劑如舊

一陳弘業寒熱嘔吐苦難俛仰腹中脹痛夜不能

寐六脉弦細而緊數刮放畧鬆用紅花澤蘭劉寄奴茜草桑寄生併行氣消食之藥微温飲之二劑而愈

治痧救人脉論

或謂余曰古書所載屋漏雀啄諸怪脉現者痧脉代者痧脉二三部無脉爲得有生理乎及覽玉衡痧脉止有六部無脉者痧即諸怪脉必口放痧服藥不應者痧與古書所載不同何歟曰古人論此等脉爲痧脉者其常也余論此等脉爲痧脉者余惟見此疾實憐之冀萬有一可救者因痧尚當救之者因乎痧之變也凡痧脹之脉都有類諸痧脉之變不執常脉而輕棄之也

治驗

一陳見雅內室懷娠發熱赤痢腹痛不止服他藥不效余診之脉四動一止代脉也閤有痧腑放二十餘缺用寶花散微冷服之付以桑寄生益母草連翹蘇梗紅花金銀花山查荊子當歸枳殼青皮

一張舜瞻創室腹痛嘔吐延余脉如彈石知其患疝痛極脉亦變也令其婦放疝三十餘鍼用寶花散救甘井砂仁湯稍冷飲之什以獨活紅花湯加山查神麯萵子青皮微冷飲二劑而愈

一傅純宇發熱昏沉脉如解索先用陰陽水鴈芳汁飲之放指臂疝三十餘鍼稍覺清爽用細辛大黃丸清茶稍冷飲之什以荊芥銀花湯加青皮微温服二劑而痊

一鄔雲公頭面紅腫目閉喉痛六脉無根知其疝氣阻塞脉路也刺腿足疝四十餘鍼流紫黑血甚多又刺手臂疝二十餘鍼未愈用清凉至寶飲減細辛加山豆根射干牛膝石斛桑皮枳殼稍冷飲三劑而痊

一金子近次子祖翼九月間適因勞動飲食不時忽壯熱頭痛自以紫蘇湯薰頭而大汗胸中脹悶他醫用藥下之反口吐白沫時有譫以爲疝乃更延醫診視見舌胎灰色以傷寒藥治之子延恐犯疝氣先以半小鍾試服少頃即譫語片時而止熱仍不解愈覺沉重脉有八至遂連易三醫皆云傷寒三次服藥皆昏沉譫語如前第五日眼如火赤唇若塗硃鼻如煙煤舌胎黑燥枯乾而短聲音不清足冷至腹陰囊卵縮肉脫神昏醫者皆辭不治已備後事至七日乃始放疝因病勢危篤止放二鍼唇眼舌聲諸症頓愈陰囊二卵漸舒脉覺平復始現腹痛乃知口渴固惑人言疝症不可服藥止飲童便服紫金錠而痛止後又隨痛隨服繼進飲食大便乾結至十八日用蜜導法遂變下痢日夜五六十次凡六日始服疝症藥一劑即安睡痢乃止後延他醫調理補之不數日睡時即發遍身水晶瘡癟覺時即隱醫家莫解其故予近因刮穿頸額間瘡瘤流出皆汗也即盜汗不止他醫咸謂久病虛脫大用補劑斂汗不惟無益更加自汗且完穀不化小便短赤頻數變爲砂淋醫又昔束手謝事爰復放疝用八正散二劑服之疝氣始轉身即壯熱約有二更時身涼汗止惟口食生茨菇五六日砂淋亦止而全愈祖翼之病變幻莫測久總因

止放二鍼不服痧症藥以除根之故也究以治痧而得全脉而八至必症雖多其可棄耶

一金子近長子權可八月間發斑遍身如痲疹狀延他醫視之則曰癍疹復延幼科診之亦云痧疹服藥十日不退脉僅二至醫家因疑其少年嗇喪故爾虛脫欲用補劑子近恐亦痧氣不敢服命權可起而視之則遍身痧點皆活動流注兩腿皮肉紅紫因放腿灣痧一鍼而皮肉白又放腿灣痧數鍼而皮肉白惟小腿紅紫未退臥卽復流動遍散於身仍作稀稀癍點緣脉尤二至用川烏草烏為一小丸服之脉復如常大汗出而全愈

痧筋統說

或曰前書放痧有十今放痧者奚不止於此余曰遍身青筋古有載矣謂放痧有十者不過就痧毒先達臟腑者明之爾至腿灣痧筋尤人易曉余詳之為初學者便推而廣之寧有賸乎

傷風痧脉辨

或曰前子傷寒辨痧詳矣若犯痧似傷風何如余曰肺主皮毛心主血肝主筋傷風犯肺三部脉見浮緊多且風陽也風傷衛在表故脉浮緩故脉緩有犯此症脉不浮緩反見沉緊或洪大痧脹一驗也若傷風帶寒鼻塞畏冷脉當浮而微緊脉反沉伏或芤長痧脹二驗也若傷風有汗表虛也脉當浮而微數脉反沉緊或芤或伏痧脹三驗也若傷風有痰氣急發喘脉當浮滑反微濇沉伏痧脹四驗也以此推之足矣

治驗

一駱叔源傷風發熱咳嗽痰喘已半月矣左脉沉伏右脉濇而微數此慢痧為患也左腿灣放二鍼紫黑血流至足又刮痧不愈付寶花散加明礬末稍冷湯飲之用荊芥湯減川芎加蘇子紅花蒲黃土貝母烏藥微冷飲之而愈

一高允謨傷風鼻塞肩背拘急頭項疼痛有以足太陽膀胱經藥治之頭項益痛叫喊不已甚至肩背沉重時覺昏迷延余治之左寸微伏右關尤大先服圓紅散稍醒刺腿灣六鍼不愈用寶花散清

茶徹冷飲之肩背稍轉頭痛少安詢所服者腹中覺冷即用防風散瘧湯減枳殼加羌活川芎紫蘇烏藥温飲寒散而安一凌公遠內室傷風喉啞胸腹飽悶兩關俱乳余曰乳者瘀血未有上下俱瘀其瘧乎其家人刮之紫瘧甚多飽悶即解付獨活紅花湯加射干前胡薄荷石斛連翹玄參二劑徹冷飲之傷風喉啞俱痊

眩暈瘧脉辨

暈有血暈氣暈痰暈火暈濕暈暑暈有血虛發暈有氣虛發暈有風中而暈有寒中而暈有勞力而暈有加之以瘧暈古人無治古書無論何以知之大都血暈脉芤氣暈脉沉痰暈脉滑火暈脉數濕暈脉濡暑暈脉虛血虛發暈脉濇氣虛發暈脉微風中而暈脉浮緩寒中而暈脉弦緊勞力而暈脉右尺浮洪此暈脉之大略也若病似血暈反短似氣暈脉反浮似痰暈脉反濇似火暈脉反濇似濕暈脉反細似暑暈脉反實似血虛發暈脉反滑似氣虛發暈脉反大似風中而暈脉反細實是皆脉症不合余歷驗之而信其爲瘧此瘧暈之治不誣也

治驗

一陳蕭遠嘗苦發暈醒則日夜頭眩余往候之脉右虛左實徐疾不常余曰此非放瘧不可於腿灣上下放十餘鍼紫黑血流如注指上亦放二十餘鍼用寶花散沉香向魏丸清茶稍冷飲之付防風勝金湯加桃仁紅花稍冷飲之後遂不復患眩暈

一姜渭濱內室正月間驟然發暈一日三次舉家惶恐余見其脉沉而微緊令其婢爲指上放瘧三十餘鍼用故苦丹加沉香末清茶稍冷飲之付荆芥銀花湯加葛子枳殼一劑而痊

一梅君玉子三月間吐蛔發暈昏沉不醒六脉俱伏左右虎口脉青色放指頭瘧一十八鍼用細辛大黃丸清茶調黑糖稍冷飲之漸甦付清黃飲減姜黃加陳皮烏藥紅花微冷飲之乃愈

一霍庭賢內室四月間壯熱面赤口渴唇焦有以

陽明胃經症藥治之遂發帶終日不醒余診之脈兩寸弦細兩關沉微兩尺左大右緊曰脈症不合者要看瘧毒一退即治舌胎可也

治驗

一翁在慈發熱口渴舌有黑胎臥難轉動氣急痰喘六脈洪實放瘧三十餘鍼未愈用圓紅散砂仁湯微温飲之又付必勝湯大便下黑糞惟口渴黑胎未愈加石膏黃連二劑乃瘳

一曹華宇長子十一月間犯傷寒兼瘧舌卷耳聾心苗故見胎治宜石膏黃連大黃黃芩黃栢之類若不先治瘧恐此等藥又寒凝血分反成大患故治此

一盛思虞六月間飲酒頭汗發暴脈寸關洪大無倫兩尺脈伏閉瘧筋放十餘鍼皆紫黑毒血付陳皮厚朴湯加乾葛山查蒼子微冷飲之而醒又用藿香湯加黃連黃芩乃安

瘧脹舌胎論

或謂全書載瘧論治俱備舌胎僅存其名豈瘧脹舌胎無可治乎余曰非也蓋謂瘧脹有別症之舌胎則可謂舌胎即瘧脹之症是不識瘧脹之適當其然併不識舌胎之所以然也誠以舌胎乃足陽明胃腑熱病故治瘧脹先理其瘧後治舌胎即安者先理舌胎後治瘧脹則危蓋舌胎乃胃腑熱極氣衝心胸舌爲心苗故見胎治宜石膏黃連大黃黃芩黃栢之類若不先治瘧恐此等藥又寒凝血分反成大患故治此者要看瘧毒一退即治舌胎可也

治驗

一翁在慈發熱口渴舌有黑胎臥難轉動氣急痰喘六脈洪實放瘧三十餘鍼未愈用圓紅散砂仁湯微温飲之又付必勝湯大便下黑糞惟口渴黑胎未愈加石膏黃連二劑乃瘳

一曹華宇長子十一月間犯傷寒兼瘧舌卷耳聾舌上黑胎芒刺大渴昏沉發熱身重不能轉側胸中悶悶瀉痢清水先以圓紅散加鬱金末清茶稍飲之舌卷耳聾漸愈瀉水即止大渴稍解但舌胎不退胸中悶悶前貝腹中脈冷瘧氣已絕用和解宣化飲滅前胡大腹皮加桃仁紅花和實青皮石膏黃連大黃微温飲之食結悶悶俱消黑胎芒刺皆退惟大便不通用黃芩錢半酌一錢温飲之

大便通而愈

一張旋庵內室傷食飽悶按之則痛日晡發熱舌心焦黃芒刺延余脈微無力余曰瘄也放腿灣瘄三鍼流紫黑毒血用紫朴湯加柴胡乾葛微冷飲之後加石膏黃連大黃黃栢溫飲四劑大便下宿糞而愈

一龔雲濤發熱嘔噦舌有黑胎芒刺起二大泡踡卧聲重逃悶幾疚脉左弦緊右微細放腿上瘄二十餘鍼用三黃石膏湯微溫飲之稍愈驟進飲食逃悶復發用消食順氣之劑通而安

瘄脹兼痧脹

痲疹兼瘄脹

痲疹方惟是升發清凉解利茲竟有若此不治者因不知痲疹中有瘄也蓋痲疹乘虛而發若穢氣暑氣時行不正之氣亦可乘病而感有犯瘄者但先治瘄脹痲疹自發自散蓋痲疹兼瘄脹瘄脹爲難痲疹反隱而難現不可不辨也

治驗

一金權可二月間犯時行痲疹心胸煩悶延余治之脉症不合放瘄後用寶花散併活血順氣消食之劑俱調黑糖侯稍冷飲之復刮瘄訖如前服二劑乃安

一潘質黃子犯痲疹脉微放腿灣瘄二鍼血流紫色又放指上瘄三十餘鍼付圓紅散併清凉至寶飲合紅花湯俱微冷飲之即愈

一余弟驤武子八歲正月間犯痲疹胸腹脹悶煩躁熱渴咳嗽氣急面赤身熱脉不洪大反見細數放腿灣瘄二鍼付圓紅散沉香丸用荆芥薄荷湯合枳實大黃湯俱微冷飲之痲疹即發透隨散而愈　其時一僕婦亦咳嗽煩悶同犯痲疹如上治而痊

一王日斯女壯熱咳嗽痲疹初現氣急面赤脉症不合放指上瘄二十餘鍼付圓紅散加沉香末調黑糖湯稍冷飲之用清氣化痰飲合蒲黃飲均微冷飲之即發透隨散而愈

瘄脹兼痲疹

傷風咳嗽煩悶爲痧疹之候然亦有痧疹未發或鬲
穢氣或感暑氣或吸時行不正之氣當即痧脹或心
痛腹痛或脹悶喘急或徧身疼痛或發昏沉一似
痧疹不發內攻心腹痛及週身使止認爲痧疹之候
升發之勢必危殆不知傷風咳嗽煩悶雖有痧疹發
於日後其痧脹內攻即痧疹有現形者固之反隱更
助痧脹爲禍況痧疹未形痧脹沉重可不先救痧脹
乎

治驗

一陸迺安內人發熱咳嗽胸腹疼痛叫喊非常脈
症不合令其僕婦放腿灣痧未愈先以寶花散阿
魏丸清茶稍冷飲之付必勝湯滅大黃加枳實連
翹殼子二劑微冷飲之疼痛稍已次日如前劑減
五靈脂加荆芥黃芩微温飲之疼痛乃止痧疹即
發再劑而痊

一沈端肱女咳嗽發熱脹悶不已六脉弦緊或時
歇指放指頭痧二十餘鍼未愈用寶花散加沉香
末稍冷飲之付即勝余湯加紅花荆芥治之痧

疹隨發用荆芥湯滅川芎加黃芩玄參金銀花微
温飲二劑而瘳

一陳弘甫傷風發熱咳嗽煩悶脉左沉右洪放乳
上痧二鍼用紫朴湯冷飲痧疹漸現次日爲穢氣
所觸復隱隱不發刮兩臂肩背痧用荆芥湯滅川
芎加黃芩銀花紅花沙參烏藥微冷飲之痧疹即
發再劑而愈

一高子良弟四歲正月間傷風咳嗽煩悶有以痧
疹治之不發反吐血發暈昏沉延余脉症不合放

舌下痧二鍼付紫朴湯加黃芩微冷飲之痧疹始
現次日稍飲温茶半鍾痧疹復隱余曰痧脹餘毒
復發內攻故痧疹隨之而隱又刮痧畢服必勝湯
減大黃五靈脂貝母加黃芩微冷飲之痧疹即透後惟
清凉解毒而痊

痧脹類痧疹

或謂余曰痧脹之發即痧疹也子於痧脹特多放痧
之法爾不知所放之痧即放痧疹之脹氣也安得云
痧非痧脹之標痧脹非痧疹之本與余曰我見痧

疹似傷風咳嗽而發者有未開有感穢氣發痲疹感熱天暑氣發痲疹者皆非痲疹自有痲疹痧脹自有痧脹病乎況痧脹既云即痲疹何以有痲疹因穢氣暑氣所乘兼痧脹而發痲疹即隱而不發必俟放刮後痲疹始發乎乃知痲疹不與痧脹同故刮者放者名痧脹雖有刮出之痧不可即認爲痲疹其痧脹亦不與痲疹同必因傷風所發始爲痲疹實不同也乃茲有痧脹不因傷風發熱咳嗽所起當見刮放用藥後發出遍身形影如痲疹者雖形似痲疹實非痲疹故名之爲類痲疹痧焉或曰詎有非痲疹而形可同於痲疹者曰此亦猶疹毒發爲腫毒發爲紫疱之類耳何疑乎

治驗

一聞德音內人腹中疼痛右脈微而弦左脈細而濇令其婢放膕灣痧三錻血流紫黑色未愈用寶花散救苦丹清茶稍冷飲之付以和脾宣化飲加茜草桃仁微冷飲之發出一身類痲疹者余用防風散痧湯減細辛加連翹紅花金銀花桃仁治之而痊。

一施均李孫女發熱咳嗽腹脹脣沉微有痲疹形影大便瀉黃水有用升發之藥不效延余治之脈上盛而下虛乃知發熱咳嗽雖本傷風實非因傷風而有痲疹形影也放指頭痧二十餘錻用圓紅散調黑糖微冷湯飲之稍覺清爽用獨活紅花湯加山查蔔子澤蘭治之連送二劑大便下盡黑物而愈。

一章連漪三子發熱昏沉腰脇間微有形影與痲疹相似有用升發之劑惟恐不透次日迎余六脈歇指余曰痲疹之病何遽爾歇指耶雖昏沉氣喘咳無痰聲脈不合症斯痧脹之類痲疹者與放頭頂痧兼放左太陽及乳上痧三錻未愈用荊芥湯加山稜蓬术白蒺藜微冷飲之發一身類痲疹者遂安。

一薛思高發熱逃悶氣不得舒胸腹頭面有痲疹形余診之兩關俱芤此痧脹之類痲疹也放痧十餘錻又刮痧訖用沉香鬱金散清茶稍冷飲之面

痊

一張省原子胸腹飽悶昏沉不醒痘筋不現但微有痲疹形脉左寸關沉細如無右寸亦伏余思痲疹脉不若是令其家人用蜜心蘸菜油點火焠之即醒但飽悶未解用寶花散加沉香蒲黃清茶微冷飲之付參凱和解飲減山藥人參甘草加桃仁紅花治之而痊

痲疹後復痘脹

問痘脹有愈而屢屢復發者何若痲疹有愈而屢屢復發者乎曰無有然則謂痲疹後復痘脹謬矣使有犯痲疹復痘脹乃即以治痲疹法治之誤莫大焉故曰痲疹後復痘脹不可不知

治驗

一王日斯幼女正月間痲疹後瀉痢白色治之稍安驟然腹痛脉短而微余曰此穢氣新觸作痛非痲疹之故故指上痘二十餘錢未愈用牧苦丹清茶稍冷服之付藿香湯加葡子紅花烏藥木通微冷飲之即痊

一陶元升痲疹後忽壯熱面赤痰喘不已兩額太陽抽痛異常脉不洪滑反滿細痘氣阻塞脉路也痰喘不已痘氣上壅也兩三陽也其面赤發熱者毒盛極而攻表也均不因痲疹而然啓腿灣痘筋放六錢毒血墨黑未愈用清凉至寶飲減細辛加黃芩乾葛紅花牛膝木通微冷飲二劑漸安但腹中飽悶按之則痛用丁沉阿魏九微温飲之又付必勝湯温飲四劑下盡黑惡毒物而愈

一癸酌甫子二月間痲疹後遍身疼痛不能轉側有以痲疹餘毒治之反加疼痛不能轉側者痘脹毒攻珠時一促疾盛遍身疼痛不能轉側者痘脹毒攻血分也脉累累如貫珠疾促者痘脹於中筋脉縮急而然也反加沉重者誤飲温熱痘毒內攻勢盛也放腿灣痘四錢及臂指痘二十餘錢咸流紫黑血未愈用桃仁紅花湯加牛膝山查枳殼磨降香

痲疹夾痘脹蜘結

痧脹玉衡書　後卷

痧脹玉衡書　後卷

痧脹玉衡書　後卷

芒刺腹脹迷悶舌短聲重氣急發喘余見脉左寸關微伏餘脉弦緊曰痧毒阻於筋脉脉氣不宣故微伏而弦緊兼之胃腑熱極痧毒乘之一飲熱湯熱物痧毒橫行攻擊臟腑故見此等惡症先放頭頂痧一鍼次放指頭痧二十餘鍼及乳上痧二鍼迷悶即蘇付以烏藥順氣湯加石膏黃連大黃桃仁二劑微冷服之頭汗舌胎始退餘症漸解復放指上痧付枳實大黃湯減槐花加紅花芒硝二劑溫服乃瘳

一孫彥衢內室壯熱發黃頭汗如雨大渴唇焦左脉弦緊右脉沉微放手臂腿灣上下痧四十餘鍼流出紫黑毒血未愈付細辛大黃丸沉香鬱金散微冷湯下用桃仁紅花湯加牛膝石斛二劑微溫飲之乃瘥

一梁鍾素傷寒六日壯熱發癍大渴昏沉余見脉洪大無倫兩太陽青筋刺痧三鍼放腿灣痧五鍼出毒血未愈用荊芥紅花湯合清涼至寶飲加石膏黃連黃芩兼活血順氣再劑而愈

一湯茂珍次女八月傷寒日晡壯熱日渴發痧頭痛如破聲重耳聾吐烟二條迷悶幾次兩寸脉微無力兩關弦細兩尺左滑右緊放腿灣痧三鍼略鼓用清涼至寶飲加黃芩牛膝石膏桃仁澤蘭烏藥枳殼微冷飲之不應復放痧用熟大黃三錢細茶一撮煎服而瘥

痧類陰症

痧症類傷寒不獨類傷寒傳經熱症更有不似陽而似陰者幾令人反疑為直中三陰真寒症痧毒入深也稍用熱藥熱飲便不可救療

治驗

一章晉卿發熱沉重口渴兩顴紅赤唇燥舌胎兩手震動舉家驚惶脉沉微無力時有用乾薑肉桂治之有用附子治之此則認脉為陰而作傷寒三陰真寒症治之也服之危篤延余四子端午診之知其脉症不合看腿灣痧筋次日鍼流紫黑毒血付石膏黃連黃芩兼活血順氣冷飲之一劑而愈再劑而安

一楸葢音發熱嘔吐泄瀉手足陰縮伯固急頭汗如雨有指爲虛極而然用大劑人參補之反加昏悶余按其脉沉細無力視其面有戴陽之色迫詢所飲見熱而拒過冷則喜余思此必內有瘧症熱毒故脉症若斯扶看腿灣瘧筋二條放之流紫黑毒血如注用桃仁紅花湯加角刺牛膝微温服四劑用清凉至寶飲加黃芩温飲二劑而痊

一何心視身不發熱咳嗽吐瀉蹉卧沉重手足俱冷昏迷不醒喉中痰聲不絶醫者四人咸云床褥不潔內中陰寒用人參黃芪附子乾薑等藥服之病日增余按脉徐疾不常時有歇指探其氣口熱如爐看其舌有黃黑胎芒刺余曰此非直中陰經眞寒症也其族兄爭之不已余曰焉有陰症而舌胎芒刺口熱如爐者乎況服參芪薑附已有明徵若必欲以陰治請辭其家人固求余先用陰陽水二碗飲之遂覺稍醒其弟二人竭力扶起放腿灣瘧六鍼付以射干兜苓湯去甘菊加烏藥玄明粉梹榔葛子二劑稍冷飲之後減玄明粉加童便六

服而痊

呃逆痧

呃逆俗名冷呃有寒有熱有虛有實有因痰火而發有因氣阻而生有因食阻而得有因血鬱面成有因病重發喘爲呃謂之喘呃若一槩認呃爲冷以丁香柿蒂主之謬矣故老弱氣虛犯呃非參不補若虛極陰寒犯呃非薑桂附子不温即此冷呃治之亦異而況痧脹爲呃有痰火血鬱之分有食阻氣阻之異有病重喘呃之凶苟非細辨受病之原用藥稍或不妥非惟不效勢必呃劇是用明痧呃之害焉

治驗

一徐望舒傷寒變瘧呃逆三日夜兩寸脉微餘脉緊滑余曰呃逆脉異病後兼痧也聞腿灣上下痧筋放四鍼紫黑血流不愈用細辛大黃九清茶稍冷服之付清凉至實飲微冷下而痊

一王彦甫內室產後月餘發熱呃逆腹脹沉重其長子謂余曰老母產後傷寒六日沉重異常忽發冷呃將若何余診之六脉弦細而疾口渴畏熱飲

痙症顯然放膏痙三鍼血流如注又放指上痙三十餘鍼用蘇木散併付桃仁紅花湯加山查蔴子二劑俱微温飲之乃愈

一孫靖公六月心煩吧逆兩寸關俱細澁而數且喜冷飲余曰痙脉已現痙症昭然刮痧放痙不愈用清涼至寶飲減細辛加香薷黄連童便食鹽微冷服遂愈

盤腸痙

痙毒肆行盤轉腸胃雖不痛不疼苦楚萬狀命在須臾此緊痙之症也

治驗

一張方曦内人十二月間胸腹中氣不舒暢惟是盤旋絞絞於胸腹腸胃中叫喊幾欲將及半日晚延余診其脉洪大無倫令其僕婦放指頭痙三十餘鍼用救苦丹沉香九清茶稍冷飲之未愈付防風勝金湯加桃仁紅花治之而疼

一汪慶公弟三月飯後驟然叫喊腹中絞痛遄悶無極六脉俱伏放腿

泉米愈用鹽湯令飲二大碗吐去新食付清氣化痰飲稍冷服亦愈

一盛玉銑炎日方晡胸腹遄悶苦不可言自謂疚期在即舉家驚惶余右三部脉伏左三部脉洪大無倫放指頭痙十餘鍼未愈用楚湯冷飲二碗吐去新食付蒲青飲減薑黄加葡子微冷服而疼

自汗盜汗驚惶痙

自汗陽虧盜汗陰弱聞聲而驚震遇響而惶懼者虛極之候若因痙有是症者固表固本在所大忌務宜辨之

治驗

一陳肅遠内人本質素虛凡遇病非人參不效四月間心胸煩悶汗流不絶聞聲驚恐初病延余脉未顯難辨余聞素虛雖不敢用參付平劑不應延他醫付藥加參神之疾益甚復拉余按脉不見沉微反見浮洪緊大急曰痙也三子叔揚爲母放痙畢余用寶花散

遠患虛實未明。脈證參互。不可一概而施。
冬沙參丹皮四苓麥冬
一潛中黃心胸煩悶
筋放之仰發毒不愈越六日延余按其脈不與症
合余曰瘍毒放故無大害其發熱者適遇瘍氣
衝心是以得生非放瘍之害也復爲放指上瘍三
十餘缺未愈用寶花散微冷飲之用甜酒調紅花湯
加荷子調黑糖治之而瘥
一祝公庵次子發熱頭疼已先將腿瘍
一石敬村女白渴盜汗腹脹如股有治之不應余
按脈弦細無力放指頭瘍二十餘缺用蘇木散合
寶花散沙仁湯微溫飲之付蒲黃飲加丹刺荷子
溫飲四劑又用清涼至寶飲二劑而瘥

瘍類三瘧

瘧有一日一發有間日一發有三日一發邪氣所凑
感受各有淺深若三日一發者所感稍深但瘍毒乘
之陰受其禍即有不測焉能識之邊於仝書所記外
見有瘍類三瘧者故續編之以彰其害焉

治驗

一陸淑韓祖年近七旬八月患瘧間二日一發寒
熱甚重心胸煩悶將及半月診之左脈微濇余曰
不意斯疾亦有瘍焉刺腿灣瘍三缺流血紫黑用
寶花散沉香丸滴茶微冷飲之付防風散瘍湯加
連翹柴胡橘紅膽星微冷服二劑六日乃瘥
一懷惟貞患三瘧半年忽頭悶沉重坐臥不安六
脈俱伏余曰此三瘧兼瘍者也刺腿灣瘍二缺流
紫黑毒血用寶花散滴茶微冷飲之遂愈後不服
藥漸瘥

咽喉諸症兼瘍

咽喉諸疾亦有兼瘍之症與若云咽喉從古無兼瘍
論試思古人治咽喉十八症有刺少商穴法此何異
乎大少商穴屬太陰肺經在手指爪甲內側刺之出

血以洩其毒治惟一經所傷或上或下隨經刺放以拔瘂毒乃及莫救於咽喉乎余竊謂咽喉兼瘂看筋能先治瘂令瘂毒內發病必難愈若按脈敷可也

治驗

一余長孫犯喉痺脈虛而微數閉腿灣瘂筋放三針流紫黑毒血吹冰硼散用清涼至寶飲減細辛加射干連翹枳殼牛膝貝母微温飲之而愈

一陸思湖犯喉癬危急醫治不應余診之脈弦而緊右寸脈伏閥有瘂筋刺十餘鍼紫黑毒血流如涌泉吹冰硼散用清涼至寶飲減細辛加山豆根連翹薄荷飲之而疼痛脈兩寸俱伏余曰症與一繆瑞吾子犯喉痺脈異殆必有瘂若止治喉痺恐難即愈不信餘之他醫調治痛益甚復延余放指頭瘂三十餘鍼曰今三日面紫一畨敏躬甚、

一潘象黃隣人犯喉腫大看有瘂筋云此宜刺放以拔瘂毒乃反莫救於咽喉乎余竊謂咽喉兼瘂看筋能先治瘂令瘂毒內發病必難愈若按脈一去然後內服藥餌外用吹

一翁珍頑舌下起重舌者難盡述有以少陰君火或緩即使口舌症凶瘂脹較之尤急斷不可先口舌而後瘂脹也、

治驗

口舌兼瘂

口舌有疾、適因感觸犯瘂、瘂症雖發在後、治之不容

治之不應余按其脈左寸沉微右關無力若據脈宜補據症宜瀉取瘂筋驗之放腿灣亦十餘鍼皆紫黑毒血未余立方余曰向所服者俱清涼之味宜小加川連所吹者更引涎之物宜多加冰片即可奏效於瘂疾也但脈藥不當温飲客乾微温足矣三日而愈

益甚甚至寶飲減細辛加

脈微緩左脈沉伏

牛膝烏藥枳殼青皮利冷飲之用冰硼散加膽礬兒茶吹之乃痊

類瘋瘧

瘋有真瘋有類瘋不可不辨其實緊將花蛇等藥攻之誤矣余見瘧脹多變更有類乎瘋者故正其名曰類瘋瘧

治驗

一范嗣瞻咳嗽氣急兩顴唇口鮮紅有以不足症藥治之不應余以瘧療之而痊迨半年後面顏上

忽變出圓片紅色高起外科視之認作大瘋治余按脉微而緩曰瘧也問瘧筋放腿灣下三鍼紫黑色毒血成流又放指頭瘧二十餘鍼用沉香鬱金散清茶冷飲之付加聖散加紅花青皮調黑糖湯微冷飲之而愈

黃氣病兼瘧

腸胃內熱積滯氣阻成黃氣病往往有兼瘧者非先治瘧則黃氣病終不能治也

治驗

一襄武弟婦犯黃氣病面色萎黃腹脹如臌腿足俱腫六脉微澀令僕婦為之放瘧三十餘鍼俱紫黑色毒血用沉香鬱金散清涼至寶飲加青皮烏藥檳榔山查萸子牛膝俱稍冷服腹脹始鬆後惟用黃氣病本藥微冷飲四劑而痊

一酬香年犯黃氣病熱渴唇烈面黃腹脹手足俱腫食即作瀉及按其脉徐疾不常緣視腿灣上下瘧筋刺十餘鍼毒血成流用阿魏丸砂仁湯微冷飲之脹氣遂減余即以治黃氣病本藥治之六劑而痊

一襄武弟婦犯黃氣病面色萎黃腹脹如臌腿足俱腫六脉微澀令僕婦為之放瘧三十餘鍼俱紫黑色毒血用沉香鬱金散清涼至寶飲加青皮烏藥檳榔山查萸子牛膝俱稍冷服腹脹始鬆後惟用黃氣病本藥微冷飲四劑而痊

一酬香年犯黃氣病熱渴唇烈面黃腹脹手足俱腫食即作瀉及按其脉徐疾不常緣視腿灣上下瘧筋刺十餘鍼毒血成流用阿魏丸砂仁湯微冷飲之脹氣遂減余即以治黃氣病本藥治之六劑而痊

一董臨橋腹脹如臌兩足微腫欲食不食面色乾黃諸藥不應求余治之脉不洪數反沉遲刺指臂三十餘鍼胸腹爽即用治黃氣病藥稍冷飲四劑而愈

翻胃噎膈痰

病有翻胃兼瘧有瘧變翻胃有噎膈兼瘧有瘧變噎膈其瘧似慢日漸凶暴宜細辨之

治驗

一包世球年六旬餘患翻胃症食即心痛嘔吐不止余按其脉六部洪緊有力乃閱痧筋放手臂腿上刺二十餘鍼付以烏藥順氣湯及降香桃花散俱微溫服四日而痊

一蔡愛山胸中飽悶欲食不食食即胃脘不寧苦楚萬狀余診之右三部脉微濇放腿彎二十餘鍼略鬆日服蘇木散微溫酒下二錢六日而愈

筋骨疼痛痧

筋骨疼痛多延蔓終身治此者或風或濕或氣阻血

疑或流痰流火如此而已然有效有不效或爲痧暗相纏令人莫識此痧甚慢不可不知也

治驗

一董季連筋骨疼痛臥床二年諸藥不應余診之右脉微弦左脉沉細閱痧筋放之血流紫黑用圓紅散微溫湯飲之付蒲黃飲加五靈脂角刺溫服六劑而痊

一郝文存筋骨疼痛步履艱難吐痰氣急左脉微弦右脉緊放腿灣痧紫黑毒血三鍼用必勝湯加角刺微溫服乃痊

一世俗傳鬼箭之說有鍼挑火燁油髮艾桃楷諸法不敢服藥疑眞有鬼祟非也識者辨之謂鬼箭是風神箭是寒疰床箭是濕痛而轉動者氣與痰也痛而難轉動者血也各有方治然中亦有雜痧者先治痧毒後除餘症治箭亦須知也

治驗

一曹叔恒偏身走注疼痛不能展動或曰此鬼箭

也以油髮艾葉楷之以燈心蘸菜油點火燁之不應適見余自述其病詮之脉左虛右實放痧三鍼紫黑血流用桃仁紅花湯加穿山甲天虫香附微溫服漸痊

一鍾洪武內室腰背疼痛臥床不起有以爲鬼箭之病從痛處挑筋十餘鍼不愈延余脉徐疾不常曰痧也令其婢刮而且放刺腿灣痧二十餘鍼流紫黑毒血用紅花湯加穿山甲澤蘭劉寄奴四劑

久瀉肉瘦瘍

瀉久則肉瘦或健脾或燥濕或消積或參水或補命門火或平肝木氣治瀉之藥不遍如是若慢瘍之變久瀉肉瘦病原不同但宜治瘍則瀉自止矣

治驗

一姚公堅潘郎久瀉不已不思米食日漸羸瘦大肉漸脫脈反有力放瘍二十餘鍼紫黑毒血成流付寶花散阿魏丸俱稍冷飲之即愈

一莫電雲久瀉不已骨瘦如柴唇紅口渴粥食不進胸中飽悶脈反微伏放腿灣瘍四鍼毒血紫黑流出如花用沉香丸清茶稍冷飲之付萩朮湯加銀花澤蘭治之而愈

一巢茂公次子久瀉肉削咳嗽不已夜臥盜汗白微紅余診之脈寸伏關弦放腿灣上下瘍三鍼復刮瘍畢付清涼至寶飲加山查葡子銀花做冷飲之而瘥

婦人隱疾瘍

婦人幽隱疾多有兼瘍最難識惟在診脈之人指下明白乃無差誤爾

治驗

一婦人患血淋三月矣頭面腿足俱腫六脈洪實緊盛余意血淋熱症也洪實緊盛熱脈也何乃頭面腿足驟然俱腫殆其瘍乎令其家人放腿灣瘍二十餘鍼多用清涼解毒之劑治之而瘥

一婦人患血崩其家人曰瘍也引他婦閱之果有瘍筋放之用養血和中之劑治之而愈

脚氣瘍

脚氣有因乎瘍者此慢瘍纏綿腿足或半年一年或五年十年其疾催在腿足上身氣血流通脈往往不現但兩尺脈微數有力而已凡遇維病切忌升提以防瘍若不知治瘍毒舉行腿足紅腫瘍筋一散無從可放所以四肢瘍難治

治驗

一老年人苦足底燥烈以氣血衰微所致不用藥治之悶有瘍筋初放四鍼毒氣散行腿足遂腫次日放瘍四十餘鍼其腫漸平三日又放瘍四十

餘鍼足底漸滋潤惟是日常灸痧不服藥而愈
一王姓者患腳氣腫足俱腫若有痧筋懼痛不治緣世人犯此者多故記之
耳痛痧
耳孔甚微腫痛最苦若兼痧其勢必盛治惟以痧爲先耳痛亦有驗焉
治驗
一鄭惟和左耳出膿腫痛連左太陽及肩脇俱痛右脈沉微左關細滑看痧筋刺左腿灣十餘鍼其痛遂減內用如聖散稍冷飲之外用羊糞一粒綿裹塞耳即愈
一翁左溪右耳腫痛日夜不寧脈微而緊放腿灣痧十二鍼血流紫黑用清涼至寶飲減細辛加牛膝石斛稍冷飲之而瘥
手臂痛痧
手臂有痧攻及臟腑者爲緊痧不攻臟腑者爲慢痧慢痧之症惟刺手臂緊痧之症兼服痧劑
治驗

一余右臂筋中作痛閃有痧筋刺三鍼出毒血臂痛遂愈
一高松鶴左臂疼痛醫治不應閃臂上痧筋刺四鍼出毒血不藥而愈
腫毒夾痧辨
腫毒陽者爲癰陰者爲疽往往有夾痧而發設使不先理痧單去毒亦不效也
治驗
一王姓者腰腎間白腫如盤臥不轉側痛苦萬狀將及二月余按脈弦緊而或伏曰夾痧之毒也先放其痧後理其毒逾半月出微膿而愈
一人大腿紅腫如爪先放痧而治之愈
一人左腎囊紅腫獨大先放痧而治之愈
一人小腹痛極生毒平腫白色先放痧而治之愈
一人右臂生黑疔先放痧而治之愈
一人生右腎疽大如小盤黑黑其孔數十不知痛癢發熱不食閉左腿有痧筋放之即身涼進食四日而瘥

一人生懸癰兼患雙橫痰引一善放痧者於尻尾骨上放六鍼腿灣放七鍼漸愈
一人生瘧掌瘋放痧而愈
一人大痲瘋手足拳曲其形眞可憐也閱有痧筋故記之

刺螫瘟痧

時有壯熱煩悶遍身痛如刺螫所傷鄉俗相傳名爲刺螫瘟焉以痧治之可全也

治驗

一汪雲北熱口渴胸腹迷悶以手撫摩之即如刺螫傷痛遍體皆然放腿灣痧二十餘鍼毒血成流用穿山甲天虫角刺加活血順氣之藥稍冷飲之而瘥

地衛瘟痧

時有此疾村俗相傳名爲地衛瘟者悶之亦有痧也治在前遍身腫脹痧條內故不更載治驗但恐時人或誤故復記之

痧變發斑

一林悅溪犯時疫瘟疾壯熱口渴胸腹迷悶以手撫摩之即如刺螫傷痛遍體皆然放腿灣痧二十餘鍼毒血成流用穿山甲天虫角刺加活血順氣之藥稍冷飲之而瘥

地衛瘟痧

時有此疾村俗相傳名爲地衛瘟者悶之亦有痧也治在前遍身腫脹痧條內故不更載治驗但恐時人或誤故復記之

痧變發斑

痧者凶疾也痧面發順毒氣結治尤凶之症也宜急治之遲則難救

治驗

一汪雲北熱口渴胸腹煩悶讝語神昏左脈沉微右脈欲脫痧也先服陰陽水一碗神昏少清讝語稍定然後扶起放痧乾外用赤豆水搗敷圍內吹米硼散升以穿山甲天虫角刺舟干山豆根土貝母連翹烏藥枳殼川連牛膝微冷飲之顧遂出膿些須四日而愈

急收逆症要法

症有順有險有逆險者猶可回生逆者斷難療治此不易之論也然余觀嬰兒出痘閱犯兼痧之症或難放標或倒不逆故兼痧之症不起發或當起發分顆面反隱或發痲疹或變焦黑或見飛腫或牛血泡或肉腫症不腫或下身先發面臉額不起頂不有漿或瑣碎細密或薄暗或一片如胭脂色種種逆症往往因痧毒氣血壅阻以致頑命想嘗生痘其痧隨宜用藥清血一法疏通俾散逆者可

轉面為順難標者即起者即起當藥者即藥無奈世人以痘不可救療更無生路惟茲一法可救但恐痧動痘毒內攻甚速難挽回若逆痘始現有痧即放治之甚易凡遇逆痘急宜鑒諸

治驗

一金權可女四歲十一月間痘五朝放標至足面痘猶細如芥子隱隱不發其腰下痘反有水珠色真逆痘也閱左腿灣有痧筋放一鍼手指上痧放

十五鍼俱紫黑毒血面痘立時紅活起發余看痧氣已絕惟用十神解毒湯減大腹皮加天虫大力子山查青皮一劑次日面有行漿之勢惟用養血托漿清涼解毒之藥五劑痘即如期貫膿收靨而愈

一金權可子三歲十二月間痘六朝左腰痘落有瞎窠形色如水珠其面臉痘紫赤滿頭不發厥酒漿桑虫一條反變兩顆一片如臙脂色不分顆粒左額見飛漿一粒亦逆痘也余為放指上痧二十餘鍼痘即分顆紅活余惟用痧痘四劑治之次日痘即行漿後惟用治痘常藥遂貫膿收靨而愈

一汪扶播子八歲六月間痘五朝面上肉腫痘不腫他醫謝事延余閱腿灣有痧筋放四鍼紫黑毒血成流用寶花散兼圖紅散微溫湯服次日痘即起脹後惟用大補氣血藥助貫膿收靨而愈

一褚雋甫女十二歲八月間痘四朝痲不出腎莫治延余閱指膂上痧筋放二十餘鍼用大黃丸稍冷湯飲之痲退痘起後惟用清涼解毒之藥即如期貫漿收靨乃瘳

一詹福先子六歲九月間痘四朝大渴舌心有黃黑胎腰腹大痛面部痘色焦紫過頁不發延余閱有痧筋放腿灣指頭痧二十餘鍼痛不止用細辛大黃丸清茶微冷飲之痛稍減付次石膏一劑微溫飲之痛止胎退痘漸起脹猶大便不通去川連石膏日服此湯貫膿收靨便通而愈

痛痺疾也患此者雖不即斃然往往勿獲長壽治惟疏風消痰清熱或温下元而已不知亦有瘁焉者宜辨之

治驗

一朱建溪婢犯羊癇風三年矣余診之六脈緊伏不勻間瘁筋放之付以沉香滾痰丸微温湯飲之遂愈永不再發

一盛昭先文子患猪癇風六年脈浮緊而數間瘁筋放之脈遂平付以沉香滾痰丸微温湯飲之亦不再發

麻木酸痒瘁

麻木酸痒古人論治宜道余不更述但瘁症變幻時亦有之

治驗

一翁尚景遍身麻木腿膝酸痒異常脈微而細腿足瘁四十餘鍼指頭瘁六鍼未愈付圓紅散微温湯服之用當歸金銀花連翹泰艽穿山甲末薑湯角刺紅花二劑如前服而痊

頭虛足腫瘁

世俗相傳有云男怕頭虛女怕脚腫腫膨脹治之難療也獨是頭虛之症世豈無有消風熱熱而得愈者乎不知腫因風熱乃可治效若不因風熱而虛腫實因瘁毒上攻三陽先宜放刮後用清涼引下之劑治之應無不愈無令更變出凶險別病也至若脚腫之疾婦人犯此不數年而小腿腫加之大腿亦腫漸漸入腹睡即腿足不腫內發脹悶若當起坐行動胸腹乃鬆足腿復腫如是日復一日更不數年勢必小便不利大便亦阻即成真臌愚按此因濕毒之氣蒸淫於足傷其血分變為慢瘁不由鼻吸而入故數年驟害脈亦有現有不現極悶瘁筋或在腿或在足面或在足兩旁必多刺數次出毒血為要如不愈當內服藥餌平其氣血為主大忌升發燥熱之品恐毒氣上騰也若此之瘁有患五六年而斃有患二十餘年而斃世無識者受苦甚多不可不細余故特為之著焉

治驗

一女茂甫驟患頭面紅腫心胸煩悶口渴唇焦六脉俱伏放鎗頂瘡及手指腿灣瘡二十餘鍼不愈用清涼至寶飲減細辛加石膏知母黃芩稍冷飲之三服而痊

一方士彥患頭面漸腫眉髮盡落已二年矣脉洪數而緊盛放指背瘡及兩太陽瘡二十餘鍼腿灣瘡四鍼服清涼至寶飲減薄荷細辛加穿山甲天虫烏藥續斷桑寄生紅花歸身微温飲之十服而痊

一秦馥生內室素患脚腫及腿漸升於腹夜苦心中飽悶飲食不寧日間行動足腿復腫十餘年矣診脉細數令其家人爲之數放足面及兩旁瘡用川楝子金銀花木通澤瀉梹榔澤蘭青皮枳殼烏藥連翹温飲八服遂愈

一張書膳病後足腫無力少進飲食兩尺脉伏閱足面瘡及足旁瘡腿灣瘡放之用川楝子梹榔金銀花連翹白茯苓澤瀉歸身續斷紅花白蒺藜烏藥而痊

藥而痊

黃疸瘡

黃疸之症亦痼疾也不用鮮草頭方之迅利則不效然亦有效有不效者詎黃疸有必不可治者耶蓋黃疸因內有實熱而發若瘡毒所變亦有然者務宜先施刮放後取黃疸方選擇而用自可得痊

治驗

一夏月溪目睛爪甲小便皆黃四肢上下遍體黃腫服他醫諸方不愈余診之脉微數而緊若遽脉宜補遽症宜清不可中治乃閱瘍筋放之漸鬆用麥門冬四兩猪仮油四兩煎服而痊

一婦人黃疸放瘍後用草頭方搗汁酒冲服二次而痊

小兒夜啼瘍

小兒暮夜啼哭不止父母愛之當百計撫摩憂疑無極會不得立時安靜爲憾不知胸腹疼痛故爾啼哭若曰小兒無瘍吾不信也

治驗

一朱廣甫女二歲。出痘後。忽至夜半。忽然啼哭叫跳不住。意其胸腹作痛。用子薑香油制之。痧起不藥而愈。

一汪洪皐子二歲。深啼哭。迨至清晨不歇。延余診之。兩腿灣有痧筋放一鍼。流紫黑毒血。用防風勝金湯多加麥芽稍冷飲之而安。

驚風痰熱痧

小兒犯此。惟用疏風疏風而熱不除。豁痰定驚之品。其常也。然竟有痰不消。定驚而驚益甚者。得毋審其病原。有未當乎。余嘗見此。審其症候稍雜。閒有痧焉。即以痧症治之。甚效。

治驗

一岳瑞昇幼子。發熱面赤。痰喘不已。兩目上視。困重沉沉。他醫莫治。延余。脈緊而數。先用圓紅散稍冷湯飲之。合其家人。刮痧痧起未愈。用和肿宣化。微冷飲之。遂安。

一高子聯女一歲。痰嗽身熱。手足抽搐。昏迷不醒。端莫子言。視脈不現。六脈俱伏。閒腿灣痧放一鍼至夜半。忽然啼哭叫跳不住。刮以蘆香油制之。痧起不藥而愈。又用三香散微冷湯下而痊。

死症痧

詢治痧之法。凡人犯死症。亦有可救者乎。曰有。余且無論百病死症。多有可救之實。惟據傷寒集中。有云。赤癍五死一生。黑癍十死一生。陽症見陰脈者死。陰陽毒過六七日不治。兩感傷寒者死。汗後不爲汗衰。陰證之陰陽交者死。不得汗者死。發熱脈疾躁。狂言。不能食。謂之三死。咳逆不止者死。厥結者死。厥陰舌卷囊縮者死。脈代者死。少陰吐利。煩燥四逆者死。結胸症悉具。煩躁者死。發熱至七八日。膚冷而躁無時暫安。曰厥厥不治。少陽與陽明合。汗不和。脈長大而弦。名曰負。負者死。陰陽易病。頭重眼花。四肢拘急。小腹紋痛。手足攣痛者死。脈陰陽俱虛。熱不止者死。傷寒七八日已上。大發熱者難治。溲便遺失者死。循衣摸脉。邪熱內結。脈弦滿者死。喘而不休者死。衆汗發黃者死。鼻如煙煤者死。唇吻反青者死。環口黧黑者死。此等之症。往往兼痧。已前治驗。歷歷

有據然余所救者甚多難以悉數但人犯死症如落深淵利在見之晉救之急爾

羊毛瘟瘧

此瘧言遠先生道之甚悉所以垂救世人多矣余實未見不敢妄論近又聞丹徒袁兄所述自北方來親見此症胸前生羊毛數莖北人又有用銅錢置病所以艾火燒錢上外將瓦鑵或竹鑵盒之即時收出汗水而愈北人名爲打火鑵併能治瘧痛是也抑又聞北方人用手推背上二筋撮起揑緊一時許亦能治

瘧痛此二法余雖未經驗若爲之想亦有益無損故併誌之以爲窮荒僻野無醫療治者一生路焉

瘧脹破迷論

瘧中禁忌余慮不知瘧慢犯之尤慮知瘧而識所忌譬若昏夜迷塗高低莫辨縱步於岩谷間鮮不顛仆者矣蓋瘧受病與雜症不同見端與雜症相類病家不信以雜症治之勿顧瘧中禁忌勢必日甚一日病入膏肓即有進言刮放一試焉無及矣則受迷於瘧服之始者此其一也亦有始即知瘧稱用刮放便謂業既治瘧當用別藥幸而不犯瘧禁或可收功若瘧氣未絕一犯所忌愈服愈危身命難保乃曰非因瘧脹之故則受迷於瘧脹之終有此其一也又有瘧不識

用別藥不效因而僅用刮放不作以治瘧之劑或僅投一二劑復投別症之藥致瘧患復發茫然不覺乃曰治瘧無效不足信也不知治瘧用藥稍或不合勢必瘧毒內攻而斃則始終受迷於瘧脹之害者又其一更不特如是已也或瘧症有時汗出如油誤服酸斂之方或瘧症有時足冷過膝悞服香燥濇滯之類或瘧品或瘧症有時上嘔下瀉誤服香薷桂之症有時惡寒畏冷誤服薑椒辛辣之物更有瘧症變爲脈虛誤用溫補之藥瘧症變爲脈旺誤用冰寒之藥或瘧症變爲怪脈雖不皆生然誤認必死棄而不救而且瘧症常似氣虛誤用參芪苓朮以補氣嘗似血虛誤用熟地何首烏以補血而且瘧多死症凶險非常不復細審病源以爲別症將斃而且瘧症罕鬆食物太蚤因而瘧物相裹結於心胸難以解散而且

痧症未絕痧毒尚存驟飲熱湯熱酒遂致痧症復發內危莫過每有變在頃刻悔之無及此等受連皆余所目擊而心傷者也若乃有見痧諱言痧犯痧惡言痧雖死於痧勿知爲痧之害者其天之所限乎余固不得而強之也倘觀醫林多士業擅岐黃深通古籍者動輒援引內經諄諄不已竟不知黃帝始製九鍼之法以療民病多刺少藥即如內經有云諸瘧而脈不見刺十指間出血血去必已先視身之赤如小豆者盡取之又云先其發時如食頃而刺之一刺則衰二刺則知三刺則已不已刺舌下兩脈出血不已刺郄中盛經出血又刺項已下俠脊者必已如先頭痛及重者先刺頭上及兩額兩眉間出血先項背痛者先刺之先腰脊痛者先刺郄中出血先手臂痛者先刺手少陰陽明十指間先足脛痠痛者先刺足陽明十指間出血又如腰痛引頭脊尻背如重狀刺其郄中太陽正經出血刺解脈在膝筋肉分間郄外廉之横脈出血血止解脈令人腰痛如引帶如折腰狀善恐刺解脈在郄中結絡如黍米刺之血射以黑見赤血而已經載煌煌垂訓萬古正後人之所當祖習者也故痧多變余不能盡述兒在爾所不信者試於清夜思之苟遇斯疾倘衷心迷當刺不刺當藥不藥或誤人或誤已彼此不與諒有同心慎之慎之